







হোমিওপ্যাথিক  
নবঔষধাবলী

অর্থাৎ  
নূতন ঔষধের বিবরণ, লক্ষণ, শারীরিক  
প্রয়োগাদি সম্বলিত

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

তৃতীয় সংস্করণ।

৩ হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক সংকলিত।

A  
MANUAL  
OF  
MATERIA MEDICA  
AND  
SPECIAL THERAPEUTICS  
of the  
NEW REMEDIES.  
IN BENGALI.

Published by  
CHARU BRATA ROY.  
LAHIRI & CO.

College Street, Calcutta.





হোমিওপ্যাথিক  
নবঔষধাবলী

অর্থাৎ

নূতন ঔষধের বিবরণ, লক্ষণ ও আময়িক  
প্রয়োগাদি সম্বলিত

ভৈষজ্য-তত্ত্ব ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

৬ হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক সংকলিত ।

**MANUAL**  
OF  
**MATERIA MEDICA**  
AND  
**SPECIAL THERAPEUTICS**  
of the  
**NEW REMEDIES.**  
**IN BENGALI.**

**Dacca**  
JAROATULI—JANHABI-PRESS.

*Printed by Bhupati Mohan Dey.*

1914.

[ *All Right Reserved.* ]

মূল্য তিনথণ্ড একত্রে ৮ টাকা ।



## তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

নবঔষধাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এসংস্করণে পুস্তকের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই । পূর্ব সংস্করণের ছায় ডাঃ হানসেনের “রেম্মার রেমিডিস” নামক পুস্তকের অনুবাদ “বিরল ঔষধাবলী” নামে এবারও নবঔষধাবলীর পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া গ্রন্থথানিকে “ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার” তৃতীয় খণ্ড স্বরূপ প্রকাশ করিলাম । আশাকরি, এইরূপ সংযোজন ও পরিবর্তনে বঙ্গীয় চিকিৎসক, ছাত্র ও গৃহস্থের সকল অভাব বিদূরিত হইবে । পূর্ব সংস্করণে ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকার মূল্য ৭।০ টাকা ছিল । এ সংস্করণে ২। টাকা মূল্যের এই গ্রন্থ উহার সহিত সংযোজিত হইলেও গ্রাহক বর্গের সুবিধার নিমিত্ত সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৯।০ টাকা স্থলে ৮। টাকা মাত্র ধার্য করা গেল । এখন হইতে নবঔষধাবলী আর পৃথক বিক্রীত হইবে না । ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকার পরিশিষ্ট স্বরূপ উহারই ৩য় খণ্ডরূপে একত্র বিক্রীত হইবে । আশা করি এই পরিবর্তনে পুস্তক পানি মর্দাঙ্গ সুন্দর ও গ্রাহক বর্গের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে ।

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়

নবাবপুর, ঢাকা ।

জ্যৈষ্ঠ । ১৩২১ ।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ।

## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

নবঔষধাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এসংস্করণে পূর্ব সংস্করণের ঔষধগুলি বর্ণানুক্রমে বিদ্রুত, পরিমার্জিত, পরিবর্তিত, ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । অনেক গুলি নূতন ঔষধ নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । প্রায় শত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে । ডাঃ হানসেনের “রেম্মার রেমিডিস” নামক পুস্তকের অনুবাদ “বিরল ঔষধাবলী” নামে এবার নবঔষধাবলীর পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে । তাঁহার পুস্তকের যে ঔষধ গুলি নবঔষধাবলীতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহা অবশ্যই পরিশিষ্টে আর পুনরুল্লেখিত হয় নাই । হানসেন চারিবারের পরিশ্রম করিয়া অনেক গুলি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পড়িয়া এই ঔষধ গুলি সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ডাঃ কাউপার থোয়েটের বিখ্যাত ভৈষজ্য-তত্ত্বের পরিশিষ্টরূপে উহা প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা তাঁহার পরিশ্রমের ফল নবঔষধাবলীর পরিশিষ্টরূপে বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম । ভরসা করি, এই সকল পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনে নবঔষধাবলী এবার পাঠক দিগের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে ।

বৈশাখ । ১৩১২ ।

প্রণেতা ।



## নবঔষধাবলীর সূচীপত্র ।

অকজেলিকম এসিডম ...	১	এম্বুসাইনম ...	৪২	কিউরোর	.. ৯৭
অরম আসিনিওসম ...	৪	এপোসাইনম এণ্ডোসেমিকো-		কুইব্রেকো.	.. ১০০
অরিএট শোডি ক্লোরিডম	৫	লিয়ম	৪৩	কোকা	.. ১০০
অরিগেনম ভলগেয়ার ...	৬	এপোমক'ইনম	৪৪	কোডিন	.. ১০৪
অসমিয়ম ...	৮	এবসিহিয়ম ...	৪৪	গ্রিঙিলিয়া	.. ১১৩
আরেনিয়া ডায়েডেমা ...	১০	এবিস ক্যানেডেলিস	৪৬	চিওনাহস বার্জিনিকা	.. ১১৫
আর্কশিয়ম ল্যাপা ...	১২	এবিস নাইগ্রা	৪৮	চিনিম আসে'নিকোসম	.. ১১৬
আর্টিমিসিয়া ভলগারিস	১৩	এমিল নাইট্রাইট	৫০	চিলোন গ্রাত্রা	.. ১২০
আসে'নিওট অব আয়রণ	১৪	এরম ড্রেকোনাইটম	৫৪	জগলাস'সাইনিরিয়	.. ১২০
— — স্ট্র'কনিয়া ...	১৫	এরেলিয়া রেসিমোসা	৫৬	জাগারাণ্ডা	.. ১২২
— — এটিমণি ...	১৫	এলিট্রিস ফেরিনোসা ...	৫৮	জিজিয়া অরিয়	.. ১২৩
ইউক্যালিপ্টস ...	১৬	এলট্রোনিয়া কনস্ট্রিক্টা ...	৫৮	জিজিয়ার	.. ১২৫
ইউক্লা ফিলেমেণ্টোসা ...	২০	এল্লিরিয়াস রুবেন্স ...	৫৯	জিম্নোক্রেডস	.. ১২৭
ইউনিমস এট্রোপারপিউরিস		এম্পারেগস	.. ৬০	জিরেনিয়ম	.. ১২৭
...	২১	এসক্লিপিয়াস কণিউটাই	৬১	জেবোরাণ্ডী	.. ১২৮
ইউক্লবিয়ম ...	২২	এসক্লিপিয়াস টিউবরোসা	৬৩	জ্যাট্রোফা	.. ১৩১
ইউক্লবিয়া করোলেটা	২৫	ওপনিসিয়া ভলগারিস ...	৬৬	জ্যাছোকজাইলম	.. ১৩২
ইণ্ডিগো ...	২৬	ওলিয়ম ক্যাজুপটা ...	৬৭	টাররা এক্সোডিসিয়েকা	১৩৬
ইনাছি ক্রোকেটা ...	২৭	ওলিয়ম জেকরিস এসেলাই	৬৯	টিউবার কিউলাইনম	.. ১৩৯
ইরিওডিস্টন কালিকর্শিকম	২৯	ওলিয়ম রিসিনি	৭৯	টিলিয়া ট্রিফোলিয়েটা ...	১৪২
ইরেকথাইটিস ...	৩১	ওলিয়ম স্তাণ্টেলম	৮০	টেব্রেটিউলা হিম্পেনিকা	১৪৪
ইরিজিয়ম একোয়াটিকম	৩৩	ককস ক্যাটাই	৮১	ট্রিফলিয়ম পার্ফোলিয়েটম	১৪৮
ইল্লাটেরিয়ম ...	৩৪	কণ্ডুরাডো	৮৫	ডিপথিরিনম	.. ১৫০
ইলাপ্স ...	৩৪	কনভেলেরিয়া	৮৫	ডোরিকোরা	.. ১৫১
ইক্টিউলস গ্রাত্রা ...	৩৬	কমোক্রেডিয়া ডেন্টেটা	৮৬	ডোলিকোস	.. ১৫১
একেলাইফা ইণ্ডিকা ...	৩৭	কর্পস সারসিনেটা	৮৯	থিরিডিয়ন	.. ১৫২
এক্টিয়া স্পিকেটা ...	৩৮	কর্পস ফ্লোরিডা	৯২	থ্যাপসিবাস'র্সা	.. ১৫৬
এগেভ এমেরিকানা ...	৩৯	কসমোলিন	৯৩	নাজা	.. ১৫৭
এম্বুজিয়া ...	৩৯	কার্ডিউ মেরিএনেস	৯৪	লুফার	.. ১৬১
এনোথিয়া ...	৪১	কিউবেবা ...	৯৭	নেফেলিয়ম	.. ১৬৪

ড্রাইম আসে নিকটম ... ১৬৪	ক্রোমাইড অব ক্যালসিয়াম ২৩০	লাইকোপস ... ২৭৮
পপিউলস ... ১৬৭	— — মারকিউরি ... ২৩১	লাইনেনরিয়া ... ২৮১
পলিগোনম ... ১৬৮	— — আয়রণ ... ২৩১	লাইসিন ... ২৮২
পলিনিয়া ... ১৭২	— — নিকেল ... ২৩২	লেপিস এম্বস ... ২৮৩
পলিপোরস ... ১৭৩	— — লিথিয়ম ... ২৩২	ল্যাক ডিক্লোরেটম ... ২৮৫
পলিমোনিয়া ... ১৭৭	— — জিঙ্ক ... ২৩২	ল্যাক ক্যানাইনম ... ২৮৬
পাইপার মিথিলিকম ... ১৭৭	— — কুইনাইন ... ২৩৩	ল্যাক্টুকা ভিরোসা ... ২৮৮
পাইরোজেন ... ১৮৩	— — সোডিয়ম ... ২৩৩	ষ্টিলিক্সিয়া ... ২৯০
পারিস কোয়াণ্ড্রিফোলিয়া ১৮৫	ভাইপারা ... ২৩৩	সম্বল ... ২৯২
পিওনিয়া ... ১৮৭	আইবার্গম ... ২৩৪	সাইপ্রিপিডিয়ম ... ২৯৪
পিঙ্কলিকুইডা ... ১৮৭	ভিনকা মাইনর ... ২৩৭	সায়েনাইড অব পটাসিয়ম ২৯৬
পিক্রিকম এসিডম ... ১৮৮	ভিস্কম ... ২৩৯	সায়েনিউরেট অব মারকিউরি ... ২৯৯
পেট্রোসিলিনম ... ১৯২	ভেরিওলাইনঃম ... ২৪২	সারাসিনিয়া ... ৩০২
পেছোরম ... ১৯২	মাইগেল ... ২৪২	সিনেমোনম ... ৩০৩
পেরারা ব্রেবা ... ১৯৩	মার্টস কমিউনিস ... ২৪৫	সিফিলাইনম ... ৩০৪
প্লানস স্পিনোসা ... ১৯৪	মিচেল্লা ... ২৪৬	সিম্ফাইটম ... ৩০৫
প্লাটেগো মেজর ... ১৯৫	মিনি এল্টিস ... ২৪৭	সিয়েনোথস ... ৩০৫
কর্মিকা ... ২০৪	মিফাইটিস ... ২৪৯	সিরেসস ... ৩০৭
ফাইজোপ্টিগমা ... ২০৬	মিরিকা ... ২৫১	সিলফিয়ম ... ৩০৮
কিউকাস ... ২১২	মেডোরাইনঃম ... ২৫৪	স্ট্রাটোনিম ... ৩০৯
কেলেণ্ড্রিয়ম ... ২১৩	মেছা পিপারিটা ... ২৫৮	স্ট্রালিসিলিক এসিড ... ৩১৩
বিউকো ... ২১৪	মেলিলোটস ... ২৫৮	স্ট্রেলেরিয়া ... ৩১৮
বেজোয়েট অব এমোনিয়া ২১৬	ম্যানসিনেলা ... ২৬৭	স্ট্রুইলা ... ৩২০
ব্যাডাইএগা ... ২১৮	ম্যালেরিয়া অফিসিভালিস ২৬২	হাইড্রোকোটাইল ... ৩২১
ব্যারসমা ক্রিনেটস ... ২২০	রসভেনেনেটা ... ২৬৫	হাইপোকসফাইট অব লাইম ... ৩২২
ব্যালসেমম পেরুভিয়ানম ২২১	রস গ্লাবরম ... ২৬৯	হিডিওমা ... ৩২৪
ব্রাকিলটিস ... ২২৩	রস এরোমেটিকা ... ২৭০	হিপেটিকা ... ৩২৫
ক্রোমাইডস ... ২২৪	রাটানহিয়া ... ২৭১	(১৭৭) হেক্সালাভা ... ৩২৫
ক্রোমাইড অব এমোনিয়া ২২৫	রিসিনস কমিউনিস ... ২৭২	
— ক্যানফর ... ২২৮	রোবিনা ... ২৭৭	

# হোমিওপ্যাথিক নবঔষধাবলী

অকজেলিকম এসিডম—অকজেলিক এসিড ।

ঔষধার্থে অকজেলিক এসিডের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার অকজেলিক এসিডের প্রবল ক্রিয়া দর্শে, ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রভাবে গতিশক্তি-বিধায়ক স্নায়ু-কেন্দ্রের পক্ষাঘাত জন্মে এবং কখন কখন মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মধ্য-দণ্ডের ( এক্সিস ) ক্রিয়া-শক্তি বিধ্বংস হইয়া সহসা জীবন বিনষ্ট হয় । এতদ্বারা বক্ষঃস্থলের পেশীর বিশিষ্টরূপ আক্ষিপ্ত অবস্থা, অঙ্গের শুষ্কতা, এবং স্পর্শ-জ্ঞানের বিলোপ, স্নায়ু-শূল ও পক্ষাঘাতের লক্ষণও উৎপন্ন হয় । অকজেলিক এসিডের ক্রিয়ায় শ্বাস-যন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহিত অবস্থা জন্মে, এবং বৃহৎ স্নায়ু, ইহার উপদাহ-জনক বিত্তমানতা নিবন্ধন, অন্ন-পথের শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হয় ।

প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

পৃষ্ঠবংশের রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় । কটি ও কুচকীতে দুর্বলতা ও অবশতা, জজ্বার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত উর্হার প্রসারণ, এবং পৃষ্ঠে অবশতা সহকারে পৃষ্ঠবংশের কোমলতা । সমগ্র পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া তীব্র প্রাদাহিক বেদনা সহকারে পৃষ্ঠবংশীয় মিনিগ্রাইটিস । অঙ্গের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রবল সঞ্চরমান বেদনা, শ্বাস-ক্লচ্ছ ও অবশতা, এবং এই ঔষধের লক্ষণ সংযুক্ত লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া । পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রদাহ জনিত পক্ষাঘাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুষ্কতা ; শ্বাস-কেন্দ্রের আবেশ ।—এই সকল রোগে ইহার ব্যবহার হয় । এই ঔষধের পৃষ্ঠবংশের তরুণ লক্ষণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় । স্ফীতির সন্ধিস্থানের নিম্ন হইতে কটি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ কর্ভনবৎ বেদনা বিশিষ্ট পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-শূল । বাম ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে তীব্র সঞ্চরমান বেদনা, শ্বাস-ক্লচ্ছ, সবলে নির্গত প্রশ্বাস ; পৃষ্ঠের অবশতা ও দুর্বলতা, জজ্বার শীতলতা ও শক্তিশূন্যতা, ইত্যাদি দৃশ্যে



হৃৎশূল রোগে এই ঔষধের কলদায়কতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাত্রিতে শয়নান্তে হৃৎকল।  
বাম ফুসফুসের ভূমিদেহে রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহের অবস্থিতি। রক্তবাহী নাড়ীর দ্বায়-শূল  
চিড়িক-মারা বেদনা। পৃষ্ঠবংশের লক্ষণ সংযুক্ত রঞ্জোহীনতা। দেহ-শাখার বিশেষ  
লক্ষণ বিশিষ্ট অকজেলিউরিয়া। আমবাতিরিক গাউট, মিষ্ট্রব্য আহারে বেদনার বৃদ্ধি  
ককি পানের অব্যবহিত পরেই অতিদার। রক্তাতিসার। আমাশয়ান্তের প্রদাহ।  
আমাশয়-শূল। \* রাত্রিতে বিবন্ধিত কাস, তৎসহ বিবন্ধিমা ও পৃষ্ঠে বেদনা (রডক)।  
উদর-বেদনা সহকারে গলাজ্বলা (মুর)। হৃৎপিণ্ডের বিশ্লেণাসহ দায়বীর স্বর-নাশ  
(এফোনিয়া)।—এই সকল রোগেও অকজেলিক এসিডের প্রয়োগ হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনোভাব সমবেত করিতে শক্তির খর্বতা। অতিশয় উল্লাসিততা, চিন্তা ও  
কাণ্ডের দ্রুততরতা (কফি)। রোগিনী বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই উহার প্রত্যাবৃতি  
(ব্যার)।

মস্তক।—শিরোধূর্ন, শয়ন করিলে আন্দোলন অসুভব। মস্তকে শূন্যতা অসুভব;  
মূচ্ছাকল্পতা অসুভব, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত রক্ত সরিয়া পড়িয়াছে। কপালে  
ও মস্তকের শিখর-দেশে অহুগ্র, ভারাক্রান্ত শিরঃশীড়া। প্রতিকর্ণের পশ্চাতে পের্ট আঁটার  
স্থান মস্তকে আকৃষ্ট।

চক্ষু।—পড়িবার সময় অক্ষরের অপরিস্ফুটতা। শিরোধূর্ন ও ঘর্ষ সহকারে অন্ধকার  
দর্শন (আধার দেখা)। দুই চক্ষু-কোটরেই বেদনা; বামেরটায় আধিক্য।

নাসিকা।—হাঁচি; জলবৎ শর্কী। ০ নাকের দক্ষিণ পার্শ্বের আরক্ত, চিকণ ক্ষীততা,  
নাসাগ্রে উহার আরম্ভ (বেল); তৎসহকারে নাসিকার উদ্বেদ।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর ও সীস বর্ণ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে উত্তাপ অসুভব। পূর্ণতা  
অসুভব; শ্বাসমণ্ডলের অধিকতর আরক্ততা। শীতল ঘর্ষে আচ্ছন্নতা (ট্যাবে, ভিরে)।

মুখ-মধ্য।—মাড়ি হইতে রক্ত-পাত ঐ উহার স্থানে স্থানে বেদনা। মাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
ক্ষত। জিহবার ক্ষীততা, অসুভবাধিক্য, আরক্ততা, শুষ্কতা, জ্বালা; শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ সহকারে  
ক্ষীততা। মুখে অন্ন আবাদ (ক্যাক, মাগ-কা, নক্স)। প্রচুর লাল-শ্রাব (\* আইও,  
\* মার্ক, \* নাই-এসি)।

গল-মধ্য।—গলার মধ্যে ও আমাশয়ে জ্বালা। গলায় হাঁজিয়া ও টাচিয়া যাওয়ার স্থান  
অসুভব; গাঢ় শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গিলিতে আয়াস ও যাতনা।

আমাশয়।—ক্ষুধার বৃদ্ধি; স্বাদাভাব সহ ক্ষুধার অবর্তমানতা। শিরোধূর্ন,  
ক্ষুধাশূন্যতা, বিবন্ধিমা ও উদর-বেদনা সহকারে পিপাসা। বুকজ্বালা; সন্ধ্যাকালে উহার  
অতিশয়। শূন্য বা অন্ন উল্কার; প্রতিবারই আহারের পরে স্বাদশূন্য বাতোধার।

বারবার হিকা (ইমে, হাইও)। বিবিম্বা ও বারবার বমন। শূন্যদরতা অল্পভব, তক্ত্ত আহার করার আবশ্যকতা। আমাশয়-গহ্বরে প্রবল প্রচাপনী বেদনা। আমাশয়-গহ্বরে জালা (আস, \* কলচি, মার্ক-কর)। আমাশয়ে স্পর্শ-দেব; বৎসামাত্র স্পর্শে দারুণ বেদনার উৎপত্তি।

উদর।—বহুতে হুচী-বেদন; গভীর শ্বাসগ্রহণে উহার উপশম। বাম কুক্ষিতে ক্রমাগত স্তব্ধ বেদনা; হুচী বেদন। নাভীর নিকটে উদর-বেদনা (কলোস); আমাশয়ে বায়ু নিঃসরণ। উদরে জালা ও বেদনা।

মল।—অধিশ্রান্ত অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ। মলিন, কাদা কাদা, প্রভূত মল; আম ও রক্তমিশ্র মল। ০ কফি পানু করিবামাত্র অতিসার। ০ শয়ন করিলে অতিসারের প্রত্যাবৃতি। সরলাস্ত্রে প্রচাপন ও কুহন। কোষ্ঠবন্ধ।

মূত্র-যন্ত্র।—বৃক্ক-প্রদেশে বেদনা। খড়ের ত্রায় জরদ রং, পরিষ্কার, প্রচুর, পুনঃ পুনঃ পরিত্যক্ত মূত্র; অক্লজেলিউরিয়া। বিদাহী বিন্দুর ত্রায় মূত্র-মার্গে জালা। মূত্রত্যাগ-কালে লিঙ্গমণিতে বেদনা।

জননেদ্রিয়।—সন্তোগ-লিম্বার অতিশয় আধিক্য। অশ্রীল স্বপ্ন সহকারে রাত্রিতে স্বপ্ন দোয়। অগুণকোষ ভারী ও স্তব্ধ অল্পভূত হয়; শুক্রবাহী নাড়ীতে সঞ্চরমান বেদনা (ক্লিম, স্পঞ্জ)।

শ্বাস-যন্ত্র।—কথা বলিবার সময় স্বরভঙ্গ ও স্বরবন্ধে স্লেচ্ছাশ্রুতব। প্রবল পরিশ্রমে অধিশ্রান্ত শুষ্ক কাশ। স্বরবন্ধে আকুঞ্চনী বেদনা, ও হাঁস ফাঁস সহকারে শ্বাস-কষ্ট; দক্ষিণ পাশ্বে দিক বাতনার আতিশয়; ০ হৃৎশূল। আক্লিষ্ট শ্বাস। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছন্দতা সহকারে হ্রস্ব, দ্রুত শ্বাসের আবেশ। বাম ফুসফুসে ও হৃৎপিণ্ডে সঞ্চরমান তীব্র বেদনা, উদরোর্দ্ধ পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ; ০ হৃৎশূল। বক্ষঃস্থলে অতীব, ভারী, ক্ষতবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে সঞ্চরমান বেদনা। হৃৎপিণ্ডের অবিরত ফরফর ও স্পন্দন। নাড়ীত দ্রুততার আধিক্য, গ্রোয় অপ্রাপ্যতা, তৎসহ গাত্রের শীতলতা ও আঁঠা আঁঠা বর্ষাদি (\* ট্যাবে, \* ভিরে)।

গ্রোবা ও পৃষ্ঠ।—উভয় স্ক্কাস্থির মধ্যে স্ক্কাস্থির স্ফ্রাণের নিম্নে, মাজা পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা; স্তব্ধ অল্পভব, বাম স্ক্কাস্থির অগ্রভাগের নীচে উহার আধিক্য, তৎসহ স্তব্ধতা। বক্ষঃস্থল হইতে স্ক্কাস্থি পর্য্যন্ত হুচী-বেধ। পৃষ্ঠে তরুণ বেদনা, ক্রমশঃ উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ, ও অতিশয় বাতনা; অবস্থান পরিবর্তন করিয়া শান্তি লাভের চেষ্টা। কটিতে ও কুচকীতে দুর্বলতা, পদদ্বয় পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; শরীর ধারণে পৃষ্ঠের অতিরিক্ত দৌর্বল্য অল্পভূত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক প্রকার অল্পভব অবশ্যতা অল্পভব। ০ আমাশয়িক

গাউট রোগে বেদনা, মিষ্টদ্রব্য আহারে উহার বৃদ্ধি । **উদ্ভাস** ।—কক্ষ হইতে হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবশতা । বাহুদ্বয়ে সূতীভ্র, শস্ত্র-কর্তনবৎ বেদনা ; ০ হৃৎশূল ; দক্ষিণ মণিবন্ধে মচকিয়া ঝাওয়ার ঞায় বেদনা ; উহা প্রসারণের প্রবৃত্তি ; কিছু ধরিতে পারা যায় না । হস্তদ্বয় ঝারী ; ও নৃতবৎ শীতল ; অমুভূত হয় । হস্তাঙ্গুলী ও নখের সীস-বর্ণ ; অঙ্গুলীর আকস্মিক আকর্ষণ । **নিম্নাঙ্গ** ।—নিম্নাঙ্গের নীলাঙ্গতা, শীতলতা, ও প্রায় সম্যক অচলতা । উরুতে অবশতা ও স্রুড়স্রুড়ি অথবা কণ্টক-বেধন । নিম্নাঙ্গের পঙ্গুতা ও স্তম্ভতা । নিম্নাঙ্গের অবশতা ও শ্রান্তি, ফিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে কষ্ট । বাম জাহুর বহির্দিকের কণ্ডরায় প্রবল সঙ্কোচনী বেদনা ।

**দেহ** ।—প্রায় পক্ষাঘাতের অনুরূপ এক প্রকার বিশেষ অবশতা । থাকিয়া থাকিয়া লক্ষণ সকলের প্রত্যাবৃত্তি ; কতিপয় ঘটিকা বা এক দিবস বিরাম । \* \* সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা । \* কেবল কয়েক সেকেন্ড কাল উহার অবস্থিতি, \* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ, কল্পকালস্থায়ী সূচী-বেধের ঞায়, উৎক্ষেপবৎ বেদনা ।

**ত্বক** ।—ক্ষৌরকালে ঘর্ষণ জনিত উত্তপ্ততার ঞায় অমুভব । ত্বকে গোলাকার তালির ঞায় বিচিত্র চিহ্ন ।

**নিদ্রা** ।—জন্তুণ ; দিবাভাগে নিদ্রালুতা । রাত্রিতে স্বংকম্প সহকারে জাগরণ ।

**জ্বর** ।—হাঁচি সংযুক্ত শীত । আরক্ত বদন সহ কম্পকর শীত । পৃষ্ঠবংশের উপরে কীট-চারণায় ঞায় শীত । প্রত্যেকবার উত্তাপ । ঘর্ম্ম সহকারে তাপাবেশ । শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম ।

**উপচয়** ।—রোগের লক্ষণ ও বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে উহার প্রত্যাবৃত্তি ( বারী ) ; চিনি, কফি, ও সুরা সেবনে বৃদ্ধি ।

**উপশম** ।—বিমুক্ত বায়ুতে উপশম ( \* পলস ) ।

**সমগুণ** ।—আর্স, মার্ক-কর ।

## অরম আর্সিনিওসম — আর্সিনিয়েট অব গোল্ড ।

আর্সেনিক ও অরম মিশ্রিত এই নূতন ঔষধের তদ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় । \* নিম্নলিখিত রোগে ইহা ব্যবহার্য্য । মূত্ৰাভয় সংযুক্ত আয়ুহত্যা প্রবৃত্তিবিপ্লিষ্ট উন্মাদ অর্থাৎ গভীর বিবাদ বসন্ত আয়ুহত্যা করিবার প্রবল প্রবৃত্তি অথচ মরিতে অতিশয় ভয় ও ঝুঁকণ্ডা লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । উপদংশজনিত পুরাতন শিরঃশ্লিড়া, অস্থিপুতি ( নিক্রোসিস ), অস্থিবেষ্টপ্রদাহ ( পেরিঅষ্টাইটিস ), পুতিনম্র ( ওজিনা ) প্রভৃতি রোগে অরম জ্ঞাপক যন্ত্রণাপ্রদ অস্থিবেদনা ও আর্সেনিক স্তম্ভক তীব্র নায়বীর

বেদনা সমবেত থাকিলে এবং আইওডাইড অব পোটাস বিফল হইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ । মুখমণ্ডল, নাসিকা, ও জরায়ুর ককট রোগ ( ক্যানসার ) এবং অস্থপথের ম্যালিগন্যান্ট ( দূষিত ) রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইতে পারে । এপ্রকার অমেকগুলি পুরাতন রোগ আছে যাহাতে অরম ও আসৈনিক উভয় ঔষধের লক্ষণই প্রকাশ পায় এবং ইহাদের কোনটাই ব্যবহার করিতে হইবে চিকিৎসক তাহা ঠিক করিতে পারেন না । এই সকল রোগে এই মিশ্র-ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । ডাঃ ম্যাসার্ট ইহা ক্যানসার ও যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । ইটালী ও আমেরিকায় চিকিৎসকগণ গণ্ডমালা জনিত লুপ্স প্রভৃতি রোগে ইহার বিলক্ষণ উপকারীতা স্বীকার করেন । এই ঔষধের ক্রিয়ায় প্রথমে আমাশয় ও অস্ত্রের সঙ্কোচন ক্রিয়া উত্তেজিত হইয়া আচুষণ-ক্রিয়ার অতিশয় সম্ভবতা জন্মে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, তৎপরে পরিপোষণ-ক্রিয়ার উৎকর্ষ জন্মিয়া নানাপ্রকার এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগে ফল দর্শে । হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিকারজনিত রোগেও ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করেন । ইহার তৃতীয় দশমিক হইতে ষষ্ঠ দশমিকক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

## অরিএট সোডিক্লোরিডম—ক্লোরাইড অব গোল্ড ও সোডিয়ম ।

ঔষধার্থে স্বর্ণের যে সকল প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে ক্লোরাইড অব গোল্ড ও সোডিয়ম সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন । বিষমাত্রায় এতদ্বারা প্রবল আমাশয়স্ব-প্রদাহ ও তৎসহ খল্লী, আক্ষেপিক কম্পন, অনিদ্রা, কামোদ্দাদ, অচৈতন্য, ও অত্যন্ত গুরুতর লক্ষণ উৎপন্ন হয় । মল-কূচ্ছ ।—অতিমাত্রায় ইহাতে আমাশয়দৌর্ভেদে বেদনা, বিবমিষা, ক্ষুধাহীনতা, ও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে । এই কোষ্ঠরোধে অস্ত্রের গ্রন্থি হইতে আমশ্রাব লক্ষণ থাকে । অতএব অস্ত্রের আমশ্রাব সম্বলিত কোষ্ঠবদ্ধতায় হাইড্রাষ্টিয়ার ন্যায় এই ঔষধও উপকারী । অগ্নিমান্দ্য ।—বিষাদ ; মৃত্যুর ইচ্ছা ; আরক্ত চিকণ জিহ্বা ; আহারান্তে আমাশয়ের বামপার্শ্বে জ্বালাকর আকুষ্ঠবৎ চাপক বেদন ; আহারান্তে অতিসার ; এই সকল লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় অগ্নিমান্দ্যে এই স্বর্ণ ফলপ্রদ । উপদংশ ।—পারদ অপব্যবহারের পর, অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় নাসিকার অস্থি আক্রান্ত, কিংবা গলায় ক্ষত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয় । জননেন্দ্রিয়ের রোগ ।—স্বর্ণের মুখ্যক্রিয়া বশতঃ গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের রক্তসঞ্চয় জনিত উপদাহ জন্মে ও ঐ উপদাহ অপ্রবল জরায়ুপ্রদাহ, ডিম্বাশয়প্রদাহ, অকালে প্রভূত রক্তশ্রাব, অভ্যন্ত গর্ভশ্রাব, কামোদ্দাদ এবং জরায়ুর ক্ষত প্রভৃতিতে পরিণত হয়, অতএব এই সকল রোগে ইহার ষষ্ঠক্রমের বিচূর্ণ ও তদুৎকর্ষ ব্যবহার করা যায় । স্বর্ণের গৌণক্রিয়ায় দৌণ্ড্যজনিত রক্তোপাংশ, স্বপ্ন ও বিলম্বিত রক্ত,

সঙ্গম-প্রবৃত্তির ক্ষীণতা, ডিবাশনের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ বন্ধ্যাত্ব, ডিবাশনিক শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি নিম্নক্রমে অর্থাৎ প্রথম শততমিক হইতে তৃতীয় শততমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া এই সকল পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি কামোদ্দীপনা, ডিবাশন-প্রদাহ, আমাশয় ও অন্ত্রের উপদাহ, এবং আত্মহত্যার প্রবৃত্তি লক্ষণাপন্ন স্থতিকোন্মাদ রোগে ও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। পুরুষেও স্বর্ণ এতৎসদৃশ লক্ষণ জন্মায় এবং মুখ্যতঃ (অত্যন্ত অল্প মাত্রায়) ইহা রক্তাধিকাজনিত জননেক্রিয়ের উত্তেজনায়, স্বপ্নাবহাঙ্ক শুক্রশ্রাব, ও প্রবল লিম্বোড্রেকারিতে ব্যবহৃত হয়। গোণতঃ অধিক মাত্রায় (২৫ হইতে ৩৫, প্রত্যহ তিনবার) সঙ্গমশক্তির ক্ষীণতা; দিবাভাগে শুক্রশ্রাব অথবা রাত্রিকালে স্বপ্ন ব্যতীত, ক্ষীণ উদ্বেকে রতঃপাত; ক্ষীণ উদ্বেক বশতঃ সংসর্গে অসামর্থ্য; জননেক্রিয়ের উপদাহিতা, ও সঙ্গমকালে শীঘ্র শুক্রনিঃসরণ প্রভৃতি আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ামের ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। ব্রোমাইড অব পোটাস বখন অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক তখন ইহা অল্পমাত্রায়, এবং পোটাস বখন অল্পমাত্রায় তখন এই স্বর্ণ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। ইহার এক গ্রেণ, এক আউন্স পরিস্কৃত জলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচবিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করা যায়। বিবাদ আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিধিষ্ট উন্মাদ; অবসাদবায়ু, ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ, এইগুলি গোণফল। অতএব এই সকল রোগে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হওয়াই উচিত। মুখ্যতঃ ইহাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মে সুতরাং তৃতীয় ক্রমের নিম্নের ক্রম ব্যবহার করিলে রোগের লক্ষণ বন্ধিত হয়। পুরাতন বৃক্ক পীড়াজনিত কোন কোন শোথ রোগেও মিউরিয়েট অব গোল্ড ব্যবহারে সূত্র-বুদ্ধি হইয়া সঙ্গম শোথ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

## অরিগেনম ভলগেয়ার—ওয়াইল্ড মার্জেরাম

এই উদ্ভিদ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জন্মে। সস্ত বৃক্ষের অরিষ্ট বা তৈলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—জননেক্রিয়ের বিশেষতঃ নারীদিগের জনন-বস্ত্রে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে ও তদ্বারা কাম-প্রবৃত্তির উদ্বেক জন্মে। অনন্তর অতিরিক্ত কামোত্তেজনার পরিণাম স্বরূপ মস্তিষ্ক ও শ্বাসমণ্ডল আক্রান্ত হয়।

অধিকার।—অগ্নীল চিন্তা ও অগ্নীল স্বপ্ন; এবং \* বিবর্তিত সম্ভোগ-লিপ্সা ও সঙ্গমেক্রিয়ের অতিরিক্ত উপদাহ জনিত ক্ষুধাবায়ু রোগে ও খেতপ্রদরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## প্রধান প্রধান আনুষঙ্গিক প্রয়োগ ।

**কামোন্মাদ ।**—ফরাসিস চিকিৎসক ডাঃ গালাসার্ডিন এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে ইহার বিষক্রিয়ায় যুবতীদিগের কাম-প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হয় । জীলোকের কামোন্মাদে এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম বিশেষ ফলপ্রদ । ডাঃ গালাসার্ডিন এতদ্বারা আটজন জীলোকের কামোন্মাদ আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।

**শ্বেতপ্রদরাদি ।**—কৃত্রিম মৈথুন-প্রবৃত্তি, ও জননেজ্রিয়ার উপদাহ সংযুক্ত শ্বেতপ্রদরও এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । ডাঃ গালাসার্ডিন ইহার ৩০ ক্রম, এবং ডাঃ এমোরি ইহার ৩০ ক্রম ব্যবহারে এই প্রকার কতকগুলি রোগিণীকে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন । একজন যুবতী অসুস্থ বিষয়ে হৃদয় সঙ্কেত প্রতিদিন কৃত্রিম মৈথুন করিত । যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সে এই দুঃপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিত না ।

অরিগেনম তৃতীয়ক্রম ব্যবহারে সে আরোগ্য লাভ করে । চল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন কুমারীর শ্বেত প্রদর ও মণিপুর-বণ্ডুয়ন সহকারে সঙ্গমোজ্রিয়ার উপদাহ ডাঃ এমোরি এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন । পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন বিবাহিতা জীলোকের সঙ্গমোজ্রিয়ার উপদাহসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর ছিল । তৎপূর্বে কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহার প্রবল কামোন্মাদেজনা এবং তজ্জন্ত উৎকর্ষ ও ধর্ম-কর্মে বিরক্তি জন্মিয়াছিল । ডাঃ এমোরি এই ঔষধ প্রয়োগে এই রোগিণীকেও আরোগ্য করিয়াছিলেন । একজন বিধবার ইজ্রিয়-সুখ লালসার উদ্দীপনা বশতঃ শরীর ও মনের অতিশয় অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল, অরিগেনম ত্রিংশক্রম সেবনে তাহা নিবারিত হয় । ডাঃসকোরাইডিস বলেন যে এতদ্বারা বক্ষ্যাহ, শ্বেত প্রদর, ও জরায়ুর বাতাদান আরোগ্যপ্রাপ্ত হয় ।

**গুন্মাবায়ু ।**—ডাঃ বেইস বলেন যে জীলোকদিগের জননেজ্রিয়ার উপদাহজনিত অনির্দিষ্ট মায়বীয় রোগে এতদ্বারা সুন্দর ফলদর্শে । কামপ্রবৃত্তিজনিত অগ্ন ও গুন্মাবায়ু এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—রোগিণীর প্রশান্তভাব চিন্তাপূর্ণতা, বিষাদ, নিরাশ-চিন্তা ; বাতায়ন হইতে পড়িয়া বাইবার প্রবৃত্তি ; সর্বদা কেবল হাঁটিবার ইচ্ছা ; বিশ্রামে অসমর্থতা । সকল বিষয়েই বিরক্তি জন্মে ; মরিতে ইচ্ছা হয় ; জীবনে বিরক্তি বোধ হয় ; কিছুতেই প্রমোদ জন্মে না । স্থিরভাবে চিন্তা করিতে পারা যায় না । মস্তকে অতিশয় উত্তাপসহ মনে কামজ কল্পনার উদয় । বারবার নিদ্রাভঙ্গসহ কামভাববিষয়ক \* স্বপ্ন ; ও কল্পিত হইয়া জাগরণ । একদিন বিষমৃতি ও দুর্বলতা, অল্পদিন প্রফুল্লতা । অপ্রফুল্লতা ও তৎপরে উচ্চ প্রকৃতি ( মেজাজ ) ( কক্ষীয় বিপরীত ) । \* সঙ্গমোজ্রিয়ার উপদাহ সহকারে অঙ্গীল

মনোভাব । গভীর, বিবাদ, রোগিণী মনে করে যে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে । হস্তি হইতে জাগরণকালে ভূত নিকটে আসিতেছে বলিয়া চিৎকার । যেন নরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়াছে, এপ্রকার ধারণা । অর্দ্ধ উন্নতবৎ অল্পভব ; ( জননেন্দ্রিয়ের উপদাহ সংযুক্ত কোন যুবতীর ) আত্মহত্যা বিষয়ক চিন্তা । মস্তক ।—মস্তকে অতিশয় উত্তাপ ; যখন সেই উত্তাপ বৃদ্ধি পায় তখন মাথা অনিচ্ছায় একপার্শ্ব হইতে অত্র পার্শ্বে ঘূর্ণিত হয় । সন্তোষ-লালসা সহ শব্দদ্বয়ে শিরঃপীড়া । শব্দায় শয়ন করিতে যাইবার সময় শিরোঘূর্ণন । প্রাতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্র ।—রাত্রিতে বারংবার মূত্র-বেগ, তন্নিমিত্ত জাগ্রৎ হইতে হয় । \* বিবর্দ্ধিত সঙ্গম-প্রবৃত্তি । \* অঙ্গীল কল্পনা ও স্বপ্ন । স্তনের উপরে ও নিকটে কণ্ডুয়ন । দশ বৎসরের নানবয়স্কা বালিকাদিগের হস্ত-মৈথুন প্রবৃত্তি । মানসিক দুর্বলতা সহ হস্ত-মৈথুন । ষ্বেত প্রদর ও গণিপুর কণ্ডুয়ন সহ সঙ্গম-েন্দ্রিয়ের উপদাহ । ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার আতিশয়াবশতঃ অস্থিরতা ও অশান্তি । ষ্বেতপ্রদর, বক্ষ্যাস্থ, ও জরায়ুর বাতায়ান । পরিপাক-যন্ত্র ।—ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পিপাসা, এবং আমাশয় ও অস্ত্রে বেদনা । দেহ ।—বাহু, জজ্বা, হস্ত ও পদে সঞ্চয়মান আমবাতিক বেদনা । প্রান্ত্রে উজ্জ্বল আরক্ত উত্তেজ, এবং জজ্বা ও উদরের চর্মে দাগ ।

সমগুণ ।—ক্যাছ, ক্যান-ইণ্ড, কোলিন, হেলোন, প্রাট, ভেলের, হিডিওমা ।

## অসমিয়ম—অসমিক এসিড ।

অসমিয়ম একপ্রকার ধূসরবর্ণ দাতু । ঔষধার্থে এই রূঢ় পদার্থের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

\* ক্রিয়া ।—মাস্তিক-পৃষ্ঠবংশীয় জায়ুগুলের অভ্যন্তর দিয়া খান-পথে ও বৃক্কের উপর অসমিয়মের প্রধান ক্রিয়া দশিয়া প্রবল উপদাহ ও প্রদাহের উৎপত্তি হয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—তরুণ-স্বরস-প্রদাহ, বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, ও হৃৎক-কাশ ; বায়ু-পথে উপদাহ, আক্ষেপিক কাস, রক্তবৎ স্লেমা এবং স্লেমা তুলিয়া ফেলিতে নিষ্ফল ও অতিশয় চেষ্টা, ইত্যাদি লক্ষণে, অসমিয়ম উপকারী । অশ্রুজ্বা সংযুক্ত অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধ ও নিম্নভাগের স্নায়ু-শূলে ইহার ব্যবহার আছে । এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে এই ঔষধে বাস্তবিকই প্রকোমা রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ; রামধনু সদৃশ বিচিত্রবর্ণ দর্শন ও চক্ষুর চতুর্দিকে উগ্র বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—রুদ্ধতা, কোপনতা, অস্থিরতা । মনে মনে মানসিক দুর্বলতার জ্ঞান । শব্দের অর্থবাহানে প্রয়োগ ( ডল, প্রম ) । কার্যে অগ্রবৃত্তি । মস্তক ।—অতীত ; ও শিরোগোরব সংযুক্ত শিরঃপীড়া চক্ষু ।—অক্ষি-কোটরে স্থতীত বেদনা, অক্ষিপুটের

আক্ষেপিক সংরুদ্ধতা । দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা ; কুস্মটিকার দেখার স্থায় অক্ষয়শুলি একত্র ধাবিত দৃষ্ট হয় ( \* সাইক্লো, ফস, \* জেল ) । অধিক অক্ষপাত সহকারে চক্ষে জ্বালাকর বেদনা । দীপ-শিখা নিলাভ হরিৎ অথবা পীতবর্ণ মণ্ডলে ( \* ফস ) ; কিম্বা রামধনুর স্থায় অঙ্গুরীয়কে পরিবেষ্টিত দৃষ্ট হয়, দূর হইতে দেখিলে সেই শিখা ধূলি বা ধূমে আবৃত দেখার কর্ণ ।—দক্ষিণ কর্ণে টুন্ টুন্ শব্দ । সায়াহে প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে, অনন্তর বাম কর্ণে বেদনা । নাসিকা ।—হাঁচি সংযুক্ত শব্দ ( এক, আর্জ, ইউফর ) । নাসিকার জ্বালাকর উপদাহ । নাসারন্ধ্রে শীতল বায়ু ভাল লাগেনা ( হাইড্রাস, সোরি ) । ব্রাহ্মশক্তির হাস । মুখ-মধ্য ।—হুতুতে বেদনা ; চৰ্ৰণ পেশীতে বেদনা । জিহ্বার লেপাচ্ছন্নতা ; উহার প্রান্তভাগের বন্ধুরতা ; মধ্যভাগে লোহিত রেখা । অধিক লাল-নিঃসরণ । মুখে রক্তের আন্বাদ ; ধাতব আন্বাদ ( \* ইন্ধি, ককু, \* মার্ক, নাজা ) । আমাশয় ।—উল্কার ; বিষমিবা ; \* বমন । আমাশয়-গহ্বরে অল্পগ্র বেদনা ও গুরুত্ব সহকারে গা-বমি-বমি করা ও অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা । উদর ।—উদরের ক্ষীততা ও অল্পত্বাধিক্য ; অতিশয় কৃজন । মল ও মলদ্বার ।—মলত্যাগকালে ও তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা ( আস, ক্যাহ, \* আইরিস, মার্ক ) । অতিসার । কোষ্ঠবদ্ধ । মূত্র-যন্ত্র ।—সাগুলালমূত্র ( \* মার্ক কর, ফস, ফাইটো, \* প্লম ) । উগ্র-গন্ধ ; মলিন-কপিশ ও স্বল্প মূত্র ( প্লম ) । উজ্জল-লোহিত অধঃপতিত পদার্থ । ০ ব্রাইটস ডিজিজ । জননেন্দ্রিয় ।—অণ্ডকোষে ও শুক্রবাহী নাড়ী গুচ্ছে বেদনা ( \* ক্রিম, স্পঞ্জ ) । উপস্থের প্রবল উল্গম । শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রে তুড়তুড়ি, উপদাহ বশতঃ কাসের উদ্বেক ; যাতনা ; জ্বালা ; অবদরণ ( রস, \* কম ) । বায়ু-পথে প্রভূত স্লেগ্মা-নিঃস্রব ( \* এন্ট টার্ট, \* ইপি, \* ফস, \* ষ্টাম ) । রজ্জুবৎ স্লেগ্মা, উহা অনায়াসে স্থলিত হয় না, গিলিয়া ফেলিতে হয় ( কালী বাই ) । কঠিনালীতে জ্বালাকর উপদাহ । কাস ও প্রতিশ্রায় সহকারে স্বরযন্ত্রে স্বরভঙ্গ ও বেদনা । গান করিলে ও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে স্বরভঙ্গের আধিক্য । আক্ষেপিক কাসের আবেশ ( কোরাল, ফস ) । কাসিবার সময় বুকাস্থির নীচে বেদনা, বক্ষঃস্থলের উভয় পাশ্বে উহার সম্প্রসারণ, তৎসহ জ্বালাকর স্পর্শ-দেহ, বোধ হয় যেন সর্বত্র অবদরণ জন্মিয়াছে ; অনেককাল কাসিতে কাসিতে দলা-দলা, হরিদ্রাবর্ণ হুছেহুছে স্লেগ্মা নিঃসরণ । পৃষ্ঠ ।—পৃষ্ঠে ও নিতম্বে প্রচাপনী বেদনা । দেহ ।—অতিশয় দ্রবলতা ও অবসন্নতা । অঙ্গে কর্তন ও চিমটিকাটার স্থায় বেদনা । ত্বক্ ।—হাতের পিঠে লাল লাল দাগ । প্রকৌষ্ঠে, হস্ত ও গণ্ডে অপরিপাক উদ্বেদ । বাহুদ্বয়ে লোহিত-কপিস অপচ্যমান পীড়কা, ও উহার শব্দ-পাত । লোহিতবর্ণ মণ্ডল পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদ্বাগ্র ফোকা । কীট-চারণার স্থায় কণ্ডুয়ন ।

সমগুণ ।—আস, ম্যাক্স, সেলেন ।



## আরেণিয়া ডায়েডেমা—ডায়েডেম স্পাইডার । ৪

আয়েডেম স্পাইডার একপ্রকার মাকড়সা। এই মাকড়সা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় জন্মে। ইহা দেখিতে অণ্ডা কার। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটা দীর্ঘ রেখা আছে। সেই রেখাতে গীত ও শুভ্রবর্ণ বিন্দু ও অপর তিনটা রেখা দৃষ্ট হয়। ইহার জাল গোলাকার এবং উহাতে লম্বিমা ও দ্রাবিমা রেখা আছে বলিয়া ইহাকে জিওগ্রাফিক্যাল স্পাইডার অর্থাৎ ভৌগোলিক-উর্ণলাভ বলে। সমগ্র কীট কয়েক মাস পর্য্যন্ত এলকোহলে ভিজাইয়া রাখিয়া ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে একটা জীবিত মাকড়সা একশত বিন্দু গ্যাবসোলিউট এলকোহলে দশ বার দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ইহার মূল অরিষ্ট, অথবা একশত গ্রেণ ছুঙ্ক শর্করার সহিত একটা জীবিত মাকড়সা খল করিয়া বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল দ্রাব্য-মণ্ডলে ও রক্তে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ক্যাটালেপ্সি।—এই উর্ণনাভের দংশনে শীতলতা জন্মে সুতরাং শীত-প্রধান নানাবিধ রোগে ডাঃ ভনগ্রভল ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাদের আর্দ্রতা সহ্য হয়না তাহাদের পক্ষেই ইহা উপযোগী। একজন স্ত্রীলোকের ক্যাটালেপ্সি ও পর্য্যায়শীল শিরঃশীড়া দি ছিল, আর্দ্র ঋতুতে ও নান করিলে তাহার অসুস্থ বৃদ্ধি পাইত। তাহার হাত পা শীতল ছিল এবং সে সর্বদা শীত শীত অনুভব করিত, আরেণিয়া ব্যবহারে অল্পসময়ের মধ্যে এই রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। প্লীহা।—আর একজন পুরুষের বিবর্দ্ধিত প্লীহা ও জ্বর ছিল, রোগী সর্বদাই শীতানুভব করিত, সে আর্দ্র স্থানে থাকিত, এবং বৃষ্টি হইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইত, আরেণিয়া দ্বিতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ক্লোরোসিস।—গ্রভল বলেন যে কোন কোন রোগীর ক্লোরোসিস রোগে এই ঔষধ অমোঘ। তাঁহার মতে রোগীর “অবিরত শীতানুভব” লক্ষণে অনেক রোগেই এই ঔষধ উপযোগী। নিউমোনিয়া, ব্রণশোথ প্রভৃতিতেও তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষমজ্বর।—একজন রোগীর পর্য্যায় জ্বর ছিল। অপরাহ্ন সাত ঘটিকার সময় শীত উপস্থিত হইয়া আটকা পর্য্যন্ত থাকিত, দাহ বা ঘর্ম্ম হইত না। তিন দিবসে ইহাকে ৮০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়ান হয়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না। তৎপরে আরেণিয়া ২৫, ৫ বিন্দু মাত্রায় প্রতিঘটায় প্রয়োগ করিতে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে আরেণিয়ার সমস্ত লক্ষণ আর্দ্র ঋতুতে ও আর্দ্রস্থানে বাসে বিবর্দ্ধিত হয়। পুরাতন সবিরাম জ্বরেই এই কথার বাখ্যার্থ্য বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। আরেণিয়াজ্ঞাপক কারণ রোগী রৌদ্রের দিনে ভাল থাকে, বৃষ্টির দিনে পীড়িত হয়। আর্দ্র দিবসে সে শীত শীত অনুভব করে, তৎপরে অত্যন্ত তাপ প্রকাশ পায়, অথবা একেবারেই উত্তাপ

উপস্থিত হয় না। এই শীত একদিন পর একদিন, সাতদিন অন্তর; কিম্বা অত্র কোন নির্দ্ধারিত কালের পর ঠিক একই সময় প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর, রোগীর গ্নীহার বিবর্দ্ধন, ও রক্তস্রাব-লক্ষণও বিত্তমান থাকে। এই প্রকার পুরাতন সবিরাম জ্বরে পূর্বে কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকুক বা না থাকুক আরেগিয়া সেবনে সুন্দর ফল দর্শে। জ্বরের পর্যায়শীলতা লক্ষণে সিঙ্কোনাও কুনাইনের সহিত আরেগিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অনুপ-স্থানে বাস বশতঃ জ্বরে ও গ্নীহার স্মীততাদি লক্ষণে এই দুই ঔষধের ও ব্যবহার আছে। ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে জ্বরের উপস্থিতি লক্ষণে সিড্রণও আরেগিয়ার সমগুণ বটে। কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানের জ্বরেই সিড্রণ উপকারী। শীত প্রধান ও আর্দ্র স্থানের জ্বরে আরেগিয়া ফলপ্রদ। অপর, আরেগিয়ার জ্বরে শীতেরই প্রধাত্ত থাকে, তাপ যৎসামান্য থাকে, অথবা একেবারেই থাকে না। কিন্তু সিড্রণের জ্বরে মস্তকে রক্তসঞ্চয়, মুখমণ্ডলে পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, গাত্রে শুষ্ক উত্তাপ এবং তৎসহকারে নাড়ীর পূর্ণতা ও দ্রুততা থাকে।

**অতিসার।**—আরেগিয়া দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকৃতির রোগীদিগের অতিসার ও আরোগ্য হয়। অতিশয় অস্ত্র-কৃজন সহকারে জলবৎ মল নিঃসরণ; অস্থির নিদ্রা; মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংগী স্নায়ুর বিকার জন্ম জাগরণান্তে শরীরের কোন কোন অংশ স্মীত অহুভব, যথা বাহ বা হাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিশয় বৃহত্তর বোধ এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **অস্থি-রোগ।**—অস্থি-রোগেও আরেগিয়ার প্রয়োগ হয়। গুল্ফাফ্রির রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ, বা কেরিজ বশতঃ অস্থিতে বেধন বা খননবৎ বেদনা জন্মিলে এবং রোগীর নিকট অস্থি তুষারবৎ শীতল বোধ হইলে এই ঔষধ ব্যবহ্যেয়। **শিরঃপীড়া।**—একজন জ্রীলোকের পুরাতন শিরঃপীড়া ছিল। মাথা ধরিবার পূর্বে তাহার চক্ষুর সম্মুখে আলোকের রেখা দৃষ্ট ও ভ্রমি হইত, তজ্জন্ম তাহাকে শুইয়া থাকিতে হইত। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডলে অতিশয় উত্তাপ, শ্রান্তি, ও দুর্বলতা জন্মিত। এই শিরঃপীড়া একদিন থাকিত। আরেগিয়া ষষ্ঠক্রম সেবনে ইহার রোগ আরোভ্য হইয়াছিল।

**দন্ত-শূল।**—এক ব্যক্তির উপরের কর্তন-দন্তে নখ-ভেদ ও প্রচাপনের শায় বেদনা ছিল। সেই বেদনা প্রত্যহ পূর্বাঙ্ক নয়টার সময় উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ন সাতটা পর্যন্ত থাকিত, বেদনার বিরামের পর এক প্রকার অহুভবাবিক্য ও বায়ুগ্রহণে শীতাহুভব অবশিষ্ট থাকিত। নন্দ্যভমিকা সেবনে কোন ফল দর্শেনা অবশেষে এই রোগীকে একটা আরেগিয়া নামক মাকড়সায় দংশন করে সেই অবধি তাহার দন্ত-বেদনা ক্রমে ক্রমে সারিয়া যায়। এই বিবরণ উল্লেখ্য চিকিৎসক বলেন যে মাছি ও গাল বেন স্মীত হইয়াছে এই প্রকার অহুভব বিশিষ্ট দন্তশূল তিনি আরেগিয়া ষষ্ঠক্রম ব্যবহারে অনেক বার আরোগ্য করিয়াছেন। ফ্যারিংটন বলেন যে আর্দ্র ঋতুতে ও শয়ন করিবামাত্র বিবর্দ্ধিত দন্ত-বেদনায় এই ঔষধ উপকারী।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—জড়তা ; বিশৃঙ্খলা । শিরঃপীড়া,—কপালাদিতে অতীব, প্রচাপনবৎ, নির্দারিত্ব সময়ে সমাগত বেদনা । চক্ষু ।—চক্ষে উত্তাপ ও কম্পনবৎ অনুভব। কর্ণ,—কর্ণে বেদনা ও চাপ । নাসিকা ।—প্রতিশ্রায় ; রক্তপাত । মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা । স্নায়ুমণ্ডল ।—স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা ; প্রচাপন ও নখাঘাতের দ্বারা বেদনা । স্পন্দন ; আক্ষেপ ; অবশতা । রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র ।—রক্ত-সঞ্চালনের বিমদ-গতি ; রক্তস্রাবের প্রবণতা । শীতলতার প্রাধান্য ; ও অস্থি-বেদনা সংযুক্ত জ্বর । শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রে স্রুচী-বেধবৎ যাতনা । ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব । মুখ-মধ্য ।—শীতলতা অনুভব ; দন্তবেদনা ; জিহ্বায় গাঢ় লেপ । অবিরত অতিশয় পিপাসা । উদর ।—অতিশয় গুরুত্ব ; আধান ; পেটকামড়ানি ; নির্দারিত সময়ে সমাগত উদর-বেদনা । মল ।—পাতলা, তরল, উৎসেচিত ; বেদনাসংযুক্ত মল । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—যথাকালের অতিরিক্ত পূর্ণে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব । নিদ্রা ।—অস্থির নিদ্রা ; বার বার জাগরণ ; কান্ননিক স্বপ্ন । দেহ ও অঙ্গ ।—দীর্ঘাস্থিতে খননবৎ অতীব বেদনা সহকারে আলস্ত ও শ্রান্তি । বাহ্য পেশীতে হেঁচকা টানের দ্বারা বেদনা ; হাতের আঙ্গুলের অবশতা ; জন্ত্বার শ্রান্তি ও বেদনা । উপচয় ।—সন্ধ্যার প্রাকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি । উপশম ।—বিষুক্ত বায়ুতে উপশম । উপযোগিতা ।—আর্দ্র বায়ুতে অতিশয় অনুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী ।

সমগুণ ।—সিঙ্কোনা, কুইনাইন, সিড্রন ; ভিরাট, পলস, লাই, ল্যাক, আর্স ।

## আর্কশিয়ম ল্যাপপা —বার্ডক ।

এই বৃক্ষ দুই প্রকার । এক প্রকারের পত্র বড়, আর এক প্রকারের পত্র ক্ষুদ্র । এই বড় পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । ইহা প্রায় সকল দেশেই জন্মে । ইহার মূল ও বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

এই ঔষধ বহুকাল হইতে ‘রক্তশোধক, স্বরূপ গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ডাঃ বার্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ক্রমাগত ইহার কাথ বা পাক ব্যবহারে দুর্দ্দম্য চর্মরোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন । তিনি এতদ্বারা কতক গুলি দারুণক বা টিনিয়া ক্যাপেটস রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল রোগীরা মস্তক সম্যকরূপে ধুসরাভ খেতবর্ণ চিপটিকায়

আবৃত, হইয়াছিল এবং চুলের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; পীড়কা মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল । সলফ, আইরিস, মার্ক, গ্রাফ, লাইকো ব্যবহারে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না। অবশেষে বার্ড'কর মুহুফান্ট প্রয়োগে আরোগ্য লাভ হয় । এই ঔষধে ক্রোশালাক্সিয়া নামক রোগও আরোগ্য-হইয়াছে । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে আর্ট্র'জর্গন্ধ পীড়কায় ধূসরাত শ্বেতবর্ণ চিপটিকা জন্মিলে, বিশেষতঃ গ্রন্থি ক্ষীত হইলে, এমন কি কক্ষ-গ্রন্থি থাকিলেও এই ঔষধ উপযোগী । বাতেও ব্রাইওনিয়ার সহিত আর্কশিয়ম ল্যাপ্পার তুলনা হইতে পারে । এই ঔষধেও নড়িলে চড়িলে শ্বুন্ধিপায় এরূপ পেণীর স্পর্শ-দ্রব্য ও বহু বেদনা আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । ক্রমাগত ইহা ব্যবহার করিয়া প্রাচীন বিসর্প একেবারে সারিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ডাঃ হেল বলেন যে শাহাদের বারবার স্ফোটক হয় এই ঔষধ সেবনে তাহাদের স্ফোটক-প্রবতা দূর হইয়া থাকে । অঞ্জনী, অক্ষিপুটের ক্ষত, কক্ষতলের দুর্গন্ধ ঘর্ষ, ও কক্ষতলের ত্রণশোথেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ । শোথ ও মুহুফাচ্ছে ও কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিতে বলেন ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—\*মস্তক, মুখমণ্ডল ও গ্রীবার উদ্ভেদ । টিনিয়া কাপেটিস বা দারুণক । ক্রোশালাক্সিয়া, নানা প্রকার পামা । অনেক বৎসরের পুরাতন বিসর্প । বালকদিগের মস্তকে রসস্রাবী দুর্গন্ধ পীড়কা । মুখমণ্ডল ও চক্ষু ।—মুখমণ্ডল ও চক্ষুর পাতায় স্ফোটক । চক্ষুর পাতার প্রান্তদেশে অঞ্জনী, ও ক্ষত । মূত্রবস্ত্র ।—\*বারবার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব । মূত্রতাগের পর মূত্রাশয়ে বেদনা । সামান্য বৃক্ক পীড়াজনিত শোথ । দেহ ।—কক্ষ-গ্রন্থি ক্ষীততা ও পৃথোৎপত্তি । সর্কসরীরে বেদনা বিশিষ্ট ও বিলম্বে আরোগ্যমীল স্ফোটক । করতলে দুর্গন্ধময় ঘর্ষ ।

সমগুণ ।—আইরিস, লাইকো, ক্যাক, ফাইটো, গ্রাফ, হিপার, সলফ, ভাইওলা-টিক ।

## আর্টিমিসিয়া ভলগারিস ।

আর্টিমিসিয়া ভলগারিস কম্পোজিটা জাতীয় উদ্ভিদ । অপস্মার রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী । প্রবল চিন্তা-বিকার, বিশেষতঃ ভয় বশতঃ রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে পুনঃ পুনঃ একের পর অপর আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল আক্ষেপের বিরতি থাকিলে ; এবং সাধারণতঃ রোগাবশেষের পর নিদ্রা জন্মিলে আর্টিমিসিয়া ব্যবহৃত হয় । পেটিম্যাল বা বহু অপস্মারও ইহার কতকটা উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । এইজাতীয় অত্যন্ত ঔষধের হায় চক্ষুও আর্টিমিসিয়ার ক্রিয়া দর্শে । “রঞ্জিত আলোকে শিরোমূর্ধনের উৎপত্তি” ইহার একটি লক্ষণ । চিত্রিত কাচের জানালার নিকট বসিলে রোগীর মাথা

যোরে। চক্ষু ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলে উহাতে বেদনা, ও দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, এবং চক্ষু মর্দনে ক্ষণকাল সেই অপরিচ্ছন্নতার শাস্তি আর্টিমিসিয়ার আর একটা চক্ষু-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে চক্ষু-রোগেও এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। কুমিজনিত আক্ষেপে সিনার জ্বায় আর্টিমিসিয়ারও ব্যবহার আছে। তরুণ হাইড্রোসিফেগাস রোগে বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত, দক্ষিণ পার্শ্বের আক্ষেপ; শিশুর নিদ্রিত বা স্বপ্নবৎ অবস্থা অথচ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইয়া অধিক পরিমাণ জল পান; গাত্রের শীতলতা, অনিচ্ছায় (অসাদে) মল নিঃসরণ; —এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েস্থাল আর্টিমিসিয়া ব্যবহারের বিধি দেন।

আর্টিমিসিয়া এত্রোটেনম।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে সহসা উপস্থিত পৃষ্ঠ-বংশের প্রদাহে ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার পুরাতন প্রদাহে এই ঔষধ উপযোগী। পৃষ্ঠে সহসা অবিস্যম বেদনা ও নড়িলে চড়িলে উহার শাস্তি; এবং অবশ্যতা ও পক্ষাঘাত ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ) বাত-প্রস্তু রোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে মণিবন্ধ ও গুলফ-সন্ধির প্রদাহও ক্ষীততা; সন্ধিস্থলির স্তম্ভতা ও উহাতে কণ্টকবেদ-বৎ বাতনা অসুভব; গাউটরোগের বিলোপ জনিত পীড়া; —এই সকল লক্ষণে সন্ধিবাতে আর্টিমিসিয়া এত্রোটেনম ব্যবহৃত হয়।

## আসেনিয়েট অব আয়রণ। ✕

মলফেট অব আয়রণ দ্রবে আর্সেনিয়েট অব পোটাস দ্রব মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রথমে শুষ্ক থাকে, কিন্তু বাতাস লাগিলে হরিষণ হয়। এই চূর্ণের স্বাদ-গন্ধ নাই। ইহা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু মিউরিএটিক এসিডে সহজে দ্রবীভূত হয়। ষষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

একজন ক্ষীণবক্ত পাণ্ডুরণ বালিকার কোরিয়া রোগ ছিল তাহাকে এলোপ্যাথি মতে হাইট্রেট অব আয়রণ ও কুইনাইন ফাউলার্স সলিউশন, টিচার ফেরিমিউরেটিস ও অন্যান্য ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল। ডাঃ হেল এই রোগিণীর তখনও আয়রণ ও আসেনিক জ্ঞাপক লক্ষণ দৃষ্টে পর্য্যায়ক্রমে এই দুই ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আসেনিয়েট অব আয়রণের দ্বিতীয় দশমিকক্রমের বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় প্রয়োগ করেন। তাহাতে সে সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করে। এই মিশ্র-ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই। পরীক্ষার বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। আসেনিক ও আয়রণের রাসায়নিক সংমিলনে শুণাস্তর উৎপন্ন হয় না, সত্তরাং কে দুই ঔষধের প্রধান প্রধান লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই মিশ্র-ঔষধ ব্যবহার করিলেই হইলেই পারে। লোহের রক্তক্ষীণতা ও আসেনিকের স্নায়ুমাণ্ডলের

লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন ও এতদ্বারা সুফল প্রাপ্ত হন। তিনি আমাশয়ের বা অন্ত্রের রোগে ইহা কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যে এই সকল রোগে কেবল আর্সেনিক, অথবা আর্সেনাইট অব কপার ইহা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। কিন্তু তিনি বলেন যে ক্ষীণরক্ত ব্যক্তিদিগের চর্মরোগে এই ঔষধ তিনি সুব্যবহৃত মনে করেন।

## আর্সিনিয়েট অব ট্রিকনিয়া । x

শরীরের তরল বিধান, গ্রন্থি বহু, ও শৈল্পিক ঝিল্লীতে আর্সেনিকের প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে। স্নায়ুমাণ্ডলে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-গুচ্ছে অর্থাৎ গতি-জনন ও পরিপোষণায়ুতে ট্রিকনিয়ার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং এই উভয় ঔষধজ্ঞাপক রোগীর লক্ষণে আর্সিনিয়েট অব ট্রিকনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই। ষষ্ঠ শততম ক্রম পর্যন্ত ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

একজন বালকের পুরাতন অতিসার রোগ ছিল। অতিসারের লক্ষণগুলি সকলই আর্সেনিকের সদৃশ ছিল বটে কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার নজ্জমিকা বা ট্রিকনিয়াজ্ঞাপক সূত্রাশ্রয়, সরলান্ন ও নিম্নোজের পক্ষাঘাত ছিল। আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া অতিসারের লক্ষণ আরোগ্যান্তে তৎপরে পক্ষাঘাতের জন্ত নজ্জমিকা প্রয়োগ করিবার সময় ছিলনা। কারণ, রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন ছিল। একজন্ত ডাঃ হেল তাহাকে একেবারেই আর্সিনিয়েট অব ট্রিকনিয়া চতুর্থক্রম, একগ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করেন এবং উহাতে রোগী সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করে এইপ্রকার জটিল রোগেই ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। যে সকল রোগে শৈল্পিক ঝিল্লী, গ্রন্থিমাণ্ডল, ও পরিপোষণ-বহুমণ্ডলের বৈলক্ষণ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমাণ্ডলও প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হয় অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত, পুরাতন ক্ষত, শীর্ণকর রোগ; অপিচ ওলাউঠা, টাইফসজ্বর, ও সাংঘাতিক রক্তাতিসার প্রভৃতিতে তিনি এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুবোধ করেন।

## আর্সিনিয়েট অব এণ্টিমনি । x

এণ্টিমনি ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে এই ঔষধ উৎপন্ন হয়। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্তর্বে রক্তসঞ্চয়। কপালে বেদনা। শঙ্কালে গৌরব। সর্কাজীন গ্রানি অল্পভব।  
দুর্কলভা অল্পভব। অক্ষিপ্পহবে বেদনা। চক্ষুর গুরুমাণ্ডলের প্রদাহ। মুখমাণ্ডলের

ক্ষীততা। ক্ষুধাহীনতা। বিষমিধা। বেদনাশূল সামান্য অতিসার। নাড়ীর ৯০ বার  
 স্পন্দন। বজ্রগণীয় স্বায়ুতে সঞ্চারণশীল বেদনা। \* হৃদ্রোগজনিত ও কাসি সংযুক্ত শ্বাসক্লেশ।  
 ৩ ফুসফুসে বায়ুর সম্প্রবেশজনিত অতিশয় শ্বাস-ক্লেশ। \* হৃৎপিণ্ডের অতিশয় পুরাতন  
 দুর্বলতা—এই সকল আর্সিনিয়ট অব এন্টিমণির লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের  
 দুর্বলতায়, আত্মযন্ত্রিক শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস, কাস, ও শীর্ণতা লক্ষণে তিনি এই ঔষধ অধিক  
 ব্যবহার করেন। ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রত্যহ তিনবার ব্যবহারে উপকার  
 দর্শে।

## ইউক্যালিপ্টস গ্লবিউলস-ফিভার-টী।

মার্টেনী জাতীয় ইউক্যালিপ্টস গ্লবিউলস নামক বৃহৎ বৃক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও ট্যান্সেনিয়ায়  
 অল্পো জন্মে। যে স্থানে এই বৃক্ষ থাকে তাহার নিকটবর্তী স্থলে ম্যালেরিয়া জনিত রোগের  
 প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। নিম্ন সজল, ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশে ইউক্যালিপ্টস বৃক্ষ রোপণ  
 করিলে উহার অস্বাস্থ্যকরতা নষ্ট হয়। যে সকল জলাদিতে ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি জীবাত্ম  
 আছে ইউক্যালিপ্টস সংযোগে তাহা পরিশোধিত হয়। যে জলাশয়ের ধারে এই বৃক্ষ জন্মে বা  
 ঘাহার জলে ইহার পত্র পতিত হয় তাহার জলপান করিলে ম্যালেরিয়া জরের আক্রমণ  
 প্রতিবন্ধ হয়। ইংরাজীতে ইহাকে ফিভার-টী বা জর-তরু বলে। ইহার সরস পত্র বা  
 শুষ্ক পত্রের সূক্ষ্ম চূর্ণের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম ডাইলুট এলকোহল,  
 এবং অত্যন্ত ক্রম এলকোহল সহকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল এথাৎ এসেন্সকে  
 ইউক্যালিপ্টল বলে। ইহা আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে।

ক্রিয়া।—পরিপাক-বস্ত্রে ইউক্যালিপ্টসের ক্রিয়া দর্শিয়া অজীর্ণ জন্মিয়া অনন্তর  
 অতিসারের উৎপত্তি হয়, সকল প্রকার শারীরিক নিঃশ্রবেই ইউক্যালিপ্টসের উপাদান  
 উপাদান ইউক্যালিপ্টোল নামক একপ্রকার তৈলের গন্ধ থাকে। অপর, ইউক্যালিপ্টস  
 হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিবদ্ধিত, ধমনীর অশিথিলতা মন্দীভূত, এবং একপ্রকার সজ্বর অবস্থা উৎ-  
 পাদিত করে। ম্যালেরিয়া জনিত স বিরাম বা স্বল্প-বিরাম-জরের সহিত এই জরের সাদৃশ্য  
 লক্ষিত হয়। ঈদৃশ জরেই হোমিওপ্যাথি মতে ইউক্যালিপ্টস ব্যবহৃত হয় ও অতিশয়  
 উপকার করে।

অধিকার।—সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জরে; ম্যালেরিয়া জনিত বিষাক্ততায়;  
 কুইনাইন বিফল হইবার পরে; ও অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত শারীরিক বিকৃতিতে;  
 প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগ জনিত শ্বাসে, এবং ফুসফুস-পাক্ষাশয়িক  
 দ্রাব্য ও উহার শাখায় ধমত্বক্কুদের প্রচাপে, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপশম জন্মায়  
 নাসিকার পুরাতন ও তরুণ প্রতিশ্রাব; জ্বপ-শ্বাস-কাস; ফুসফুসের গ্যাংগ্রীণ; প্রচুর

নিষ্টিবন বিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস । এই সকল রোগেও ইহার প্রয়োগ হয় । রক্তাতিসার ; অতিসার ; শ্বেতপ্রদর ; ক্ষত ; পুষ্ণোৎপন্ন অভিভাত ; দায়ুশূল ; আমবাত ; টাইফয়েড জ্বর ; প্রভৃতিতেও কখন কখন ইউক্যালিপ্টস ব্যবস্থা করা যায় । ইহার পচন-নিবারক গুণ আছে বলিয়া জ্বরায়ুর প্রতিষ্ঠায় ; জ্বিনা, ক্যান্সার, গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি রোগে অতিশয় দুর্গন্ধ লক্ষণে ইউক্যালিপ্টসের স্থানিক প্রয়োগ হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

জ্বর ।—সকল প্রকার পর্যায়জরে ; জরসহকারে পীঠা বা যকৃতের রোগ থাকিলে ; ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থলের জ্বরে উদরের বিশৃঙ্খলা ও রোগীর শীর্ণতা থাকিলে ; এবং প্রজ্বর জ্বরে, অর্থাৎ জ্বরের অবধারিত সময়ে জ্বর না হইয়া তৎপরিবর্তে মস্তিষ্কের প্রবল উপসর্গ উপস্থিত হইলে ইউক্যালিপ্টস ব্যবহৃত হয় । স বিরাম ও স্বল্পবিরামজ্বরে অধিকমাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিয়াও জ্বর আরোগ্য না হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে । ঐক্যাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর ; দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর ম্যালেরিয়া জ্বর ; জ্বরের সকল অবস্থায় শিরোগূর্ণন ও শরীর-বেদনা ; প্রথমে পীঠার ক্ষীণতা ও বেদনা, অনন্তর ক্রমে ক্রমে উহার দৃঢ়তা ;—এই সকল লক্ষণে ইউক্যালিপ্টস উপযোগী । কুইনাইন অপেক্ষা ইহাতে শতকরা অধিক রোগী আরোগ্য লাভ করে বলিয়া উল্লিখিত আছে । এই ঔষধের বিরাম জ্বরসমূহ পাণ্ডু এবং ম্যালেরিয়াজনিত নৈশঘর্ম ও নিবারিত হয় । অষ্ট্রেলিয়ার ইহা জ্বরের প্রচলিত ঔষধ ।

প্রতিষ্ঠায় বা ক্যাটার ।—ইউক্যালিপ্টসের প্রতিষ্ঠায়-বিনাশক গুণ আছে । অতএব বায়ুনলী-ভুজ, গর্ভাশয় ও মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায়ে এবং প্রমেহ ও লালামেহাদি মূত্রমার্গের প্রতিষ্ঠায়ে এই ঔষধে সুন্দর উপকার দর্শে । ডাঃ সার-জন-রোজ্জ কর ম্যাক বলেন যে জ্বরায়ুর সামান্য প্রতিষ্ঠায়ে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই । তিনি ইহার আভ্যন্তরিক ও পিচকারীরূপে বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা করেন । প্রভূত নিষ্টিবন বিশিষ্ট বায়ুনলীভুজপ্রদাহে এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মাস্রাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও রোগীর সর্বাঙ্গীন অবস্থার উৎকর্ষ জন্মে । এই সকল রোগে ডাঃ করম্যাক ইউক্যালিপ্টসের এক ড্রাম অরিষ্ট দুই আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন দুইবার সেবন করাইয়া থাকেন । ডাঃ উষ্টার বলেন যে মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায় কেবল এই ঔষধ ব্যবহারেই আরোগ্য হয় । আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকাশে ( ষ্ট্রিকচার ) এতদ্বারা অতি সস্তর উপশম জন্মে । অনেকগুলি তরুণ প্রমেহের রোগী একমাত্র এই ঔষধ সেবনেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

পুতিক্ষতাদি ।—ইউক্যালিপ্টস সংক্রমণ-প্রতিষেধক, দুর্গন্ধহারক, ও পচন-নিবারক । এজ্রত ওজিনা ; জিহ্বা, গল-মধ্য, ও জ্বরায়ুর ক্যানসার ; এবং গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি রোগের আশ্রয়ে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে । এতদ্বারা সহর দুর্গন্ধ নিবারিত ও যাতনা প্রশমিত হয় । ইহার দুর্গন্ধ সংহরণ গুণ অতীব প্রসিদ্ধ । ডাঃ করম্যাক জ্বরায়ুর



রোগে ইউক্যালিপ্টসের এক হইতে চারিড্রাম অরিষ্ট, আট আউন্স ঈষদ্রব্য জলে মিশাইয়া পিচকারী ব্যবহার করেন। রোগ-ভেদে ইহার কুলি ও ব্যবহৃত হয়। ক্ষত ও সত্ত্বত্রণেও ইউক্যালিপ্টসের স্থানিক প্রয়োগ পরমোপকারী। কেহ লিটের পরিবর্তে এই বৃক্ষের পত্রদ্বারা ক্ষতে পটী বাঁধিয়া থাকেন। আমাশয়ের ক্ষতে ও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডিপথিরিয়া, স্কার্লেটিনা, ফুসফুসের গ্যাংগ্রীণ, রক্তাতিসার প্রভৃতিতেও পুঁতি-গন্ধ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

**দন্তু-শূল**।—দন্তের স্ফূর্তিতে তুলায় করিয়া ইউক্যালিপ্টসের তৈল ইউক্যালিপ্টোল সংলগ্ন করিয়া দিলে দন্তের বেদনার শান্তি জন্মে।

**অতিসার**।—পাতলা জলবৎ অতিসারে মলস্রাবের পূর্বে অস্ত্রের নিম্নাংশে তীব্র বেদনা লক্ষণে ইউক্যালিপ্টস ফলপ্রদ।

**অশ্রান্ত রোগ**।—মুখমণ্ডলের সবিরাম বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার কুড়ি হইতে ত্রিশ বিন্দু মাদার টিংচার একবাটা তণ্ডুলে ঢালিয়া দিয়া শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দিলে উহা নিশ্বসনে নিদ্রা হয়; যক্ষ্মার কাস ও উপশমিত হইয়া থাকে। ইউক্যালিপ্টসের পত্র চর্ষণ করিলে রক্তস্রাবী দন্ত-মূলের দৃঢ়তা ও স্বাসের সুগন্ধ জন্মে। দ্রুত, ক্ষুদ্রনাড়ী সহবর্তী শ্বাস-ক্লেশতা এই ঔষধে আরোগ্য হয়। হ্রদ্রোগজনিত শ্বাসে ইহার পত্রের ধূমপানে স্নানর উপকার দর্শে রক্তস্রাব রোধার্থে ইহার জলমিশ্রিত তৈল বা ফ্যান্ট ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ইউক্যালিপ্টস উপকার করে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—সাধারণ মানসিক উত্তেজনা। অবিরত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। মত্ততার স্থায়ী অনুভব। ভ্রমি।

**মস্তক**।—\* ০ স্নায়বীয় শিরোবেদনা, ও অশ্রান্ত প্রকার অপর্ধ্যায় শিরোবেদনা। রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদেগের রক্তসঞ্চয়জনিত শিরঃপীড়া, ও তৎপরে প্রকৃত জ্বর। মস্তকের পূর্ণতা সংযুক্ত মুহু, গৌরববিশিষ্ট, সম্মুখকপালের শিরঃপীড়া। ০ নীরক্ত ব্যক্তিদের শিরঃপীড়া (এই ঔষধে বেদনার শান্তি ও নিদ্রা জন্মে)।

**চক্ষু**।—চক্ষু উত্তাপ, জ্বালা, ও কটকট অনুভব। চক্ষুর পাতার গুরুত্ব অনুভব। ০ প্রতিশ্রাণ ও প্রমেহ জনিত অভিব্যক্তি।

**মুখমণ্ডল**।—রক্তসঞ্চিত আকৃতিবিশিষ্ট আরক্ত মুখমণ্ডল।

**নাসিকা**।—নাসিকা অববদ্ধবৎ অনুভব। নাসা-সেতুর অনুপ্রস্থে আকটতা, বোধহয় যেন নাসিকা হইতে রক্তপাত হইবে। পাতলা জলবৎ প্রতিশ্রাণ। ০ নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্রাণ, দুর্গন্ধ ও পৃথক স্রাব নিঃসরণ।

**মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য**।—\* পিপাসা সহকারে গল-কোষ ও গলনলী পর্য্যন্ত সম্প্র-

সারিত জালা অল্পভব । \* অত্যন্ত লালশ্রাব । গল-মধ্যে পূর্ণাভব ; গিলিতে গলায় স্পর্শ-দেহ । শুভ্র, গাঢ়, ফেণিল স্লেয়া নিজীবন । সর্বদা যেন গলায় স্লেয়া রহিয়াছে একরূপ অল্পভব । গলা শিথিলিত ও পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয় ।

আমাশয় ।—তীব্র-গন্ধ উদ্গার । ইউক্যালিপ্টস সেবনের পর কতিপয় ঘটিকা পর্যন্ত উহার অস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার । ধীরে ধীরে পরিপাক ; উদ্গার ও ক্ষীততা । ক্ষুধার উৎকর্ষ । অতিরিক্ত পানাহারের দ্বারা পূর্ণতা অল্পভব । আমাশয়ের মগ্নতা বা ক্ষীণতা অল্পভব । আমাশয় প্রদেশে ও অন্ত্রে স্পর্শ-দেহ ও জালা অল্পভব, তৎসহ সরলাস্ত্রে অতিশয় উত্তাপ, অনন্তর কুহন ও আম নিঃসরণ এবং অতিশয় অবসন্নতা । অবশেষে অস্ত্র হইতে প্রবল বিরেচন ও রক্তশ্রাব । উদরোর্দ্ধ ও নাস্তী প্রদেশে জালা অল্পভব এবং তৎসহকারে বস্ত্রগাধ্রদ পিপাসা, শিরোঘূর্ণন, অন্ধকার-দর্শন ; মস্তকে পূর্ণতা অল্পভব ও সমুখ কপালে মন্দ মন্দ শিরঃপীড়া ।

উদর ।—উদরোর্দ্ধভাগে গুরুত্ব অল্পভব । নাস্তী-প্রদেশে অস্বথ-জনক চাপ ও পূর্ণতা অল্পভব । অন্ত্রের উর্দ্ধভাগে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা, তৎপরে সমুদয় অন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া উহার প্রসারণ । যেন অতিসার জন্মিবে অস্ত্রে একরূপ অল্পভব । ( পণ্ডিগের গ্লীহার আকৃষ্টন ও কাঠিষ্ঠ, উপরিভাগে দানার উৎপত্তি ; এবং সমগ্র গ্লীহার আয়তনের হ্রাস ) ।

মল ।—\* সরলাস্ত্রে উত্তাপ, কুহন, আম নিঃসরণ, ও অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত রক্তাতিসার ; অস্ত্র হইতে রক্তশ্রাব । অস্ত্র হইতে রক্তশ্রাব সহ প্রবল বিরেচন । অল্প-কালস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধ । \* পাতলা জলবৎ অতিসার, বিরেচনের পূর্বে অন্ত্রের নিঃসরণে তীব্র অবিরাম বেদনা । সন্নিপাত-লক্ষণাপন্ন অতিসার ও রক্তাতিসার । আম ও রক্তশ্রাবী পুরাতন অতিসার ।

মূত্রে ।—অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ । রাত্রিতে ও দিবসে মূত্রাধিক্য । মূত্রাশয়ের প্রতিগ্ধ্যায় । মূত্র-নাশ । মূত্রাশয়ের নিঃসারণী-শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছে এপ্রকার অল্পভব ।

জননেন্দ্রিয় ।—স্ত্রী-মূত্রমার্গের মুখের চারিদিকে ক্ষত । তরুণ উপদংশ-ক্ষত । উপদংশিক প্রামেহ । বিদাহী, দুর্গন্ধি স্লেয়াশ্রাবী স্বেতপ্রদর । মূত্রমার্গের আক্ষেপিক নিরুদ্ধপ্রকাশ ( ঐচ্ছিকচার ) ।

বক্ষঃস্থল ।—বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগের বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ । শ্বাসের গতির ক্ষততা । হৃদ্রোগজনিত শ্বাস, ( এই ঔষধে শ্বাস-কুজের শান্তি জন্মে ) । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে উদরের বৃহদ্রমনীর প্রবল স্পন্দন ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—উর্দ্ধাঙ্গে ও নিম্নাঙ্গে প্রথমে কণ্টক-বেদন অল্পভব, তৎপরে বাহুতে ও জস্তায় বেদনা, একপ্রকার শুক্লতা ও শ্রান্তি অল্পভব, এবং উহার শিরায় পূর্ণতাম্পভব ।

ত্বক্।—শিরা-প্রসারণজনিত ক্ষত। হুর্গন্ধি দূষিত শ্রাব-নিঃসরণশীল নালী-ক্ষত। পুষ্পাশ্রী সজ্জরণ ; ( গ্যাংগ্রীণ প্রতিবেদন করে )। চর্মে দ্রববৎ উদ্বেদ ; গ্রন্থি স্ফীততা ; এবং দূষিত, নিস্তেজ ক্ষত। পদের মধ্যভাগ ও হস্তের মধ্যভাগের সন্ধিস্থানে গ্রন্থি স্ফীততা।

দেহ।—আমবাতিক বেদনা, উৎক্ষেপণ, ছেদন, সৃচী বেদনবৎ বেদনা, রাত্রিতে-উষ্ণার আতিশয্য, তৎপরে শরীরের নানাস্থানে স্ফীততা ; স্তনাগ্রেয় নিয়ে একটু দক্ষিণ পার্শ্বে, একস্থানে বাদামের গায় স্ফীততা, এবং উষ্ণাতে সৃচীবেদনবৎ সঞ্চরমান বেদনা।

জ্বর।—স্বল্প-বিরামজ্বরঃ কম্পজ্বর। গুটিকারোগজনিত প্রভূত ঘর্মসম্বলিত বিলেপী-জ্বর। ঐক্যাহিক, দ্বাহিক দ্বৌকালীন দ্বাহিক সবিরামজ্বর। কুইনাইনজনিত ধাতু-দোষ। টাইফয়েডজ্বর।

সমন্বিত।—এবসিষ্ট, আস', ব্যাপ্ট, চায়না, সিড্রন, কার্বলিক এসিড, সোডা-সলকাইট, করণস, কোপেভা, কিউবেব।

## ইউকা ফিলেমেন্টোসা।

ইউকা আমরিক ও আফ্রিক লক্ষণাপেক্ষা পৈত্তিক লক্ষণের প্রধাণ জন্মায়। সমুখ কপালে বা শঙ্খস্থলে শিরঃপীড়া, বারম্বার মুখ-রাগ, পীত বা মলিনবর্ণ মুখমণ্ডল, পীত বা পীতাত শুভ্র জিহ্বা, ও উষ্ণতে দন্তের চিহ্ন, যকৃতের কেন্দ্রস্থানে মৃদু বেদনা, ক্ষুধা-মান্দ্য, উদরের স্ফীততা ও স্পর্শ-দেষ, উদর-বেদনা, বারম্বার বায়ুনিঃসরণ সহকারে কুহন, ঘনঘন জলবৎ বা পীতাত কপিশবর্ণ মল-শ্রাব ইউকার লক্ষণ। এতদ্বারা ত্বকের অরুণিমার গায় লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। হুইজন পরীক্ষাকারীর মেট্রমুণ্ডের আবরণ-চর্মের জ্বালা ও স্ফীততা এবং মূত্রদ্বারের আরক্ততাও জন্মিয়াছিল। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যকৃতের উদ্ধভাগ দিয়া পৃষ্ঠ পর্যন্ত সংপ্রসারিত বেদনা ; মুখের বিরসতা, অধিক পিত্তমিশ্রিত আতিসারিক মল ; মলপথে অধিক বায়ু নিঃসরণ লক্ষণাবিত পিত্ত-প্রকোপে ইউকা অতি প্রশংসিত ঔষধ। ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে মলশ্রাবের বারাদিক্য ; নিদ্রাহইতে জাগ্রিত-মাত্র মল-প্রবৃত্তি ; মলতাগের পূর্বে ও পরে অস্থির নিদ্রাশেষে তীব্র বেদনা সহকারে পীতবর্ণ মল ; কোমল কপিশ মল ও তৎপরে কুহন ; মলতাগান্তে পেটকামড়ানি, ও সমুখের দিকে অবনত হইলে উষ্ণ উপশম ; অবিরত মল-প্রবৃত্তি ; পাঁতলা, পীতাত কপিশ প্রভূত মল, ও মলতাগান্তে মলদ্বারের টাটানি ; \* মলতাগের পূর্বে প্রবল কুহন, কিন্তু একবার মলতাগ আরম্ভ হইলে জলের গায় সবেগে মলশ্রাব ;—এই সকল লক্ষণে অভিমারে এই ঔষধ ফলপ্রদ। যকৃতদোষ ; লিঙ্গমুণ্ডের শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রদাহ ; ও গ্রন্থি-রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

## ইউনিমস এটোপারপিউরিয়স—ওয়াহু ।

ইউনিমস একপ্রকার ক্ষুদ্র গুণ্ডা । ইহা আমেরিকা ও ইউরোপ উভয় মহাদেশেই জন্মে । ইউরোপজাত ইউনিমসকে ইউনিমস হউরোপিয়স কহে । ইউনিমসের বীণ্যকে ইউনিমিন বলে । ইউনিমসের বন্ধলের অস্থি, এবং ইউনিমিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

বেদনা ।—কটি হইতে স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত তাড়িৎ বেগে বেদনার গতি বিশিষ্ট কটি-বেদনা ; এবং কপালে অবিরত বেদনা, ও চক্ষুমুদিত করিবার স্থায় চক্ষুর উপর প্রচাপন লক্ষণাপন্ন শিরোবেদনায় ইউনিমস ইউরোপিয়স ব্যবহৃত হয় । **ব্রাইটসডিজিজ** ।—অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন প্রাতিশ্রায়িক ও আমবাতিক অস্থগ, অর্ধ-শিরোবেদনা ; শিরোবেদনার যতই তীব্রতা মুখে ততই আঁৰুমেনের (অণ্ডলাস) আধিক্য ; নিয়ন্ত্রণ ও শারীরিক দুর্বলতা । যক্কদ্রোণ । এই সকল লক্ষণাবিত ব্রাইটসডিজিজ নামক বন্ধক-রোগে ইউনিমস এটোপারপিউরিয়স ফলপ্রদ । ডাঃ হেলকোম প্রচুর ব্রাইটসডিজিজ ইউনিমিন প্রথম শততম ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া দুইজন বোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন । ডাঃ হেল বন্ধক-রোগের সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করিয়া ইউনিমিন ব্যবহারে গৃষ্ট, কটি, যক্ক ও প্লীহা প্রদেশের বেদনা আরোগ্য করিয়াছেন । তাঁহার চিকিৎসিত বোগীর মুখে অণ্ডলাস প্রকাশ পাইয়াছিল না । **যক্কদ্রোণ** ।—ইউনিমিন যক্কতের ক্রিয়া উত্তেজনা জন্মায় । অতএব যক্কতের ক্রিয়া-বিকার জনিত অধিক পিত্ত-নিঃস্রবে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ও দ্বন্দ্ব পিত্ত-নিঃস্রবে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয় । **অতিসার** ।—ইউনিমিনের লক্ষণে কলার মর্দন ও কলার ইনফান্টমের লক্ষণ দৃষ্ট হয় । ডাঃ হেল বলেন যে যক্কতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ উৎপন্ন শিশুদিগের গ্রীষ্মকালের অতিসারে হরিৎ, পীত, বা জলপাইয়ের বর্ণ মলশ্রাব, উদর-বেদনা, বিবমিষা, পিত্ত-বমন অথবা পিত্তমিশ্রিত ভুক্তদ্রব্য বমন, অল্প অল্প জ্বর, ক্ষুধাহীনতা, অজীর্ণ, বিশেষতঃ দুগ্ধের অপরিপাক, অবসন্নতা, কুপ্তি, ও বদনের পাণ্ডু, পীত, বা য়বর্ণ ; এই সকল লক্ষণে ইউনিমিন তদ হইতে ৬৪ বিচূর্ণ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে অস্বাভাবিক ঔষধাপেক্ষা উপকার দর্শে । উচ্চক্রমেও উপকার হইতে পারে, কিন্তু তিনি এখনও উহার ব্যবহার করেন নাই । এক এক বারের বমন-বিষেচন এক এক রত্নের হইলে সাধারণতঃ পলসেটিলাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পিত্তশ্রাবের বৈষম্যেই মলের একরূপ বর্ণ-বৈষম্য ঘটে মনে করিয়া ডাঃ হেল ইউনিমিন তদ বিচূর্ণ ব্যবহারে শিশুদিগের এইপ্রকার অতিসারে পলসেটিলাই অপেক্ষা অধিক অফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি অতি অল্প বয়স্ক শিশুদিগকে তদ, এবং একটু অধিক বয়স্ক শিশুদিগকে ২৪ ক্রমের বিচূর্ণ তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এতদ্বারা মলের বর্ণ ও গাঢ়তা স্বাভাবিক হইয়া উঠে । **মবিরাম জ্বর** ।—

সবিরাম জরে অস্বাভাবিক তীব্র পিত্তশ্রাবের আধিক্য বশতঃ পৈত্তিক বমন ও বিরেচন থাকিলে ইউনিমিন প্রথমদশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই ঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণমাত্রায় ব্যবহার করিলে জিহ্বা পরিষ্কার ও পিত্ত-শ্রাব স্বাভাবিক হইয়া উঠে। তৎপরে কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি জরের সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। হানসেন বলেন যে পিত্ত-প্রকোপে ও পৈত্তিক জরে ইউনিমিন অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্নিমান্দ্য।—যকৃদ্বোষ জনিত অগ্নিমান্দ্যে ও ইউনিমিন উপকারী। পিত্ত শীলা।—পিত্ত-শ্রাব বিবর্জিত করিয়া এই ঔষধ পিত্ত-শিলায় উপকার দর্শায়। সাগুলাল মূত্র।—যকৃতের লক্ষণ ও প্রগাঢ় বর্ণের স্বল্পমূত্র লক্ষণে ইউনিমিন ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তিষ্ক।—সমস্ত স্নায়ুগুলে একপ্রকার দুর্বলতা অনুভব। পরীক্ষাকারিণীর এরূপ অনুভব যেন তিনি আকৃষ্ট হইয়া গৃহের মধ্যভাগ হইতে উপরে উত্থিত হইতেছেন এবং হাঁটবার সময় পা ফেলিতে আয়াস হইতেছে; কিন্তু দৃঢ়রূপে দাঁড়াইতে পারিতেছেন। বসিবার ও হাঁটবার সময় উবুড করিয়া ফেলিবার হ্রাস অনুভব। মস্তকের উল্লীংশের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিয়া একপ্রকার অল্প গোরববৎ বেদনা। মস্তকের বৃহত্ত ও অপরিচ্ছন্নতা অনুভব। আমাশয় ও অন্ত্র।—আমাশয়ে ভরানক বিবমিষা, এবং বদনে ঘর্ষ ও উত্তাপ, তৎসহকারে পৃষ্ঠের উপর এবং বাহ্যর পৃষ্ঠভাগে পর্যায়ক্রমে শীত; (ভিনিগারে এই লক্ষণ দূরীভূত হইয়াছিল)। অতিবিরেচন, তৎসহকারে অতীব বিবমিষা, অতিশয় পেটকামড়ানি, অবসন্নতা, ও শীতল ঘর্ম্ম। প্রভূত, প্রবল, ও অতিশয় বায়ুনিঃসরণসংযুক্ত বিরেচন। ০ সামান্য বিহুচিকা, ও শিশু-বিহুচিকা,। ( ? )। ০ অতিশয় উদর-বেদনাসংযুক্ত অতিসার। ( ? ) জ্বর।—০ সবিরাম জর। ( ? )।

## ইউফরবিয়ম—উল্ফ্‌স্‌ মিক্স।

ইউফরবিয়সী জাতীয় এই উদ্ভিদ মরোক্কো দেশে জন্মে। ইহার আঠার চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—কোটন, জ্যাট্রোফা; ও অন্যান্য অতি বিরেচক ঔষধের অনুরূপ পরিপাক-পণে ইউফরবিয়মেরও ক্রিয়া দর্শে, এবং বমন, বিরেচন, ও গুলাউঠার হ্রাস অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কেও ইহার ক্রিয়ায় প্রবল রক্ত-সঞ্চয় জন্মে, ও তৎসহকারে তরুণ উন্মাদের লক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাঃ হেম্পেল ইউফরবিয়মের মাস্তিষ্ক লক্ষণ অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করেন। অত্যন্ত লক্ষণের সহিত ইউফরবিয়মের মাস্তিষ্ক লক্ষণ বিতমান না থাকিলে তিনি কখনও ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন না। তিনি বলেন যে

যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া উপদ্রুত না হয়, মস্তিষ্কের উপদাহের কোন নিদর্শন না থাকে, মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়ের, অথবা প্রলাপের কোন লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমাশয় ও অন্ত্রের উপদাহে সদৃশমতে ইউফরবিয়ম উপযোগী প্রতিপন্ন না হইতে ও পারে। ইউফরবিয়ম শ্বাস যন্ত্রের শৈল্পিক বিল্লীর প্রবল উপদাহ ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। চর্মে ইহার ক্রিয়াবশতঃ পামা ও বিসর্পাকার উপদাহ জন্মে।

**অধিকার ।**—আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ ; আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ ; অব্যাপক ওলাউঠা, ও ওলাউঠার অতিসারে ; বিশেষতঃ এই সকল রোগ সহকারে মস্তিষ্কের উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয়, প্রলাপ, এমন কি তরুণ উন্মাদ থাকিলে ইউফরবিয়ম ফলপ্রদ। শিরোবেদনা, অধিক হাঁচি, অশ্রুস্রাব, বিদাহী প্রতিশ্রাব, থক্ থক্ কাস, লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে এই ঔষধ উপকারী। দপদপ ও উৎক্ষেপ সংযুক্ত পেঁচ আঁটার মত দাঁত-বেদনা। বিসর্পজনিত প্রবল প্রদাহ। পচ্যমান ও পামাজ উদ্বেদ। পুরাতন নিস্তেজ ক্ষত। গ্যাংগ্রীণ—এই সকল রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়। ক্যান্সার রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়, এবং এতদ্বারা এপিথেলিওমা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে।

### • প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**অস্থি-রোগ ।**—অস্থির কেরিজ ও অত্যাচার রোগে, অস্থিতে জ্বালা লক্ষণে ইউফরবিয়ম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে পারদ অপব্যবহৃত অস্থিরোগেই জ্বালাকর বেদনা লক্ষণে ইহা বিশেষ উৎযোগী। **কোষ্ঠবদ্ধ ।**—অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা জনিত কোষ্ঠবদ্ধে কঠিন মল আগ্রাসে নির্গত হইলে ; অথবা পূর্বে সরলায় কণ্ডুয়িত হইয়া শিরিষের দ্বারা মল নিঃসৃত হইলে ইউফরবিয়ম ব্যবহার্য। **কোথ (গ্যাংগ্রীণ) ।**—প্রদাহ ও ক্ষীততা, তৎপরে নিস্তেজ গ্যাংগ্রীণ ; শীত ও কম্প ; বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীণ। **গৃধ্রসী ।**—বিদারণ, ছল-বেদন, ও প্রচাপনবৎ বেদনা, নড়িলে চড়িলে উপশম ও অস্থির থাকিলে বৃদ্ধি ; পক্ষাবাতবৎ অনুভব, ও আসন হইতে উত্থানে কষ্ট ইউফরবিয়মের লক্ষণ। **উন্মাদ ।**—অল্পকালস্থায়ী উন্মাদের আবেশ ; ঘোড়ার লাঙ্গুলেরদিকে ফিরিয়া উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি ; আপনার খেয়াল জানিয়া একাকী ও নীরব থাকিবার ইচ্ছা লক্ষণে ডাঃ হেম্পেল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। **বিদগ্ধ-দৃষ্টি ।**—ছানিরোগে দৃষ্টি অর্থাৎ যক্ষুর (লেস) ছন্ধের দ্বারা শ্বেতবর্ণ হইলে ইহা ব্যবস্থেয়। **দস্ত-বেদনা ।**—দস্তের তজুরতায় ইউফরবিয়ম বিশেষ উপযোগী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। দস্তের অবিরাম সূচী-বেদন বা রক্ত করণবৎ বেদনা সহকারে গালের বিসর্পের দ্বারা ক্ষীততা, অথবা খণ্ডে খণ্ডে দস্ত ভাঙ্গিয়া পড়া লক্ষণে ইউফরবিয়ম ব্যবহার্য। **ক্ষত ।**—পুরাতন, নিস্তেজ ক্ষত ; ক্ষতের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ ; স্পর্শজ্ঞান পরিশূন্য ক্ষত ; ক্ষতে কর্কশ ও বিদারণবৎ বেদনা ;—এই সকল লক্ষণে ইউফরবিয়ম ব্যবস্থেয়। **কুমি ।**—কখনও ক্ষুধাহীনতা, কখনও অতিক্রোধ ; লেপাত

জিহ্বা, অন্ন অন্ন জর ; দুর্গন্ধি নিশ্বাস ; আমাশয়ের ক্ষীততা ; কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার ; শীর্ণতা, খিটখিটে স্বভাব, ও নিদ্রাহীনতা লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—বিষাদ ; উৎকর্ষা ; আশঙ্কা । মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ( \* বেল ), এবং অনিয়মিত ক্রত-গতি নাড়ী সহকারে ০ \* তরুণ উদ্ভাদ ( \* বেল, \* হাইও, \* ওপি, \* ট্রাম ) । মস্তক ।—বিষাক্ত বায়ুতে দণ্ডায়মান বা বিচরণ কালে প্রবল শিরোবূর্ণন । প্রবল প্রচাপক শিরঃশীড়া । চক্ষু ।—অশ্রুপাত সহ চক্ষু কামড়ানি । আলোকাসহতা ( \* এক, \* বেল, \* মার্ক, \* সল ) । কর্ণ ।—কর্ণে টুন্টু শব্দ, হাঁচি দিবার সময়ও ঐরূপ শব্দ । নাসিকা ।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি ; তরল প্রতিশ্রায় । মুখমণ্ডল ।—\* পীতবর্ণ রস-পূর্ণ, মটরের ছায় বড় ফোট সংযুক্ত, বিসর্পজনিত, গণ্ডস্থলের প্রদাহিত ক্ষীততা । মুখ-মধ্য ।—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে, ছিন্ন ইওয়ার ছায় উৎক্ষেপণ সহকারে \* পেঁচে মোচড়ানোর মত দাঁত-বেদনা । অত্যন্ত লাল সঞ্চয় ( \* সিক, \* অ'ইও, মার্ক ) । গল-মধ্য ।—আমাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত গলা-জালা ( \* আস', ক্যাস, ক্যাপ্স, মার্ক-কর ) । আমাশয় ।—শীতল পানীয় দ্রব্যের পিপাসা ( \* এক, \* আস', \* ব্রাই, ) । উদার ; বারংবার হিকা । বিবমিষা ও বমন আমাশয়ে জালা ( \* আস', \* ক্যাস, \* ক্যাপ্স, \* মার্ক-কর ) । আমাশয়ে আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও মোচড়ানি । উদর ।—নিম্ন উদর । উদরে অতিশয় বৃজন, তৎপরে বায়ু নিঃসরণ ( \* এলো, \* কলো, \* লাউ ) । প্রবল আক্ষেপিক অগ্নান-শূল ( \* কলো ) । মল ।—প্রচুর বিবেচন ও বমন । অতিসারিক, রক্তাতিসারিক, অন্তরুৎসেচিক, পাতলা, জলবৎ, প্রচূত মল ; লেহবৎ, দ্বিঃ পীতবর্ণ, কাদাকাদা মল ( \* বেল, ক্যাক্স, \* হিপ, পড ) । কোষ্ঠবদ্ধ । শ্বাস-যন্ত্র ।—গলার অভ্যন্তরে অথবা বক্ষস্থলে তুড়তুড়ি সহকারে শুক খঞ্চ খঞ্চ কাস । অগ্নাসিত শ্বাস । বক্ষস্থলের বামপার্শ্বে স্তম্ভীবেদনবৎ যাতনা । নাড়ী ।—ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, ক্রত নাড়ী । দেহ ।—কুচকী ও উরুর অস্থিতে রাত্রিতে জ্বালাকর বেদনা । মুচ্ছা প্রবণতা । ত্বক্ ।—\* বিসর্পজনিত প্রদাহ ; \* দ্বিঃ পীতবর্ণ রসপূর্ণ বড় বড় ফোঁকা । নিদ্রারিত সীমাবিশিষ্ট অর্দ্ধ মণ্ডলকার প্রবল প্রদাহ । পচাম্ন উঃস্তদ, একজিমা, গ্যাংগ্রীণ ( \* আস', \* ল্যাক ) । স্বকের বিদাহী জ্বালাকর কণ্ডুয়ন । জ্বর ।—সর্ষশরীরে শীত ও কম্প । উত্তপ্ত, শুষ্ক গাত্র ( \* এক, \* বেল ) । শীতল ঘর্ষ ( \* ক্যাম্ফ, \* ভিরে-এল ) ।

সমগুণ ।—আস', ক্যাম্ফ, ক্রো টিগ, জ্যাটোফা, কলচি, ইলে, ভিরে-এল ।

## প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

যে সকল নূতন ঔষধ আমার রুত ভৈষজ্যতত্ত্বের পঞ্চম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অথচ সময়ে সময়ে চিকিৎসা কার্যে বাহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য সেই সকল ঔষধের ক্রিয়া, আময়িক প্রয়োগ ও লক্ষণাদি ডাঃ হেল, ফ্যারিংটন, লিলিয়েস্থাল, মার্সী প্রভৃতি চিকিৎসকদিগের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য সকলন পূর্ব্বক এই “নবঔষধাবলী” প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকে পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত দুই চারিটা পুরাতন ঔষধও আছে। ডাঃ হেলের গ্রন্থ অনুপূর্ব্বক অনুবাদ করি নাই। হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থী বাঙ্গলা ভাষাবিদ পাঠকের পক্ষে বাহা বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে করিয়াছি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণ, এতদ্বারা তাঁহাদের কথঞ্চিৎ উপকার এবং এই রোগ-শোক-দারিদ্র্য সঙ্কুল বঙ্গদেশে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার সমধিক প্রচার হইলেই পরিশ্রম সফল হয়।

কেহ কেহ নূতন ঔষধগুলির তত পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা অল্প কয়েকটা ঔষধ দ্বারাই সমস্ত চিকিৎসা কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু রোগের বহুল আকার প্রকার ও রোগীর বিবিধ প্রকৃতি; এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের গুরুতর দায়িত্ব; এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের ভৈষজ্য-জ্ঞানের যতই বাহুল্য থাকে,—অজ্ঞাগার যতই পূর্ণ থাকে ততই মঙ্গল, ততই শত-দীর্ঘ রোগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম-শক্তির আধিক্য জন্মে। অতএব নূতন ঔষধগুলি উপেক্ষা করা উচিত নহে। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে-রোগীর সহিত যে ঔষধের সম-মতে ঠিক সাদৃশ্য আছে তাহা প্রতিনিয়ত বা কদাচিৎ, প্রতিদিন বা বর্ষান্তে একবার ব্যবহৃত হইলেও তাহাই সেই রোগীর প্রকৃত ঔষধ। সেই ঔষধের পরিবর্তে অন্য কোন ঔষধ উপযোগী নহে। সে ব্রহ্মাজ্ঞা ভিন্ন সে রোগ সম্পূর্ণরূপে বধ্য নহে।

নূতন ঔষধগুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্যক পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত ঔষধও আছে। কিন্তু উহাদের চিকিৎসা সিদ্ধ ফলবত্তা সুনিশ্চিত। এজন্য ডাঃ হেল তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকল ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। “ভদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে” মহর্ষি চরকের এই মহাবাক্য কখনও অশ্রুতা হইবার নহে। যে ঔষধে রোগের আরোগ্য জন্মিবে তাহা প্রকৃত ঔষধ বলিয়া চিরদিনই সমাদৃত হইবে। হেল বলেন যে, যে ঔষধে যে কোন সম্প্রদায়ের চিকিৎসক দ্বারা রোগ আরোগ্য হউক না কেন, কেবল সম-মতেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। সম-মত সার্ব্বভৌমিক। সম-মতই চিকিৎসার একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম। উত্তর কালে এই সকল অপরীক্ষিত ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিক্রমে সম্যকরূপে পরীক্ষিত হইলেই উহাদের সদৃশ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পরীক্ষিত হইলেই উহাদের সদৃশ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং তাঁহার বাক্যের যথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। বাস্তবিক অনেকগুলি ঔষধ সন্দেহেই এরূপ হইয়াছে।

ডাঃ হেল লেখেন যে মাত্রা হোমিওপ্যাথি নহে। রোগের ও ঔষধের সাদৃশ্যই



হোমিওপ্যাথি। বিশত ক্রমই হটক বা মূল ঔষধই হটক, যে পরিমাণ ঔষধে নিরুপদ্রবে রোগীর রোগ আরোগ্য হয় তাহাই তাহার পক্ষে যথোপযুক্ত মাত্রা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে এক সময়ে হানিম্যানও কোন উৎকট রোগে ভিরেট্রেমের মূলের চূর্ণ চারিগ্রেণ মাত্রায় চারিমাত্রা ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব এলোপ্যাথি বা অত্যাধিক চিকিৎসায় অধিক মাত্রায় কেবল এক ঔষধে কোন রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে ডাঃ হেল উহা হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্রানুসারেই আরোগ্য হইয়াছে মনে করেন। তিনি বলেন যে এলোপ্যাথি চিকিৎসায় যে স্থলে রোগের উপচয়ের আশঙ্কায় কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয় না সে স্থলে সেই রোগের সহিত সেই ঔষধের মুখ্য-সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে; এবং যে স্থলে স্থল-মাত্রায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যথা, পক্ষাঘাতে নব্ভমিকা, জরায়ুর ত্তরুতায় আর্গট বা কলোকাইলম ব্যবস্থা করিয়া রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় সে স্থলে সেই রোগের সহিত সেই ঔষধের গৌণ-সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। এজন্ত অনেক সময় পরীক্ষা না করিয়াও কেবল এলোপ্যাথিক চিকিৎসার আরোগ্যাদির বিবরণ দেখিয়া প্রকৃত ঔষধের হোমিওপ্যাথিক সাদৃশ্য নিরূপিত হয়। এবং এই প্রকারে উপলব্ধ মুখ্য-সাদৃশ্য-উচ্চক্রম ও গৌণ সাদৃশ্যে নিয়মক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। ইহাই ডাঃ হেলের উদ্ভাবিত মাত্রাবিষয়ক বিশেষ নিয়ম। তাঁহার ও অত্যাতিরিক্ত মাত্রাবিষয়ক মত, এবং তৎসম্বন্ধে ডাঃ ডনহামের সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা মংগ্রহীত ভৈষজ্যতত্ত্বের মাত্রা ও ক্রম নামক খণ্ডে সংক্ষেপে উল্লেখিত আছে। পাঠক তাহা পাঠ করিলেই সর্বিশেষ জানিতে পারিবেন। “নবঔষধাবলী” প্রাধানতঃ ডাঃ হেলের গ্রন্থ হইতেই সংকলিত, সুতরাং ইহার স্থানে স্থানে তাঁহার উদ্ভাবিত এই মুখ্য-সাদৃশ্য এবং মাত্রাবিষয়ক নিয়মের কথার উল্লেখ আছে। এজন্তই এস্থলে উহা বিবৃত হইল।

এই পুস্তকে যে সকল সঙ্কেতাঙ্গী ব্যবহৃত হইয়াছে অভিনব শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এস্থলে তাহা ব্যাখ্যাত হইল। উচ্চারণ।—বাঙ্গালা অক্ষরে যে সকল ইংরেজী শব্দ লিখিত হইয়াছে সেই সকল শব্দের বা শব্দাংশের অন্ত্য অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইবে। চিহ্ন।—যে সকল লক্ষণ ঔষধ-পরীক্ষায় প্রকাশিত ও চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্বে \* এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল লক্ষণ কেবল চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পূর্বে ০ এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। (?) এই চিহ্ন অধিক অল্পসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাসূচক ও অনিশ্চয়তা জ্ঞাপক।

ভৈষজ্য-তত্ত্বের পরিশিষ্ট স্বরূপ “নবঔষধাবলী” সাদরে পাঠকের করে সমর্পিত হইল। ভ্রমসা করি ভৈষজ্যতত্ত্বের ছায় ইহাও তাঁহার নিকট অনাদৃত হইবে না।

## ইউফরবিয়া করোলেটা—মিক্স উইড ।

ইউফরবিয়সী জাতীয় এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ইউনাইটেড স্টেটসে জন্মে । ইহার সরল মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ।**—ইউফরবিয়া করোলেটা পরিপাক-পথের টেলমিক বিধান-তত্ত্বতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ওলাউঠার ত্রায় অবস্থা জন্মায় । ইহার ক্রিয়ায় প্রধানতঃ নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় :—\* আকস্মিক প্রবল বমন, প্রথমে ভুক্তদ্রব্য ও আমাশয়ে অত্যাশ্রু যে পদার্থ থাকে তাহা, অনন্তর প্লেগ্মামিশ্রিত জল, এবং অনাশ্রু সঙ্গশ পরিষ্কৃত তরল পদার্থ বগিত হয়, অব্যবহিত পরেই জ্বলৎ অধিক বিরেচন জন্মে, অতিসার ও বমন অন্তঃকর্ণ পরে পরে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তৎসহকারে অঙ্গের যন্ত্রণাপূর্ণ আক্ষেপ, \* অতিশয় উৎকণ্ঠা, এবং মৃত্যুবৎ দুর্বলতা ও অবসন্নতা থাকে ( আস', ভিরে-এর ) ।

**অধিকার ।**—এই ঔষধে অব্যাপক ওলাউঠায়, বিশেষতঃ শিশু বিহুচিকায় উপকার দর্শে । আমাশয়ে নগরদ্বারা ছিন্ন করার ত্রায় যাতনা, ও শরীরের শীতল ঘর্ম সংযুক্ত উৎকট বমন-বেগ ও বমনও এতদ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**অগ্নিমান্দ্য ।**—ক্লান্তি, বিবমিষা, বমন ও তৎসহ শীতল হস্তপদ লক্ষণে ডাঃ মার্সী এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন । **সামুদ্রিক বিবমিষা ।**—এই রোগে ইউফরবিয়া করোলেটা সম্পূর্ণ সম-মত সঙ্গত । ইহার ৩৬ বা ৬৬ ক্রম ব্যবস্থায় । **কুমি ।**—বালাকালের কুমি-লক্ষণে ইহার মূলের ছালের ১৬ বিচূর্ণ অথবা ইউফরবিনের ৩৬ বিচূর্ণ এক হইতে দুইগুণ মাত্রায় শয়ন সময়ে সেবন বিশেষ ফলপ্রদ । **আমাশয়-প্রদাহ ।**—ভয়-প্রাপ্তি, অথবা অধিক পরিমাণে বরফ বা ফলাদি আহার জন্ত আকস্মিক বিবমিষা, বমন, জলবৎ বিরেচন, ও আমাশয়ে শূন্যতা বা অস্বচ্ছন্দতা অহুভব; দুর্বলতা, মন্দ-গতি দুর্বল নাড়ী; শীতল গাত্র; শীতল হস্ত-পদ; দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম; জন্বা ও পদের আক্ষেপ;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েহাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । ডাঃ হেল গলার অভ্যন্তরে ও আমাশয়ে জ্বালা লক্ষণাপন্ন কয়েকটা রোগীকে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । **ওলাউঠা ।**—ওলাউঠার ও শিশু-বিহুচিকায়ও পুরোক্ত লক্ষণে ডাঃ হেল ইহার তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়া অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ইউফরবিয়া করোলেটা জ্যাক্টোফার ত্রায় বমন, বিরেচন ও সর্বশরীরে শীতল ঘর্ম উৎপাদন করে এবং ওলাউঠার ব্যবহৃত হয় । রোগীর মরিতে প্রবৃত্তি ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ । **রক্তাতিসার ।**—ইউফরবিয়ার বিষ-ক্রিয়ায় জলবৎ অতিসার শেষ হইলে পরে উদর বেদনা সংযুক্ত অন্ত-প্রদাহ; ও সক্ষুণ্ণ আম-রক্ত নিঃসরণ লক্ষণ উপস্থিত হয় । অতএব এই ঔষধসূচক বমন-বিরেচনের পরে রক্তাতিসার

( ডিসেণ্ট্রি ) জন্মিলে অথবা ওলাউঠা বা বাল-বিহুচিকা রক্তাতিসারে পরিণত হইলে ইউফরবিয়া করোলেটা প্রয়োগে উপকার দর্শে । গ্রীষ্মাতিসার ( সমার ডায়ারিয়া ) ।—কোন কোন প্রকার বহুব্যাপক গ্রীষ্মাতিসারের পূর্বে বালক বা যুবকের গাত্রে স্বকের আরক্ততা সহকারে জলপূর্ণ ফোঁফার স্থায় একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় । এই উদ্ভেদ সহসা বসিয়া গিয়া ওলাউঠার স্থায় বিরচন প্রকাশ পায় । এরূপ অবস্থায় ক্রোটন টিগলিয়মের স্থায় এই ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে । পূর্বোৎপন্ন উদ্ভেদ শীতপিত্তের স্থায় হইলে এপিস বা আসের্নিক ; এবং অপচ্যমান পীড়কার স্থায় হইলে পলসেটিলা বা ডলকামারা উপযোগী । আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ ।—আমাশয়ান্ত্রের একপ্রকার বিশেষ উপদাহ জন্মে, তাহাতে অতি অল্পমাত্র শর্দি লাগিলে অথবা আহারের একটু ক্রটি হইলে জল বা ভুক্তান্ন বমন এবং অজীর্ণ দ্রব্য ও জল বিরচন হয়, তৎপরে উদরের ক্ষীণতা ও কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে । এই রোগেও ইউফরবিয়া ব্যবস্থেয় । রোগ একেবারে নিশ্চল করিতে হইলে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রমাগত ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

অতিশয় বিবমিষা, প্রভূত বমন, তৎপরে মস্তময় জলবৎ অতিসার, উদর-বেদনা, অতিশয় অবসাদন, শীতল ঘর্ম, মূছ্রা, থল্লী প্রভৃতি ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ পায় । মূছ্রাকল্পতা সহ মস্তকঘূর্ণন ; কর্ণনাদ সহ অতিশয় শিরোগূর্ণন ; মানসিক উৎকণ্ঠা সহ মৃত্যুবৎ অল্পভব ; বিবমিষা সহ মুখ ও জিহ্বায় জালা ; \* আকস্মিক বিবমিষা, তৎপরে সহসা প্রবল বমন ও তণ্ডুলাশুবৎ বিরচন, তৎসহকারে আমাশয়ে শূন্যতা অল্পভব ; \* অন্ত্রের বেদনাবিশিষ্ট আক্ষেপ সহকারে অন্ত্র হইতে শরীর-ক্ষয়কর প্রভূত বিরচন ; অতিসার সহকারে দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম ; অতিসার ও বমন সহ জজ্বা ও পদের আক্ষেপ ; \* দুর্দ্দম্য অতিসার, অন্ত্রের ও আমাশয়ের তরুণ প্রদাহ ;—এই গুলি ইউফরবিয়া করোলেটার প্রধান-লক্ষণ ।

সমগুণ ।—আস', ক্যাম্ফ, সিকেলি, ভিরেট-এলব্ ।

## ইণ্ডিগো — নীল ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় নিম্নলিখিত রোগে ইণ্ডিগোর ব্যবহার দৃষ্ট হয়-যথা,—  
কুমি ।—স্বত্রকুমি রোগে, বিশেষতঃ অপ্রফুল্ল বালকবালিকাদিগের পক্ষে ইণ্ডিগো উপকারী । কুমি হইতে আক্ষেপ জন্মিলে ইণ্ডিগো উহার উৎকৃষ্ট ঔষধ । ডাঃ ফ্যারিংটন লেখেন যে কুমির উপদাহের প্রতিক্রিয়া বশতঃ অপস্মার সদৃশ আক্ষেপে ইণ্ডিগো ব্যবহৃত হয় । রোগী নিরোংসাহ, বিমর্ষ, বা ভীক প্রকৃতির না হইলে এই ঔষধে কোন উপকার দর্শে না । রোগীর প্রচণ্ডতা বা উত্তেজনা থাকিলে নক্সভমিকা বা বিউকো উপযোগী । মলদ্বারের দুর্দ্দম্য কণ্ডুয়ন বশতঃ বালকের নিজাই হইতে জাগরণ লক্ষণেও ইণ্ডিগো ফলপ্রদ । কাস ।

—শুষ্ককাস, সর্বদা তৎসহকারে নাসিকা হইতে রক্তপাত, প্রবল কাস, কাসিতে কাসিতে বমন ; সাধারণ ও শয্যা শয়নান্তে শ্বাস-রোধক কাস ; হৃৎকম্বি ; ইণ্ডিগোর লক্ষণ ।  
**রক্তশ্রাব** ।—শুষ্ককাস সহকারে নাসিকা হইতে রক্তপাত । অপস্মার ।—রোগীর ভীক ও \* বিষম প্রকৃতি ; জীবনে বিরক্তি, অতিশয় বিষাদ অল্পভব ; \* উদর হইতে মন্তকে উদ্ভাপাবেশ, তৎসহ কপালের চারিদিকে যেন কোন দৃঢ় বন্ধন বঁধা রহিয়াছে এরূপ বোধ ; ভ্রমি সহকারে অপস্মারের আক্রমণের আরম্ভ ; সমগ্র মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাৎ হইতে মস্তকদিকে তরঙ্গবৎ আন্দোলন অল্পভব ; উদরের গ্রন্থিল নায়ু-গুচ্ছ হইতে অথবা শীত বা ভয় হইতে অপস্মারের উৎপত্তি ; ইণ্ডিগোর প্রয়োগ-লক্ষণ । অপস্মারগ্রস্ত-দিগের বিষাদ-বায়ু ( মেলানকোলিয়া ) রোগেও এই সকল লক্ষণে ইণ্ডিগো উপযোগী ।  
**অন্যান্য রোগ** ।—মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্রায়, প্রমেহের পরবর্তী মূত্র-মার্গের সংবৃত্তির সম্ভাবনা ( টেষ্ট ) । \* ঋতু-কালে স্তনে আলা ( গরেন্সি ) । \* মাথা যেন বরফে জমিয়া গিয়াছে এরূপ অল্পভব ও ক্ষুধাহীনতা সহকারে শিরঃপীড়া ।

**বিশেষ লক্ষণ** ।—রোগীর নিরুৎসাহিতা, বিমর্ষতা, বা ভীকতা । মস্তিষ্ক যেন কেবল-স্থানে গুসারিত হইতেছে এপ্রকার অল্পভব । জিহ্বায় ধাতব আচ্ছাদ, ও গল-কোষে আকুঞ্চন অল্পভব । বাম জাহ্নু-সন্ধির উপর চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত : ছেদনকর বেদনা, বাম গুলফ-সন্ধিতে এক অঙ্গুলী বিস্তৃতি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রসারণ, সাধারণ উপবেশনে উহার উপস্থিতি, উঠিয়া হাঁটলে বিরতি, বিশ্রামে আবার প্রত্যাবর্ত্তি । মূত্রে শ্বেয়ার বিद्यমানতা সহকারে মূত্রাশয়ের উপদাহ ।

## ইনাছি ক্রোকেটা — ড্রপ ওয়াটার । ৯

অথেলিফেরি জাতীয় ইনাছি ক্রোকেটা বা ওয়াটার-হেমলক নামক উদ্ভিদ ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেইনের সমস্ত স্থানে জন্মে । আমেরিকায় ইহাকে ওনাছি ক্রোকেটা বলে । ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া** ।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় নায়ু-গুণ্ডে ইহার প্রবল ক্রিয়া দর্শিয়া অপস্মারের চায় আক্ষেপ, এবং মেডলা-অবলঙ্কেটা ও উহার সমীপবর্তী নায়বীয় বিধান-তন্তুর প্রদাহ ও কোমলতা জন্মে । যদিও ইথুসা, সিকিউটা, কোনায়ম ও ইনাছি সমজাতীয় বিষ, ও ইনাছিই সর্বাপেক্ষ তীব্র, তথাপি রোগ-চিকিৎসায় ইহা তত ব্যবহৃত হয় না ।

**আময়িক প্রয়োগ** ।—এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে এই ঔষধে অপস্মারের চায় আক্ষেপ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । সাতমাস গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোকের ; দৃষ্টতঃ হামাদি উদ্ভেদ প্রকাশের পূর্বে একজন বালকের ; এবং ঋতুকালে বিবর্তিত আর একজন স্ত্রীলোকের অপস্মার ; ইনাছি প্রয়োগে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । ডাঃ হিউজ বলেন যে

প্রকৃত অপস্মারে এতদ্বারা উপকার দর্শনা । তবে বালক ও গর্ভবতীদিগের অপস্মারের  
 হ্রাসে আক্ষেপে এই ঔষধ ( ৩ ক্রমে ) উপকার দর্শে । বক্ষঃস্থলের নিম্নতর ভাগে ঘড়  
 ঘড় গন্ধ, ও গাঢ়, ফেণিল নিম্নীতন বিশিষ্ট গল-বণ্ডুয়নকর কাসও এতদ্বারা আয়োগ্য প্রাপ্ত  
 হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—মদিরা-মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ ( \* ) বেল, কাহ্ন \* ঙ্গাম ) ; উন্মাদ । অকস্মাৎ  
 সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতা ( \* বেল, \* ওপি ) ) মস্তক ।—পতন ; এবং বিবিম্বা, বমন,  
 মুচ্ছা ও আক্ষেপ সহকারে প্রবল শিরোগূর্ণন । মস্তকে প্রবল বেদনা । বাক্রোধ,  
 অচৈতন্ত্য ; রক্তনের ক্ষীততা ও সীস-বর্ণ ; প্রসারিত কনীনিকা ; আয়াসিত শ্বাস ; আকু  
 ক্ষিত অঙ্গ ; এবং হস্তস্তম্ভ সহকারে সংশ্বাস রোগ ( \* বেল ) । আক্ষেপের পর তন্দ্রা-দোষ  
 ( কোমা ) । চক্ষু ।—\* কনীনিকা প্রসারিত ( \* বেল, \* হাইও, ওপি, \* ঙ্গাম ) ; চক্ষু  
 উর্দ্ধদিকে ও অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত । নাসিকা ।—নাসিকা হইতে রক্তপাত । মুখমণ্ডল ।  
 —\* মুখমণ্ডলের পেশীর দ্রুত আক্ষেপিক স্পন্দন ( \* এগে ; \* বেল, সিকু, নক্স, ইয়ে ) ।  
 \* সীস-বর্ণ ও \* ক্ষীত, পাণ্ডুর ও শীতল ; মূতবৎ বিকট ; ব্যাকুলিত, মুখমণ্ডল । হস্ত-স্তম্ভ ;  
 হস্তদ্বয়ের স্পষ্ট সঙ্কট ( এবসিহ, সিকু, ইয়ে, হাইও, লরো, নাজা, \* নক্স ) । মুখমণ্ডলে  
 মুখে ফেণা নিঃসরণ ( সিকু, কুপ, হাইও, লরো ) ; রক্তাক্ত শ্লেষ্মা । মুণ্ড গুল ও ঝলসান ;  
 বাক্রশূল । গল-মধ্য ।—গলায় প্রবল আকুঞ্চন ও জালা । আমাশয় ।—হিষ্কা,  
 বুকজালা । বিবিম্বা ও বমন । উদর ।—উদর-বেদনা সহ উদরের অধিক ক্ষীততা ।  
 মল ।—অনিচ্ছায় নির্গত মল ; অতিসার । শ্বাস-যন্ত্র ।—আক্ষেপিক শ্বাস-ক্রিয়া ; আয়া-  
 সিত, দ্রুত, সশব্দ, হ্রস্ব ; সর্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস ও আক্ষেপিক কাস দ্বারা প্রতিহত ; এবং প্রায়  
 অবিজ্ঞেয় ; শ্বাস । হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা । ক্ষুদ্র, ক্ষীণ,  
 অনিয়মিত, প্রায় অপ্রাপ্য, নাড়ী । দেহ ।—\* অপস্মারের হ্রাসে আক্ষেপ, \* ভয়ঙ্কর  
 আক্ষেপ, তৎপরে তন্দ্রা-দোষ বা গভীর নিদ্রা । শিরোগূর্ণন, উন্মাদ, বিবিম্বা, বমন,  
 অচৈতন্ত্য, হস্তবৎ মুখ-বিকৃতি, উর্দ্ধোন্মিত অক্ষি-গোলক, ও প্রসারিত কনীনিকা, সহকারে  
 \* আক্ষেপ ( এবসিহ, বেল, সিকু ) । ক্ষীত, আকস্মিক আক্ষেপ, হস্তস্তম্ভ, জিহ্বা দংশন ;  
 তৎপর সম্পূর্ণ চৈতন্ত্যহীনতা । ক্ষীত ; সীসবর্ণ মুখমণ্ডল ; মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তাক্ত  
 ফেণা নিঃসরণ ; আক্ষেপিক শ্বাস ; অচৈতন্ত্য ; ক্ষীণ নাড়ী ; ও অবসন্নতা, সহকারে  
 আক্ষেপ । জ্বর ।—অত্যন্ত শীতলতা ; শারীরিক উত্তাপের বিলুপ্তি । প্রভূত ঘর্ম ;  
 ঘর্মে দুর্গন্ধ । উপচয় ।—জলে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি ।

সমগুণ ।—এগে, \* সিকু, ঙ্গাম, হাইড্রোসা-এমি ।

## ইরি ও ডিক্টন কালিফর্নিয়াম — ইয়ার্কী স্মাণ্টা ।

এই পরম সুন্দর বৃক্ষ কালিফর্নিয়ায় জন্মে। তথায় ইয়াকে ইয়ার্কী স্মাণ্টা বা পবিত্র তরু বলে। ইহার পত্র হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্বরষস্বে ও বায়ুনলীতেই ইয়ার্কী স্মাণ্টার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গ্রিণ্ডিলিয়ায় সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। গ্রিণ্ডিলিয়ার ত্রায় ইয়ার্কীও শৈল্পিক ঝিল্লী হইতে শ্লেষ্মাশ্রাব জন্মায়, তবে প্রভেদ এই যে গ্রিণ্ডিলিয়ায় যেরূপ শ্বাস রোগের ত্রায় অধিক শ্বাস-ক্লম্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইয়ার্কী স্মাণ্টায় সেরূপ দেখা যায় না; কিন্তু তৎপরিবর্তে অবিরত উপদাহকর কাস, এবং শৈল্পিক ঝিল্লীর অতিশয় অনুভবাবিক্য হৃৎক বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দেহ ও অবদরণাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বায়ুনলীভুজপ্রদাহ।—গ্রিণ্ডিলিয়ায় ত্রায় প্রাদাহিক ক্রিয়ায় ইয়ার্কীও মুখ্যতঃ সম-মত সঙ্গত, স্তত্রাং তরুণ বায়ুনলীভুজপ্রদাহ ও স্বরষস্বে-প্রদাহে ইহা ডাঃ হেলের মতে মধ্যক্রমে উপযোগী। ডাঃ মার্সি ৩শ ও ৬দ ক্রমের উল্লেখ করেন। জরের উপদাহের যতই আধিক্য, বেদনার যতই তীব্রতা ও কাসের যতই পরিপূর্ণতা থাকিবে ততই উচ্চক্রমে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তরুণ রোগ পুরাতনে পরিণত হইলে এবং স্বরের অতিশয় ক্ষীণতা, প্রভূত পুষ্ক শ্লেষ্মা নিষ্টিবন, বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দেহ, ও থল্লী, স্ফুর্ষাহীনতা, ও শীর্ণতা লক্ষণ বিজ্ঞান থাকিলে উপযুক্ত মাত্রায় ইয়ার্কী স্মাণ্টায় সুন্দর ফল দর্শে। ডাঃ পিজের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুসেই (বায়ুবাহীনলে) ইয়ার্কীর অধিকতর ক্রিয়া জন্মে। বায়ুনলীভুজপ্রদাহের ত্রায় নাসিকার তরুণ ও পুরাতন প্রতিষ্ঠায়েও এই ঔষধে উপকার করে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার নিম্নতম ক্রম ব্যবহার করিয়া কতকগুলি পুষ্ক শ্লেষ্মাশ্রাবী পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের রোগী ও হৃৎ-শব্দ-কাস আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সি বলেন যে বায়ুনলী আক্রান্ত হইলে ও ফুসফুসের ক্ষয়রোগে তিনি এই ঔষধের মাদার টিঙ্কার ত্রিশ ফোঁটা দশ আউন্স উত্তপ্ত জলে মিশাইয়া রোগীকে আশ্রয় করিতে দেন; অথবা ইহার দুই একটা পত্র একপাত্র তপ্ত জলে ভিজাইয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দেন। শ্বাস (আজমা)।—আয়াসে নিঃসারিত নিষ্টিবন ও অতিশয় অবসাদন লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েহাল শ্বাস রোগে ইয়ার্কী স্মাণ্টা ব্যবস্থা করেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে নিষ্টিবন নিঃসরণে উপশম লক্ষণে শ্বাস-রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ব্রঙ্কাইটিস থাইসিস রোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বায়ুনলীর প্রতিষ্ঠায় জন্মিয়া অবশেষে উহা যক্ষ্মায় পরিণত হইলে এবং তাহাতে জ্বর, নৈশযক্ষ্মা; শরীরের শীর্ণতা; শ্লেষ্মাসঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-রোগের ত্রায় শ্বাস থাকিলেও আহার সহ্য না হইলে ইয়ার্কী স্মাণ্টা যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করে।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—ঈষৎ মত্ততার শায় শিরোবর্ণন । মস্তকের গৌরব ও জড়তা । মস্তকের সকল দিকে বাহিরের দিকে প্রচাপন অল্পভব, উপমস্তকে উহার আধিক্য । তীব্র শিরোবেদনা । সম্মুখদিকে অল্প অল্প শিরোপীড়া । থাকিয়া থাকিয়া, অথবা সহসা বামে বা দক্ষিণে মস্তক ফিরাইলে দক্ষিণ কর্ণে সূত্রী বেদনা । বাহ্যকর্ণে সঞ্চরমান বেদনা । মুখ-মণ্ডলের আরক্ত রাগ । \* নাসিকা হইতে শর্দিজনিত পীতাহরিরণ শ্রাব নিঃসরণ । নাসিকার প্রতিষ্ঠায় ও হাঁচি । গুল-মধ্য ।—গল-কোষে ও গল মধ্যে জ্বালা অল্পভব । \* নাসিকার পশ্চাভাগের রক্ত হইতে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লেহবৎ শ্লেয়াশ্রাব । নাসিকার পশ্চাভাগের রক্তের পরিশুদ্ধতা । উক্ত রক্তদ্বয়ের উপদাহ, নীচেরদিকে গলার অভ্যন্তরে আঠা আঠা 'শ্লেয়া নিঃসরণ, অবিরত খকখক কাস, গলকোষের কথঞ্চিৎ উপদাহ । আমাশয় ।—আমাশয়ে একঘণ্টা স্থায়ী দারুণ বিবমিষা । কিঞ্চিৎ মাত্র আহারগ্রহণে তরল মলশ্রাব, ও তৎসহ বিবমিষা, তৎপরে উদরের পূর্ণতানুভব । আমাশয় ও অন্ত্রের অতিশয় প্রসারণ অল্পভব, কিন্তু বাস্তবিক কোনপ্রকার ক্ষীণতা লক্ষিত হয় না । হৃৎ-প্রদেশে গৌরব অল্পভব । উদর ।—উদরের অতিশয় ক্ষীণতা অল্পভব, ছত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি । মলদ্বার ও সরলান্ত্রের অতিশয় অস্বথকর শিথিলতা—গুদভ্রংশ । জনন-যন্ত্র ।—প্রধানতঃ বাম অণ্ডে স্পর্শ-দেহ অল্পভব, উহার উপর চাপ সহ হয় না, এবং উহাতে স্পর্শ-দেহ বশতঃ নড়িতে চড়িতে আশঙ্কা জন্মে, অধিক প্রচাপনে উপশম পড়ে । শ্বাস-যন্ত্র ।—\* হাঁসফাঁস স্বর ; শ্বাসরোগের লক্ষণ । স্বর-যন্ত্রের আকৃষ্টন ; বুদ্ধিস্থির উর্দ্ধাংশে কঠনলীতে কিছু যেন প্রচাপিত হইতেছে এপ্রকার অল্পভব । স্বর-যন্ত্রের আকৃষ্টন ও পরিশেষ । স্বর-যন্ত্র ও কঠনলীর উপদাহ । বাতাতপের পরিবর্তনে ও স্বর-রজ্জুর ব্যবহারে স্বর-যন্ত্র ও কঠনলীর অল্পভবাদিক্য, এবং তজ্জন্ত কাসাবেশের উদ্বেক । শুভ্র শ্লেয়া নিঃসরণ । ০ বায়ুনলীর তরুণ ও পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । বক্ষঃস্থল ।—বুদ্ধিস্থির পশ্চাতে অবিরত গৌরব অল্পভব । বক্ষঃস্থলে গুরু ভার স্থাপিতবৎ অল্পভব । বক্ষঃস্থলের গৌরব উহার উপশমার্থে সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন । অল্পক্ষণ পরে পরে, অথবা সহসা অবস্থান পরিবর্তনে দক্ষিণ ফুসফুসে তীব্র বেদনা । হৃৎপিণ্ড ।—হৃৎপ্রদেশে অল্প অল্প বেদনা । এক প্রকার বিশেষ দায়বীয় অল্পভবাদিক্য সহকারে নড়ীর বেগের দশ স্পন্দনের আধিক্য । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—বাম প্রকোষ্ঠে বেদনা । জন্ম বাবহারে আয়স সহকারে বাম জাহুতে উগ্র বেদনা । ত্বক্ ।—গাত্রে আরক্ত উদ্বেক, ও চারি পাঁচদিন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি । জ্বর ।—ঈষৎ জ্বর । গুণদ্বয়ের আরক্ত রাগ ও জ্বালা । নিদ্রা ।—নিদ্রাকালে গৌঁ গৌঁ করা । রাত্রিতে কৌঁ কৌঁ করা ।

সমগুণ ।—ত্রিভুজিয়া, ফল, হিপার, ক্রমেজ, কষ্টিকম, ষ্টাণম, কোপেবা, ড্রিসিরা ।

## ইরেকথাইটিস হাইরেসিফোলিয়াম—ফায়ারউইড ।

আর্দ্র অরণ্যে অথবা দক্ষ ভূমিতে এই উদ্ভিদ সমুৎপন্ন হয়। ইহা হইতে ইরিজারণ বা টর্পেণ্টাইনের ছায় একপ্রকার তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঔষধার্থে এই তৈল হইতে ক্রম এবং লমগ্র উদ্ভিদ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় শরীরস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রে ধামনিক রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হয়। এতদ্বারা বেলেডোনা ও চায়নার ছায়, অথবা রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাতের পূর্ববর্তী শিরঃপীড়ার ছায় শিরঃপীড়া জন্মে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইরেক-পাইটিসের উপদাহকারিণী (ইরিট্যান্ট সদৃশ) ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—রক্তশ্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহ রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

রক্তশ্রাব।—নাসিকা হইতে উজ্জল লোহিতবর্ণ রক্তশ্রাবে এই ঔষধ অমোঘ। মুখ, ফুসফুস, অস্ত্র, জরায়ু, ও বৃকক হইতে ঐ প্রকার রক্তপাতেও ইহা তজ্জপ ফলপ্রদ। ইরেক-থাইটিস, ইরিজারণ ও টর্পেণ্টাইন এই তিন ঔষধেরই মুখ্য রক্তশ্রাবের সহিত রক্ত-সঞ্চালনের উত্তেজনা বিস্তারিত থাকে। এক্রপ অবস্থায় বৃহৎ মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা বিধিত নহে। তৃতীয় দশমিক ক্রমের নিম্নে ইহা ব্যবস্থা করা নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ত্রয়ের গৌণ-ক্রিয়ায় যে শৈরিক রক্তশ্রাব উৎপাদিত হয় তাহার প্রকৃতি অশ্রু প্রকার; উহার সহিত রক্তবহা নাড়ীর নিশ্চেষ্টতা ও শিথিলতা বর্তমান থাকে, রক্ত মলিনবর্ণ ও রক্ততত্ত্ব পরিশুদ্ধ থাকে, এবং উহার নিম্নে একপ্রকার জঁষৎ কৃষ্ণবর্ণ অধঃক্ষেপ নিপতিত হয়। টাইফয়েড জ্বর, ব্রাইটাখা রোগ, ও জীবনীশক্তি নিস্তেজকর অত্যাশ্র রোগে এই প্রকারের রক্তশ্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। শৈরিক রক্তশ্রাবে ১৫ ক্রম বা মূল অরিষ্ট এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল দর্শে।

অগ্নিমান্দ্য।—ইরেকথাইটিস আমাশয়ে জ্বালা, খল্লী; বিবমিষা, বমন; প্রভূত পীতবর্ণ প্রাতে বিবদ্ধিত অতিসার ও তৎসহ উদরে খল্লী জন্মায়। এই ঔষধে এক ব্যক্তির উষ্ণ রুটা ও কফি সেবনের পরবর্তী উল্কার ও বৃকজ্বালা আরোগ্য পাইয়াছিল।

রক্তাতিসার।—বিষুদ্ধ রক্তপাত, জ্বর, ও উদর বেদনাদি লক্ষণাবিত ডিসেন্টারি রোগে একোনাইট বা ইপিলাক সহকারে পর্যায়ক্রমে ইরেকথাইটিস প্রয়োগ করিলে সমস্ত রোগ প্রতিকূল হয়।

রজোরোগ।—নিয়মিত সময়ের পূর্বে অধিক পরিমাণ রক্তশ্রাবে ইরেকথাইটিস ক্যালকেরিয়া ও সিনিসিওর সমকক্ষ। ডাঃ হেল নাসের শেষভাগে ক্যালকেরিয়া বা সিনিসিও, এবং ঋতুকালে ইরেকথাইটিস বা ইরিজারণ ব্যনহার করিয়া থাকেন।



**প্রমেহ।**—থমেহ ও লালা-মেহ (গনোরিয়া ও গ্লীট) রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। কোপেতা ও কিউবেব হইতে ইহার প্রভেদ এই যে এতদজ্ঞাপক শ্রাব সর্বদাই স্বল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়। ইহার প্রদাহের সহিত ক্যান্থেরিস ও টর্পেন্টাইনের প্রদাহের অধিকতর লাদৃশ লক্ষিত হয় এবং ইহার লক্ষণেও অতিশয় যাতনা, ও স্বল্প রক্তাক্ত শ্রাব নিঃসরণ বিস্তমান থাকে। প্রমেহের ভোগকালে বা শ্রাবাবরোধ বশতঃ অণু-প্রদাহ জন্মিলে পলসেটিলা বা ক্রিমোটসের ঝায় এই ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন, প্রত্যেক বস্তু ঘেন উপরে, নীচে ও পার্শ্বে যায়। সম্মুখ কপালে অতীব শিরঃপীড়া। শিরোবেদনা, তৎসহ শঙ্কায়ের ধমনীর দপদপ, এক স্বল্প হইতে অল্প স্বল্প পর্যন্ত পৃষ্ঠের অন্ত্রগ্রন্থে থাকিয়া থাকিমা উভাপের প্রধাবন; সেই উত্তাপাহুভবের সহসা শীতাহুভবে পরিণতি, এবং বিবিম্বা সহকারে মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠে তদ্রূপ গতি।

**নাসিকা।**—\* নাসিকা হইতে উজ্জল লোহিতবর্ণ রক্তপাত।

**মুখ-মধ্য।**—\* দন্ত-মূল হইতে রক্তপাত ও দন্তের শিথিলতা।

**আমাশয়।**—আমাশয়ে জ্বালা ও উদরে খল্লী সহকারে উদ্গার। যেন বিবিম্বা জন্মিলে আমাশয়ে একরূপ একপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। আমাশয়ে জ্বালা সহকারে ঘমন, তৎপরে কাঠবন্ধ। শীতল জল পানাস্তে আমাশয় যেন দ্রবীভূত হইবে আমাশয়ে একরূপ অনুভব। শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়াসহ বিবিম্বা। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। রক্তাক্ত শ্লেষ্মা ঘমন; ০ বিগুহ রক্ত ঘমন। ০ উষ্ণ কট বা কফি সেবনের পর উদ্গার ও বুকজ্বালা।

**উদর ও মল।**—পনর মিনিট অন্তে এক একবার নাভী-প্রদেশে খল্লী। কোষ্ঠবন্ধ, তৎপরে প্রভূত অতিসার। পীতবর্ণ প্রভূত পুরীষময় অতিসার, তৎপূর্বে প্রাতে উদর বেদনা, এবং তৎপরে দুই তিন দিন কোষ্ঠবন্ধ। ০ অল্প হইতে রক্তশ্রাব (টাইফসজরে)। ০ অর্শের বলি হইতে অতিশয় রক্তশ্রাব। ০ আমরক্ত রোগে প্রায় বিগুহ রক্তপাত। শূল সহকারে রক্তের রেখাক্ত অল্প অল্প আম নিঃসরণ।

**জনন-যন্ত্র।**—(স্ত্রী)। \* জরায়ু হইতে উজ্জল লোহিতবর্ণ রক্তশ্রাব ও প্রভূত রজঃ-শ্রাব। ০ প্রভূত অকাল রজঃ। (পুং)।—উপস্থের উত্তেজনা ও উদ্বেক এবং নয়তা ও লজ্জা বিষয়ক স্বপ্ন। প্রাতঃকালের প্রাকালে স্বপ্ন ও রক্তপাত সহকারে লিঙ্গোদ্বেক। \* মূত্রদ্বারে অল্প অল্প জ্বালা, ৩ অধিক পরিমাণে মূত্রশ্রাব। \* দক্ষিণ অণ্ডের ক্ষীততা, অবিরাম বেদনা, স্পর্শ-দেব।

**মূত্র-যন্ত্র।**—\* স্বল্প যন্ত্রণাশ্রম, জ্বালাকর ও রক্তাক্ত মূত্র; মূত্রত্যাগাস্তে মূত্র-মার্গ হইতে রক্ত ক্ষরিত হয়। \* মলিন, শুষ্ক ও রক্তবিমিশ্রিত মূত্র। \* বৃক্ক ও মূত্রাশয় হইতে রক্তশ্রাব। মূত্রে অধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মার অণু ভাসমান। মূত্রের

আক্কেপিক গুরুত্ব ১০.২৪ ; প্রতিক্রিয়া অল্প ; পরিমাণ প্রতিদিন ৪০ আউন্স । অবস্থিতির পর মূত্রের দুগ্ধবৎ আকৃতি । ৪২ আউন্স হইতে ৩৩ আউন্স পর্য্যন্ত মূত্রের পরিমাণের হ্রাস ।

শ্বাস-যন্ত্র ।—শ্লেষ্মা ও পুষ্ণ মিশ্রিত নিষ্ঠীবন ( প্রায় রক্তাক্ত ) বিশিষ্ট কাস ।

পৃষ্ঠ ও শাখা ।—কটিতে অবিরাম বেদনা । নিম্নাঙ্গে বেদনা ।

দেহ ।—\* সর্বাঙ্গীন রক্ত-সঞ্চালনের উত্তেজনা সহকারে প্রবল ধামনিক রক্তস্রাব ।

বিশেষ লক্ষণ ।—\* নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্ত-পাত । মুখ, ফুসফুস, অঙ্গ, জরায়ু ও বৃকক হইতে পূর্বোক্ত প্রকারের রক্তস্রাব, এবং তৎসহকারে রক্তসঞ্চালনের উত্তেজনা ।

সমগুণ ।—এসেরম, কিউবেবা, কোপেতা, ইরিজারগ, মিলিফোলিয়ম, স্ত্রাবিনা, টুলিয়ম, টেরিবিস্থিনা ।

## ইরিঞ্জিয়ম একোয়াটিকম—বণ্টন স্নেকরুট ।

অশ্বেলীফেরী জাতীয় এই শাক আমেরিকায় জন্মে । ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—সঙ্গমেদ্রিয়ের উপরই ইরিঞ্জিয়মের প্রধান ক্রিয়া দর্শে । এতদ্বারা সম্ভোগ-প্রবৃত্তির অবসাদ ও সঙ্গম-শক্তির লাঘব জন্মে । অপর শ্বাস-পথ, ও মূত্রপথের শৈথিল্যক বিলীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া উপদাহ ও শ্লেষ্মাজ্বাবী জ্বষৎপ্রদাহ জন্মায় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—শুক্র-দৌর্বল্যেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় ; দিবসে ও রাত্রিতে উপস্থের উত্থান ব্যতীত অনিচ্ছায় শুক্রপাতে ; কৃত্রিম মৈথুনের পরে ; এবং সামান্য কারণে প্রেষ্টেটিক রসের নিঃসরণে ; ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । অপর, নিম্নোক্ত লক্ষণে মূত্রাশয়ের প্রতিক্রিয়া ও বায়ু-নলী-ভুজের প্রতিষ্ঠায়েও ইহার ব্যবহার আছে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মূত্রযন্ত্র ।—বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ও অল্প অল্প মূত্রস্রাব, এবং মূত্র-মার্গে জ্বালা ও টাটানি ( \* ক্যান-স্রাট, \* ক্যান্থ ) । জনন-যন্ত্র ।—সঙ্গম-লিপ্সার বিলুপ্তি, অনন্তর অশ্রীল স্বপ্ন, \* ও শুক্রপাত সহকারে উহার উত্তেজনা ; \* যৎসামান্য কারণে মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির রস নিঃসরণ । শ্বাসযন্ত্র ।—গাঢ়, রজ্জ্ববৎ, অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ, অল্প অল্প শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে হ্রস্ব কাস ।

## ইলাটেরিয়ম — স্কোয়ার্টিং কিউকয়ার ।

ইলাটেরিয়ম কিউকারবিটেলী জাতীয় উদ্ভিদ । ইহা গ্রীষ্ম ও ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে জন্মে । ইহার অপক বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—শৈল্পিক বিল্লীতে ইলাটেরিয়মের প্রবল ক্রিয়া দর্শ্য । তাহাতে নাসিকা, গল-নলী, আমাশয় অথবা অন্ত্র যে স্থানের শৈল্পিক-বিল্লী দ্বারা প্রথমে ইহা আশোষিত হয় তথা হইতেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলবৎ মস্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে । কিন্তু আমাশয়-প্রণালীতেই ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং প্রবল বমন ও অতিসার জন্মে । বমনে আমাশয়িক নিঃস্রব নিঃসৃত ও অতিসারে অন্ত্রের শৈল্পিক বিল্লীর উপদ্বক নির্গত হয়, অর্থাৎ দীর্ঘ কাল ইহার ক্রিয়া হইতে থাকিলে এক প্রকার আমাশয়-প্রদাহের উৎপত্তি হয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ওলাউঠার অতিসারে মল-লক্ষণদৃষ্টে ইলাটেরিয়মের ব্যবহার হয় । বৃক্ক-মূলক শোথে ; হৃদযন্ত্রের শোথে ; এবং উগ্র সবিরাম জ্বর ও এই ঔষধের সম-লক্ষণ বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগে ; ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । সায়োটিকায়ও ইলাটেরিয়ম ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

আমাশয় ।—বিবমিষা ; অতিশয় দুর্বলতা সহকারে জলবৎ পদার্থ, অথবা স্রবৎ হরিদর্ণ পৈত্তিক পদার্থ বমন । উদর ।—অজ্ঞে কর্তন ও মোচড়ানবৎ বেদনা । মল ।—\* প্রভূত তরল মল ( আস', সিক, ভিরা-এর ) ; \* জলবৎ ; ফেণিল, অথবা জল-পাইয়ের ঞায় সবুজ বর্ণ মল ( ক্রোট-টিগ, গ্রাট, \* সিকে ) । নিম্নাঙ্গ ।—বাম বক্ষণ-স্নায়ুর গতি-পথে পায়ের উপরি ভাগ ও পদাঙ্গুলী পর্যন্ত চিড়িক-মারা বেদনা, অধিকন্তু মুহুঃ অবিরাম বেদনা ।

সমগুণ ।—কলচি, কলোসি, ক্রোট-টিগ, গ্রাট, সিকে, ভিরাট ।

## ইলাপ্স ।

ইলাপ্স কোরেলিনস এক প্রকার বিষধর সর্প । দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশে এই সর্প জন্মে । ইহার গাত্র প্রবালের ঞায় শঙ্ক আছে বলিয়া ইহাকে কোরাল-স্নেক বা প্রবাল-সর্প বলে । ইলাপ্সের বিষ হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—চক্ষু, কর্ণ, ও ফুসফুসেই ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শ্য । এতদ্বারা দৃষ্টিক্ষীণতা, কর্ণহইতে পীতমিশ্রিত হরিদর্ণ, তরল, ও রক্তাক্ত স্রাব নিঃসরণ ও আংশিক রধিরতা জন্মে । পানীয় দ্রব্যে আমাশয় শীতল বোধ হয় । ইলাপ্সের ক্রিয়ায় বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয় । প্রাতে উহাতে এমনই তীব্র বেদনা থাকে যে রোগী শয্যা হইতে

উঠিতে পারে না । ফুসফুসের উভয় শিখরই রোগাক্রান্ত হয় । পানাস্তে বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভূত হয় । কাসের সহিত বুকে তীব্র বেদনা থাকে, দক্ষিণ শিখরেই উহার আতিশয্য অনুভূত হয়, কাসিবার সময় উহা যেন ছিড়িয়া গেল একরূপ বোধ হইতে থাকে, এবং কাল রক্ত নিষ্টিবিত হয় । ক্লেপিও যেন পেষিত হইতেছে ইলাপ্স একরূপ অনুভবও জন্মায় । সাধারণতঃ ইহার ষষ্ঠ ও দ্বাদশ ক্রম ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**দৃষ্টি-হীনতা** :—সকল বস্তুই, রাত্রিতেও শুভ্র দর্শন ; চকুর সম্মুখে ধূসর আচ্ছাদন দর্শন ; মাথা নোয়াইলে মস্তকে রক্ত-উত্থান এবং শিরোবর্ণন ও নাসা-মূলে যাতনা ; আলোক ও অন্ধকারে প্রভেদ করিতে অশক্তি । হৃদাহ ( কার্ডিয়ালজিয়া ) ।—শীতল পানীয় আনাশয়ে বরফবৎ শীতল অনুভব ; আহাৰাস্তে আমাশয়ে ভার-বোধ ; আমাশয়-গহবরে শূন্যতানুভব, ও উপর হইয়া শয়নে উহার শান্তি ; কোষ্ঠবদ্ধ ; কোন সাংঘাতিক রোগাক্রমণের আশঙ্কা, মিষ্টীকৃত ঘোল পানের আকাঙ্ক্ষা । **প্রতিশ্রায়** ।—নাসিকা ও গল-নলীর পুরাতন প্রদাহ । নাসিকা ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ ; অত্যল্পমাত্র বায়ু-প্রবাহে প্রতিশ্রায়ের আক্রমণ ; নাসিকা হইতে শাদা, জলবৎ স্লেমা নিঃসরণ ; গলার আকুঞ্চন ও তজ্জন্ত পেয় দ্রব্যের প্রতিবোধ ; প্রাতে জিহবার ক্ষীততা ও জৈব শুভ্রবর্ণ ; গিলিবার সময় কর্ণ পর্য্যন্ত যাতনায় প্রসারণ ; পুনঃ পুনঃ শিরো-বেদনা, ( বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাৎভাগে ) ; আহাৰাস্তে অননানীতে একথণ্ড স্পঞ্জ অব-স্থিতির হ্রাস অবরোধ অনুভব । **বাল-রোগ** :—শিশুদিগের শক্তি ; অত্যল্প মাত্র বাতাস লাগিলে শক্তির আক্রমণ, নাসিকা হইতে স্বেতবর্ণ জলবৎ স্লেমা নিঃসরণ । **কাস** ।—যক্ষাকাস । কাল রক্ত নিষ্টিবন, ও হৃদ-প্রদেশে ছিন্নতা অনুভব সহ কাস ; প্রায় অবিরত কাস, তৎসহ ফুসফুসের অভ্যন্তর দিয়া বিশেষতঃ দক্ষিণ বক্ষের উর্দ্ধাংশে ভয়ঙ্কর ছিন্নবৎ বেদনা । **শিরোবেদনা** :—যেন সমস্ত রক্ত মস্তকে একত্র হইয়াছে মস্তকের এপ্রকার পূর্ণতা ; হস্তের শীতলতা সহ সংশ্রাস রোগের আশঙ্কা ; মস্তকের মধ্যস্থলে প্রবল বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইতেছে, তৎসহ বিবমিষা ও তজ্জন্ত মস্তক হির রাখিতে অপার-গতা । প্রথমে এক পার্শ্বে তৎপরে অত্র পার্শ্বে কর্তনের শ্রায় বেদনা । **শ্রুতি-দোষ** :—গিলিবার সময় কর্ণে কড়কড় শব্দ ; যেন কর্ণকুহরে একটা মক্ষিকা অবরুদ্ধ রহিয়াছে কর্ণে সর্ষদা একরূপ গুণ্ণ-গুণ্ণ ধ্বনি ; শ্রুতি-বিভ্রম, সিস ও ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ । **কর্ণ-বেদনা** ।—হরিভাভ পীত বা জলবৎ স্রাব ; কর্ণে অতিশয় কণ্ডুয়ন ; শুষ্ক স্লেমা-থণ্ডে নাসারন্ধ্রের অবরোধ ও তজ্জন্ত রোগীর হা করিয়া নিদ্রা যাওয়া । **জ্বর** ।—অপরাহ্ন ৭ টার সময় শীত অনন্তর অতিশয় তাপ, পরিশেষে অল্প অল্প ঘর্ম ; সমস্ত রাত্রি খাস-কষ্ট ও যুত ব্যক্তিদিগকে স্বপ্নে দেখা । এই সকল রোগে পূর্বোক্ত লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েটাল ইলাপ্স ব্যবহারের বিধি

দিন। ডাঃ মার্সী বলেন যে যক্ষ্মারোগের নৈশঘর্ষ, ও ক্ষয়কর অতিসারে এই ঔষধে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। হিচম্যান যক্ষ্মার কাসে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। ফ্যারিংটনও যক্ষ্মারোগে কখন কখন ইলাপ্সের অতিশয় উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

প্রথমে বায় অনন্তর দক্ষিণ চক্ষে প্রবল শিরশীড়া, এবং কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাভাগ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ। অক্ষত, দুর্গন্ধ, পীতাত হরিদ্বর্ণ, রক্তাক্তস্রাব, এবং কর্ণ-নাদ সহ বধিরতা। গলধঃকরণে নাসিকা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা। পুরাতন কর্ণ-স্রাব। প্রতিশ্রায়ে কাল কর্ণ-মল (খইল)। \* কর্ণে গড় গড় ও কড় কড় শব্দ সহকারে রাত্রিতে সহসা বধিরতার আক্রমণ। নাসা-রক্তের উর্দ্ধভাগে অবরুদ্ধতা, নাসিকায় মন্দ গন্ধ, গলকোষ (ফ্যারিংস) চিপটিকাযুক্ত, শুষ্ক ও বিদারিত অথবা শুষ্ক হরিভাত পীতবর্ণ ঝিল্লীধারা আবৃত। নাসিকা হইতে রক্তপাত। পুরাতন গুতিনস্ত্র (ওজিনা) ও নাসিকার প্রতিশ্রায়ে (বালক-বালিকাদিগেরও), শুষ্ক শ্লেষ্মার পৌঞ্জিধারা মতত নাসিকার অবরুদ্ধতা, নাসা-মূলে বেদনা (লাইকো)। শীতল জল পানের পর আমাশয়ে অতিশয় শীতলতা অনুভবের অবশিষ্টতা (কলচি, ল্যাক)। কালরক্ত উত্তোলনসহ কাস (যক্ষ্মায়ও), \* ফুসফুস বেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এরূপ ভয়ঙ্কর বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের শিথরে। পানাস্তে বক্ষঃস্থলের শীতলতা (কলচি, ল্যাক)। বরফের ঝায় শীতল পা।

### ইস্কিউলস্ গ্রাত্রা—বক্আই।

এই বৃহৎ বৃক্ষ মার্কিণথণ্ডে ওহিও নদীর কূলে জন্মে। ইহার শুষ্ক ফলের বিচূর্ণ এবং ডাইলিউট এলকোহল সহকারে বন্ধল ও সমগ্র ফলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ফলেই অবিক বিধ-গুণ অবস্থিতি করে।

ক্রিয়া।—ইহা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠংশীয় স্নায়ুগুলের উপদাহকর; এতদ্বারা অস্ত্র-প্রণালী, ও সম্ভবতঃ যকৃৎ আক্রান্ত হয়।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

অর্শ।—অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট মলিন বেগুণি রক্তের বহির্কলি অর্শে কোষ্ঠবদ্ধ, শিরোধূর্ণন, ত্রিকদেশ ও নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে এই ফল শরীরে ধারণ করিলেও ইহার আরোগ্যকর গুণ শরীরে শোষিত হইয়া অর্শ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সিরিট্রো স্পাইন্ডাল মিনিঞ্জাইটিস (মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় ঝিল্লীর প্রদাহ) রোগেও গ্রীবাস্ত্রস্ত, শিরোধূর্ণন, বমন, টংকার, আখ্যান, ও

অট্টেতত্ত্ব বা তজ্জাদোষ লক্ষণে ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন। পৃষ্ঠবংশের রোগে দৃষ্টি-শক্তির লাঘব সহকারে জজ্বার আংশিক পক্ষাঘাত।

সাধারণতঃ ইহার প্রথম তিন ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মনের বিশৃঙ্খলা ও তৎসহ সর্বদা শিরোবুর্ন, এবং তৎপরে সাধারণতঃ অট্টেতত্ত্ব ও তজ্জাদোষ। মস্তক।—দোলায়মান গতি ও অট্টেতত্ত্ব সহ শিরোবুর্ন। মস্তকের পূর্ণতা ও গুরুতা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বাক্যের জড়তা, বিবমিষা ও বমন সহ শিরোবুর্ন। চক্ষু।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বা বিলোপ। চক্ষুর স্থিরতা ও তাবশূন্যতা। মুখ-মধ্য।—জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্যের জড়তা। আমাশয় ও উদর।—আমাশয় ও উদরের অতিশয় আধান। আহারের অকিঞ্চিৎ সহ বিবমিষা, আমাশয়ে খালধরার স্থায় বেদনা সহ বমন। মল ও মলদ্বার।—\* দুর্বল্য কোষ্ঠবদ্ধ; কঠিন গ্রন্থি মল। \* পৃষ্ঠের খঞ্জতা ও দুর্বলতা সহ মলিন বেণুগিরঙ্গের অর্শবলি। ত্রীবা ও পৃষ্ঠ।—(আক্ষেপিক) গ্রীবাস্তম্ভ। পশ্চাদিকে বক্রকর টকার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—পৃষ্ঠের অতিশয় খঞ্জতা ও দুর্বলতা। জন্তুদিগের পশ্চাৎ পদের পক্ষাঘাত। আক্ষেপিক আকুঞ্চন সহ নিম্নাঙ্গের কম্পন। নিদ্রা।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলা সহ অট্টেতত্ত্ব তৎপরে তজ্জাদোষ। দেহ।—আক্ষেপ ও তৎপরে পক্ষাঘাত।

বিশেষ লক্ষণ—মদিরা-মত্ততার স্থায় আন্ডোলিত গতি সহকারে শিরোবুর্ন। বিশৃঙ্খল স্থিতি। মস্তকের গোরব। বাক্যের স্থূলত্ব। আমাশয়ে খল্লী। অতিশয় দুর্বলতা। কম্পন ও জজ্বা-সঙ্কোচন করিবার ঔষল প্রবণতা।

সমগুণ।—ইন্ডিউ-হিপো, এলোজ, কোলিন, ককিউ, ইয়ে, নব্ব-ভম, জিন্ন-ক্লাউ।

### একেলাইকা ইণ্ডিকা—যুক্তাবুরী।

এই গুল্ম ভারতবর্ষে জন্মে। এলকোহল সহকারে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ক্যালকেরিয়া কার্কনিকা একেলাইকার বিষমগুণ।

ক্রিয়া।—কেবল খাস-বস্ত্রেই ইহার ক্রিয়া দর্শে, এবং \* শুষ্ককাস ও তৎপরে রক্ত-নিষ্টিবন জন্মে।

শুষ্ক কাস তৎপরে রক্তনিষ্টিবন। রক্তকাস, প্রাতে পরিষ্কার রক্ত সন্ধ্যাকালে দলাদলা মলিন রক্তশ্রাব; রাত্রিতে ঔষল কাশের আবেশ। স্বরভঙ্গসহ রক্তকাস। ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব। ক্ষয়রোগগ্রস্তা রোগিণীর কখনও গ্যাচ কখনও জলবৎ স্বেতপ্রদর। এইগুলি একেলাইকার লক্ষণ।

**আময়িক প্রয়োগ ।**—এই ঔষধে রক্ত-কাস আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । ডাঃ হেল বলেন যে প্রাতে বিস্তৃত রক্ত, ও সায়াহ্নে মলিন সংযত রক্ত-পিণ্ড নিষ্টিবন একেলাইফার প্রয়োগ-লক্ষণ । কলিকাতার ডাঃ টনিয়ার ইহার অরিষ্ট দশবিন্দু মাত্রায় পান করাতে প্রবল শুষ্ককাসের আক্রমণ ও তৎপরে রক্ত নিষ্টিবন প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তিনি এই প্রকার অবস্থায় এই ঔষধ সদৃশ মতে ব্যবহার করিয়া কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন । ডাঃ হলকোম ও টমাস বলেন যে ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে অত্যন্ত ঔষধ বিফল হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় । প্রাতে বিস্তৃত রক্ত ও সন্ধ্যাকালে মলিত সংযত রক্তস্রাব ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ । ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে প্রাতে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে মলিন সংযত রক্তস্রাব ; নিষ্টিবন পরিশূন্য কাস ; ও বক্ষ-দাহ-পূর্ব্ব ধামনিক রক্তস্রাব লক্ষণে ফুসফুসের রক্তস্রাবে একেলাইফা উপযোগী । ডাঃ ফ্যারিংটন শুষ্ককাসের আবেশের পরবর্ত্তী রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । ডাঃ হেল লেখেন যে গুটিকা জনিত ফুসফুসের রক্তস্রাবে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী নহে । কিন্তু লিলিয়েস্থাল বাম ফুসফুসের শিখরদেশে গুটিকা সঞ্চয় ; প্রাতে উজ্জ্বল লোহিত ও সন্ধ্যাকালে মলিন রক্তস্রাব ; রাত্রিতে কাসের অত্যন্ত প্রাবল্য, বক্ষঃস্থলে অবিরাম তীব্রবেদনা, ও অঙ্গুলীর আঘাতে অতীব শব্দ ; এবং ক্রমাগত নীর্ণতা প্রাপ্তি লক্ষণে যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । ইহার ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশক্রম ব্যবহৃত হইয়াছিল ।

**সমগুণ ।**—একন, আর্গ, হেম, ইপি, মিলি, ফস ।

## এক্টিয়া স্পিকেটা—বেনবেরি

এক্টিয়া স্পিকেটা রেণনকিউলেসী জাতীয় উদ্ভিদ । এই তৃণ ইউরোপ ও এসিয়ার অরণ্যে জন্মে । ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ।**—এক্টিয়া স্পিকেটার ক্রিয়ার প্রধানতঃ আমবাতের ত্রায় একপ্রকার অবস্থা জন্মে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতেই এই ক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ।

**আময়িক প্রয়োগ ।**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আমবাতিক গ্রন্থিবাতেই এই ঔষধ বিশিষ্ট-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; আমাশয়ের অল্পত্ব বিত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী হয় ।

**প্রধান প্রধান লক্ষণ ।**

**ঈন ।**—\*প্রচণ্ড প্রলাপ (\*বেল, ক্যাছ, \*ষ্ট্রাম) । **মুখমণ্ডল ।**—\* মুখমণ্ডলে আমবাতের ত্রায় বেদনা (একন) । **আমাশয় ।**—\* অল্প বমন (ক্যাক্স, আইরিস্, ইপি, নক্স, পড) । **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।**—\* যৎসামান্য শান্তির পরে সন্ধির ক্ষীণতা ।

\* হস্তদ্বয়ে পক্ষাঘাতের চর্কলতার ত্রায় বেদনা । \* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত (\*কল, লিড) ।

মণিবন্ধে অথবা অঙ্গুলী-সন্ধিতে বেদনা; স্পর্শে অতিশয় স্পর্শ-দেব, দারুণ বেদনা, রাত্রিতে উহার আতিশয়। নিম্নাঙ্গের ক্ষীণতা, বেদনা, ও দুর্বলতা। উরুদ্বয় উত্তোলন সময়ে উহার কম্পন। জাহ্নুদ্বয়ে অতিশয় শ্রান্তি অনুভব। দেহ।—আহারান্তে, বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণান্তে, অথবা অধিক-কথা বলিলে অতিশয় অবসাদ ও দুর্বলতা। \* ছেদন ও আকর্ষণবৎ বেদনা।

সমগুণ।—একন, কল, সিমি, লিডম।

## এগেভ এমেরিকানা—এমেরিকান এলো।

এই উদ্ভিদ এমেরিকার মেক্সিকো, ফ্লোরিডা প্রভৃতি দেশে জন্মে। ইহা দেখিতে সুসব্বর শ্রাতীয় বৃক্ষের অনুরূপ। ইহার মূলে ও পত্রের এক প্রকার স্মিষ্টরস আছে। উহা ঘনীভূত করিয়া চিনি, ও অন্তরুৎসেচিত করিয়া সুরা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার অন্তরুৎসিক্ত রসপানে মত্ততা জন্মে। এগেভের সত্ত্ব রস মূত্রকর, মূত্রবিরেচক, ও রক্ত-নিঃসারক বলিয়া উল্লেখিত আছে। এপর্যন্ত ইহার ভর্জিত পত্রের রসই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে এগেভের সরস পত্র ও মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগেভ লেবুর রস, সাইট্রিক এসিড, কালী ক্রোর, ও ভ্যাট্রুম-মিউরের সমগুণ। সেনাদিগের পাণ্ডুর ও ম্লান মুখাঙ্কতি লক্ষণাপন্ন স্বার্ভি রোগে এই ঔষধ আরোগ্যকর। দন্ত-মূলের ক্ষীণতা ও রক্তপাত; জন্মায় মলিন, বেগুনি রঙ্গের দাগ, সেইগুলির ক্ষীণতা, ব্যথিততা, ও প্রস্রাববৎ কঠিনতা; নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও ক্ষীণতা, এবং মূলের আবদ্ধতা লক্ষণে স্বার্ভি (শীতাদ) রোগগ্রস্ত এগারজন রোগী লেবুর রস বিকলাস্তে এই ঔষধ সেবন করিয়া সত্ত্বর উপকার লাভ করিয়াছিল। প্রমেহের যাতনাসংযুক্ত লিঙ্কোথানেও ইহার ব্যবহার হয়।

## এক্সফুরা ।

এক্সফুরা তিক্ত গন্ধদ্রব্যের অন্তর্গত এবং বল্য বলিয়া অভিহিত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার অত্যাশ্রয় গুণও আছে। এতদ্বারা পেশীর ও সন্ধিস্থানের আকৃষ্টতা, অশিথিলতা, ও স্তম্ভতা জন্মে এবং উহাতে আঘাতাস্তিক বেদনার স্থায় এক প্রকার ঘূষ্টবৎ বেদনা ও স্পর্শ-দেব থাকে। এই অশিথিলতা শব্দ ও হস্তর পেশীতেই সমধিক অনুভূত হইয়া হস্তস্তম্ভের আভাস প্রকাশ পায়। এক্সফুরা অস্থিও আক্রমণ করে এবং অপর আর একটা কুটেনী জাতীয় ঔষধ ক্রুটা গ্রেবিওলেসের সহিত এবিধে ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অস্থি-বেহের উপঘাত্তেই সঞ্চরনতঃ ক্রুটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পেশীর প্রচ্ছন্ন সঙ্কোচন সম্বলিত



অস্থির উপঘাতে এস্ফুটুরা অধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। এস্ফুটুরা ভিয়ার ক্রিয়া যে অস্থিতে জন্মে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দীর্ঘাস্থি আক্রান্ত হইলেই ডাঃ ইজিডি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ডাঃ করণ্ডারকার ইহার দ্বিতীয় শততমিক ক্রম ব্যবহারে একজন রোগীর নিম্ন হস্তর নিক্রোসিস রোগ সম্যকরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন। সামান্য কারণে কোপনতা (কেরিজ রোগসহ); কফি সেবনের আকাজকা; কোমল মল সহকারে দীর্ঘলাঙ্গের আবেগ (কুহন); মূত্র-বেগ ও শুভ্র মূত্র-নিঃসরণ; পেশীর প্রচলন সঙ্কোচন সম্বলিত অস্থি বেগের উপঘাত এইগুলি এস্ফুটুরার চিকিৎসা-সিদ্ধ বিশেষ লক্ষণ। আর একপ্রকার এস্ফুটুরা আছে তাহাতে এস্ফুটুরা ফল্‌সা বা কৃত্রিম এস্ফুটুরা বলে। ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় না।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ভ্রমি।—প্রবাহিত জল পার হইবার বা খালের ধারে বেড়াইবার সময় পতনের আশঙ্কাজনক ভ্রমি; মস্তকের পশ্চাঙ্গাগ হইতে ভ্রমির উৎপত্তি। মূত্র-রোগ।—মূত্রাশয়ের আবেগ ও তৎপরে অধিক পরিমাণ শুভ্র মূত্র নিঃসরণ; মূত্রভাগের পর আবেগ; ঘারবার মূত্রভাগের প্রয়োজন, অথচ এক এক বার কয়েকবিন্দু মলিন পীতবর্ণ মূত্র-মাত্র নিঃসরণ ও তজ্জন্তু জ্বালা; কমলারঙ্গের মূত্র ও সত্ত্বর উহার আবিলতা। হ্রুপশব্দ কাস।—প্রাতে কণ্ঠনলীর নিম্নভাগের একপ্রকার উপদাহ বশতঃ প্রবল কাসের উদ্বেক, দিবাভাগে পীতবর্ণ অধিক শ্লেষ্মা নিষ্টিবন; স্বরযন্ত্রে হ্রুশ্রু শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ স্বরভঙ্গ; সবিরাম আক্ষেপিক নিশ্বাস, অতিশয় শ্বাস-কষ্ট। ধনুস্তম্ভ।—পৃষ্ঠের পেশীর আক্ষেপসহ ধনুস্তম্ভ ও হনুস্তম্ভ; গ্রীবা ও স্বক্কাস্থির শুকতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুকতা ও প্রসারণ; বৈদ্যুতিক প্রকম্পনের হ্রায় পৃষ্ঠে স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, আক্ষেপিক স্পন্দন; স্পর্শ, শব্দ, বা দ্রব্যহৃৎ জল পানে উদ্রিক্ত ধনুষ্টকারের আক্ষেপ; আক্ষেপকালে আরাসিত শ্বাস; গোঁগোঁ শব্দ ও অক্ষি-নিমীলন; বদনের পেশীর আকৃষ্টতা, পান-প্রবৃত্তি পরিশূন্ত পিপাসা; ক্রত, আক্শিপ্ত, ও সবিরাম নাড়ী। পক্ষাঘাত।—পক্ষাঘাত, অস্থির মজ্জার শুকতার হ্রায় সর্ব শরীরের দুর্বলতা; পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও প্রসারণী পেশীর পীড়া; পৃষ্ঠে তাড়িং প্রকম্পের হ্রায় স্পন্দন ও স্পর্শ, শব্দ বা দ্রব্যহৃৎ জলপানে উদ্রিক্ত ধনুষ্টকারের আক্ষেপ; পীড়া-ক্রান্ত স্থান স্পর্শে রোগের আধিক্য; পক্ষাঘাত সংযুক্ত বাত। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রদাহ।—পৃষ্ঠে তাড়িং প্রকম্পের হ্রায় স্পন্দন ও উৎক্ষেপ; মুখমণ্ডলের পেশীর অশিথিলতা; হনুস্তম্ভ অস্থি-রোগ।—অস্থি-ক্ষত; অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট ক্ষত, উহার অস্থি আক্রমণ ও অস্থির মজ্জা পর্গাস্ত প্রবেশ, খণ্ড খণ্ড অস্থি পতন; অধিক কফি পায়ী ও কফি পানের অতিরিক্ত ইচ্ছা বিশিষ্ট, এবং সামান্য কারণে সহজে ক্রোধোদ্রিক্ত ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দীর্ঘাস্থির কেরিজ (এলেন) নিম্ন-হস্তর নিক্রোসিস (ফ্যারিংটন)। হৃদ-শূল।—

আকস্মিক শ্বাস; অবিরত বক্ষঃস্থলের সঞ্চলন-গতি; উৎকর্ষ ও ক্লংকম্প; বৃদ্ধাঙ্গি ও পৃষ্ঠে কর্তনবৎ আকস্মিক বাতনা; সায়াহ্নে শয়নে হৃদ-প্রদেশে আকুঞ্জন অন্তঃভব, উঠিয়া বসিলে উহার হ্রাস। এই সকল রোগে ডাঃ লিলিয়েস্থাল এজুটুরা ব্যবহারের বিধি দেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

হৃদয় উদ্ঘাটিত করিবার সময় কপাল প্রান্তের পেশীতে কার্যদ্বা ধরার ছায় বেদনা। \* মুখমণ্ডলের পেশীতে আকর্ষণ। \* চর্ষণ-পেশীতে বেদনা, বোপ হয় যেন অভিরিক্ত চর্ষণ করিতে করিতে উহার শান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বসিয়া থাকিলে অথবা নিদ্রাকালে প্রবল ক্লংকম্প, তৎসহকারে ক্লংপিণ্ড যেন আকুঞ্চিত হইয়াছে এরূপ বাতনা অন্তঃভব (কাক্সি)। দক্ষিণ স্বক্সাঙ্গির নিম্ন হইতে স্তন-বৃত্ত পর্যন্ত কর্তনবৎ বেদনা। \* স্বক্সাঙ্গি দ্বয়ের মধ্যস্থানে ও গ্রীবার পশ্চাত্তাগে, তাড়িতাঘাতের অনুরূপ, আকর্ষণবৎ স্তক (ষ্ট্রিফ) বেদনা। বাম উরুর মধ্যে ও কট্যঙ্গির উপরের প্রান্তে অত্যন্ত বাতনাপূর্ণ উৎক্ষেপণবৎ স্ফটী বেদন, এবং কেবল উপবেশন-কালে উহার অন্তঃভব।

### এনোথিরা বাইএনিস।

এনোথিরা বাইএনিসকে ইংরেজীতে ইভনিং প্রিমরোজ বলে। এই পুষ্পবৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। তথায় ইহা এনোথিরা উচ্চারিত হয়। সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্রুত হয়। ইহার ক্রিয়া এক্ষণে সন্নিশ্চিত হয় নাই। পুরাতন অতিসার; \* শিশু-বিস্রুচিকা; এবং অবসাদজনক, প্রায় অনিচ্ছায় নিশ্বেত, জলবৎ \* গ্রীষ্মকালীয় অতিসারের চিকিৎসায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

অতিসারেই প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে অবসাদকর, জলবৎ অতিসারে এনোথিরা অমূল্য ঔষধ। ইহাতে ট্যানিক এসিড আছে এজুট ইহার ক্রিয়া সঙ্কোচক স্বরূপ দর্শন বলিয়া যে উল্লেখিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। এনোথিরা বাস্তবিক সম-মতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কেননা এতদ্বারা অতিসার উৎপন্ন ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। চেষ্টা ব্যতীত মলস্রাব ও তৎসহকারে দ্বায়বীয় অবসাদ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে টাইফয়েড জরের পরবর্তী অবসাদকর জলবৎ অতিসার; বালক দিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসার; প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রত্যাবৃত্ত পুরাতন অতিসার; অতিশয় নিরাশিতা, পাণ্ডুরতা, ও দীর্ণতা সংযুক্ত প্রসবাস্তিক অতিসার; এবং দ্বায়বীয় অতিসারে এনোথিরা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ডাউগ্লাস বালক দিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসারে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। প্রত্যেকবার মলস্রাবের পরে ইহার মাত্রার টিকায় এক এক বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া তিনি দুই তিন দিবসে এই রোগ

আরোগ্য করিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রকার অতিসারে, অপাচিত ভুক্তদ্রব্য বিমিশ্রিত অতিসারে এবং রক্তাতিসারেও ইহা ফলপ্রসূ। টাইফয়েড জ্বরের জলবৎ অতিসারে, পেদ্যারাখ্য গ্রন্থির ক্ষতে প্রগাঢ় সুপ্তি বা তন্দ্রা-দোষ সত্ত্বেও এই ঔষধের মাদার টিকার পাঁচ বিন্দু মাত্রায় দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারে উপকার দর্শে।

## এন্ট্রাসাইনঃম।

এন্ট্রাসাইনঃম রোগজ ঔষধ। এন্ট্রাসাইন অর্থাৎ কার্ককলের বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

কার্ককল, দূষিত ক্ষত এবং \* ক্ষত, পচলা ও-অসহ জ্বালাসংযুক্ত রোগে এন্ট্রাসাইনঃম ব্যবহৃত হয়। যখন আর্সেনিক বা অত্র কোন সুনির্বাচিত ঔষধে কার্ককল কিংবা দূষিত ক্ষতের জ্বালাকর বেদনার নিবারণ হয়না, তখন ইহা ব্যবহার্য। রক্ত-স্রাব; মুখ-বিবর, নাসিকা, মল-দ্বার বা মূত্র-দ্বার হইতে রক্ত-ক্ষরণ; কাল, গাঢ়, আলকাতরার মত, শীঘ্র শীঘ্র বিসমাসিত (ক্রোট) রক্ত। সেপ্টিক ফিভার, শীঘ্র শক্তি-ক্ষয়, নাড়ীর নিম্নগতা, প্রলাপ ও মুচ্ছা (পাইরো)। গ্যাংগ্রীণ সংযুক্ত ক্ষত; দূষিত প্রকৃতির অঙ্গুল-হার, কার্ককল, এরিসিপেলাস। দূষিত অঙ্গুল-হার; পচলা ও ভয়ানক জ্বালাকর বেদনা (আর্স, কার্ক-এসি, ল্যাক)। সাংঘাতিক দূষিত ত্রণ, \* কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ফোঁফা, চর্বিণ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু। কার্ককল। \* ভয়ঙ্কর জ্বালাকর বেদনা; রসানির ত্রায় ছুরিত পুষ নিঃসরণ। মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ জনিত ক্ষত, বিশেষতঃ উহার গ্যাংগ্রীণ জন্মিবার অভিযুক্ততা; দূষিত পুষজ জ্বর (সেপ্টিক ফিভার), সুস্পষ্ট অবসন্নতা (আর্স, পাইরো)। সন্ধিগ্ন কীটের ছল-বেধ। ক্ষীণতার বর্ণের পরিবর্তন, এবং আঘাত-স্থল হইতে লসিকাবাহী নাড়ীর গতি-পথে লাল লাল রেখার উৎপত্তি (ল্যাক, পাইরো)। পুষ বা অত্র কোন দূষিত পদার্থ রক্তে শোষিত হইয়া জ্বালাকর বেদনা ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন প্রদাহ (আর্স, পাইরো)। গো, মেঘ ও অশ্বের বহুব্যাপক প্লীহা রোগ। পচাজ্বরের বা মৃত-দেহ-ব্যবচ্ছেদগৃহের দুর্গন্ধ আব্রাণের মন্দফল; দুর্গন্ধ নিশ্বসনে বিযুক্ততা (পাইরো)।—উপরোক্তস্থলে এন্ট্রাসাইনঃমের প্রয়োগ হয়।

হেরিং বলেন কার্ককলকে শস্ত্র-চিকিৎসার রোগ বলা ঠিক নহে। উহা কাটিয়া দেওয়ায় প্রায়ই অপকার হয়। কার্ককল কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, প্রকৃত চিকিৎসায় একটা রোগীও নষ্ট হয় নাই।

সম্বন্ধ।—(১) পুষ-দূষিত অবস্থায় আর্স, কার্ক-এসি, ল্যাক, সিকেলি, পাইরোর সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) ক্যান্সার, কার্ককল অথবা এরিসিপেলাসের ভয়ানক বেদনার যখন আর্স বা এন্ট্রাসাইন উপশম জন্মেনা তখন ইউফরবিয়ামের সহিত এই ঔষধ তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

# এপোসাইনম এণ্ডোনেমিফোলিয়ম—বিটারকট ।

এই বৃক্ষ আমেরিকায় ইউনাইটেড স্টেটসে জন্মে । কুসুম উৎপাদনের পর আগষ্ট মাসে সমগ্র সরস বৃক্ষ বা মূল হইতে ডাইলুট এলকোহল সহকারে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—পেশী ও সন্ধিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং সম্ভবতঃ তন্তুর বিধানেও (সেরাস টিসু) এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্রাংশের পেশী ও তন্তুময় বিধানে এই এপোসাইনমের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া ডাঃ হেল লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া দুই জন “ক্লমেটিক গার্ডট” গ্রন্থ রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, দুই জনই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল । ডাঃ হেনেরির পরীক্ষাভাসারে সন্ধির তরুণ বেদনার সহিত ঋণী, পৈত্তিক মল ও দস্তে চলিষ্ণু বেদনা এই ঔষধি প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । ইহার মূল অরিষ্ট এক এক বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলে ক্রমি নিঃসারিত হয় । শোথেও ইহার ব্যবহার আছে, কিন্তু শোথরোগে এপোসাইনম ক্যানেরবিনমই সমধিক ফলপ্রদ । অতিশয় শুষ্কতা সংযুক্ত তরুণ বাত । সন্ধির ক্ষীণতা ও পিত্ত বমন সংযুক্ত পুরাতন সন্ধি-বাত । সাধারণ আমবাতিক বেদনা ।—এই সকল স্থলেও এই ঔষধ উপকারী ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—\* পিত্ত, আমবাত, ও রক্তসঞ্চয়জনিত শিরঃপীড়া । \* আমবাতিক বা হায়বীয় অর্ধ-শিরঃশূল । নাসিকা ।—নাসারন্ধ্রের অতিশয় কণ্ডুয়ন ও উপদাহ সহ তীব্র হাঁচি । মুখমণ্ডল ও দন্ত ।—মুখমণ্ডল ও শরীর ক্ষীণ অল্পভব । মুখমণ্ডল ও শরীরের প্রবল কণ্ডুয়ন । মুখমণ্ডলের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা; মুখমণ্ডলের স্পন্দন । বামপার্শ্বে নিম্ন-হৃদয় সমস্ত দস্তে বেদনা । আমাশয় ।—জিহ্বার শুষ্ক লেপ । প্রবল শিরঃপীড়া সহ অত্যন্ত বিবমিষা । উদগার সহ অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল বমন । বিবর্জিত ক্ষুধা । উদর ।—অবিবর্ত বিবমিষা ও বমন সহ অতিসার । সন্ধ্যাকালে জ্বর উদর-বেদনা সহ কণ্ঠবর্ণ কোমল প্রচুর মলশ্রাব । ক্রমি নিঃসরণ । অগ্নিমান্দ্য । মূত্রযন্ত্র ।—অতিশয় মূত্রাধিক্য (মুখ্যাকল) । শিরঃপীড়া সহ স্বল্প মূত্র (গৌণফল) । মূত্রত্যাগ-কালে মূত্রমার্গে জ্বালা অল্পভব । মূত্ররোধজনিত তন্দ্রা-দোষ । হৃদ্রোগজনিত শোথ । জননযন্ত্র ।—পুরুষাঙ্গের প্রান্তে তুড়তুড়ি অল্পভব । লিঙ্গমূণ্ডে উপদংশ ক্ষত । (স্ত্রী) প্রসববেদনার ছায় বিবামশীল বেদনা । রক্ত-শূল, ও গর্ভশ্রাবের উপক্রম এবং তৎসহ প্রভূত মূত্রশ্রাব । শ্বাসযন্ত্র ।—বায়ুনলীভূজপ্রদাহ ও অত্যাশ্রয় ফুসফুসীয় রোগে কফ নিঃসা-রক । বায়ুনলীভূজের উপদাহ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—তরুণ বাত, প্রদাহ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সন্ধিতে নিবন্ধ, অতিশয় বেদনা ও ক্ষীণতা । পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্ধির তরুণ বাত । অঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে বেদনা । চর্ম্ম ।—গাত্রের শীতলতা সহ সারারাত্রি প্রভূত ঘর্ম্ম । নিদ্রা । প্রচুর ঘর্ম্ম সহ অতিশয় নিদ্রালুতা । জ্বর ।—হৃৎপিণ্ডের বিবর্তিত ক্রিয়া ; ক্ষত ও পূর্ণ নাড়ী । সমগুণ ।—একন, এসক্লি-টিউ, এসি-বেজ, কলোকা, কলচি, সিমিসি, আইরিস, পডো ।

## এপোমফাইনম ।

অহিফেণের বীৰ্য্য মফাইন হইতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহযোগে এপোমফাইন নামক উপক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায় । ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—এপোমফাইনম বমন জন্মায় । বমনোৎপাদনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে । \* “বমন-প্রবৃত্তি । \* পূর্ব্ববর্ত্তী বিবিধা ব্যতীত বমন ; \* অনাধাসে বমন ; জলপান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জল বমন ; দুগ্ধ বমন ।” এই কয়েকটি এপোমফাইনের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত বমনেই হোমিওপ্যাথিতে এই ঔষধের প্রয়োগ হয় । বিধান-বিকার জনিত রোগ সহকারে বা তদ্ব্যতীত ভুক্ত দ্রব্য বমন ; গর্ভ গর্ভাশয়ের স্থানচ্যুতি ; কিম্বা গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের অথ কোন প্রকার উপদাহ বশতঃ বমন । সামুদ্রিক বিবিধা ।—এই সকল বমনে এপোমফাইনম ব্যবস্থেয় । ইহার বমন-কারক গুণও মনে রাখা কর্ত্তব্য । বিবাক্ত হইলে বখন সম্ভব বমন করান আবশ্যক হয় তখন হাইপোডামিক পিচকারী দ্বারা এপোমফাইন ত্বকের নীচে প্রবিষ্ট করিতে হয় । প্রাপ্তবয়স্কের শরীরে এক গ্রেণের দশমাংশ প্রবেশ করাইলেই পাঁচ হইতে পনের মিনিটের মধ্যে বমন হয় । কিন্তু ওপিয়ম দ্বারা বিবাক্ত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় না ।

সমগুণ ।—কপ, ইপি, জাঙ্গ, ভিরেট-এ, জিঙ্ক ।

## এবসিহিয়ম—ওয়ারন উড ।

আর্টিমিসিয়া এবসিহিয়ম কম্পোজিট জাতীয় উদ্ভিদ । এই গুল্ম ইউরোপে জন্মে । ইহার সরস তরুণ পল্লব হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

পানীয়রূপে বাঁহায়া এবসিহিয়ম ব্যবহার করেন ইহার অপব্যবহার বশতঃ তাঁহাদের অপকার হয় । প্রথমতঃ এবসিহিয়মের ক্রিয়ায় চিত্তের প্রক্লেশতা জন্মে, তৎপরে সম্ভব নানাপ্রকার কুলক্ষণ উপস্থিত হয় । তন্মধ্যে একপ্রকার ভয়ঙ্কর প্রলাপ জন্মে । প্রলাপকালে যৌগিকে বিচরণ করিতে হয় । সিনা, ক্যামোমিলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর সকল ঔষধেই এই বিচরণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

**ক্রিয়া ।**—স্নায়ুগুণে এবিসিহ্মিয়মের বিশেষ প্রভাব প্রকাশ পায় । তজ্জন্তু অপস্মার প্রকৃতির লক্ষণ, পেণীর কম্পন, প্রবল ও অপ্রবল আক্ষেপ, মুখে ফেণোদগম, এবং অনিচ্ছায় মল ও শুক্র নিঃসরণ জন্মে । মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায়, বিশেষতঃ মেডুলা অবলম্বোটা প্রদেশে রক্তসঞ্চয় জন্মিয়া অবাস্তব দৃষ্টি ও প্রলাপ উপস্থিত হয় । গোণতঃ এতদ্বারা পরিপোষণ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে, এজন্ত প্রথমে ক্ষুধা বন্ধি পায়, পরিপাক-শক্তির আধিক্য হয়, রক্তসঞ্চালনের দ্রুততা জন্মে, এবং কিয়ৎ পরিমানে শারীরিক নিঃশ্বাস বৃদ্ধিত হইয়া থাকে । কিছুকাল পরে উহার বিপরীত অবস্থা জন্মে, জীর্ণশক্তি কমিয়া যায় ও উহার আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ইহার ক্রিয়া এককোহলের অনুরূপ, কিন্তু পুরাতন ফল তদপেক্ষা সমধিক গুরুতর ।

**আময়িক প্রয়োগ ।**—মস্তিষ্ক, মেডুলা, ও পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চয়, ভয়ঙ্কর প্রলাপ; টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় বশতঃ নিদ্রাশূন্যতা; প্রতিশ্রাব্য জন্মিত গুল্মগুলের প্রদাহ বিবদ্ধিত যকৃত বা গ্লীহা; বায়ুজন্তু উদর-বেদনা ( বাত-শূল ); \* বালকদিগের অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ; \* অপস্মার মৃদু আক্ষেপ; অগ্নমান্দ্য; ক্লোরোসিস; সায়েটিকা ।—এইসকল রোগে এবিসিহ্মিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এবিসিহ্মিয়মের যোগী যন্ত্রনায় হাঁটিয়া বেড়ায় ও নানাপ্রকার কল্পিত দৃশ্য দর্শন করে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—আশু সংঘটিত ঘটনাও স্মরণ থাকেনা । উন্মত্ততা ; জড়বুদ্ধিতা পশুত্ব । গুপ্তহত্যার আতঙ্ক । বিভীষিকা-দর্শন ( ওপি ) ও ভয়ঙ্কর অবাস্তব দৃষ্টি ( এনা, ক্যান-ইণ্ড, \* হাইও, \* ট্রাম ) । পর্যায়ক্রমে স্মৃতি ও বিপজ্জনক প্রচণ্ডতা । ০ আক্ষেপ সহকারে অচেতনতা ( সিকু ) । **মস্তক ;**—উঠিলে পর অথবা পশ্চাদ্ধিকে পতনোক্রম সহ শিরো-বুর্ন । শিরোপীড়া সহকারে মস্তকের বিশৃঙ্খলা । মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় রক্তসঞ্চয় ।

**চক্ষু ।**—চক্ষুর গুল্মগুলের কৈশিকা-নাড়ীর রক্ত-পূর্ণতা । বাহিরের ঝিল্লীর পীতবর্ণ । চক্ষুর প্রদীপ্ততা । চক্ষুতে বেদনা ও কণ্ডুয়ন । চক্ষুর পাতা ভারী বোধ হয় ( কঠ, কোন, ত্রাট-কা ) । চক্ষুর তারায় অসমভাবে প্রসারিত । **কর্ণ ।**—০ শিরোপীড়ার পরে কর্ণ হইতে শ্রাব নিঃসরণ । **মুখমণ্ডল ।**—বুদ্ধিশূন্যতা । মুখমণ্ডলে রক্তের প্রাধান্য ( \* একন, \* বেল ) । ০ অপস্মারে মুখভঙ্গি করা ও মুখে ফেণা বাহির করা । মুখ-মধ্য ।

—হস্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ( ইয়ে, সিকু, হাইও, নজ-ভম ) । অপস্মারে জিহ্বা দংশন; স্থূল, বহির্গত জিহ্বা; প্রায় কথা বলিতে পারা যায় না; জিহ্বার কম্পন, জিহ্বা পক্ষাঘাতিতবৎ দেখায় । **আমাশয় ।**—ক্ষুধাহীনতা; খাদ্য দ্রব্যে অরুচি । ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে ভারী হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন জীর্ণ হইবে না ( আর্স, \* ব্রাই সিট, কলচি, \* নজ-ভম, পল ) । **আমাশয় শীতল ও ভারাক্রান্ত বোধ হয় ।** উদগার, বিবমিষা; তিক্ত শ্লেষ্মা বমন । **পিত্ত-কোষ** প্রদেশে বেন বিবমিষা একরূপ অনুভব । আমাশয়ের অস্বচ্ছন্দতা ও উপদাহিতা

অনুভব। উদয়।—বক্স ও স্নীহা ক্ষীতবৎ অনুভূত হয়। কটির চারিদিকে ও উদয়ে ক্ষীততা। উদয়ে অত্যন্ত বায়ু-সঞ্চয় (\* কার্কো, সিক, \* লাই, সল)। মূত্র-যন্ত্র।—অবিরত মূত্রভ্যাগের প্রবৃত্তি। গাঢ় কমলা-বর্ণ, উগ্র-গন্ধ, (বেঞ্জ-এসি), অখ-মূত্র সৃশ (জাট-আ, নাই-এসি); সাণ্ডলাল; মূত্র। স্ত্রী-জননেদ্রিয়।—দক্ষিণ ডিবাশয়ে চিড়িকমাড়া বেদনা (এপিস)। ০ \* হরিৎ পাণ্ডু (ক্লোরোসিস) (\* ফির, হেলন)। হৃৎপিণ্ড।—পৃষ্ঠের দিকে অনুভূত হৃৎপিণ্ডের কম্প। স্বক্কাস্থি প্রদেশে হৃৎপিণ্ডের আঘাত শুনিতে পারা যায়। দেহ।—প্লাদঘয় অতিশয় শীতল। অপস্মারের আবেশের ছায় পতন, অচৈতন্য, মুখের বিকৃতি, অঙ্গের আক্ষেপ, মুখে রক্তাক্ত ফেণা ও জিহ্বা দংশন (সিকু); তৎপরে অতিশয় দৌর্বল্য। শীঘ্র শীঘ্র ক্রমাগত উপস্থিত অপস্মারের আক্রমণ উত্তেজিত, অভ্যন্তরদিকে ধনুকের ছায় বক্র টঙ্কার; দস্তে দস্তে ঘর্ষণ; অনন্তর স্প্রি (নক্স-ভম, ওপি)। ০ \* আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পক্ষাঘাত। গৃধসী। উপযোগিতা।—যুবক-যুবতীদিগের পক্ষে উপযোগী।

সমগুণ।—আর্ট-ভল, এব্রোট, এলকোহল, বেল, ক্যাম, হাইও, ট্রায়।

## এবিস ক্যানেডেলিস — হেমলক প্রস।

কনিফেরি জাতীয় এই চিরহরিৎ বৃক্ষ আমেরিকার অরণ্যে জন্মে। ইহার সরস বহুল ও অপরিফুট কলিকা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—শৈথলিক বিহীন হইবার ক্রিয়া দর্শিয়া প্রধানতঃ আমাশয়ের প্রতিষ্ঠার ছায় অবস্থা জন্মে।

অধিকার।—\* অগ্নি-মান্দ্য। অজীর্ণ জনিত জ্বর ও অত্যাশ্র উপদ্রব। কন্দ। এই সকল রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ব্যটিার অবদি ষ্টমাক বা আমাশয়ের প্লেয়াধিক্য জনিত অজীর্ণ রোগে মস্তকের লঘুতা অনুভব, উদরোদ্ধ দেশে চর্কণবৎ বাতনা, ক্ষুধা ও শ্রান্তি অনুভব, তীব্র ক্ষুধা, কিন্তু ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিলে আমাশয়ের ক্ষীততা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ডাঃ গ্যালাল ও ডাঃ বেক্টউইথ অনেক রোগী আরাগ্য করিয়াছেন। ডাঃ ফ্যারিংটন সর্বজাতীয় পরিপোষণের অপ্ৰাচুর্যজনিত কন্দরোগেও ইহা ব্যবহারের বিধি দেন। এবিস নাইগ্রার নির্যাসের অরিচেরও প্রায় এইপ্রকার গুণ। ডাঃ স্মিথ এবিস নাইগ্রার আঠা চর্কণ করিতে তাহার বোধ হইয়াছিল যেন আমাশয়ে একটা কঠিন সিদ্ধ ডিহ অজীর্ণবস্থায় রহিয়াছে। ডাঃ এলেন এইরূপ লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্য এবিস নাইগ্রা ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শকট হইতে পতিত হইয়া এক ব্যক্তির রক্তবহন জন্মে, তাহার সর্বদা বোধ হইত যেন গলনশীতে কিছু লাগিয়া রহিয়াছে।

আর্গিকা সেবনে তাঁহার রক্ত-বমন নিবায়িত, এবং এবিস নাইগ্রা (৩৮) দ্বারা ঐ প্রকার অল্পভব দুরীকৃত হইয়াছিল। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে অগ্নিমন্দ্য রোগে আমাশয়ের উর্দ্ধমুখে যেন কোন অপাচ্য শক্ত বস্তু লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এই প্রকার অল্পভব এবিস নাইগ্রার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। অগ্নিমন্দ্যের আনুষঙ্গিক অপ্রফুল্লতা ও কোষ্ঠবদ্ধাদিও বিদ্যমান থাকে। ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব, অপরাহ্নে আহ্বারের স্পৃহা, রাত্রিতে অতিশয় ক্ষুধা ও অনিদ্রা; সন্তুপ্ত ভোজনের পর যাতনা, কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যদ্রব্য পরিভ্যাগে অগ্নিমন্দ্যের অল্পশম; অল্প উদগার ও বারবার বমন; আমাশয়ে অপরিপাচিত, শক্ত-সিদ্ধ অণ্ডাবস্থানের ভ্রায় অল্পভব; আমাশয়-গহবরের ঠিক উপরে অবিরত যন্ত্রণাপ্রদ আকুঞ্জন, যেন অপরিপাচিত ভুক্তদ্রব্যের শক্ত পিণ্ড তথায় অবস্থিত রহিয়াছে এক্রপ অল্পভব;—অগ্নিমন্দ্য এই সকল এবিস নাইগ্রার লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—কোপনতা ও সহজে বিরক্তি (কাম, নক্স)। মস্তক।—মস্তকের লম্বতা, মস্তকীয় ভ্রায় অল্পভব (কক, নক্স-ম. নক্স-ভ, ওপি), মস্তকের আন্দোলন, বোধ হয় যেন মস্তকের শিখরদেশে রক্ত-সঞ্চিত হইয়াছে (বেল)। আমাশয়।—মুখের শুষ্কতা (আস', ব্রাই, \* নক্স-ম)। \* উদরোর্ধ্বে চর্ষণ, ক্ষুধা ও ক্লান্তি অল্পভব (হাইড, ইথে, ফস, \* পলস সিপি, সলফ)। \* মাংস (\* ম্যাগ-কা), আচার (\* হিপ) ও অশাশ্বত খাদ্যদ্রব্যের স্পৃহা। পরিপাক করিবার শক্তি অপেক্ষা অধিক আহ্বারের প্রবৃত্তি (ব্রাই, ভির, \* লাই, মার্ক, \* সিনা)। অস্ত্রে বিবমিষা অল্পভব। আমাশয় ও উদরোর্ধ্বে দেশের প্রসারণ; ও জালা (\* আস', \* কলচি, ক্যাঙ্ক, ফস, ভিরেট)। উদর।—আহারান্তে অতিশয় ক্ষুধা সহ অস্ত্র-কুঞ্জন (\* লাই, \* সিদ্ধ) স্পর্শে যকৃৎদেশে শক্ত বোধ হয়। মলদ্বার ও মল।—সরলাস্ত্রে জালা (\* আস', ক্যাঙ্ক, \* আইরিস, মার্ক)। কোষ্ঠবদ্ধ। মূত্র-যন্ত্র।—দিনরাত্রে বার বার মূত্রত্যাগ; শুষ্ক তৃণের বর্ণ মূত্র। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—জরায়ু কোমল ও দুর্বল বোধ হয়। জরায়ুর গাত্রে ক্ষতবৎ বোধ হয়; চাপ দিলে উহার শাস্তি জন্মে। শ্বাস যন্ত্র।—আয়সিত শ্বাস (একন, আস')। হৃৎপিণ্ড।—আয়সিত হৃৎ-ক্রিয়া। আমাশয়ের ক্ষীণতা সহ হৃৎপিণ্ডের বিবদ্ধিত ক্রিয়া। পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ স্বক্কাস্থির পশ্চাতে বেদনা (\* চেলি, পডো)। ত্রিকদেশে দুর্বলতা অল্পভব। স্বক্কাস্থির বাবধান স্থানে শীতল জলের ভ্রায় অল্পভব। দেহ।—হস্তদ্বয় শীতল ও কুঞ্চিত; ত্বক শীতল ও আঠা আঠা। হাঁটু উপরের দিকে টানিয়া শয়ন। অতিশয় অবসন্নতা, সর্বদা \* কেবল শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা। নিদ্রা।—জুস্তগ, তজ্রালুতা; রাত্রিতে অতিশয় অস্থিরতা, এপাশ-ওপাশ করা (\* একন)। জ্বর।—পৃষ্ঠের নিম্নে শীত (ক্যাম্প, ল্যাক)। রক্ত যেন বরফের জলে পরিণত হইতেছে, এক্রপ শীত ও কাম্প।

সমগুণ।—ইকি, কোপে, নক্স-ভম, ইথে, টেরে।



## এবিস নাইট্রা—ব্লাক স্প্রুস ।

কনিফেরি জাতীয় এই বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে । ইহার আঠা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—আমাশয়ের শৈল্পিক বিল্লীতেই বিশিষ্টরূপে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং ওজ্জ্বল জীর্ণাক্তির বিশৃঙ্খলা ও তদনুরূপ লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—\* অগ্নিমান্দ্য ।—অজীর্ণ জনিত উপদ্রব । এবং চা অথবা তামাক সেবন জনিত অগ্নিমান্দ্য দ্বায়ে এবিস নাইট্রার প্রয়োগ হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ

মন ।—\* অতিশয় অপ্রফুল্লতা ও বিষণ্ণতা । স্নায়বীয়তা, চিন্তা বা অধ্যয়ন করিতে পারা যায় না । মস্তক ।—শিরোবুর্ন । মস্তক ভাঙ্গ বোধ হয় না । মূহু মূহু শিরোবেদনা । আরক্ত গুণ্ডহয় সহ উত্তপ্ত মস্তক । কর্ণ ।—বাম কর্ণের বহির্দ্বারে বেদনা । গলমধ্য ।—গলার অবরোধ অনুভব । গল-নলীর নীচের প্রান্তের দিকে যেন কিছু লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভব । ( উপরের প্রান্তে, ল্যাক-এসি ) আমাশয় ।—রাত্রিতে ক্ষুধিত ও জাগ্রত । \* প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার অভাব ; কিন্তু মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা । \* পরিতৃপ্ত ভোজনের পর যাতনা । যেন সকলই গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াছে আমাশয়ে অবিরত এরূপ একপ্রকার যাতনা অনুভব, দুর্বল হইলে উহার আতিশয় । \* আমাশয়ে যেন একটা সিদ্ধ শক্ত ডিম্ব অজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে এরূপ অনুভব । মল ।—\* কেষ্টবদ্ধ । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—বিলম্বিত বা বিলুপ্ত ঋতু । হৃৎপিণ্ড ।—হৃৎপিণ্ডের গুরু, ধীর স্পন্দন ; তীব্র কঠনবৎ বেদনা । দেহ ।—সহজে বেদম হইয়া পড়া । শ্বাস-কৃচ্ছ । কটিতে বেদনা ( বেল, কল, সিমি, পল, ক্রিয়ো ) । অস্থিতে আমবাতের বেদনা ও অবিরাম বেদনা । একবার উত্তাপ একবার শীত । নিদ্রা ।—দিবসে নিদ্রালুতা, রাত্রিতে কুশ্রুপ সহ জাগ্রততা ও অস্থিরতা ।

সমগুণ ।—ব্রাই, ক্যাম ইয়ে, নক্স-ভয়, ল্যাক্ট-এসি ।

## এব্রোটেনম—সাদারণ উড ।

কম্পোজিটা জাতীয় এই গুল্ম দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে । ইহার সরস পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়

ক্রিয়া ।—পরিপোষণ-বজ্রমণ্ডলে এব্রোটেনমের প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া পরিপোষণ-ক্রিয়ার অতিশয় অবসাদন জন্মে, এবং উপদ্রুত পরিপাক-ক্রিয়া, অতিশয় শীর্ণতা ও শরীর-ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় । \*এজ্জ শিশুদিগের শরীরক্ষয় ( মারাসমাস ) রোগের চিকিৎসায়ই প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভাস্কব ও মাস্কব বিধান-তত্ত্বতেও

ইহার ক্রিয়া দর্শে। নায়মণ্ডলে ইহার মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া নায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয় এবং নায়বীয় বেদনা সংযুক্ত স্পর্শ-জ্ঞান-পরিশূন্যতা ও পক্ষাঘাত জন্মে। এই নায়বীয় বেদনায় অতিশয় অস্থিরতা জন্মায় এবং নড়িলে চড়িলে বেদনায় উপশম পড়ে।

**আময়িক প্রয়োগ।**—\* শিশুদিগের শরীর-ক্ষয় রোগ; কুপোষণ বশতঃ শীর্ণতা জনক রোগ; আমবাতি, বিশেষতঃ প্রাণাহিক আমবাতি, (ক্ষীততার পূর্বে); গ্রন্থি-বাতি; গ্যাস্ট্রালজিয়া; গ্যাস্ট্রালজিয়ার বিলোপ বশতঃ মন্দফল; শিশুদিগের কুরণ্ড; ক্রোরোসিস; স্ফোটক; এই সকল রোগে এব্রোটেনম ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—ব্যাকুলতা, অপ্রসন্নতা, বুদ্ধির জড়তা। শিশুর অপ্রকৃষ্টতা, ক্ষণরাগিতা।  
**মস্তক।**—মাথা তুলিয়া রাখিতে পারা যায়না (হ্যাট-মিউ, ভিরাট-এব)। মস্তকের কেশবৃত্ত ভাগে ক্ষত; ও কণ্ডুয়ন। মস্তকের অবিরাম বেদনা ও পূর্ণতা। **কর্ণ।**—  
 কর্ণে মধুমক্ষিকার ছায় শুণ্ শুণ্ শব্দ; দক্ষিণ কর্ণ হইতে বাতাস নিঃসরণ। **চক্ষু।**—  
 ০ চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, নিস্তেজ দৃষ্টি। **নাসিকা।**—নাসিকার শুষ্কতা;  
 ০ বালকদিগের নাসিকা হইতে রক্তপাত। **মুখমণ্ডল।**—০ বৃদ্ধের ছায় কৃষ্ণিততা (ব্যারা)। শীর্ণতা সহ ব্যোত্রণ (সল)। **মুখ-মধ্য।**—আঠা আঠা, অন্ন আশ্বাদ।  
 জিহ্বায ঘা। মুখ-বিবরের উত্তপ্ততা ও শুষ্কতা। **আমাশয়।**—চর্কণকর ক্ষুধা; অভিক্ষুধা, অথচ শরীরের শীর্ণতা-প্রাপ্তি। অন্নত্বের ছায় জ্বালা। ০ আমাশয় যেন ঝুলিতেছে অথবা জলে সাঁতার দিতেছে এক্রপ অল্পভব, তৎসহ শীতলতা। কঠন, চর্কণ, ও জলনবৎ বেদনা, রাজিতে উহার আধিক্য। **উদর।**—উদরের অতিশয় ক্ষীততা। ০ উদরের নানাহানে শক্ত শক্ত পিণ্ড। অস্ত্রে দুর্বলতা ও নিম্নতা অল্পভব। **মল।**—০ ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাচিত অবস্থায় নিঃসরণ। ০ সহসা অতিসার প্রশমিত হওয়াতে আমবাতি। কোষ্ঠবদ্ধ। ০ পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ। (এণ্ট-ফ্রুড)। স্পর্শে বা মলত্যাগকালে জ্বালা সহ বলিনির্গমনশীল অর্শ। **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং) ০ বালকদিগের কুরণ্ড, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরের পরে। (স্ত্রী) বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে চিড়িক-মাঝা বেদনা। ০ নবজাত সন্তানের নাতী হইতে রক্ত ও রস ক্ষরণ। **শ্বাস-যন্ত্র।**—শীতল বায়ুতে এক প্রকার অবদরণ অল্পভবের উৎপত্তি (হাইড)। উত্তপ্ত বায়ু নিঃশ্বসনের ছায় অল্পভব। **শ্বাস-কৃচ্ছ্র,** ০ ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহের পরে রোগাক্রান্ত-পার্শ্বে, বিষুক্তভাবে শ্বাস-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক, প্রচাপন-অল্পভব সদৃশ, অবশেষের বিজ্ঞানতা।  
**হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—আমবাতে বক্ষঃস্থলের অল্পপ্রস্থে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র ও উগ্র বেদনা। ০ হৃৎপিণ্ডে আমবাতির স্থান-বিকল্প। দুর্বল ও ক্ষুদ্র নাড়ী। **পৃষ্ঠ।**—ত্রিকস্থানে বেদনা। ঝটিলেশে, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত, গুরু বেদনা। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—সঞ্চালনে অসামর্থ্য। দেহ-শাখার দুর্বলতা। ০ শরীরের, বিশেষতঃ জন্মাবস্থার শীর্ণতা। পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের স্পর্শ-দেব ও পঙ্খতা; প্রাতে উহার আতিশয্য ( রস )। হস্তাঙ্গুলীতে অবশতা অনুভব ( কোন, ফস, সিকে )। দেহ—দুর্বলতা ও অসুস্থতা অনুভব; উত্তেজিত হইলে কম্পন। গ্রীবা ও পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে ও হস্ত-পদে আমবাতের বেদনা। সর্কশরীরের পঙ্খতা ও স্পর্শ-দেব। নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। জ্বর।—  
 ০ আমবাতের আক্রমণ কালে তীব্র জ্বর। ০ ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে শীত সহ, অতিশয় দৌর্বল্য-জনক বিলেপী জ্বর; শরীর-ক্ষয়। চর্ম্ম।—০ চর্ম্ম লোলিত; শিথিল হইয়া ঝুলিয়া থাকে; ক্ষয়। ০ স্ফোটক ( হুপার সলফারের পর )। উপযোগিতা।—শিতাদিগের পক্ষে সবিশেষ, ও বালকদিগের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

সমগুণ।—এগার, বারা, ব্রাট, কোন, সিমি, জেল, ফস, রস, জিঙ্ক।

## এমিল নাইট্রাইট—নাইট্রাইট অব এমিল ।

এমিল নাইট্রাইট দ্রব পীতবর্ণ, তৈলময়, অতিশয় উষ্ণায়ী, অত্যন্ত দাহ্য, জল অপেক্ষা লঘু একপ্রকার তরল পদার্থ। নাইট্রিক এসিড সহকারে এমিলিক এলকোহল ( ফিউসেল অয়েল ) যুগ্ম তাপে উত্তপ্ত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। শতভাগিক পদ্ধতিতে এলকোহল সহযোগে ইহার ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার কয়েক বিন্দু এক একবার অঙ্গাণু দ্বারা প্রয়োজিত হয়।

ক্রিয়া।—নাইট্রাইট অব এমিলের সহিত হোমিওপ্যাথিক ঔষদজ্যোতিষের অল্প কোন ঔষধের বিশেষ সাদৃশ্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। তবে মনয়েন ও বেলেডোনার সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। মনয়েনের ঔষ্য এতদ্বারা ধমনীর শিথিলতা জন্মে ও সেই শিথিলতা রক্ত সঞ্চয়ের ঔষ্য দেখায়। কিন্তু মনয়েন জনিত রক্তসঞ্চয় প্রবল ও সবেগ, এবং সর্ব্বদাই উহাতে বেদনানুভব বিদ্যমান থাকে। যন্তিফের ধমনীতে প্রবল বেগে রক্তের গতি বশতঃ এমিল জনিত রক্তসঞ্চয় জন্মেনা, কেবল ঐ সমস্ত রক্তবহা নাড়ীর শিথিলতা নিবন্ধন উহা যুগ্মভাবে রক্তপূর্ণ হয়। এমিলের ক্রিয়ায় প্রায়ই মস্তকে বেদনা জন্মে না, তবে ইহার ক্রিয়ার আতিশয্য বশতঃ কখন কখন শিরোবেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমিল জনিত মস্তকের রক্তপূর্ণতা ক্ষণস্থায়ী, বেলেডোনার ঔষ্য স্থায়ী নহে। এমিলের ক্রিয়া প্রায়ই দুই তিন মিনিটের অধিক থাকে না। এবং ইহার ক্রিয়া অতি দ্রুত প্রকাশ পায়। অঙ্গাণু, পান, স্বকের নিম্নে বস্ত্রপ্রয়োগ যে কোন প্রকারে কেন এমিল ব্যবহার করা বাউকনা, ত্রিশ বা চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ; এবং মস্তক, মুখমণ্ডল ও গ্রীবায বর্ষের হ্রচনা করে। অনধিক পরিমাণে অর্থাৎ কয়েক বিন্দুমাত্রায় এমিল অঙ্গাণু কর্ত্ত্বিল মস্তকের পূর্ণতা ও প্রসারণ

অনুভব, পরিশেষে উহার তীব্র বেদনায় পরিণতি, তৎপরে মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ত-  
রাগ; গভীর, আয়াস-সাধ্য শ্বাস, এবং অত্যন্ত দ্রুত ও প্রবল হৃদক্রিয়া উপস্থিত হয়।  
এই সকল লক্ষণ এত শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় যে এইগুলি সমুদাই এক সময়ে উপস্থিত  
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ অত্যাশ্চর্য লক্ষণের পূর্বেই  
স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নাইটাইট অব এমিলের বিধিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সকলের পক্ষাঘাত ও অতিশয়  
প্রসারণ জন্মে সুতরাং কণকাল হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠে।  
তৎপরে আরও এমিল আত্মাণ করিলে হৃৎপিণ্ডে বেগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পরিশেষে  
একেবারেই উহার শক্তি বিলুপ্ত হয়। ডাঃ উড বলেন যে ইহার বিধিক্রিয়ায় প্রতিক্ষিপ্ত  
ক্রিয়ার ও ঐচ্ছিক গতির যে ইচ্ছতা জন্মে তাহা পৃষ্ঠবংশ-মূলক। এমিল দ্বারা পৃষ্ঠবংশের  
গতিজনন-স্নায়ুমূলের প্রবল অবসাদ উৎপন্ন হয়। স্নায়ু ও পেশীতেও অতি অল্প পরিমাণে  
এই প্রকার ক্রিয়া জন্মে। জ্ঞানজনন-স্নায়ু ও স্নায়ুমূলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া  
বোধ হয় না। কারণ মৃত্যুর আসন্নকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিস্তারিত থাকে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আনন্দাদির মন্দফল।—হৃৎপিণ্ডের শক্তির সাক্ষাৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতীত যে সকল  
স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর প্রসারণ, ও শরীরের উপরিভাগের আরক্ত রাগ ও উত্তপ্ততা উৎপন্ন  
হয় তাহাতেই এমিল সমমতানুসারে মুখ্যতঃ প্রয়োজ্য। সুতরাং আনন্দ, ভয়, শোকাদি  
মনোভাব জনিত শারীরিক বিকারে, সহসা মুখের আরক্তরাগ, ধমনীর প্রসারণ, নাক্তীর  
দ্রুততা এবং হৃদস্পন্দনের আধিক্য লক্ষণে এমিল উপযোগী।

হৃদ্রোগ।—হৃৎশূল হৃৎপিণ্ডের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ জন্মে, এমিল  
সেই পেশীর শিথিলতা জন্মাষ্টয়া এই রোগে উপকার করে। রোগের আবশ্যকালে  
ইহার আত্মাণ লইলে শীঘ্রই যাতনার বিরাম পড়ে। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে হৃৎপিণ্ডের  
অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া-বিকার জনিত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। নাইটাইট অব এমিলের ক্রিয়ায়  
ভেসোমোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মে। সুতরাং মস্তক-বক্ষাদি শরীরের নানাস্থানে  
রক্ত-সঞ্চয়ে এতদ্বারা উপকার দর্শে। ইহার বিধ-ক্রিয়ায় মুখমণ্ডল আরক্ত ও ক্ষীত এবং  
শ্বাস অতিশয় আয়াসিত হয়। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠে বটে কিন্তু উহার বলের  
লাঘব জন্মে। হৃৎপিণ্ডে একপ্রকার আকুঞ্চন অনুভূত হয়। তজ্জন্ত বোগীকে উঠিয়া  
বসিতে হয়। সাধারণতঃ মূত্রে অল্প পরিমাণে অগুলাল মিশ্রিত থাকে। রোগীর এতই  
অনুভবাবিক্য জন্মে যে সামান্য কারণে, এমনকি দ্বার উদঘাটনে পর্য্যন্ত তাহার মুখ-রাগ  
উৎপন্ন হয়। এজন্ত হৃদ্রুদ্বি; শ্বাস-কাস; মূছা; ও অত্যাশ্চর্য অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের যাতনা,  
হৃৎ-ক্রিয়ার গোলযোগ, এবং গ্রীবার বৃহৎ ধমনীস্থয়ের প্রবল স্পন্দন লক্ষণে এই ঔষধ  
ফলপ্রসূ হয়।

শ্বাসকাস।—এই রোগেও এমিল উপকারী। এতদ্বারা স্ফর শ্বাসকষ্ট নিবারিত, ও উহার পুনরাক্রমণ নিবৃত্ত হয়। শ্বাস-রোধের আশঙ্কা বিশিষ্ট আক্কেপিক কাসে; ও ব্রাইট-রোগের শ্বাস-কুচ্ছে, এমিল উপশমপ্রদ।

আক্কেপ।—ডাঃ স্কাগারসন বলেন যে এই ঔষধে আক্কেপ শিথিল করে। ডাঃ এনটি আমাশয়ের আক্কেপে ইহা ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হৃৎকাসেও কেহ কেহ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ডাঃ বিচার্ডসন বলেন যে তিনি ষ্ট্রিকনিয়া দ্বারা বিযাক্ত ভেকের আক্কেপ এমিল প্রয়োগে নিবারণ করিয়াছেন। অতএব ষ্ট্রিকনিয়া দ্বারা বিযাক্ত হইলে ও ধলুইকার রোগে তিনি এমিল আত্মাণ বা চর্ম্মের নিম্নে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। অপস্মার রোগেও এমিল প্রয়োজিত হইয়া থাকে ও উপকার করে। রোগের পূর্বসূচনা উপস্থিত হইবা মাত্র এই ঔষধ আত্মাণ করিলে আবেশ নিবারিত হয়। ডাঃ ক্রিচটন বলেন যে যে সকল অপস্মারে ক্রমাগত আক্কেপ ও এক আবেশের অব্যবহিত পরেই আবার আবেশ উপস্থিত হয় অর্থাৎ গেষ্টেস এপিলেপ্টিকস রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেল কয়েক জন অপস্মারগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ দুই হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় গঁদের মণ্ড সহকারে দিনে তিনবার প্রয়োগ করিয়া ঘন ঘন রোগাক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অপস্মার বখন ঘন ঘন উপস্থিত হয় তখনই এই ঔষধ উপকারী। তিন সপ্তাহ বা একমাস বিরামের পর রোগ উপস্থিত হইলে এই প্রকারে এমিল প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। তিনি বলেন যে কোন কোন রোগীর পক্ষে ইহা, পূর্ণমাত্রায় ( ২০-৩০ গ্রাণ ) ব্রোমাইড অব পোটাসিয়াম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, কাহাও পক্ষে ব্রোমাইড অব পোটাসিয়াম ইহা অপেক্ষা উপকারী। কোন কোন রোগীর, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এই ঔষধ সেবনে শিরোবূর্ন ও উত্তাপাদি অন্তর্যকর লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব প্রথম প্রথম শয়নাবস্থায় ও অল্প মাত্রায় ইহা ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রী-রোগ।—রজোনিবৃত্তি কালে স্ত্রীলোকদিগের বেষরীরের নানাস্থানে এক প্রকার উত্তাপ ও জ্বালাদি জন্মে তাহাতে এমিল অতিশয় উপকারী। ডাঃ হেল একবিন্দু মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহার কাহার এক বিন্দুর তৃতীয় বা ত্রিংশ অংশ পর্য্যন্তও সহ হয় না। অতএব তিনি একড্রাম রেটিকফায়েড স্পিরিটে দুই বিন্দু মিশ্রিত করিয়া উহার তিন হইতে পাঁচবিন্দু চিনিতে করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার, এবং উত্তাপাবেশ ( ফ্লুশিং ) উপস্থিত হইবামাত্র আর এক বার ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ এই ঔষধে সত্ত্বল দর্শে। কখন কখন এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করান আবশ্যক হয়। রোগীর ঔষধ অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। ডাঃ কাউপার ধোয়েট বলেন যে রজোনিবৃত্তিকালে মুখ-রাগ ও শিরোবেদনাসহ; অপর দৃষ্টিরিয়ার লক্ষণ সংযুক্ত; ঋতু-বৈষম্য ও জরায়ুর রক্তস্রাবাদিতে এমিল ব্যবহৃত হয়।

বিষয় জ্বর ।—ইন্দোরের ডাঃ সগুর্স' এমিল অতিশয় ঘর্ষকর বলিয়া জ্বরে ব্যবহার করিয়া থাকেন । তিনি ২ ফোঁটা এমিল, ২ ফোঁটা ধনিয়ার তৈলের সহিত অথবা কেবল ২ ফোঁটা এমিল একখণ্ড ক্ষুদ্র লিটে করিয়া আত্মাণ করিতে দেন । ৫। ৭ মিনিট আত্মাণ করিতে করিতে রোগীর শ্বাস ও নাকী দ্রুত ও গাত্র উষ্ণ হইয়া উঠে । শরীর উষ্ণ হইলে ঔষধ আত্মাণ স্থগিত রাখিতে হয় । তৎপরে প্রভূত ঘর্ষ হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায় । কাহার কাহার উষ্ণ বা ঘর্ষাবস্থা ব্যতীতও জ্বর বিরাম পড়ে । এই প্রকারে কেবল এমিল ব্যবহারেই জ্বরের পুনরাক্রমণও নিবারিত হয় । কখন কখন কুইনাইন ব্যবস্থা করাও আবশ্যক হয় ।

অগ্ন্যাগ্নি রোগ ।—অর্কাঘাত বা সর্দিগর্ম্মিতে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রসূ । এমিল আত্মাণে বা সেবনে সামুদ্রিক বিবমিষার নিবৃত্তি হয় । ডাঃ মার্গা বলেন যে অক্ষিগর্হবয়ের প্রায়শু লে প্রথমদশমিক শক্তির নাইট্রাইট অব এমিল দশবিন্দু ক্রমালে করিয়া আত্মাণ করিলে সত্ত্বর বেদনা নিবারিত হয় । পুনরায় বেদনা উপস্থিত হইলে দুই আউন্স পানিস্রব জলে এই ঔষধের পাঁচবিন্দু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর বেদনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করা আবশ্যক হয় ।

নাইট্রাইট অব এমিলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রোগীর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন । অতএব কাহার কি পরিমাণ সহ হইবে তাহা স্রবজ্ঞ চিকিৎসক স্বয়ং নিরূপণ করিয়া লইবেন । বাতাসাদি লাগিলে ইহার গুণ নষ্ট হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—যেন কিছু ঘটিবে এরূপ উৎকর্ষা ; বিমল বায়ু সেবন আবশ্যক হয় । মস্তক —বামদিকে বিবর্জিত শিরঃশীড়া । \* মস্তকে অতিশয় পূর্ণতা অল্পভব সহকারে মস্তকে উত্তাপ দপদপ । \* মস্তকে ও কর্ণে আঘাত, দপদপ, ও বিদারণবৎ অল্পভব, তৎসহ গলা ও হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্জন ( \* বেল, \* হাইও; ষ্ট্রাম ) । শঙ্কায় অশিথিলতা অল্পভব সহকারে দৃশ্যমান স্পন্দন বিশিষ্ট দপদপ ( ঘন ) । কিছু যেন উপরের দিকে প্রধাবিত হইতেছে এ প্রকার অল্পভব, এবং মস্তক-শিখরে দপদপ । চক্ষু ।—\* ০ একদৃষ্টি বিশিষ্ট, বহিমুখ চক্ষু ( \* বেল, হাইও, ওপি ) । ০ বহিরাগত অক্ষি-গোলক বিশিষ্ট গলগণ্ড । ( অক্ষি-বীক্ষণ বস্ত্র দ্বারা দর্শনে ) অক্ষিমণ্ডলের শিরা বিবর্জিত, স্ফীত ও কৌক-ডান ; ধমনী স্বাভাবিক । কর্ণ ।—\* কর্ণে অতিশয় দপদপ । মুখমণ্ডল ।—\* মুখরাগ ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা, অনন্তর স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডুরতা ( ঘন ) । মুখরাগ, তৎপরে মুখমণ্ডলের শিরার স্ফীততা । মুখমণ্ডলের অতিশয় উত্তাপ ও আরক্ততা, যুক্ত যেন চর্ম্মের অভ্যন্তর দিয়া বাহির হইবে এরূপ অল্পভব ( \* বেল ) । গল-মধ্য ।—\* কর্ণাধারী প্রত্যেক পার্শ্বে, গলার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের পাশাপাশী গলায় অবরোধ অল্পভব ( \* বেল, \* ষ্ট্রাম ) । \* গল-বন্ধ অতিরিক্ত কষা বোধ ও উহা চিলা করিয়া দিবার ইচ্ছা ।

শ্বাস-যন্ত্র ।—\* গলার আকৃষ্টন অল্পভব বক্ষস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হয়, স্বরবজ্রে ও কণ্ঠনালীতে শ্বাস-কৃচ্ছ, ও শ্বাস-কাসের ছায় অল্পভব জন্মায়, তৎসহ উদগার তুলিতে ইচ্ছা হয়। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—\* হৃদয় প্রদেশে অতিশয় উৎকর্ষ। \* কোন কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের স্পন্দনের অতিশয় স্পষ্টতা ( \* একন, \* বেল, \* ভিরেট-ভি )। \* হৃৎপিণ্ডের অতিশয় গৌরব এবং হৃৎক্রিয়ার গোলযোগ ( \* একন )। \* হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে অবিরাম বেদনা ও আকৃষ্টন ( ক্যাক্ট, মিলি )। পরিবর্তন শীল, অসম, উৎক্ষেপযুক্ত নাড়ী। ০ অতিশয় যন্ত্রণায়ুক্ত হৃৎশূল। । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—\* অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্লান্তি অল্পভব। \* হস্তদ্বয়ের কম্পন। দেহ ।—\* সমগ্র শরীরে দুর্বলতা, ও শিথিলতা অল্পভব। \* সাধারণতঃ সর্বাঙ্গীন ঘর্ম।

সমগুণ ।—একন, \* বেল, ক্যাক্ট, \* মন।

## এরম ড্রেকোনাইটম ।

এরেসী জাতীয় সকল প্রকার মূলেই এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত পদার্থ আছে। এরো-ক্লট ও এই জাতীয় উদ্ভিদ। বিষাক্ত অংশ বিদূরিত করিয়াই বাণিজ্যের এরোক্লট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরক ড্রেকোনাইটম, এরম ট্রিফাইলম ও এরম কুইনেটম এই তিন প্রকার এরমের বিষ-লক্ষণে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ডাঃ হার্টের পরীক্ষায় এরমড্রেকোনাইটম এবং ক্যালেন্ডিয়ামের ক্রিয়ায় ও সাদৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয় পদার্থেই জননে-দ্রিয়ার কণ্ডুয়ন ও অসামর্থ্য; নীতপিত্ত ও অগ্নাশ্ম প্রকার উদ্বেদ ( সম্ভবতঃ স্নায়বীয় কারণ জনিত ); এবং স্বরবজ্র-প্রদাহ উৎপন্ন ও আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে ড্রেকোনাইটমও এরম ট্রিফাইলমের ছায় লক্ষণ উৎপন্ন করে, কিন্তু ড্রেকোনাইটমের ক্রিয়া ট্রিফাইলমের অপেক্ষা শ্বাস-যন্ত্রের নিম্নাংশেই জন্মে। ট্রিফাইলম স্নায়বিক কাল জন্মায়। ড্রেকোনাইটমের ক্রিয়া কণ্ঠনালী ও শ্বাস-নালীতে জন্মে এবং উহাতে শ্বাস-নালীর এক প্রকার প্রতিশ্রায় উৎপন্ন হয় এবং প্রথমতঃ জ্বালাকর জলবৎ শ্রাব, অনন্তর পুষ্ণ বা পুষ ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব পীতভ পুষ্যাক্ত নিঃশ্বাস, তৎসহ অতিশয় জ্বালা ও অবদরণ, এবং প্রবল প্রদাহের অগ্নাশ্ম লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডাঃ হার্ট অপ্রবৃদ্ধ বা পুরাতন স্নায়বিক রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। একজন রোগীর সন্দি লাগিয়া রাড্রে শ্বাস-কাসের আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল। লোবেলিয়া ও টার্টার এমোটিক সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে এরম ড্রেকোনাইটম প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ কয়েক মাত্রা ব্যবহারে রোগের আক্রমণ নিবৃত্ত হয়। তিন

বৎসর বয়সের একটি বালকের জুপের ছায় কাস, স্বরভঙ্গ, গলা-বেদনা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, স্বাভাবিক প্রাণাস, বায়ু-পথের অতিশয় স্ফীততা ও শ্বাসরোধের আশঙ্কা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়াছিল। এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রমের একমাত্রা সেবনে কুড়ি মিনিটের মধ্যে রোগের উপশম জন্মে, তিন মাত্রা সেবনের পর শিশু প্রাতেকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ঘুমায়। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ও অন্যান্য চিকিৎসকগণও এইপ্রকার অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন। ডাঃ হার্ট বলেন যে তাঁহার নিজের বার বৎসর বাবং পুরাতন মুষ্-কণ্ডূন রোগ ছিল, এই ঔষধ সেবনে তাহা আরোগ্য হয়। কর্ণরোগেও এই ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

কর্ণ ।—দক্ষিণ কর্ণে চিড়িক-মারা বেদনা। এই বেদনা ক্ষণকাল থাকে দ্রুটে কিন্তু বারে বারে উপস্থিত হয়, এবং যখন বেদনা না থাকে তখন কর্ণের মধ্যভাগে একপ্রকার পূর্ণতাহ্র-ভব ও সামান্য বেদনা থাকে। কর্ণে একপ্রকার উষ্ণতা ও পূর্ণতা অনুভব। বায়ুকর্ণ-নলে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—\* গলার মধ্যে শুষ্কতা ও যাতনা অনুভব, অবদরণ ও পূর্ণতা অনুভব, এই অনুভব বাস্তবিক কষ্টপ্রদ নহে কিন্তু বিরক্তিকর। \* থক্ থক্ কাস ; \*স্বরভঙ্গ ; কতকটা গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণ। গিলিয়া ও কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিবার অবিরত প্রবৃত্তি। \* গল-মধ্যে অবদরণ ও স্পর্শসহ্যতা। \* গলায় অবিরত অবদরণ। \* অবিরত কাস, প্রাতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ। মুখে বিষাদ। একপ্রকার মলিন, পচা আশ্বাদ আঠাবৎ শ্লেষ্মাদ্বারা জিহ্বা ও মুখের আচ্ছন্নতা। গাঢ়, পীতভ শব্দ পুষ্যময় নিঃসরণ। প্রবল কাস। গলার অবদরণ ও পুষ্যময় নিঃসরণ। স্বরযন্ত্র ।—\* স্বরযন্ত্রে বিবর্ধিত বেদনা, এবং কাসিবার অতিশয় প্রবৃত্তি। \* প্রায় দুইপ্রহর রাত্রির সময় অতিশয় শ্বাসকষ্ট, শীঘ্র উঠার বিরতি, তৎপরে স্বরযন্ত্রে ও কর্ণনালীর উর্দ্ধভাগে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ। \* কখন কখন বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা সহকারে শ্বাস-বষ্টের আবেশ ও তৎসহ সর্বদা স্বরযন্ত্র ও কর্ণনালীতে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা-নিঃস্রব। স্বরযন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে গাঢ়, ভারী, পীতের আভাযুক্ত ষ্ঠেতবর্ণ পুষ্য নিঃসরণ। বহুব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সময় জুপের ছায় কাস, স্বরভঙ্গ ও গলার অবদরণ। আমাশয় ।—বাতাশ্বানবশতঃ অস্ত্রে বেদনা। আমাশয়-গহ্বরে শূন্যতা অনুভব। উদরে বেদনা ও সরলাস্ত্রে জ্বালা সহ-কারে অস্ত্র হইতে পিত্তময় মল নিঃসরণ। মূত্র-যন্ত্র ।—দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি, মূত্রের পরিমাণের স্বল্পতা, বর্ণের অতিশয় আরক্ততা, মূত্রত্যাগে মূত্রমার্গে জ্বালা ও বদ্বগ। (মুখ্য লক্ষণ)। দিবাভাগে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূত্রপ্রবৃত্তি ; স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা চারি পাঁচ-গুণ মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি। মূত্রমার্গের মুখে, বিশেষতঃ মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও সামান্য যাতনা। (গৌণ লক্ষণ)। জননেন্দ্রিয় ।—ঔষধ পল্লীকাকালে সচমপ্রবৃত্তির অতিশয়



হৃৎযন্ত্র ও অত্যধিক, উপস্থের শিথিলতা ও কোমলতা । পুরাতন মুক-কণ্ঠদুঃখ । শ্বাসযন্ত্র । —রাত্রির প্রথমার্ধে স্ননিদ্রা, কিন্তু \* প্রায় দুই প্রহর রাত্রির সময় এক প্রকার শ্বাসকাসের আক্রমণের দ্বারা অতিশয় শ্বাসকষ্ট সহকারে জাগরণ, এবং শীঘ্র উঠার বিরতি । \* বক্ষঃস্থলে অতিশয় বেদনা, এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনলীতে অধিক শ্লেষ্মাশ্রাব সহ সময়ে সময়ে শ্বাস-কষ্টের আবেশ । হৃদগ্রন্থদেশে ও বামবাহুতে সামান্য বেদনা, হস্ত ও মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ এবং হৃৎপিণ্ডের বিবর্তিত ক্রিয়া । পৃষ্ঠ ।—পৃষ্ঠবংশাঙ্কুরে, বিশেষতঃ ঝঙ্কাহি ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে ও কটিদেশে বেদনা ; কটির অল্পপ্রস্থে অতিশয় দুর্বলতা ; অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—হস্তাঙ্গুলীতে রক্তের গতিরোধের দ্বারা বিন বিন বা অল্প অল্প হলবেধ অনুভব । পায়ের অঙ্গুলীতে রক্তের চলাচল অবরোধের দ্বারা বিন বিন বা হলবেধবৎ অনুভব । হস্তের তালুতে অস্বাভাবিক উত্তাপ । পদতল-জ্বালা ।

সমগুণঃ—এরম, এইলাহু আর্জ, বেল, কষ্ট, কার্বো, ইরিঞ্জ, হিপার, ইত্যাদি ।

## এরেলিয়া রেসিমোসা—এমেরিকান স্পাইকনড ।

ইউনাইটেড স্টেটসের বনভূমিতে এরেলিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ জন্মে । ইহার সরস মূল হইতে অগ্নি প্রস্ফুট হয় ।

ক্রিয়া ।—নিউমোগাষ্ট্রিক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া শ্বাস-যন্ত্রে এরেলিয়ার প্রধান ক্রিয়া দর্শে এবং সেই ক্রিয়ার শ্বাস কাস বা ওষধিগন্ধজ জ্বরের ( হে-ফিভার ) অল্পরূপ শ্বাস-রোধের আক্রমণ উপস্থিত হয় ।

অধিকার ।—শ্বাস-কাস, ওষধিগন্ধজ জ্বর, ও শ্বাস-রোধক প্রতিজ্ঞায়েই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় এবং উপকার করে । রজ কুচ্ছ, শ্বেতপ্রদর, প্রসবাস্তিক স্রাবের বিলোপ প্রভৃতিতেও গৃহৌষধ স্বরূপ ইহার ফাণ্টের ব্যবহার হইয়া থাকে ।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

আমেরিকায় সকল প্রকার কাসেই এরেলিয়া গৃহৌষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় । একজন নিউইয়র্কের ডাঃ জোন্স নিজ শরীরে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন । তাঁহার শ্বাসকাস রোগ ছিল । এই ঔষধ সেবনে তাঁহার সচরাচর যে প্রকার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত সে রূপ না হইয়া হে-ফিভারের দ্বারা আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি হে-ফিভার, তরল শ্লেষ্মাশ্রাবী শ্বাসকাস, এবং কোন কোন প্রকার শ্বাস-রোধক কাসে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রসূ দেখিতে পাইয়াছেন । এতদ্বারা সুস্থ শরীরে শ্বাসকাস উৎপন্ন না হইলেও শ্বাসকাসগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যের আক্রমণে উপকার দর্শে । ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার দশবিন্দু মাত্রায় মাদার টিংচার প্রতি ঘণ্টায় এক একবার ব্যবহার করিয়া

শ্বাসকাসের অনেকটা উপশম জন্মাইয়াছেন । বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় দশমিক ক্রম উপযোগী । শ্বাস-রোধক প্রতিষ্ঠায়ের বার্ষিক আক্রমণ, বাতাস-অসহ্যতা, সামান্য বায়ুপ্রবাহে হাঁচির উদ্বেক এবং নাসারন্ধ্র হইতে অধিক পরিমাণ জলবৎ তীব্র শ্রাব নিঃসরণ । হুই প্রহর রাত্রির সময় শ্বাসকষ্টসহ জাগরণ, শয়নে অসমর্থতা, ও নাসা হইতে পূর্ববৎ শ্রাব নিঃসরণ হাঁটুতে কল্পই রাখিয়া সম্মুখে অবনত হইয়া থাকিলে শ্বাসের উপশম । প্রাশ্বাস অপেক্ষা নিঃশ্বাসে অধিক আয়ান । প্রতিষ্ঠায়ের বিরতির পর ফুসফুস আক্রমণ ও শুষ্ক, কণ্ঠকুজনবিশিষ্ট কাস, এবং পীতবর্ণ, হস্তবৎ খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; এই সকল লক্ষণাপন্ন হে-এজমা রোগে ডাঃ জোন্স এরেলিয়া দশবিন্দু মাত্রায় দিনে তিনবার প্রয়োগ করিয়া তিন দিবসে রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন । পুনঃ পুনঃ হাঁচি, শ্বাস-ক্লেশতা, বায়ু যৎসামান্য শীতল হইলেই অসুখানুভব লক্ষণে প্রতিষ্ঠায়েও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । বাধকবেদনা, শ্বেতপ্রদর, এবং অবরুদ্ধ প্রসবাস্তিকপ্রসাবে এরেলিয়ার ফণ্ট সেবনে উপকার দর্শে । বিদাহী, দুর্গন্ধ শ্রাব, জরায়ুতে নিম্নাভিমুখে প্রচাপনবৎ বেদনা ; স্নায়ুগুলের ক্ষীণ অবস্থা, ও অতিশয় দুর্বলতা লক্ষণে জরায়ুর পুরাতন শ্বেতপ্রদরে ডাঃ লিলিয়েঙ্চাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । কলপেপার বলেন যে এরেলিয়া মুত্র বৃদ্ধি করে এবং বৃক্ক-শিলার বেদনার শান্তি করে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

নাসিকা ।—বিদাহী শ্লেষ্মার গতি বশতঃ নাসিকার পশ্চাৎ রক্তের টাটানি ( আস', এরম, এম-কার্ক, সেপা ), তৎসহ নাসা-পক্ষে বিদারণবৎ একপ্রকার স্পর্শ-ধেব । শ্বাসমন্ত্র ।—শুষ্ক, হাঁসফাঁস শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস ; শ্বাস-রোধের উপক্রম অনুভব ; নিঃশ্বাস গ্রহণকালে হিস্‌হিস্‌ শব্দের আধিক্য ; উঠিয়া বসি আবশ্যক হয় ( আস', শ্রাব ) ; ওষধিগুরুজ জ্বর । ০ রাত্রিতে আক্কেপিক কাস, প্রথম নিদ্রার পরে জাগিতে হয়, কাসের জন্ত আবার ঘুমাইতে পারা যায় না ; গলা তিড়তিড় করিয়া কাস জন্মে, উহার সহিত বক্ষঃস্থলের আকুঞ্জন থাকে ; উঠিয়া বসিয়া সবলে কাসিতে হয় ; কখন কখন গলায় যেন শল্য রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কাস উৎপন্ন হয় । শ্বাস-কাসের চরমে শ্বস্ন নিপীণন ; অনন্তর উহার বৃদ্ধি এবং উষ্ণ ও লবণাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ । সমগ্র বৃদ্ধান্তির নীচে ( \* রুমেন্স ) ও প্রতি ফুসফুসে অবদরণ, জ্বালা, ও যন্ত্রণা অনুভব । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—০ নিম্নাভিমুখে আবেগ ও বেদনা সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর ।

সমস্ত ।—এন্ট-টা, আস', ইপি, আইও, সাধু ।

## এলিট্রিস ফেরিনোসা — কলিকরুট ।

হিমেডোরেসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউনাইটেড হেটসে জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—শৈল্পিক বিল্লীতে ঔপদাহক স্বরূপ এলিট্রিসের ক্রিয়া দর্শে এবং বস্তি-গহ্বরস্থ বস্ত্রে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, অনন্তর সর্ক্বেশের, বিশেষতঃ জ্বী-জননেনক্রিয়ের পেশীর দুর্বলতা জন্মে।

**আময়িক প্রয়োগ।**—জরায়ুর পেশীর দুর্বলতা ; হরিৎপাণ্ডুগ্ৰস্তা কামিনীদিগেয় নিরক্ততা জনিত দুর্বলতা ; সর্ক্বেশীন নীরক্ততা সহ পেশীর দুর্বলতা জনিত বন্দ ; জরায়ুর অন্তর্বেষ্টের প্রদাহ ; শ্বেতপ্রদর ; জরায়ুর পেশীর দুর্বলতা বশতঃ অভ্যন্ত গর্ভপ্রাব বা বধ্যাঙ্ক ;—এই সকল রোগে এলিট্রিস ফলপ্রদ। ডাঃ হেল বলেন যে এলিট্রিস গর্ভাশয়স্থ যন্ত্রের চায়না। ডাঃ হেরিং বলেন যে দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ অথবা পরিপোষণের দোষে, বিশেষতঃ জ্বীলোকদিগের, যে দুর্বলতা জন্মে, অথচ কোন যান্ত্রিক রোগ থাকেনা, সেই দুর্বলতায়ই এই ঔষধ অভ্যন্ত সুপ্রযুক্ত। পরিপাক-ক্রিয়ার বীরতা ও আশ্রান লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্য ; এবং গর্ভাবস্থার বমনেও ইহা উপকারী।

**প্রধান প্রধান লক্ষণ।**—মস্তকে জড়তা, গুরুতা, ও বিশৃঙ্খলা অল্পভব সহ শ্রাস্তি, এবং মনঃ সংযম করিতে অসামর্থ্য ; মনের শক্তি ও তেজের দুর্বলতা। প্রসব-বেদনার ছায় বেদনা সংকারে যথাকালের পূর্বে প্রভূত রক্তঃপ্রাব।

**সমগুণ।**—এলো, কল, সিদ্ধ, ক্রোক, হাইড্রাস, ফির, লিলি।

## এলফোনিয়া কনফ্রিক্টা—বিটার বার্ক ।

এপোসাইনেসি জাতীয় এই গুল্ম বা বৃক্ষ নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ও কুইন্সল্যান্ডে জন্মে। এলফোনিয়া ফ্লোরিস ইহার নামান্তর। সেই স্থানের আদিম নিবাসীরা ইহাকে “কুইনাইন বার্ক” বলিয়া থাকে। ইহার উপকারকে এলফোনিয় বলে। এলফোনিয়ার বন্ধল হইতে অরিষ্ট ও উপকার হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—এতদ্বারা ভেসো-মোটর নায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিত হয় এবং অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা ; এবং অতিসার সংযুক্ত অল্পগ্র জর জন্মে। তৎপরে আরও ইহা সেবন করিলে কম্প, সাধারণতঃ শীতল ঘর্ম, বিরেচন, শিরোগূর্ণন, ও সবিরাম জরের অন্ত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**অধিকার।**—রোগান্তিক দৌর্বল্য। জর। অতিসার। রক্তাতিসার। অগ্নিমান্দ্য।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

**দুর্বলতা ।**—অষ্ট্রেলিয়ার ডাঃ ক্যাথকার্ট এই ঔষধ পরীক্ষা ও প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে সকল প্রকার তরুণ রোগের পরবর্তী দৌর্বল্যে এবং প্রসব, স্তন্যদান ও অতিসারাদির পরবর্তী দৌর্বল্যে তিনি চায়না অপেক্ষা এলগোনিয়া অধিক ফলপ্রসূ দেখিতে পাইয়াছেন । অতএব যে সকল রোগী অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে চায়না স্বেচ্ছায় নয় বলিয়া এলগোনিয়া ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে । **অতিসার ।**—গ্রীষ্মপ্রধানদেশে গ্রীষ্মকালীন অতিসারে বিরচনের সহিত অপাচিত ভুক্তদ্রব্য নির্গত হইলে এমন কি বিরচন রক্তাঙ্কিত থাকিলে ও ডাঃ ক্যাথকার্ট এই ঔষধ অব্যর্থ মনে করেন । **রক্তাতিসার ।**—ম্যালেরিয়া জনিত, অথবা পচা উদ্ভিদাদি মিশ্রিত দূষিত জলপান বশতঃ আমরক্ত রোগেও তিনি ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । **অগ্নিমান্দ্য ।**—ক্ষুধা-হীনতা দি লক্ষণাপন্ন সামান্য অগ্নিমান্দ্য রোগেও এই ঔষধে উপকার দর্শে । **জ্বর ।**—ডাঃ ক্যাথকার্ট বলেন যে তরুণ রোগের পরবর্তী অল্প জরে, পুরাতন স বিরাম জরে, অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহৃত আবদ্ধ জরে, ও ছদ্ম জরে অর্থাৎ একদিন জর, তৎপরদিন ঠিক সেই সময় আমরক্ত বিরচনে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী । এমন কি এই সকল রোগে ইহা কুইনাইন বার্ষিকেরণ, বা চিনি অয়ডিন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । তবে ইহার মাদার টিংচার ( মাতৃকারিষ্ট ) অপেক্ষাকৃত একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক করে । মূহু কাথই প্রশস্ত । অত্যন্ত রোগে রোগের পরাক্রম ও রোগীর ব্যয়ক্রম অল্পসারে মূল অরিষ্ট হইতে দুই দশমিক ক্রম পর্যন্ত একবিন্দু হইতে পাঁচ বিন্দুমাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক করে । অত্যন্ত তিক্ত ও বিষাদ বিধায় এলগোনিয়া প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয় । ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে অতিসার জ্বরাদিতে এলগোনিয়ার চায়নার সহিত সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইহার লক্ষণে চায়নার ত্রায় উপদাহিতা ( ইরিটেবিলিটি ) থাকে না ।

### এফ্রিয়ারাস রুবেন্স—ফার-ফিস ।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় ন্নায়ুগুণে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া ক্রিয়া-বিকারের অনেক গুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু বিধান-তন্ত্রের কোনপ্রকার পরিবর্তন জন্মে না । গুণাবায়ু ও ন্নায়ুগুণের লক্ষণেরই সমধিক প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, এবং এই সকল অবস্থায় ও কোরিয়া ও অপস্মার রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সন্মাস রোগের পূর্বরূপ স্বরূপ মস্তিষ্কের যুক্ত-সঞ্চয়েও ইহার ব্যবহার হয় । ইহার ক্রিয়ায় শিরা-প্রধান স্থানে উপদাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই উপদাহ কখনও প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হয় না ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।—মাষক-খাতু-দোষ, শিথিল লসিকা-প্রধান শারীরিক প্রকৃতি, কোপন স্বভাব । কোনপ্রকার চিত্ত-বিকারে, বিশেষতঃ প্রতিবাদে সহজে উত্তেজনার উৎপত্তি (এনা, কোনা) । উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ভ্রায় মত্তকে উত্তাপ । মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় । সংশ্রাস রোগে বদনের আরক্ততা, নাড়ীর দৃঢ়তা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা । স্তনের তরুণ ক্যান্সার, \* ছুরিকা দ্বারা কর্তনের ভ্রায় বেদনা ; স্তনে আকর্ষণী বেদনা ; ঋতুর পূর্বে যেরূপ হয় স্তনের সেইরূপ ক্ষীণতা ও প্রসারিততা ; স্তনদ্বয় ভিতরের দিকে আকৃষ্ট অল্পভূত হয় । স্তনে একটা সীসবর্ণ মিশ্রিত আরক্ত চিহ্নের প্রকাশ, উহা ভাদ্রিয়া গিয়া শ্রাব নিঃসরণ ; ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্তনাক্রমণ, উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ ; উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুর সমুন্নত ও বিপর্যস্ত তলদেশে ঈষৎ লোহিত ক্ষতাকারে আবৃত । চলনের অদৃঢ়তা ; পেশীর ইচ্ছার অনায়ত্ততা (এলম, জেল) । অপস্মার রোগের আবেশ উপস্থিত হইবার চারি পাঁচ দিবস পূর্বে সর্বশরীরে স্পন্দন । দুর্দম্য কোষ্ঠ-রোধ ; নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি ; জলপাইয়ের আকৃতি শক্ত শক্ত গোলার ভ্রায় মল । অতিসার ; জলবৎ, কপিশবর্ণ, প্রবল ধারায় নির্গত মল (ক্রোট, গ্রাট, জ্যাট্র, থুজা) ! নাড়ীদিগের সন্তোগলিম্বার বৃদ্ধি (লিলি) ।

সমগুণ ।—মিউরেজ, সিপিয়া ।

## এম্পারেগস—এম্পারেগস অফিসিনেলিজ ।

সিলিএনী জাতীয় এই উদ্ভিদ উত্তানে উৎপন্ন হয় । ইহার তরুণ অঙ্গুরের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—গৃষ্ঠবংশীয় ঋষ্মণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া বৃককে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে, ভজ্জন্ত হৃৎপিণ্ডের গোপ রোগ জন্মে । এই দুই বস্তুর ক্রিয়া-বিকার হইতেই সেই সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । শৈল্পিক বিঘ্নিতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অধিক নিঃসরণ-নিঃসরণ বিশিষ্ট প্রাতিজ্ঞায়িক অবস্থার উৎপত্তি হয় । নাসা-পথে, বায়ুনলী-পথে, মূত্রাশয়েই এই শেবোক্ত ক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় ।

আময়িক প্রয়োগ ।—বৃককের রোগ হইতে উৎপন্ন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত উপদ্রবে, আমবাতে, ও অগ্রাভ রোগে; এবং অধিক শ্লেষ্মা ও পুষ্প্রাবী মূত্রাশয়-প্রদাহে এই ঔষধে ফলপ্রদ । আমবাতে ও বৃকক-রোগ জনিত শোথে এম্পারেগস সুপথ্য ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—মস্তকের বিশুদ্ধতা; শিরোবর্ণন । কপালে গৌরব । শঙ্খদ্বয়ে অবিরাম বেদনা, প্রচাপনে উহার আধিক্য । চক্ষু ।—চক্ষুতে হট্টী-বেধ ও তুড়তুড়ি । নাসিকা ।—বারংবার হাঁচি ! ঈষৎ শুষ্ক, পাতলা, তরল, প্রীভূত শ্রাব নিঃসরণ সহকারে মস্তকের ও

নাসিকার প্রবল প্রতিষ্ঠায় । মূত্র-যন্ত্র ।—মূত্রমার্গে কর্তনবৎ বাতনা ও জ্বালা । বিবদ্ধিত মূত্র নিঃস্রব সহকারে পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ ( এক্সি-টিউ, ফস-এসি ) । মূত্রমার্গের মুখে স্থল স্থচীবেধবৎ বাতনা সহকারে বারংবার মূত্রত্যাগ । মূত্রের উগ্র ও বিরক্তিকর গন্ধ এসাক, বেঞ্জ-এসি, নাই-এসি ) । খড়ের বর্ণ; ঘোলা, শাদা পশমের স্থায় তলানি বিশিষ্ট, মূত্র । ফসফেটস ও ইউরেট অব-এমোনিয়া পূর্ণ স্বল্প মূত্র ( ০ বৃক্ক-রোগ জনিত শোথ ) । ০ মূত্র সহকারে অল্প পরিমাণে শিলাইরেণু নিঃসরণ । শ্বাস-যন্ত্র ।—তুড়তুড়ি ও কাসিবার প্রবৃত্তি । অধিক শ্লেষ্মা নিষ্কাশন বিশিষ্ট বয়সপ্রদ কাস ( \* ষ্ট্রন ) । নড়িলে চড়িলে, অথবা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে আয়াসিত শ্বাস ( একন, \* আস', ক্যাক্স-কা ) ; শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয় ( \* আস' ) । বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন, ও স্থচী-বেধবৎ বেদনা । হৃৎপিণ্ড । ও নাড়ী ।—\* বক্ষঃস্থলে গোরব সহ হৃৎকম্প । হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া ( \* ডিজি, ট্রাট-মিউ ) । নাড়ীর জীবৎ বিবদ্ধিত বেগ ; ক্ষীণতা । দেহ ।—পৃষ্ঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমবাতির বেদনা ( \* একন, \* ব্রাই, \* রসটক্স ) । সন্ধিস্থানে লিখিক এসিডের সঞ্চয় । ০ অতিগর ক্লান্তি এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ।

সন্মগুণ ।—এপোসা-ক্যান, কনভ্যাল, ডিজি, পারিস, স্কুইলা ।

## এসক্লিপিয়াস কর্ণিউটাই—এসক্লিপিয়াস সাইরিএকা ।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ইউনাইটেড ষ্টেটসে বাস্তার ধারে জন্মে । ইহার মূল হইতে অগ্নিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া বহুতে এক্সিপিয়ারসের গৌণক্রিয়া দর্শ্য, তাহাতে মস্ত ও শ্লেষ্মা ক্ষরিত এবং ঘর্ম উৎপন্ন হয় । ইহার ক্রিয়ায় রক্ত-সঞ্চয়েরও প্রবণতা জন্মে, মস্তিষ্কে ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়েই উহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয় ।

অধিকার ।—ঘর্ম বিলুপ্তির পর প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণাপন্ন রক্তসঞ্চয়িত ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়া । অতিসার । গর্ভবতীদিগের ইউরিমিয়া । স্কার্লেটিনার পরবর্তী শোথ । বৃক্কের রোগজনিত শোথ । হৃদ্রোগজনিত শোথ । সহসা ঘর্মরোধ বশতঃ শোথ । প্রমেহ ও লাল্যমেহ । বৃহৎ সন্ধির বাত । ইনফ্লুয়েঞ্জা । ব্রুকাইটিস ।—লক্ষণের সহিত সোসাদৃশ্য থাকিলে এই সকল রোগে এক্সিপিয়ারস ব্যবহৃত হয় ।

প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

শিরঃপীড়া ।—ডাঃ হেল বলেন যে ঘর্ম-বা মূত্র-রোধজনিত ও জরসংযুক্ত রক্ত-সঞ্চয়বিশিষ্ট শিরঃপীড়ায় ; এবং ঘর্মশূন্য ত্বক্, ক্ষীণ নাড়ী, শীতলগাত্র, শিরঃপীড়ান্তে ঘর্ম বা প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণাপন্ন স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ উপকারী । শেবোক্ত

শিরঃপীড়ায় ইহা ইথেশিয়া, পলসেটিলা, অথবা জেলসিমিনমের সমকক্ষ । অতিসার । —  
কপিশ বা পীতবর্ণ মল, বিবমিষা ও বমন এবং এক শঙ্খ দেশ হইতে অল্প শঙ্খদেশ পর্য্যন্ত  
যেন কোন ত্রীক্ষ অস্ত্র বিদ্ধ হইতেছে এরূপ শিরঃপীড়া সংযুক্ত অতিসারে এই ঔষধ ফলপ্রদ  
কৌষ্ঠবদ্ধ ।—১০ হইতে ৩০ বিলু মাত্রায় ইহার অরিষ্ট দিনে তিনবার ব্যবহারে কৌষ্ঠবদ্ধ  
আরোগ্য হইয়াছে । মূত্র-রোগ ।—মূত্রের সহিত যে সমস্ত অতরল পদার্থ নির্গত হয়  
কলচিকমের স্থায় সিদ্ধ-উইড দ্বারাও তাহা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ ছয় দিবসে ১৩২ গ্রেণ বাড়ে ।  
অতএব যে সকল রোগে এই অতরল পদার্থ সমাক্রমে নিঃসৃত হয়না সেই সকল রোগে  
অর্থাৎ গর্ভাবস্থা বা অন্য কোন কারণ জনিত ইউরিমিয়ায় ( মূত্রনাশ-বিকার ) এসক্লিপিয়াস  
স.ইরিএকা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ডাঃ মার্সী বলেন যে মূত্রবস্ত্রে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে  
এবং কি মূত্র-বৃদ্ধি, কি মূত্রহাস উভয় প্রকার মূত্র-রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয় । শোথ । —  
আরক্ত জরের পরবর্তী শোথ, ও বৃক্কের পীড়াজনিত শোথে এই ঔষধ আরোগ্যকর ।  
অভিমান্য এতদ্বারা ছয়দিবসে মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক ৩৫ আউন্স হইতে ১৩৫ আউন্স  
হইয়াছিল, অতএব গোণতঃ ইহাতে মূত্রনিঃস্রব অবরুদ্ধ হয় । ফলতঃ ইহার ফাট ও  
অরিষ্ট ব্যবহারে অনেকগুলি রোগীর বৃক্ক-রোগজনিত শোথ আরোগ্য হইয়াছে । ডাঃ  
হেল হুদ্রোগ জনিত শোথেও এই ঔষধের উপশমকারিতা স্বীকার করেন । সহসা  
ঘর্ষরোধজনিত তরুণ শোথে এবং অত্যাধিক সকলপ্রকার শোথেই ইহা উপকারী বলিয়া  
প্রতিপন্ন হইয়াছে । রক্ত-শূল ।—বাধক বেদনায়, ও আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের বিরামণীল  
বেদনায়; ত্রিকদেশ হইতে নিম্নোদরে প্রচাপন, ও স্বল্পস্রাব লক্ষণে এই ঔষধ সমমতে  
ব্যবহেয় । আমবাত ।—অনেক চিকিৎসক এতদ্বারা বাতরোগ আরোগ্য করিয়াছেন ।  
ডাঃ লী বলেন যে ইহা সিমিসিফুগার সমকক্ষ । ডাঃ প্যাটি বলেন যে ছয়জন রোগীর তরুণ  
আমবাত এই ঔষধে গড়ে আটদিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়াছিল । ইহাদের বৃহৎ সন্ধিতে  
প্রদাহ, অতিশয় বেদনা ও স্ফীততা ছিল । এতদ্বারা বেদনার বিলক্ষণ শান্তি জন্মে ।  
ডাঃ হেল বলেন যে কলচিকম ও সিমিসিফুগা বিফল হইলে বাতে এই ঔষধ অবশ্য পরীক্ষা  
করিয়া দেখা কর্তব্য । ইহার নিয়ন্ত্রণ সম্ভবতঃ অধিক উপযোগী । কুমি ।—শুভ্র জিহ্বা ;  
প্রবল শিরোবেদনাসহ অত্যন্ত বিবমিষা, মূত্রাধিক্য ও মল-প্রবৃত্তি, বিবদ্ধিত ক্ষুধা ;  
উপস্থের অন্ত্যভাগে স্ফুটন অল্পভব ; এবং হৃৎ-কুমি ;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ  
লিলিয়েটাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—শিরোবুর্নি ; চক্ষুর্দ্বয়ের ব্যবধান স্থানে প্রবল শিরোবেদনা । কপালের  
অগ্রভাগে আকৃষ্ট অল্পভব । ঘর্ষ-লোপ, অথবা শরীরে অকর্ণ্য পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ  
০ শিরঃপীড়া । দ্বায়বীয় শিরঃপীড়া, তৎপরে ঘর্ষ বা অধিক মূত্রস্রাব ( জেল ) । ( বমনাস্তে )

যেন কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র এক শঙ্খস্থান হইতে অপর শঙ্খস্থান পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইতেছে এরূপ অমুভব। **মুখমধ্য**।—গুত্রবর্ণ লেপে জিহবা আচ্ছন্ন। **গল-মধ্য**।—গল-কোষে তুড়তুড়ি অমুভব। **আমাশয়**।—অত্যন্ত বিবমিষা; প্রবল বমন ও বমনোত্তম। **মল**।—বিবর্জিত পিত্তশ্রাব ( আইরিস, পড )। জীবৎ মল-প্রবৃত্তি। বিবমিষা ও বমন সহকারে ( \* ইপি, আইরিস ), ও মলঘারের অবদারণ সহকারে ( \* আস', সলফ ) অতিসার। নরম, তরল, জীবৎ পীতবর্ণ, কতকটা পেট কামড়ানি সংযুক্ত, প্রহৃত মল। **মূত্র-যন্ত্র**। মূত্রভ্যাগে জ্বালা। বিবর্জিত মূত্রপ্রবাহ ( ইউপেট, ফস-এসি )। অল্প আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মূত্র। মূত্রে অতরল পদার্থের বৃদ্ধি। ( ব্রাই, কলচি, সিমিসি )। **জননেন্দ্রিয়**।—( পুং ) উপস্থের শেষভাগে শ্বেতবর্ণি অমুভব। ( স্ত্রী ) ( শোথ বা গর্ভাবস্থায় ) ০ সবিরাম কুস্থনসংযুক্ত, প্রসব-বেদনার স্থায় বেদনা। ( শোথে ) ঋতু বিলোপ। **শ্বাস-যন্ত্র**।—বায়ু-নলীর নিঃস্রবের আধিক্য ( \* এন্ট-টার্ট, \* ইপি, \* ফস, \* ষ্টান )। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী**।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লাঘব; নাড়ীর মন্দগতি ( \* ডিজি, \* ক্যান-ইণ্ড, \* ওপি )। বমনান্তে নাড়ীর ক্ষীণতা ( \* এন্ট-টার্ট )। **নিদ্রা**।—তন্দ্রালুতা; নিদ্রালুতা; রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা। **জ্বর**।—বমনান্তে শরীরের শীতলতা। ঘর্ষশ্রাব; প্রভূত ঘর্ষ।

**সমগুণ**।—\* এস্ক্লি-টিউ, এপোসা, ব্রাই, কলচি।

## এসক্লিপিয়াস টিউবরোসা—প্লুরিসি ক্লট।

ইউনাইটেড স্টেটস ও ক্যান্টোনার শুষ্ক ক্ষেত্রে এই উদ্ভিদ পাওয়া যায়। ইহার সবস মূল হইতে অধিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া**।—ঔষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্রের ও অস্ত্র-প্রণালীর ঔষ্মিক ঝিল্লীতে প্রাধানতঃ এস্ক্লিপিয়াস টিউবরোসার ক্রিয়া দর্শে; অপর, মস্তৃশ্রাবী বিধান-তত্ত্বতে বিশেষতঃ ফুসফুস-বেটে, ও স্নেহশ্রাবী ঝিল্লীতে, এবং পেশীতে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের পেশীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই সকল বিধান-তত্ত্বতে ইহা অপ্রবল প্রকৃতির এক প্রকার উপদাহ ও প্রদাহ জন্মায়।

**অধিকার**।—প্লুরোডিনিয়া, আমবাতিক জ্বর, আমবাতিক হৃৎপ্রদাহ, কটিবাত, ও অন্তান্ত আমবাতিক উপদ্রবেষ্ট প্রাধানতঃ এই ঔষধের ব্যবহার হয়। ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ, বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ, শিশুদিগের কৈশিক বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ, শিদি জ্বর, এবং শিদিজনিত ও পিত্তজনিত অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।



## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ বা প্লুরিসি।**—আমেরিকায় এই ঔষধ, সাধারণ লোকেরা প্লুরিসি ও প্লুরিডিনিয়া রোগে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারাই ইহার ফাট সেবন করায়। ঘর্ম হইলেই বেদনার নিবৃত্তি জন্মে, এজন্যই ইহাকে প্লুরিসি-কট বলে। বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস রোগও এই প্রকারে চিকিৎসিত ও আরোগ্য হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সমমতানুসারেও এই সকল রোগে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি অন্ততঃ প্লুরিসি ও ইন্টারকুইল রিউমেটিজম (পশুকা-মধ্য-পেশীর বাত) রোগ এই ঔষধের প্রথম দশমিক ক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে বাম ফুসফুসের ভূমিদেহে নিঃশ্বাসে বেদনানুভব, অক্ষ ও আক্ষপিক কাস, এবং সায়াক্বে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন ফুসফুস-বেষ্টের উপসর্গে এসক্রিপিয়াস উপশমপ্রদ; এবং দক্ষিণপার্শ্বের তরুণ বেদনা ফুসফুস-বেষ্টে অবস্থিতবৎ বোধ হইলেও ইহা উপকারী। **বালরোগ।**—বালকদিগের বক্ষঃস্থলের ও অন্ত্রের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। এই সকল রোগে এই ঔষধ ইপিকাকের সমতুল্য। বালকদিগের শর্দি ও কাসে, শ্লেষ্মাধারা নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা বশতঃ শ্বাস কষ্টে, প্রতিশ্রায় জনিত ক্রূপের হ্রাস কাসে; এবং শ্বাসরোধকর প্রতিশ্রায়ে এসক্রিপিয়াস উপকারী। এই সমস্ত রোগে আত্ম-বালক জরের তত তীব্রতা থাকে না, গাত্রত্বক উত্তপ্ত, কিন্তু আর্দ্র থাকে। শর্দিজরে বক্ষঃস্থল ও অন্ত্রের শ্লেষ্মিকাবিল্লী যুগপৎ আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ আঠা আঠা সবুজবর্ণ মলস্রাব থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **শ্বাস।**—বৃদ্ধদিগের শ্বাস ও প্রতিশ্রায় জনিত রোগেও ইহা ফলপ্রদ। তাড়াতাড়ি নিশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা, তৎপরে গোরবানুভব; আহারান্তে ও ধূমপানান্তে অতিশয় শ্বাসাভাব (বেদম হওয়া); হৃদপ্রদেশে কণ্টক-বেধ বা আকুণ্ঠনবৎ বেদনা; আক্ষপিক শ্বাসরোগে এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। **পেরিকার্ডাইটিস বা হৃদযেষ্ঠপ্রদাহ।**—ডাঃ হেল এই ঔষধ আমবাতিক হৃদযেষ্ঠপ্রদাহে হৃদপ্রদেশে চিমটিকাটির হ্রাস বেদনা, বামস্তম্ভ পথ্যস্ত সেই বেদনার সম্প্রসারণ, হৃৎস্পন্দ, হৃদপ্রদেশে সঙ্কোচন অনুভব ও উহার উপরে স্পর্শদেহ, এবং উত্তপ্ত ও আর্দ্র ত্বকবিশিষ্ট জ্বরলক্ষণে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়ছিলেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে বাতরোগে এই ঔষধ ব্রাইওনিয়া, সিমিসিফুগা, ও কলচিকমের সমগুণ; এবং হৃৎপিণ্ডের মূহ আমবাতিক পীড়ায় উপকারী। **রক্তাতিসার।**—প্রতিশ্রায়জনিত আমরক্তরোগে সর্কাক্সে আমবাতিক বেদনা থাকিলে এসক্রিপিয়াস প্রয়োগে সম্বর ফল দর্শে। ইহার মাদার টিংচার বা ১৫ ক্রম ব্যবহৃত হয়। **অতিসার।**—ডাঃ মার্টিন বলেন যে এক ব্যক্তির উদরের নিম্নদেশে বেদনা ছিল, এই বেদনা কখন কখন ত্রুত-প্রবল হইত যে রোগী হাঁটিতে বা গাড়ীতে বেড়াইতে পারিত না। তাহার প্রতিদিন পাঁচ ছয়বার দান্ত হইত। সময়ে

সময়ে এই বেদনা রাত্রি দুই তিনটার সময় অতিশয় উগ্রভাবে উপস্থিত হইত এবং তখন সহসা মলশ্রাব হইত । তৎপরে উদরে এমন স্পর্শদ্বেষ খাকিয়া বাইত যে রোগী হাঁটিতে পারিত না । তামাকের অপব্যবহারে এই সকল লক্ষণ জন্মিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল । এই ঔষধের পাঁচ কে.টা অরিষ্ট এক আউন্স জলে মিশাইয়া একবার সেবন করাতো পঁচিশ বৎসরের এই অসুখ একেবারে আরোগ্য হইয়াছিল । বেদনাবিশিষ্ট, অতিশয় উগ্র গন্ধ বা নষ্ট অণ্ডের ছায় তরল মল, মলশ্রাবকালে অল্প যেন্ন বাহির হইয়া পড়িবে এপ্রকার অসুভব; কাল আঠাআঠা মল, মলে চর্বিব ছায় হরিদ্রাবর্ণ চিহ্ন, এবং উদরের অভ্যন্তর দিয়া যেন অগ্নির প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে এরূপ অসুভব লক্ষণাপন্ন অতিসারে ডাঃ লিলিয়েছাল এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা ব্যবহা করেন । গগুমালি ।— গুটিকা রোগ উৎপন্ন হইবার প্রবল সম্ভাবনা ; শরীরের নানাস্থানে তীব্র বেদনা, ও পেশীর স্পর্শদ্বেষ, বেদনার স্থান-বিকল্পতা, শক্তির লাঘব, পরিপাক-শক্তি ও সমীকরণ-শক্তির ক্ষীণতা ; গ্রীবার গ্রন্থির বিবর্জন, কোম্বার ছায় উদ্ভেদ ; সর্বশরীরে অপচ্যমান ও পচ্যমান পীড়কা ;—এই সকল লক্ষণে গগুমালি-দোষে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা, জড়ত্ব, ও গুরুত্ব ; মস্তক ঘূর্ণন । কপালে ও মস্তক-শিখরে অতীব শিড়ঃপীড়া, নড়িলে চড়িলে উহার উপচয় এবং শয়ন করিলে উপশম । কাসিবার সময় কপালে বেদনা (ব্রাই) । নাসিকা ।—অধিক হাঁচি সংযুক্ত তরল সর্দি (একন) । কোং করিলে বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তপাত । নাসিকার কণ্ডুঘন ( \* সলক ) । মুখ-মধ্য ।—দৃঢ় পীতবর্ণ আবরণে জিহ্বার আচ্ছন্নতা । মুখে পচা আশ্বাদ ( আর্গ, মার্ক, \* পল ) ; রক্তের আশ্বাদ । গল-মধ্য ।—গলার জ্বং আকুঞ্চন ও স্বরযন্ত্রে কণ্টক-বেদবৎ বাতনা । আমাশয় ।—বিবিম্বা, ও বমন-চেষ্টা । আমাশয়ের ন্যায়বীর বেদনা ; চাপক বেদনা ; ভার ( আস', \* ব্রাই \* নক্স-ভম, \* পল ) ; এবং জ্বলা ( \* আস', \* কলচি ) । উদর ।—অস্বচ্ছন্দত', অথবা তীব্র কর্তনবৎ বেদনা সহকারে অস্ত্র-কুঞ্জন । আখ্যান জনিত উদর-বেদনা (এলো, কার্কো-ভে, কলোস, লাই) । প্রচাপনে উদরে অতীব বেদনা । মল ।—দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ( \* আর্গ, \* এলো, \* ব্রাই, \* কার্কো-ভে, \* গ্রাফ ) । \* পূর্ব্বে এগারটার সময় নরম, দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ, তৎপূর্বে অস্ত্র-কুঞ্জন । রক্তাতিসারিক ; অণ্ডের যেতাংশের ছায় ; পীতবর্ণ ; হরিদ্রণ ; আঠা আঠা ; পচা অণ্ডের ছায় গন্ধ বিশিষ্ট ( ক্যাক, \* ক্যাম ) ; মল । মুত্র-যন্ত্র ।—মলিন লোহিত, চূড়ান্ত ( উপাদান ) পরিপূরিত ( স্ট্রিগ্রেটেড ), সহজে বিগলিত, মুত্র । শ্বাস-যন্ত্র ।—\* গলার আকুঞ্চন সহ শুষ্ক কাস ; উহাতে কপালে ও উদরে বেদনা জন্মে, শুষ্ক, থক্ থক্ কাস । \* শ্বাস-বেদনা, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের ভূমিদোষে । শ্বাস-কাসের আবেশের ছায় ( আস' ), শ্বাসের বাতনা ও আশাস । \* বাম

স্তনাত্ৰ হইতে নীচের দিকে সঞ্চারিত তীব্র বেদনা, তৎসহ ঘাড়ের বাম পাশের স্তব্ধতা। \* বুকাহির পশ্চাতে তীব্র কৰ্ত্তনবৎ বেদনা, দীর্ঘ নিখাস আকর্ষণে, অথবা বাহুদ্বয় সঞ্চালনে উহার আতিশয়া। \* পঞ্জরাহিষয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে, বুকাহির সমীপে প্রচাপনে বেদনা, সেই বেদনার দক্ষিণ পার্শ্বে সঞ্চারণ। \* মস্তকদিকে অবনত হইলে বক্ষঃস্থলের বেদনার শান্তি। \* শুষ্ক থক্ থক্ বাস, ও স্বল্প শ্লেষ্মা নিঃস্রবন সহকারে, দক্ষিণ পার্শ্বে, ফুসফুস-বেষ্টে তরুণ বেদনা (একন, \* ব্রাই)। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডে আকৃঞ্চনী বেদনা। হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ছুরিকা দ্বারা কৰ্ত্তনের স্থায় বেদনা (একন, ক্যাউ, \* ব্রাই, কালী-কার্ক, স্পিজি) নাড়ীর জ্বলৎ বেগ-বৃদ্ধি। গ্রীবী ও পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে ও স্বক্ষদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে ছুরিকা দ্বারা কৰ্ত্তনের স্থায় বেদনা। ত্রিকস্থানের নিকট কটিতে তীব্র বেদনা; কটি-বাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সংস্থ সন্ধিতেই আমবাতির বেদনা (একন, ব্রাই, রস)। দক্ষিণ স্বক্ষে তীব্র চিড়িক-মায়া বেদনা। বাম স্বক্ষে বেদনা, বাম বক্ষঃ হইতে উহার সঞ্চারণ; দেহ।—দীর্ঘকাল রোগভোগের স্থায় দুর্বলতা ও অবসন্নতা। জ্বর।—অতিশয় দুর্বলতা ও শীর্ণতা। শীতল পা সহকারে শীত, উচ্চ তাপ, তৎসহ উত্তপ্ত ঘর্ম্ম। ত্বক।—সকল শরীরে, বিশেষতঃ বাহু, জঘনা, ও মুখমণ্ডলে জলপূর্ণ, অপচ্যমান ও পচ্যমান উত্তেজ, কণ্ডুয়ন (\* সলফ)। নিদ্রা।—তজ্জালুতা, অহির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা বিরক্তিকর স্বপ্ন।

সম্মুণ।—একন, আস, এস্কি-কগি, ব্রাই, সিগি, কলোস।

## ওপনশিয়া ভলগারিস—প্রিক্লিপিয়ার।

ক্যাস্টস জাতীয় এই গুণ্য আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস দলের বা সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। নিউইয়র্ক নগরের ডাঃ বাডিক ওপনশিয়ার দলের অরিষ্ট আশ্রয় করিয়া এই গুণ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরীক্ষায় চক্ষুর পক্ষ্মরেখায় আকৃঞ্চন অল্পভব সহকারে চক্ষুর পাতার প্রান্তে জ্বালা ও টাটানি; \* আমাশয় হইতে অঙ্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত বিবমিষা, ও অতিসার উৎপত্তির স্থায় অল্পভব; \* উদরের নিম্ন তৃতীয়াংশে অবদরণ ও বিবমিষা এবং অঙ্গগুলি উদরের নিম্নাংশে অবস্থিতবৎ অল্পভব; ০ মলিন আঠা আঠা, অবদরণকর, অবসাদজনক, বিবমিষা সংযুক্ত এবং আমাশয় ও অস্ত্রে খল্লীবিশিষ্ট অতিসারে; পর্য্যায়ক্রমে আমাশয় ও অস্ত্রের বিবমিষা; নিম্নাঙ্গের আধেয়গুলি অশিশয় বিদাহী অল্পভব; আমাশয়ে অতীব বেদনা, এবং খল্লীর হৃচনাৎ অল্পভব সহকারে বিবমিষা; শীতলতা ও অবসন্নতা অল্পভব;—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই আংশিক পরীক্ষা লক্ষণ দৃষ্টে ডাঃ হেল মনে করেন যে অস্ত্রের শৈল্পিক বিল্লীতে এবং সম্ভবতঃ উদরের ঝায়কে ওপনশিয়ার ক্রিয়া দর্শে। তিনি বলেন যে অত্যন্ত বিবমিষা বিশিষ্ট অতিসার

এতদ্বারা আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে শিশুদিগের অতিসারে উদরের নিম্নাংশ রোগের মূলস্থান হইতে এই ঔষধে উপকার দর্শে। যুবকদিগের রোগে আমাশয় হইতে অল্প পর্য্যন্ত বিবমিষা ও নিম্নোদরে অঙ্গগুলি অবস্থিতবৎ অল্পভব, অপিচ যেন অতিসার জন্মিবে এপ্রকার অল্পভব এই ঔষধের লক্ষণ।

## ওলিয়ম ক্যাজুপটী—ক্যাজুপট অয়েল।

ক্যাজুপট অয়েল মলক্কী দ্বীপস্থ একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রের তৈল। এই বৃক্ষের বহুল অতিশয় শুভ্র বলিয়া সেই দ্বীপবাসীরা ইহাকে মেলেনিউকা ক্যাজুপটী অর্থাৎ স্নেহ তরু বলে। ইহার পত্র চৌদ্বাহিয়া এই তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্যাজুপট অয়েল অতিশয় তরল ও স্বচ্ছ; ইহার আশ্বাদ সুগন্ধি ও উত্তপ্ত; মুখে দিলে কিয়ৎকাল ধরে মুখে এক প্রকার শীতলতা অল্পভূত হয়। ইহার গন্ধের সহিত টর্পেন্টাইন, ক্যাম্ফর, পেপারমিন্ট ও গোলাপফুলের সমবেত গন্ধের সাদৃশ্য আছে। ক্যাজুপট অয়েল এলকোহলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে বিচূর্ণ; অরিষ্ট; ও ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়বীয় রোগ।—এই ঔষধে স্নায়বীয় শিরোবর্ধন, শিরোবেদনা, স্নায়বীয় বমন, নিগীরণ-কৃচ্ছ, গল-নলীর আক্ষেপিক সংবৃতি, হিকা, আশ্বান-মূল রজোবিলোপ, অপস্মার, গুল্মবায়ু, পক্ষাঘাত (সম্ভবতঃ গুল্মবায়ুজনিত), এবং অন্যান্য স্নায়বীয় রোগ আরোগ্য হইয়াছে। শিরোবর্ধন, গলনলীর আকুঞ্চন, বমন, গুল্মবায়ুর লক্ষণ ক্যাজুপট অয়েলের প্রধান পরীক্ষা-লক্ষণ। হিকা।—ডাঃ হেল একবার আক্ষেপিক হিকায় প্রথম দশমিক শক্তির ক্যাজুপট অয়েল পাঁচবিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হিকার শান্তি জন্মিয়াছিল। গল-রোধ।—একজন রোগীর প্রতিনিয়ত “গল-রোধ অল্পভব” লক্ষণ ইহার কয়েক মাত্রা সেবনে দূরীকৃত হইয়াছিল। আশ্বান।—ডাঃ মার্টিন বলেন যে টাইফয়েড জ্বরের উদরাগ্নানে এতদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। বাহ্য-প্রয়োগ।—ডাঃ মার্সী বলেন যে চিলব্রেন রোগে প্রাতে ও রাত্ৰিতে এই তৈল মর্দন করিলে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন যে রুগ্নস্থানে কয়েকবিন্দু মর্দনে এতদ্বারা শিরঃশীতা উপশমিত হয়; ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের দন্ত-গহবরে ইহা লাগাইলে দন্ত-বেদনার শান্তি জন্মে; এবং বাদামের তৈলের সহিত মিশাইয়া তুলায় করিয়া কানে দিলে বধিরতা আরোগ্য-হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—কোন বিষয় চিন্তা করিতে অসমর্থতা; ধীরে ধীরে ভাবোদয়; ধীরে ধীরে ও অতিশয় গর্ষিত ভাবে বিচরণের ইচ্ছা; একাকী “বিচরণের প্রবৃত্তি। মস্তক।—সমস্ত মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া পূর্ণতা ও জড়তা অল্পভব। সেই অল্পভবের ক্রমে ক্রমে

সরিয়া বাঁইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিতি ; অধিক পরিমাণ বিষার মদিরা পানে বেক্রপ  
 অল্পভূত হয় তদ্রূপ অল্পভব ও বিচরণ ; সোজা হইয়া হাঁটিতে পারা যায় বটে, কিন্তু দৃঢ়রূপে  
 পদবিক্ষেপ করিতে পারা যায় না । হাঁটিবার সময় শিরোধ্বর্ণন অল্পভব । বদন, নয়ন ও  
 কর্ণ ।—চক্ষের গোরব অল্পভব, কিন্তু নিদ্রানুতা অল্পভূত হয় না । চক্ষু অতিশয় প্রভাশ্রু  
 দৃষ্ট হয় ; উপরের অক্ষিপুট স্থূল ও ভারী অল্পভূত হয় । মধ্যমণ্ডলে বন্ধুরতা অল্পভব ; চক্ষের  
 চিম্টি কাটিলে কষ্ট অল্পভূত হয় না । বধিরতা । মুখ-মধ্য, গল-মধ্য ও আমাশয় ।  
 —মুখে ও গলনলীতে একপ্রকার শীতলতা অল্পভব । আমাশয় পর্য্যন্ত গলা-জালা । অত্যন্ত  
 কাসি ও গল-রোধ ; তৎপরে অধিক পরিমাণে লালশ্রাব । অবিরত নিদ্রাবন-প্রবৃত্তি ও কাসিয়া  
 অধিক পরিমাণ, চুস্বেছত, শুভ্র শ্লেষ্মা উত্তোলন । জিহবা দ্বারা যেন মুখ প্রপূরিত হইবে  
 এপ্রকার অল্পভব । গলনলীতে পক্ষাঘাতবৎ অল্পভব । গল-নলীর ক্ষীততা ও আকুঞ্চন  
 অল্পভব । ক্ষারাক্ত জল পানের ত্রায় মুখের আশ্রাদ ও গলনলীর অল্পভব । গলনলী যেন  
 রক্ত হইয়া গিয়াছে এবং গিলিবার স্থান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে এপ্রকার অল্পভব ।  
 উত্তম ক্ষুধা, বাঁহা তাঁহা খাইতে পারা যায়, কিন্তু খাইবার সময় প্রকৃতিস্থ বোধ হয় না ।  
 আহার যেন অজ্ঞাতসারে বন্ধবৎ নিষ্পন্ন হইতেছে এরূপ অল্পভব । ০ স্নায়বীয় বমন,  
 অথবা গুল্মবায়ুগ্রস্তদিগের বমন । ০ স্নায়বীয় নিগীর্ণ-কৃচ্ছ্র ; অথবা গল-নলীর আক্কেপিক  
 আকুঞ্চন । ০ আক্কেপিক হিকা । আসন হইতে উঠানে যেন বমন হইবে এরূপ অল্পভব ।  
 কিছু কামড়াইবার সময় দ্বিমূল দস্তে ও উহার চতুর্দিকে বেদনা । অস্ত্র ।—আত্মান শূল  
 বিশেষতঃ শীতলতা জনিত, অথবা চর্ম্ম বা শরীর-শাখার গাউট রোগ সম্ভূত কিম্বা অল্প কোন  
 প্রকার প্রবাহ বসিয়া গিয়া সমুৎপন্ন আত্মান-শূল । ০ সহসা ঘর্ষাবরোধ বশতঃ ওলাউঠার  
 ত্রায় অতিসার । সরলান্ন পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ অল্পভব । জননেন্দ্রিয় ।—অতিশয় সন্তোষ-  
 লিপ্সা সহকারে উপস্থের উদ্বেক । রেষাশ্রাব পরিশ্রুত অশ্লীল স্বপ্ন ।—০ শীতলতা বা  
 ঘর্ষাবরোধ বশতঃ স্বতুর বিরতি বা লাঘব এবং তৎসহকারে বেদনা । পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-  
 প্রত্যঙ্গ ।—বাঁহ তুলিতে চেষ্টা সত্ত্বেও যেন নীচে পড়িয়া যাইবে এপ্রকার অল্পভব । বাম  
 মণিবন্ধের অস্থিতে খঞ্জতা অল্পভব । বাহুদ্বয় বুলায়মান ভিজা কাষ্ঠের ত্রায় অল্পভব ।  
 বাহুদ্বয় এরূপ ভারী বোধ হয় যে সমগ্র জোঁর দিয়া উহাদিগকে তুলিতে হয় । বাহুদ্বয়  
 ছাড়িয়া দিলে যেন কম্পিত হইবে এরূপ অল্পভব । সমুখ দিকে মস্তক অবনত করিলে  
 দক্ষিণ নিতম্বদেশের মধ্যদিয়া স্থচীবোধবৎ বেদনা । উরুর বাহিরের পার্শ্বে এবং প্রকোষ্ঠ ও  
 হস্তের পৃষ্ঠভাগে স্পর্শ-জ্ঞানের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব । উরুর অভ্যন্তর দিকে ও হস্তের  
 তলভাগে চিম্টি কাটিলে অতিশয় অল্পভবাবিক্য । হাঁটিবার সময় জাহুর অতিশয় দুর্বলতা  
 অল্পভব । প্রায় সমস্ত রাত্রি জাহুর বেদনা । দেহ ।—সমস্ত শরীর একটু বৃহত্তর বোধ  
 হয় । ০ অপস্মার ; পক্ষাঘাত ; পুরাতন বাত , গুল্মবায়ু ; শোথ । ০ স্নায়বীয় শ্বাস-কষ্ট ।  
 আমাশয়ে উন্মাদ ; নাড়ীর ক্রততা ও ঘর্ষ । সর্ব্বশরীরের কম্পন । বায়বার জন্তুণ ও

অঙ্গমর্দ। যেন কোন কঠিন রোগের আক্রমণ হইতে বিমুক্তি জন্মিতেছে এরূপ অমুভব। সর্কশরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে একপ্রকার অবশতা অমুভব। গাত্রে হামের জ্বর পীড়ক। সর্দি লাগার জ্বর স্বর-ভঙ্গ। উভয় ফুসফুসের উদ্বীর্ণতার অভ্যন্তর দিয়া তীব্র বেদনা।

সমগুণ,—ককিউ, এনাক, ক্যাম্ফার, ভেলের, পলস।

## ওলিয়ম জেকরিস এসেলাই-কডলিভার অয়েল ।

কডলিভার অয়েলকে ওলিয়ম মরহইও বলে। গ্যাডস মরহয়া ও অজাঅ গ্যাডস জাতীয় মৎস্তের যকুৎ হইতে এই তৈল প্রস্তুত হয়। এই মৎস্ত আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে বিস্তর জন্মে। সম্পূর্ণ পরিষ্কার, পীতবর্ণ, গাঢ়, অবিকৃত এবং মৎস্তগন্ধ বিশিষ্ট তৈলই উৎকৃষ্ট। কপিশ ও কৃষ্ণবর্ণ তৈল বিকৃত, ও বিবমিষাজনক সূতরাং অব্যবহার্য। কডলিভার অয়েল বিমিশ্র পদার্থ। ডাঃ জর্জ বলেন যে ইহাতে গ্লিসিরিন; ওলিয়িক, ম্যাগেরিক, বিউট্টরিক ও এসিটিক এসিড; এবং আইওডিন, ব্রোমিন, ফসফরাস ও ফসফরিক এসিড আছে। ইহার দ্বিসহস্রভাগ তৈল একভাগ, অথবা একশত গ্রাণ তৈলে চারিশত ভাগের একভাগ আইওডিন আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে আইওডিনের মিশ্র পদার্থের মধ্যে কডলিভার অয়েল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কডলিভার অয়েল বিগুন্ধাকারে; বিচূর্ণাকারে; এবং অরিষ্টাকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। একড্রাম তৈল এক আউন্স উগ্র এলকোহলে মিশ্রিত করিয়া ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ও সেই অরিষ্ট হইতে ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ-শর্করা সহযোগে সাধারণ নিয়মানুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপোষণ-স্নায়ুগুণীর অভ্যন্তর দিয়া অঙ্গ-পথে, রক্তে ও স্বকে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—১। কডলিভার অয়েল সেবনে রক্তের উপাদানের উৎকর্ষ জন্মে; পাণ্ডুবর্ণ, হীনরক্ত রোগীদিগের এতৎসেবনে রক্তের আতিশয়া জন্মে। ২। শরীরের যেরূপ অবস্থায় দুর্বলতা সহকারে কোষ (সেল) বর্ধনের প্রবল্য থাকে এবং অসম্যক বিকশিত বিধ্বংশশীল কোষময় ক্ষরিত পদার্থ (একজু-ডেশন) উৎপন্ন হয়, তাহাতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ৩। গাণ্ডমালা ধাতুদোষে অর্থাৎ লসিকাগ্রন্থির বিবর্ধন-প্রবণতায়; উহাদের কোষময় উপাদানের বাহ্যল্যে এবং গণিরবৎ পদার্থ উৎপাদনে, দীর্ঘে দীর্ঘে মেদাপকর্ষ সাধনে; অথবা প্রভূত রস সহকারে সত্তর মেদের পরিবর্তনে, ও তজ্জন্ত পুং ও ব্রণশোধের সমুৎপত্তিতে এই ঔষধ উপযোগী। ৪। বায়ু-পথের স্নায়িক ঝিল্লির কোষাবিক্য বশতঃ সামান্য কারণে প্রতিজ্ঞায়ের উৎপত্তি; অন্তর তদ্বারা ফুসফুসের অগ্রভাগ আক্রমণ ও ক্ষয়রোগ উৎপাদনে কডলিভার অয়েল সুপ্রয়োজ্য। ৫। দুর্বলতা, লীর্ণতা, ও রক্তহীনতা বিমিশ্রিত

প্রায় সমস্ত রোগে ; ৬। সন্ধির পুরাতন প্রদাহ, অস্থি-ক্ষত, অস্থি-পুতি, ব্রণশোথ প্রভৃতিতে ; ৩ গণ্ডমালাজনিত অস্থিরোগে ; ৭। পাণ্ডুরতা, শীর্ণতা, রক্তহীনতা প্রভৃতি সংযুক্ত পরিপোষণ-দোষে, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে ; ৮। ভয়দেহ, বিকৃতভাবে ব্যক্তিদিগের পুরাতন বাতে ; এবং ৯। শীর্ণকায়, হীনরক্ত, ক্ষীণ দেহ-তাপ ব্যক্তিদিগের স্নায়ুশূল, গৃধ্রলী, কটিশূল প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগে কডলিভার অয়েল ব্যবহৃত হয়।

কডলিভার অয়েলে আইওডিন, ব্রোমিন, ফসফরাস, ফসফরিক এসিড, ও ক্যাল-কেরিয়া প্রভৃতি সৌরা-বিষ বিনাশক ঔষধ দ্রব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চক্রমের হায় অতি অল্প পরিমাণে দিগ্ভ্রমান আছে বলিয়া এই তৈল দ্বারা পূর্বোক্ত ঔষধ গুলির আরোগ্যা-ধিকারের অন্তর্গত কতকগুলি পুরাতন রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এলোপ্যাথেরা বলেন যে কডলিভার অয়েলে যে ঔষধ দ্রব্য আছে তাহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে কোন ক্রিয়া দর্শনা, কেবল তৈলাংশেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। একথা ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, নির্দিষ্টরূপে কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিলে রোগী পরিপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয় না। বাস্তবিক ক্রয় শরীর-বস্ত্র, তৈল ও কড-অয়েলের উপাদান স্বরূপ ঔষধ দ্রব্যগুলির প্রয়োগোপযোগী না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত সঙ্গমতানুসারে ঔষধ ব্যবহৃত না হইতে পারিলে এতদ্বারা রোগ আরোগ্য হয় না। রোগীর লক্ষণসমষ্টি কেবল আইওডিন জ্ঞাপক, অথবা আইওডিন ও কডলিভার অয়েলের অত্যন্ত উপাদান জ্ঞাপক হইলে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যায়। ১। কেবল ‘শীর্ণতা’ই কডলিভার অয়েল প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ নহে। তবে আইওডিন ও ফসফরাস সূচক শীর্ণতার হায় শীর্ণতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ বটে। ২। রক্তহীনতা (এনিমিয়া) অর্থাৎ রক্তের লোহিত কণার স্বল্পতা কডলিভার অয়েল প্রয়োগের অপূর্ণ একটা প্রধান লক্ষণ। শোণিত-ক্ষয় সম্ভূত ; হরিৎপাণ্ডুজনিত, শোথসংযুক্ত ; অথবা শীর্ণতা পরিশূন্য এনিমিয়ায় এতদ্বারা কোন উপকার দর্শনা। লিউকোসাইথিমিয়া অর্থাৎ রক্তের স্বেত-কণার আধিক্য ও লোহিতকণার ন্যূনতায় এই ঔষধে কোন উপকার জন্মে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব রক্তস্রাব, কর্কট রোগ, বৃক্কের রোগ, অথবা হরিৎপাণ্ডুজনিত এনিমিয়ায় কডলিভার অয়েল উপযোগী নহে। ৩। ( ১ ) উপযুক্ত পরিপোষণের অভাব ; ( ২ ) বৃক্করোগ, আমাশয় বা অগ্নির রোগ, বিশেষতঃ মধ্যাস্ত্রের রোগ প্রভৃতি কারণে আহার স্তম্ভ শোণিতে পরিবর্তিত হইবার প্রতিবন্ধকতা ; ৩ ( ৩ ) গণ্ডমালা, গুটীকা দি বশতঃ রক্তদুর্গতাজনিত এনিমিয়ায় কডলিভার অয়েল উপকারী। বহুদিন কডলিভার অয়েল সেবন করিলে রক্তের লোহিত কণা বিবর্তিত হয়। ( ৪ ) গণ্ডমালা ধাতুদোষ বশতঃ শারীরিক ক্রিয়া নিষ্পাদনী শক্তির ক্ষীণতা সহকারে যখন শরীরে কোষ বিবর্তনের প্রবণতা জন্মে, অথবা অসম্যক বিকসিত কোষ বিশিষ্ট ক্ষরিত পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, তখনও কডলিভার অয়েল ফলপ্রদ। এই কোষ ( সেল ) বিবর্তন হইতেই গণ্ডমালা ও গুটীকা রোগ

জন্মে । ডাঃ বার বলেন যে গণ্ডমালা রোগে যদি পরিপাক-শক্তির ক্ষীণতা, আহার ধারণে আমাশয়ের অপ্রবৃত্তি, এবং বার বার আতিসারিক মলশ্রাব ; অধিকন্তু পরিপোষণের ক্ষীণতা, শরীরের শীর্ণতা, ও শারীরিক রসের স্বল্পতা থাকে, তবে কডলিভার অয়েল সেবনে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে । ক্ষুধা ভাল; পরিপাক-শক্তি নিয়মিত, ও শরীর স্থূলত্ব প্রবণ থাকিলে এই তৈলে অপকার করে । ( ৫ ) বায়ু-পথের শৈল্পিক বিলম্বিত কোষবর্ধনের প্রাবল্য জন্মিলে সামান্য কারণে ঘন ঘন সর্দি লাগে, অনন্তর ফুসফুসে বহুসংখ্যক কোষ জন্মিয়া বক্ষারোগ উৎপন্ন হয় । বাহ্যিক লসিকাগ্রন্থি অপেক্ষা আভ্যন্তরিক লসিকাগ্রন্থির রোগেই কডলিভার অয়েল অধিকতর উপকারী । বক্ষারোগের পূর্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে রোগীর যদি দুর্বলতা, পাণ্ডুরতা, ও অল্প অল্প নীরস্ততা থাকে এবং অল্প কোন স্থানিক রোগ ব্যতীত সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ সর্দি লাগে তবে কডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যায় । কারণ, অতি মাত্রায় কডলিভার অয়েল সেবন সংসামান্য কারণে প্রতিশ্রায়-প্রবণতা জন্মে ।

### প্রধান প্রধান আমায়িক প্রয়োগ ।

পুরাতন প্রতিশ্রায় ।—নাসিকা, স্বরধ্বজ, বা বায়ুনলী অথবা অস্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্রায় রোগে কডলিভার অয়েল উপকারী । হিপার সলফার, হাইড্রাটস, কোপেভা ও অন্যান্য ঔষধ সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়াও রোগীর যখন শ্লেষ্মা নিঃসরণ নিবারণিত হয় না, অধিকন্তু রোগী হীনরক্ত ও ক্ষীণদেহ হইয়া পড়ে, তাহার সহজে সর্দি লাগে, এবং সে মনে করে যে কয়েকদিন পরে পরে এইরূপ সর্দি না লাগিলে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তখন কডলিভার অয়েল অমোঘ ।

পুরাতন বাত ।—দরিদ্রতা বশতঃ এক গৃহে বহুলোকের বাস, বায়ু ও আলোক সেবনের স্বল্পতা, ক্ষীণ বা গণ্ডমালাগ্রস্ত ধাতু, এবং কুল-দোষ নিবন্ধন বাতরোগ-সম্ভব ব্যক্তিদিগের পেশীর ও তন্তু পুরাতন বাতে কডলিভার অয়েল উপযোগী । ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন বাতেই কডলিভার অয়েল প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । এই প্রকার বাতের প্রারম্ভাবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ বেদনা, ক্রমশঃ সেই বেদনার পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ ও গ্রীবার পশ্চাত্তাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ জন্মে এবং দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুষ্কতা বা দৃঢ়তা উৎপাদিত হয় । ইহাতে কোন প্রকার প্রদাহ-লক্ষণ বিद्यমান থাকেনা, কিন্তু আরক্ততা পরিশুদ্ধ রসপূর্ণ ক্ষীণতা এবং অবশেষে পক্ষাঘাতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে । আর একপ্রকার তান্তব বাত আর্দ্র বা শীতল স্থানে বহুদিন বাস করিলে উৎপন্ন হয় । ইহা কেবল সন্ধিহলে নিবন্ধ থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে রোগীর শারীরিক বলের ও পরিপোষণ-শক্তির ক্ষীণতা জন্মায় । ডাঃ মুলার বলেন যে এই দুই প্রকার বাতেই কডলিভার অয়েল ফলপ্রসূ । সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধই অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে



রোগের লক্ষণ বিবর্তিত হয়। অধিক মাত্রায় কডলিভার অয়েল ব্যবহারেও সেইরূপ বাতের বেদনা প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে সম্ভব রোগ আরোঁগ্য হয়।

**গণ্ডমালা।**—গণ্ডমালা রোগে কডলিভার অয়েলের উপযোগীতা সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণ-গ্রন্থি, গল-গ্রন্থি, হৃদ-নিম্নগ্রন্থি, গ্রীবা-গ্রন্থি, কক্ষ-গ্রন্থি, বক্ষ-গ্রন্থির গণ্ডমালাজনিত বিবর্তনে এতদ্বারা কোন উপকার দর্শনা। তবে এই সকল গ্রন্থির ক্ষীততার সহিত অস্থি-ক্ষত বিত্তমান থাকিলে তাহা নীচ আরোগ্য হয়, কিন্তু গ্রন্থির ক্ষীততা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। অস্থি-ক্ষত ও গণ্ডমালা সম্বৃত অস্থি-প্রদাহ কডলিভার অয়েল সেবনে সুন্দর আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষীততা, কোমলতা, সমীপবর্তী কোমলাংশের ক্ষত, বাহু-ব্রণ, বিলেপীজ্ব ও নীর্ণতা সকলই দূরীকৃত হয়। রোগ যতই পুরাতন ও নিস্তেজ থাকে ততই কডলিভার অয়েলে অধিক উপকার দর্শে। এবং সর্বাঙ্গীন রোগ বিয়ুক্তির পূর্বেই সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ জন্মে। দীর্ঘাস্থির উপাশ্রয় বিবর্তনের ক্ষতেই এই তৈল অতিশয় উপকারী। কিন্তু এই সকল অস্থির স্তম্ভাকার বা চেষ্টা অংশের ক্ষতে ইহা তত ফলপ্রদ নহে। অস্থিপুতি (নিক্রোসিস) ও কশেরুকার ক্ষতেও এই ঔষধের উপকারিতা সুনিশ্চিত নহে। বক্ষ-সন্ধি-রোগও এতদ্বারা অনেকগুলি আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু স্নেহশ্রাবী ঝিল্লীতে রোগের কারণ বিত্তমান না থাকিয়া অস্থিতে রোগের কারণ থাকিলেই ই। সমধিক ফলপ্রদ। সন্ধির পীড়া অপেক্ষা উহার চারিদিকস্থ নাড়ীব্রণ ও ব্রণশোথে কডলিভার অয়েল অধিকতর উপযোগী। বক্ষ-সন্ধির বাত অপেক্ষা গুল্ফ-সন্ধির বাতেরই এতদ্বারা অধিক উপকার দর্শে। রেকাইটিস রোগেও ইহার আশ্চর্য্য আরোগ্যকর শক্তি দৃষ্ট হয়। অস্থির সম্যক বিকাশ, করেটির বিবর্তন, ব্রহ্মরন্ধ্রের অসংযোজন, বিলম্ব বা অকালে দস্তোংপত্তি, বক্রংবিবর্তন ও উদরের শোথ লক্ষণে ডাঃ ট্রু বালকদিগের রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলোপধায়ক দেখিতে পাইয়াছেন। কখন কখন চারি পাঁচ দিবস চিকিৎসার পরেই অঙ্গবেদনা স্থগিত এবং এক পক্ষ অতীত হইলে কোমল অস্থি অনেকটা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। যুবকদিগের অস্থি-কোমলতায়ও কডলিভার অয়েলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। অস্থির ক্ষতে ও কোমলতায়ই যে ইহা কেবল উপকারী এমন নহে, কিন্তু গ্রন্থির ক্ষতেও এই ঔষধ উপকারী। যদিও এতদ্বারা ক্ষীতগ্রন্থি আরোগ্য না হউক, কিন্তু গণ্ডমালাজনিত গ্রন্থির ব্রণশোথ ও ক্ষতে, অথবা অবদীর্ণ প্রাপ্ত নিস্তেজ ক্ষতে, কিসা চর্ম ও পেপীর নিম্ন পর্গাস্ত প্রসারিত ক্ষতে কডলিভার অয়েল নিশ্চয়ই আরোঁগ্য-প্রব ক। কোলড স্ট্রাসেদ অর্থাৎ অপচ্যমান নিস্তেজ ব্রণশোথে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক। সহজে রক্তশ্রাবী (ফস) পরদাসংযুক্ত পুষ বিশিষ্ট নালীঘায়ও ইহা ফলপ্রদ।

**মধ্যাস্ত্রক্ষয়।**—মধ্যাস্ত্রক্ষয় রোগ এই ঔষধে প্রায়ই উপশমিত এবং কখন কখন

আরোগ্য হয়। বৃহৎ ক্ষীত-উদর, বিবর্জিত-যক্ণ ও ক্ষীত মধ্যস্ত্র গ্রন্থিবিশিষ্ট পাণ্ডুর, বিকৃত ধাতু এবং অতি শীর্ণ বালকদিগের এই রোগে কডলিভার অয়েল পনের বিন্দু অনধিক মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন ও কিয়ৎপরিমাণে উদরে মর্দন করিলে আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু গ্রন্থিগুলি অতিশয় বিবর্জিত হইয়া পড়িলে ও গুটিকাগ্রস্ত হইলে এতদ্বারা উপকার দর্শনা।

**চর্মরোগ।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত বা বিকৃতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চর্মরোগে এই ঔষধে উপকার জন্মে। একজিমা, হার্পিজ, ইম্পিটাইগো ও গণ্ডমালাজনিত ক্ষত প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রদাহ-লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে উচ্চক্রমে ব্যবহার না করিলে অপকার দর্শে। লুপস্ রোগেও কডলিভার অয়েল ফলপ্রদ। ইকথিওসিস রোগে এতদ্বারা সম্বর উপকার হয়। ক্ষুদ্র মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও রুগ্ন স্থানে তৈল মর্দন করা বিহিত।

**যক্ষ্ম।**—যক্ষ্ম রোগে এলোপ্যাথি মতে কডলিভার অয়েলের বিস্তর অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া হোমিওপ্যাথেরা ইহার তত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই রোগের সহিত যখন ইহার উপাদানগুলির সমমতানুযায়ী সাদৃশ্য আছে, অপিচ এই তৈলের অতিশয় পরিপোষণ-শক্তি আছে তখন অপব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সুব্যবহৃত হইতে ক্ষতি কি? ডাঃ বার বলেন যে কডলিভার অয়েলে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় আইওডিন থাকতে যক্ষ্মারোগে এতদ্বারা উপকার দর্শে। এই তৈল সেবনে যে সকল রোগীর ক্ষুধা ও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে তাহাদের পক্ষে ইহা ব্যবস্থেয় নহে। তিনি প্রাতিঃকালে একড্রাম পরিমাণে কেবল এক এক মাত্রা ব্যবস্থা করিতে বিধি দেন। এবং এতৎসহকারে অল্প কোন ঔষধ দিতে নিবেদন করেন। ডাঃ হেল বলেন যে প্রতিদিন এক একটা বৃহৎমাত্রা অপেক্ষা তিনবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রয়োগ করা ভাল। ডাঃ মেহফার বলেন যে, গণ্ডমালা ও গুটিকা রোগে কডলিভার অয়েল অতিশয় উপযোগী। কিন্তু ইহার অপব্যবহারে বিস্তর রোগীর অপকার হয়। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীর শরীরের ক্ষীণতা, ত্বকের সূক্ষ্মতা ও শুষ্কতা, নাড়ীর দ্রুততা, স্নায়ুগুণের অতিশয় উত্তেজনশীলতা, এবং মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্য লক্ষণে কডলিভার অয়েল উপযোগী। গণ্ডমালাগ্রস্ত যে সকল রোগীর শরীর মেদাধিক, ক্ষীত, ও শ্লেষ্মা প্রধান; নালিকা ও উপরের গুঠ স্থল থাকে এবং যাহাদের হৃৎপিণ্ডের আকৃষ্ণনের মন্দতা, স্নায়ুগুণের উত্তেজনশীলতার অল্পতা, ও মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের নিম্নতা থাকে তাহাদের পক্ষে কডলিভার অয়েল উপযোগী নহে। এপ্রকার রোগীদিগের এই তৈল ব্যবহারে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

**স্নায়বীয় রোগ।**—ডাঃ এনষ্ট বলেন যে পুণাতন আক্কেপিক রোগে অর্থাৎ বেপথু, সামান্ত অপস্মার, পারদ-বিকল্প, ও তাণ্ডব রোগে রোগীর সর্বাঙ্গীন লক্ষণ কডলিভার অয়েল প্রয়োগের উপযোগী হইলে এই ঔষধ ফলপ্রদ। উন্মাদ, মস্তিষ্কের অবসন্নতা,

পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা, ও নাস্থূল প্রভৃতিতেও কডলিভার অয়েল জ্ঞাপক জীবনশক্তির কীণতার বিত্তমানতার এই তৈল উপকারী।

**অতিসার।**—ডাঃ হলকোম শ্লেষিক ঝিল্লীর ক্ষতজনিত একজন পুরাতন অতিসারের রোগীকে একড্রাম মাত্রার কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়া ছিলেন। ডাঃ হেল বলেন যে, প্রদাহপরিশূন্ত অতিসারে এই তৈল অব্যবস্থের নহে। তিনি অতিশয় শীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও পরিপোষণ-ক্রিয়ার স্বল্পতা বিশিষ্ট কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর পুরাতন অতিসারে, আর্সেনিক, নাইট্রিক এসিড, ও ফসফরাস ব্যবহারে কোন ফলপ্রাপ্ত না হইয়া কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। -

এলোপ্যাথেরা এই ঔষধ সাধারণতঃ দুইড্রাম হইতে চারিড্রাম মাত্রার দিবসে তিনবার ব্যবহা করিয়া থাকেন। কখন কখন ইহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মাত্রাও ব্যবস্থা করেন। এরূপ অধিক মাত্রার কডলিভার অয়েল প্রয়োগে অনেক সময় রোগ বিবর্দ্ধিত ও অত্যাশ্র উপসর্গ উপস্থিত হয়। কডলিভার অয়েল সেবনে রক্তের লোহিত কণা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অতিমাত্রায় এতদ্বারা এই লোহিত কণার অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বিবর্দ্ধন জন্মে ও ফুসফুসাদিতে রক্ত সঞ্চিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে কোন কোন জন্তুকে কেবল কডলিভার অয়েল সেবন করাইয়া রাখিলে কৃত্রিম ফুসফুস-প্রদাহ উৎপন্ন হয় + অপর, কডলিভার অয়েলের অপব্যবহারে রক্তকাস, প্রদাহ, জ্বর ও অত্যাশ্র অনেক অসুখকর লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগীর রোগ আরোগ্য বা আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত না হইয়া শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। যদি সদৃশ মতামুসারে কডলিভার অয়েল ব্যব্যবস্থের হয়, তবে প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে একড্রাম পরিমাণে দিনে তিনবারই সর্বোচ্চমাত্রা। রোগের সহিত এই ঔষধের উপাদানগুলির সৌসাদৃশ্য থাকিলে কোন কোন রোগীর পক্ষে অতি অল্প মাত্রায়ই এতদ্বারা সুফল দর্শে। এরূপ অবস্থায় কয়েক বিন্দু বিশুদ্ধ তৈল অথবা নিম্নক্রম ব্যবস্থের। ডাঃ নিডহার্ড নয় আউন্স এলকোহলের সহিত এক আউন্স তৈল সংযোগ করিয়া কডলিভার অয়েলের এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করেন এবং ইহাই বিন্দুমাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল কপিশবর্ণ তৈলের বিচূর্ণ শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ রূপ মনে করেন। কারণ, ভৈষজ্য-গুণ বিশিষ্ট উপাদানগুলি কপিশবর্ণ তৈলেই অধিক অবস্থিতি করে। শিশুদিগের শরীর-ক্ষয় রোগে তিনি ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিকক্রমে উত্তম ফল দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষেও পনর বিন্দুর অধিক ও প্রতিদিন তিন বারের অধিক এই তৈল ব্যবস্থের নহে। এইরূপ অল্পমাত্রায় ইহাতে আমাশয়ের উপদাহ জন্মে না। কিন্তু কোন কোন রোগীর আমাশয়ে আদত তৈল একেবারেই সহ হয় না, তাহাদের পক্ষে বিচূর্ণ বা ক্রম ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তাহাতে কোন উপকার না দর্শে, এবং কডলিভার অয়েল সেই রোগের প্রকৃত সদৃশ ঔষধ হয়, তবে উহা গাত্রে মর্দন করিলেও উপকার জন্মে। ডাঃ পলক ও ক্লেক সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পশুদিগের রোম ছেদন করিয়া,

গায়ে প্রতিদিন কডলিভার অয়েল মর্দন করিলে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জার শীঘ্র শীঘ্র শরীরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শিশুদিগের পক্ষে এই মর্দন প্রক্রিয়ায় বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে পাঁচ বৎসরের ছানবয়স্ক বালক দিগের শীর্ণতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ সেবনে এবং উদর ও আমাশয়ের উপর আদত তৈল মর্দনে ; এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের যোগে কেবল মর্দনে তিনি অনেকগুলি রোগী অ্যারোগ্য করিয়াছেন। ঔঁহার স্মরণ পড়ে যে তিনি প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক-দিগের দ্বারা চুরারোগ্য-বলিয়া পরিত্যক্ত কয়েকজন শিশুকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কয়েক মাস পর্য্যন্ত অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে কডলিভার অয়েল মর্দন করাইয়া সম্যকরূপে যোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তৈল সহ না হইলে অল্পমাত্রা বিয়ার বা পোর্টার মদিরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করার রীতি আছে। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রাপ্ত। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে লেবুর রস চুষিলে একড্রাম পরিমাণে তৈল সহ হয়। আহ্বারের পবেই সাধারণতঃ কডলিভার অয়েল প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ হেল বলেন যে আহ্বার করিতে বসিবার অব্যবহিত পূর্বে সেবন করিলে ক্ষুদ্র মাত্রায় ইহা ভাল সহ হইয়া থাকে। ঔঁহার মতে এই তৈল ব্যবহার কালীন যদি অল্প কোন লক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তৈল ব্যবহার রহিত না করিয়া অন্তর্বর্তী ঔষধ স্বরূপ সেই সেই লক্ষণোপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর, পৈত্তিক লেপারিত জিহ্বা, অথবা আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে কডলিভার অয়েল সেবন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রাদাহিক অতিসার না হইয়া অল্প প্রকার অতিসার থাকিলে ইহা অব্যবহেদ নহে। পক্ষান্তরে কোন কোন প্রকার উৎকট অতিসার এতদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন।—বিরক্তচিত্ততা। উত্তমপুরুষের কথা। প্রথম পুরুষে বলা। ক্ষিপ্ততার জ্ঞান অল্পভব।

মস্তক।—কপালে, ও মূর্দ্ধাদেশে অবিরাম ঘূহ বেদনা। ভ্রমি, সকল বস্তু-কক্ষবর্ণ দেখায়। পূর্বাঙ্কে বমন ও অবিরত বমনচেষ্টা সহকারে শিরঃপীড়া। বাম হইতে দক্ষিণ শঙ্খ পর্য্যন্ত অবিরাম বেদনা। ০ শুষ্ক প্রতিশ্রায় ও হাঁচি। ০ তরল প্রতিশ্রায়, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলে অবদরণ অল্পভব। ০ বিবিম্বা সহ পশ্চাৎ কপাল হইতে সম্মুখ কপাল পর্য্যন্ত বেদনা। ০ কাসাস্তে বিদারণকর শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মাথা কাটিয়া যাইবে। দক্ষিণ জ্বর অভ্যন্তরাত্মশে, বোধ হয় যেন অস্থিবেষ্টের মধ্যে, ০ অবিরাম বেদনা।

চক্ষু।—বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণ কালে অশ্রুশ্রাব, বাম চক্ষে উজ্জ্বর আধিক্য। চক্ষুর উপরে গুরুত্ব, চক্ষুর পাতা এত ভারী বোধ হয় যে ঊঁহা প্রায় ভুলিতে পারা যায় না ; অক্ষিপুটের ক্ষীণতা। শীতাবস্থায় চক্ষু মৃদিত-কল্পিবার প্রবৃত্তি সহকারে চক্ষুর সম্মুখ

কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকার দর্শন । ০ দক্ষিণ চক্ষু ব্যবহার কালীন উহাতে বেদনা ০ গণ্ডমালা-  
জনিত অভিস্রব ( অপথ্যালমিয়া ) ।

কর্ণ ।—০ কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ । ০ বায়ু কর্ণের বধিরতা, এবং দক্ষিণ  
কর্ণের ভ্রণ ।

নাসিকা ।—০ শুষ্ক প্রতিশ্রাব, কাস ও হাঁচি । ০ রক্তোবিলোপ সহকারে অবশীর্ষ  
অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । পুরাতন প্রতিশ্রাব এবং পুতিনস্ত ।

মুখমণ্ডল ।—আরক্ত মুখমণ্ডল ; মুখমণ্ডলে জ্বালা । হৃৎ ও উপরেয় ওষ্ঠে স্বল্প ও  
হৃৎ কেশোৎপত্তি ।

মুখ-মধ্য ।—পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা । মুখের শুষ্কতা অল্পভব ; অবিরত পিপাসা ।  
জিহ্বায় স্পর্শ-দ্রব্য ।

গল-মধ্য ।—গলার অভ্যন্তরে স্পর্শ-দ্রব্য । আহারাঙ্তে গল-গহ্বরের কণ্ডুয়ন, ও  
কাস । \* অতিশয় স্বর-ভঙ্গ ( পুরাতন ) । ০ সন্ধ্যাকালে অল্প অল্প স্বরভঙ্গ, পরদিন উহার  
বৃদ্ধি । ০ শয়ন-কালে গল-রোধ ও প্রচাপনবৎ অনুভব । ০ পুরাতন গলা-ব্যথা, পীতবর্ণ  
শ্লেষ্মা নিগীৰ্ণনে উহার উপশম ।

স্বাদ ও ক্ষুধা ।—ক্ষুধাহীনতা, হৃৎকের স্বাদ পাওয়া যায় না । পিপাসা সহকারে  
বিবিধা, এবং ক্ষুধাহীনতা । বমন ও তৎসহ তিক্ত ও অম্ল আশ্বাদ ।

আমাশয় ও উদর ।—আমাশয়ে অতিশয় বিবিধা । আমাশয়-গহ্বরে গুরুত্ব ও  
প্রচাপন । আমাশয় প্রদেশে উত্তাপ । আমাশয়ে প্রচাপিত ও আকর্ষিতবৎ বেদনা ।  
আমাশয়ে বেদনা সহকারে অম্লবমন, ও বিরচন । পীতভোগান্তে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন,  
তৎসহ তিক্ত ও অম্ল আশ্বাদ । যকৃৎপ্রদেশে স্পর্শ-দ্রব্য ও গুরুত্ব, প্রচাপনে বা পরিশ্রমে  
উহার বৃদ্ধি । প্লীহাপ্রদেশে আঘাতবৎ বেদনা, তৎসহ পার্শ্বে কুস্থনের স্থায় বেদনা ।  
প্লীহাপ্রদেশে উৎক্ষেপণ, বা আকর্ষণবৎ বেদনা, স্বাসক্রিয়া বা কাসিবার সময় উহার বৃদ্ধি ।  
নান্তি প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা । ০ মধ্যান্ত্র-ক্ষয়-রোগ ।

মল ও মলদ্বার ।—মলের অল্লাধিক আধিক্য । রাত্রিতে ও প্রত্যুষে অতিসার ।  
হস্ত পদের জ্বালা, কখন কখন পদের শীতলতা সহকারে কোষ্ঠ বদ্ধতা ।

মূত্রোৎস্র ।—ঈষৎ লোহিতমূত্র, ও রক্তবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট প্রভূত মূত্র ।  
বৃক্ক-প্রদেশে স্পর্শ-দ্রব্য । মূত্রমার্গ হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ ।

জনন-যন্ত্র ।—০ পৃষ্ঠের দুর্বলতা সহকারে জ্বরায়ু হইতে পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ ।  
০ ০ শক্তি লাগিয়া রক্তোরোধ । ০ অকাল বা প্রভূত রক্তঃ । ০ উভয় ডিম্বাশয়ে স্পর্শ-দ্রব্য ;  
রক্ত-মূল । প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুরুষের মূত্রমার্গ হইতে জ্বালা সহকারে শ্লেষ্মা-স্রাব ।

স্বাস-যন্ত্র ।—কৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দন সহকারে স্বাস-হৃৎতা । ক্রমাগত বর্দ্ধনশীল  
স্বাসকাস । দক্ষিণপার্শ্বে, স্কফাফ্রি উপরে ও নিম্নে, স্বাসরোধকর বেদনা । কাস ও

খাসহুহতা সহকারে বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা । হৃদ্ধাহির শিথরে বেদনা । বামপার্শ্বে কয়েক মিনিটস্থায়ী তীব্র হুচীবোধ । বক্ষঃস্থলে প্রচাপন ও উত্তাপ । দক্ষিণপার্শ্বে দীর্ঘনিঃশ্বাসগ্রহণকালীন, সারাদিনব্যাপী হুচীবোধ । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে, ও বক্ষঃস্থলের পেশীতে আমবাতিক বেদনা । হৃৎপিণ্ডের আকস্মিক হুচীবোধ । ব্যাকুলতাপূর্ণ হৃৎকম্প । \* কাস সহকারে বক্ষঃস্থলে ও আমাশয়ে স্পর্শ-দেব । প্রাতে কঠিন কাসের আবেশ সহ বক্ষঃস্থলের দুর্বলতা । বাম বক্ষে পৃষ্ঠপর্য্যন্ত সম্প্রসারিত অবদরণ অহুভব । শুষ্ক থকথক কাস । সারারাত্রি কাস, হৃৎকম্প । বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশের মধ্যভাগে কণ্ডু-রনকর কাস, তৎসহ হৃৎকম্প । পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । লবণাশ্বাদ, দুঃশ্ছেত, হরিভাত পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । প্রাতে দুঃশ্ছেত পাতলা শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । কঠিন কাস সহকারে গাঢ় শুভ্র শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । পার্শ্ব বেদনা সহ শুভ্র নিষ্টিবন, পার্শ্ব অভ্যন্তর দিকে অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি । রক্ত নিষ্টিবন । ০০ কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে বেদনা । ০০ দিবা-রাত্রি উল্গারসহ প্রবল কাস । ০০ কাস সহকারে বাম বক্ষের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্বালাকর উত্তাপ । ০ উভয় ফুসফুসের উর্দ্ধ খণ্ডের প্রদাহ । ০ ঈষৎ পীতবর্ণ নিষ্টিবন বিশিষ্ট তরল কাস । ০ বাহু উত্তোলনে হুচীবোধ সহ কাস । ০ বক্ষে ও পৃষ্ঠে দুর্বলতা ; বামদিকে অধিক । ০ রক্তকাস বা ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব । ০ স্বল্পঘরের মধ্যস্থলে অবিরাম বেদনা, ও কুকুর-রববৎ কাস সহকারে বক্ষঃস্থলের কেন্দ্রস্থানে স্পর্শ-দেব । \* বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্থানে স্থানে তীব্র হুচী-বেদবৎ বেদনা । \* বক্ষঃস্থলের কোন অংশে এক ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালাকর বেদনা । \* পৃষ্ঠের নিম্নদিয়া শীতের অবতরণ, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দেব ।

এঁবি ও পৃষ্ঠ ।—সর্কশরীরে, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ-দেব । ত্রিকদেশে দুর্বলতা ও অবিরাম হুহ বেদনা, প্রচাপনে উহার উপশম । পরিশ্রমাণ্ডে বৃক্ক-প্রদেশে স্পর্শ-দেব । ০ পৃষ্ঠ হইতে বক্ষঃপর্য্যন্ত স্পর্শ-দেব । পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে তীব্র, শুষ্ক, অবিরাম বেদনা । ০ পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, ও স্পর্শে স্পর্শ-দেব । ০ ত্রিকদেশে একপ্রকার ফরফর অহুভব, উহার ক্রমে ক্রমে মত্তক-পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্থান । উঠিবার সময় উদর ও বক্ষ আক্রমণ, তজ্জন্ত হাত পা নাড়িতে অসমর্থতা ।

জ্বর ।—উত্তাপাবেশ । সমগ্র শরীরে জ্বর ও উত্তাপ । অতিশয় জ্বতনাড়ী, ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন । অতি পিপাসা ; অবিরত পিপাসা । চারিদিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীত, তৎসহ অল্প বমন ও অতিসার । হৃৎপিণ্ডে রক্তের আবেগ সহকারে সর্কশরীরে কীট-চারণার জ্বা অহুভব । চারিবার প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যেকবার দুই ঘণ্টা পরে পরে উপস্থিত, দুই ঘণ্টা অবস্থিত, দ্ব্যহিক বিষমজ্বর ; পৃষ্ঠের নিম্নে ও উদরের চারিদিকে শীতের গতি । রাত্রিতে দুই ঘণ্টাব্যাপী জ্বর, তৎপরে প্রবল জ্বর ; প্রধানতঃ উর্দ্ধাঙ্গে । আরক্ত মুখমণ্ডল সহ উত্তাপাবেশ, আমাশয়ে উত্তাপ, পদাঙ্গুলীর প্রান্ত পর্য্যন্ত

জরের উত্তাপ ; আট দশ ঘণ্টা উহার অবস্থিতি । প্রতিরাত্রে, অথবা সর্কাদা ঘর্ম্ম । প্লীহার আধাতবৎ বেদনাসহ শীত ও বিলেপীজর । পূর্বাঙ্ক তিনটার সময় এক ঘটিকাহারী শীত, তৎপরে দাহ ; নাড়ীর স্পন্দন ১০০ হইতে ১২০ বার । যক্ষ্মার প্রলেপক জর । সন্ধ্যাকালে শীত, তৎপরে দাহ ও হ্রৎকম্প । শয়নকালে শীত, তৎপরে জর, বক্ষঃস্থলে প্রচাপন ও উত্তাপ । \* সন্ধ্যার প্রাক্কালে করতলের দাহ সংযুক্ত জর । ০ সারাদিন শীতল ঘর্ম্ম ।

**উদ্ধাঙ্গ** ।—প্রধানতঃ রাত্রিকালে করতলে জ্বালাকর উত্তাপ । হস্তের শুষ্কতা, ও চক্ষুপরি শুষ্কতা । ০ কফোণি ও জালুসন্ধিতে ক্রমাগত অবিরাম বেদনা ও স্পর্শ-দেহ ।

**নিম্নাঙ্গ** ।—শীতল পদ । পদে স্পর্শ-দেহ ; বাম উরুতে ব্রণশোথ । ০ বামপদে আমবাতিক বেদনা । জালুর শ্বেতবর্ণ ক্ষীততা ; গণ্ডমালা জনিত বজ্রকণ-রোগ ।

**নিদ্রা** ।—জর ও উত্তেজনা জনিত নিদ্রাশূন্যতা ও স্পষ্ট স্বপ্ন । স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্পনিদ্রালুতা, ও তৎসহ নৈশঘর্ম্ম । সর্কাদীন অবসন্নতা সহ রাত্রি তিনটার পরে নিদ্রা-হীনতা । ০ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে গৃহে দ্রব্যাদি দর্শন ।

**চর্ম্ম** ।—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে ফোটক । বাম উরুতে ব্রণশোথ । ত্বকের আর-ক্ষুভতা ; লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ ; অপচ্যমান ও ফোকার অনুরূপ উদ্ভেদ ; ক্ষত হইতে বিষুক্তভাবে শ্রাব নিঃসরণ ।

**দেহ** ।—সর্কাদীন আলস্য ও অবসন্নতা । অতিশয় দ্ব্যবীয় উপদাহ সংযুক্ত অশ্বচ্ছন্দতা । উত্তপ্ত বায়ু-অসহতা ।

**বিশেষ লক্ষণ** ।—পৃষ্ঠের নিম্নে ও উদরের চারিদিকে শীতের গতি এবং স্বরভঙ্গ ও বৃক্ বেদনা । সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে, এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে বেদনার গতি । পরিশ্রমের পর উভয় পার্শ্বে, প্রধানতঃ বাম পার্শ্বে, অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠপর্য্যন্ত, বেদনার বৃদ্ধি । দক্ষিণ হইতে বামদিকে, তথা হইতে অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠপর্য্যন্ত বেদনার গতি । শয়নকালে, হস্ত করিলে, অথবা বায়ুপ্রবাহে কাসের বৃদ্ধি । প্রাতঃকালে উপচয় । লীর্ণতা । সমগ্র শরীরের আলস্য । গলকণ্ঠ্যনকর খক্ খক্ কাস, বিশেষতঃ রাত্রিতে, কাসের শুষ্কতা বা আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । \* বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্থানে স্থানে স্থচী-বেধনবৎ বেদনা । বক্ষঃস্থলের স্থান বিশেষে জ্বালাকর বেদনা । ক্ষুধাপরিশূন্যতা । প্রাতে সূত্রমার্গ হইতে জ্বালা সহকারে শ্লেষ্মা-নিঃসরণ । হস্তঘর্ষের শুষ্কতা । \* করতল-জ্বালা সহকারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জর ।

**সমগুণ** ।—আর্স, রোম, ক্যাক্স, সিট্রিস, আইওড, ফস, স্পঞ্জ, সলফ ।

## ওলিয়ম রিসিনি— ক্যাষ্টর অয়েল— এরও তৈল ।

এরওবীজ নিস্পীড়ন পূর্বক যে তৈল বাহির করা যায় তাহাকে ক্যাষ্টর অয়েল বলে । ক্যাষ্টর অয়েল বিরেচক । বিরেচনার্থে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সতত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন । তাঁহারা বালকের পক্ষে এক হইতে চারি ড্রাম ; এবং পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ হইতে এক আউন্স মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন । অধিক মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করিলে অস্ত্রের আচ্ছাদনঝিল্লী উপদাহিত হইয়া বিবমিষা, পেটকামড়ানি, পাতলা পুরীষময় বা লেহবৎ বিরেচন জন্মে । তৎপরেও ইহা প্রয়োগ করিতে থাকিলে (বিশেষতঃ বালকদিগের) আমরক্তময় মল ও কুহন সংযুক্ত রক্তাতিসার (ডিসেণ্ট্রি) উৎপন্ন হয় । এলোপ্যাথিকমতে ক্যাষ্টর অয়েলের অপব্যবহারে লক্ষণানুসারে ট্রাইওনিয়া ও নক্তভমিকা এই দুইটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে । হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে ওলিয়ম রিসিনি কেবল আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে । সদৃশমতে ব্যবহারার্থে ক্যাষ্টর অয়েলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

**আময়িক প্রয়োগ ।**—রক্তাতিসার ।—অনেকানেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় বারংবার ক্ষুদ্র মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করিয়া যে এই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন, অতিমাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল অস্ত্রের উপদাহ জন্মায় বলিয়াই হোমিওপ্যাথিক নিয়মে এতদ্বারা রক্তাতিসার আরোগ্য হয় । কোন কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও মৃদু প্রকৃতির রক্তাতিসারে অথবা আমশ্রাবী তরুণ অন্ত্র-প্রদাহে, দশ হইতে পনের বিন্দু মাত্রায় কয়েক ঘণ্টা পরে পরে এই তৈল ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । **অতিসার ।**—বালকদিগের অতিসারে পুরীষময়, বা লেহবৎ, অথবা আম ও রক্তময় মল, কিম্বা এই সকল প্রকার মলের সংমিশ্রণ ; জ্বর, পিপাসা ও অধিক বেদনার অভাব ; কেবল অল্প অল্প পেটকামড়ানি ও কুহন ;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে ডাঃ হেল একভাগ ক্যাষ্টর অয়েল নয়ভাগ গুগার-অব-মিক্সের সহিত মর্দিন পূর্বক প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া দশ গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারে সুন্দর ফল প্রাপ্ত হন ।

**প্রধান প্রধান লক্ষণ ।**—\* বালক বা বয়স্কদিগের গীতবর্ণ, অর্দ্ধ তরল, লেহবৎ, বিশেষ একপ্রকার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অল্প অল্প পেট কামড়ানি সংযুক্ত অতিসার । \* বারংবার মল-প্রবৃত্তি ও বিফল মল বেগ, অথবা অল্প অল্প আম ও রক্ত সহকারে কঠিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গোলাকার মল নিঃসরণ (রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থা) । ০ বালকদিগের গ্রীষ্ম কালীয় অতিসার । ০ অজীর্ণ দস্তোদ্যম, অথবা সর্দি বশতঃ অতিসার ০ দুর্দ্দম্য পুরাতন অতিসার ।



## ওলিয়ম স্ট্রাণ্টেলম – স্ট্রাণ্ডেলউড অয়েল – চন্দনের তৈল ।

চন্দন বৃক্ষ ভারতবর্ষ, সিংহল, ও চীনদেশে জন্মে । খেত, রক্ত, পীত ভেদে চন্দনকাষ্ঠ তিন প্রকার । শ্রীখণ্ড বা খেতচন্দন কাষ্ঠ হইতেই সাধারণতঃ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই তৈলকে এতদ্দেশে চুয়া বলে । চন্দন কাষ্ঠের সারভাগ ও মূল চোয়াইয়া ইহা নিঃসারিত করে । প্রাচ্য চিকিৎসকেরা গ্লেয়িক কিল্লীর, বিশেষতঃ দ্বাস-বন্ত্র ও মূত্র-বন্ত্রের গ্লেয়িক কিল্লীর রোগে ইহা অতিশয় উপকারী মনে করেন । প্রমেহ রোগে গাভীতুণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া চন্দনের তৈলের ব্যবহার আছে । এলোপ্যাথেরাও দারুচিনির তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১৫।২০ বিন্দু মাত্রায় প্রমেহ রোগে এই তৈল ব্যবস্থা করেন । হোমিওপ্যাথিমতে চন্দনের তৈল পরীক্ষিত হয় নাই । কিন্তু ডাঃ হেল ইহার চিচূর্ণ বা দ্রবরূপ (ডাইলিউশন) প্রস্তুত করিয়া প্রমেহ রোগে বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন । তিনি বলেন যে চন্দনের তৈল প্রমেহ রোগে প্রায় অমোঘ, এবং অনেক সময় কোপেবা, কিউবেব, ইরিজারন, টর্পেটাইন প্রভৃতি ইহার সমগুণ ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ডাঃ হেল বেদনাশূন্য, গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ, অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হ্রাস লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন । জেলসিমিনম, ক্যাছেরিস, বা ক্যানাবিস ব্যবহারে প্রদাহ, বেদনা, ও জ্বালা হ্রাস পড়িলে তিনি ইহার ব্যবস্থা করেন । তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে জেলসিমিনমও ক্যানাবিস সেবনে প্রদাহের তরুণতার হ্রাস পড়িলে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে । অল্পকোন উপসর্গ না থাকিলে সাধারণতঃ এতদ্বারা নয় দশ দিবসে প্রমেহ রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । তিনি ইহার প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ দশ গ্রেণ মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । মূত্রে শুদ্ধবর্ণ অধঃক্ষেপ লক্ষণাপন্ন মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ইহা উপকারী মনে করেন । এলোপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের একজন আধুনিক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে অধিক মাত্রায় চন্দনের তৈল সেবনে গুরুতর বৃক্ক-রোগের আত্মযজ্ঞিক তীব্র কটি-বেদনার স্থায় কটি ও পৃষ্ঠবেদনা জন্মে । ডাঃ হেল এই আভাসের উপর নির্ভর করিয়া বৃক্কের অনির্দিষ্ট রোগগ্রস্ত কয়েক জন রোগীকে, অত্যাশ্রু ঔষধে বিশেষ ফল না দর্শাতে ওলিয়ম স্ট্রাণ্টেলম ২৫ বিচূর্ণ সেবন করিতে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের কটি বেদনা লক্ষণ তিরে হিত হইয়াছিল । তিনি আশা করেন যে প্লেগ্মাশাবী পুরাতন কাসে, শ্বসন ও বায়ুনলীর প্রতিষ্ঠায়, এবং সম্ভবতঃ জরায়ুর ও যোনির কোন কোন প্রকার শ্রাব নিঃসরণে এতদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে । ডাঃ হানসেন তাঁহার গ্রন্থে চন্দনের তৈলের নিম্নলিখিত বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন । যথাঃ—তরুণ প্রমেহ, জ্বালাকর ও টাটানিয়া (টাটানে) বেদনা, ঘন ঘন মূত্র-প্রবৃত্তি, মূত্র পথের-মুখের ক্ষীণতা ও আরক্ততা, বেদনাবিশিষ্ট লিম্বোপদগম, মুণ্ডাবরক-ত্বকের জলে ক্ষীণত্ব ও ক্ষীণতা । গাঢ়, জ্বলন্ত পীতবর্ণ অথবা ধূস্রা পুষ্পময় শ্রাব । মূলাধারের গভীর স্থানে বেদনা, মূত্রের ধারা ক্ষুদ্র ও

থাকিয়া থাকিয়া নিঃসারিত, মৃত্যুমার্গের প্রতিকূলে যেন একটা গোলা প্রচাপিত হইতেছে এ প্রকার অসুস্থত্ব, নড়িলে চড়িলে বেদনার হ্রাস, খানিকক্ষণ ঠাণ্ডাইয়া থাকিলে বৃদ্ধি। লিঙ্গোদ্ধার কণ।

## ককস ক্যাক্টাই—কোচিলিন।

হেমিণ্টারা জাতীয় কোচিলিন আমেরিকাজাত এক প্রকার কীট। ঔষধার্থে শুষ্ক কীট হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুলের অভ্যন্তর দিয়া বৃক্ক, পরিণাক পথ ও শ্বাস-পথে ককসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। সেই ক্রিয়ায় আক্রান্ত স্থানের উপদাহ, প্রদাহ এবং রক্তবৎ শ্লেষ্মার অতিশয় নিঃস্রব জন্মে। গল-গহ্বর ও স্বরবন্ধই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

অধিকার।—স্বরবন্ধ প্রদাহ, বায়ুনলী-ভূজের প্রতিশ্রায় এবং হৃৎশব্দ-কাসেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ রক্তবৎ, দুঃশ্চত, কষ্টে নিঃসার্য, শ্বাস-রোধকর, অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিঃস্রব ইহার লক্ষণ। সমধিক স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মা-সঞ্চয় লক্ষণাপন্ন স্বরবন্ধের পুরাতন প্রতিশ্রায়। মস্তকের প্রতিশ্রায়। এবং অধিক কাসিয়া কাসিয়া গাঢ় আঠা আঠা শ্লেষ্মা তোলা, তজ্জাত বমন চেষ্টা ও বমন লক্ষণাপন্ন গল-কোষ-প্রদাহ।—এই সকল রোগেও ককস ক্যাক্টাই প্রযুক্ত। বৃক্ক-শূলে, বেদনার বৃক্ক হইতে মূত্রাশয়ে প্রসারণ; রক্ত-মূত্র; মূত্রে অধিক পরিমাণে ইউরিক এসিড ও ইউরেটের সঞ্চয়; লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

## প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

হৃৎশব্দ-কাস।—প্রাতঃকালে উপচয় লক্ষণাপন্ন হৃৎশব্দ-কাসে ডাঃ ক্যারিংটন এই ঔষধের অতিশয় উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বালক নিজে হইতে জাগ্রৎ হইবামাত্র কাসের আবেশ উপস্থিত হইয়া বমনে পরিসমাপ্ত হইলে এবং মুখ হইতে পরিষ্কার রক্তবৎ শ্লেষ্মা নীর্ঘদড়ীর স্রাব বুলিয়া থাকিলে ককস ক্যাক্টাই সুব্যবহৃত। “মুখ হইতে দড়ীর স্রাব শ্লেষ্মা বুলিয়া থাকা” এই ঔষধের একটি নিশ্চিত লক্ষণ। এই লক্ষণটি বিজ্ঞান থাকিলে রোগের প্রারম্ভে ইহার ব্যবহার করিলে হৃৎশব্দ-কাস আর বর্ধিত হয় না এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ জোসেট বলেন যে সন্ধ্যানে বার বার পরিষ্কার মূত্রস্রাব হৃৎশব্দ-কাসে ককসের লক্ষণ। হৃৎশব্দ-কাসের প্রবর্তিত অবস্থায় ফুস-ফুসের শিথর-দেশে বেদনা ও পুরোক্ত রক্তবৎ শ্লেষ্মা নিঃস্রব লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ। গিলিয়েস্‌হাল লেখেন যে হৃৎশব্দ-কাসের পরবর্তী অধিক দিন স্থায়ী বায়ু-নলীর প্রতিশ্রায়েও

ইহা উপযোগী। যক্ষ্মা।—ফ্যারিংটন বলেন যে রক্তবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও কঠাঙ্কির নীচে স্নতীত্র স্নতী-বেধবৎ বেদনা লক্ষণাপন্ন প্রাতিশ্রাস্তিক যক্ষ্মায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ—মূত্র-রেণু সংশ্লিষ্ট পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহে অল্পধাতু; মূত্র-পাত্রে সংলগ্ন ইষ্টকচূর্ণের ভ্রায় অধঃপতিত পদার্থ; আঠা আঠা, অণ্ডলালবৎ, অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মাশ্রাবী কাস, বায়ুনলীর দিশাখা-স্থল কণ্ডুয়িত হইয়া কাসের উদ্রেক, এবং প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ সত্ত্বেও বক্ষঃস্থলে যেন একটা শ্লেষ্মার গোঁজ নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতেছে এ প্রকার অসুভব, আয়াসিত শ্বাস, শ্বাস-রুদ্ধ ও বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে যাতনা, প্রাতে নিদ্রাহইতে জাগরণসময়ে কাসের বৃদ্ধি, পরিষ্কার, ওষু, বুকুররবৎ কাস, অনন্তর অল্প পরিমাণ গাঢ় আঠাআঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অথবা কাসের প্রাবল্যবশতঃ বমন, ও এই ঔষধের প্রকৃতিগত নিঃসরণ লক্ষণে ইহা ব্যবস্থ্য। কাস।—গলার খরস্পর্শতা, কাস, ও হাঁচি; থকথক করিয়া কাসিবার সময় গলায় জ্বালা; গাঢ়, আঠাআঠা, অণ্ডলালবৎ অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইয়া প্রত্যেকবার কাসের আবেশের পরিসমাপ্তি; গোলাকার, মটরের ভায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ; কঠনালীর অভ্যন্তর দিয়া যেন শ্লেষ্মা উঠিতেছে ও নামিতেছে এ প্রকার অসুভব ও তজ্জন্ত গল-কণ্ডুয়ন ও কাসের উদ্রেক; উষ্ণগৃহে উপচয়, খোলা বাতাসে উপশম; আহারান্তে আধিক্য;—এই সকল লক্ষণে কাস-রোগে বকস ক্যাঙ্কাই ব্যবহার্য। জরায়ুর রক্তশ্রাব।—\* কেবল সন্ধ্যাকালে শয়িতাবস্থায় জরায়ু হইতে অধিক রক্তশ্রাব, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে কখনও রক্ত পতিত না হওয়া; উদরের নিম্নাংশে প্রথমে দক্ষিণভাগে, পরে বামভাগে তীব্রবেদনা, যোনি-পথে বড় বড় কাল রক্তখণ্ড নিঃসরণ; মূত্র-বেগ, কিন্তু এই প্রকার একটা রক্তখণ্ড নির্গত না হইয়া গেলে মূত্রত্যাগ করিতে অসামর্থ্য; উদরে আকৃঙ্কন, অশিখিলতা, এবং কিছু যেন আমাশয়ের দিকে উঠিতেছে, তজ্জন্ত জলবমন করিতে হইবে এ প্রকার অসুভব; এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। ব্রাইটস্ ডিজিজ্।—সহসা ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় এবং প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃস্রব ও আক্কেপিক শ্বাস-রোধক কাস বকস ক্যাঙ্কাইয়ের লক্ষণ। বৃকক-প্রদাহ।—অতি প্রভূত মূত্র নিঃসরণ ও মূত্রমার্গে অপ্রথর বেদনা সহকারে বৃকক-শুলের আক্রমণ; বাম বৃকক প্রদেশ হইতে মূত্রবহা-নালীদ্বয়ের অভ্যন্তর দিয়া মূত্রাশয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত আকস্মিক, স্নতীত্র, অনেকক্ষণ স্থায়ী, ছুরিকাঘাতের ভায় যাতনা, নিদ্রা ও বজ্রগস্থানে ঘুটবৎ বেদনা; বৃককে আক্কেপিক বেদনা, তৎসহকারে মূত্রাশয়ের আবেগ ও বারম্বার প্রগাঢ় বর্ণের মূত্রশ্রাব; রক্ত-মূত্র; মূত্রে ইষ্টক চূর্ণের ভায় আধার-পাত্রে সংলগ্ন অধঃপতিত পদার্থ; মূত্রে স্নত্র, সর, ও স্থস্তির আকারে শ্লেষ্মার অবস্থিতি, এবং স্থস্তিতে (তলানি) বিজ্জড়িত অধিক শ্লেষ্মার বিহমানতা এই ঔষধের লক্ষণ। ডিম্বাশয়ের রোগ।—প্রদর-শ্রাবের পূর্বে ডিম্বাশয়, মূত্রাশয়, ও যণিপুত্র প্রদেশে খোঁচামারা বা আকর্ষণের ভায় বেদনা ইহার লক্ষণ। ভগার্ভবুদ।—ভগে এতী তীব্রবেদনা যে তজ্জন্ত শয্যা বাইরা

বসিয়া থাকিতে হয় এবং বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা যাইতে হয় ; অর্কুদে দগদগ ও জালা, এবং হাঁটলে অবদরণ অমুভব ; ককস ক্যাঙ্কাইয়ের ব্যবহার-লক্ষণ

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—আশঙ্কানীলতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা ।

মস্তক ।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা ; ঘূর্ণন । মস্তকে রক্তের প্রধাবন ( বেল, ফির ) । মুহু প্রচাপনী বেদনা ; সম্মুখপ্রদেশে ও শঙ্খদ্বয়ে দগদগ, প্রচাপন, অথবা বেধনবৎ বেদনা ।

চক্ষু ।—চক্ষু-কোটির প্রচাপনী বেদনা । শুক্রমণ্ডলের প্রদাহ ; বিবর্জিত অশ্রুশ্রাব ।

কর্ণ ।—কর্ণের মধ্যে ও নিকটে আকর্ষণ, ছেদন, ও শূটী-বেধনবৎ বেদনা । কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধবৎ অমুভব ( ন্যাস, সিলি, ) । কর্ণে তুড়তুড়ি ও কণ্ডুয়ন ( ব্যারা, হিপ, মার্ক ) । গিলিবার সময় কর্ণে চড়চড় শব্দ । কর্ণে ঝড়ের শ্রায় গর্জন-ধ্বনি ।

নাসিকা ।—পুনঃ পুনঃ প্রবল হাঁচি । নাসিকায় অত্যন্ত শ্লেষ্মা-নিঃস্রব । নাসিকায় শুষ্কতা । নাসা-প্রান্তে গীতবর্ণ চিপিটিকা ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলে কীট হাঁটার শ্রায় অমুভব ।

মুখ-মধ্য ।—দন্তে আকর্ষণ ও উৎক্ষেপণবৎ বেদনা ; শীতল দ্রব্যে দন্তের অমুভবা-ধিক্য ( এণ্ট-ফ্রুড, \* ক্যাক, ষ্টাক, সল, ) । অতিশয় পিপাসা সহকারে মুখ ও জিহ্বার পরিশুকতা ( \* আর্স, \* ব্রাই ) । মুখে ও গলায় জালা ( \* আর্স, \* ক্যাক, ক্যাঙ্কা ) । মুখ ও গলার অবদরণ । মুখ-বিবর ও গল-গহবরের এত অমুভবাধিক্য যে মুখ ধুইতে কাস ও বমনের উদ্রেক হয় এবং গাঢ় শ্লেষ্মাশিশি বমন হইয়া পড়ে । \* তালুকার তোরণের অতিশয় উপদাহিতা ; উচ্চস্বরে কথা বলিলে অথবা দাঁত মাজিলে কাস ও বমন জন্মে । \* মুখে, জলসঞ্চয় সহকারে, ধাতব আশ্বাদ । মুখে \* ধাতব ( ইস, কফ, মার্ক, সল ) ; তিক্ত ( \* ব্রাই \* সিদ্ধ, \* নক্স, \* পল, \* সল ) ; \* জীষৎ মিষ্ট \* আর্স, ব্রাই, \* মার্ক-সল ) ; অম্ল ; স্বাদ ।

গল-মধ্য ।—গল-মধ্যে ও গল-গহবরে শুষ্কতা ও জালা । \* শ্লেষ্মা নিষ্টিবন সহকারে গলার অবদরণ । গলায় সর্বদা তুড়তুড়ি । \* অলি-জিহ্বা যেন দীর্ঘ হইয়াছে এরূপ অমুভব, এবং তজ্জন্ত অনবরত কাসের উদ্রেক । উষ্ণতায়, বিশেষতঃ শয্যায় গল-লক্ষণের উপচয় । গিলিতে কষ্ট ।

আমাশয় ।—অতিশয় ক্ষুধা ; \* অধিক পিপাসা । উদগার ; বুক-জালা । বিবমিষা-বমন-চেষ্টা ; বমন-প্রবৃত্তি আমাশয়ের প্রসারণ । আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ ; ভেদনবৎ বেদনা । উদরোদ্ধেদে স্পর্শ-দ্বেষ ।

উদর ।—\* বাম কুক্ষিতে, আবদ্ধ আত্মানের শ্রায় বেদনা ; পৃষ্ঠের বামদিকে ও কটির কশেকায় সেই বেদনার সম্প্রসারণ । \* প্লীহা-প্রদেশে জ্বালাকর আকর্ষণ । অতিশয়, অস্ত্র-কুজন সহকারে উদরের আত্মানিক প্রসারণ । পেট-কামড়াই, তৎপরে অতিসার ।

মল।—মল-বেগ; কখন কখনবা উহার বিফলতা। প্রভূত, কোমল বা লেহবৎ মল।

মূত্র-যন্ত্র।—বৃকক-প্রদেশে অতীব্র, চাপক বেদনা ও স্পর্শ-ষেব। মূত্রাশয়ে চাপ। প্রস্রাব কালে মূত্রমার্গে জ্বালাকর বেদনা ( ক্যান-গ্রাট, ক্যাঙ্ক, ঠাক )। মূত্র-মার্গে হুচী-বেধ ও কণ্ডূয়ন। \* পুনঃ পুনঃ অতিশয় মূত্র-বেগ। বার বার অধিক মূত্র-ত্যাগ, মূত্র জলের ত্রায় পরিষ্কার ( ফস-এসি ) ; কিন্তু শীঘ্রই উহা আবিল ও সরাবৃত হইয়া উঠে। মূত্রে ইষ্টক-চূর্ণের ত্রায় অধঃপতিত পদার্থ ( আর্গ, \* লাই, গ্রাট-মিউ, ফস )।

জনন-যন্ত্র।—( পুং )—বিবর্ধিত লিম্ফা সহকারে পুনঃ পুনঃ উপস্থের উদ্বেক। কায়কতার ভাব; স্বপ্ন-দোষ ( সিক, ফস-এসি, ঠাক )। ( স্ত্রী )।—বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের ক্ষীততা ও উত্তাপ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ ও অধিক দিন স্থায়ী রজ-প্রাব ( ক্যাঙ্ক-কা, নক্স-ভ )।

শ্বাস-যন্ত্র।—\* বায়ু-পথে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় ( \* এণ্ট-টার্ট, \* ইপি, শ্বাস, ঠান )। \* বায়ু-পথে অবদরণ, তজ্জন্ত কাসের উদ্বেক। \* আকরোটের মত বড় একখানি ক্রটির খণ্ড যেন স্বরযন্ত্রের পশ্চাত্তাগে লাগিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অম্লভব, তজ্জন্ত সর্কদা ঢোক গিলিতে হয়। \* স্বরযন্ত্রে অতিশয় প্রবল তুড়তুড়ি, তজ্জন্ত রাত্রিতে জাগিতে হয়, কাস জন্মে, ও অতিশয় দুঃস্থ শ্লেষ্মা নিঃস্রবিত হয়। \* আস্তে আস্তে কথা বলিলেও স্বরযন্ত্রের শ্রান্তি ( আর্জ-নাই, এরম, ফস ) ; স্বরের কৰ্কশতা ও ভয়তার উৎপত্তি, এবং শ্বাসের কতকটা আয়াসিততা। গলকণ্ডূয়ন পূর্বক কাসের আবেশ, শ্লেষ্মা নিঃস্রবন সহকারে উহার পরিসমাণ্ডি। \* দাঁত মাজিলে বা মুখ ধুইলে কাসের উদ্বেক। \* আঠা আঠা, সাণ্ডলাল, অধিক-পরিমাণ, শ্লেষ্মা নিঃস্রবন বিশিষ্ট কাস ( \* ঠান )। \* কাসের অল্পকালস্থায়ী আবেশ, তৎপরে সহজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার, শ্লেষ্মা-খণ্ড নিঃস্রবণ। \* শ্বাস-কষ্ট। বক্ষঃস্থলের ভার ও স্পর্শ-ষেব। বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে হুচী-বেধন ও শঙ্গ-ভেদনবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদয়-প্রদেশে প্রচাপনী বেদনা। \* আহায়াস্তে উৎকর্ষ সহ হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত বেগ ও স্পন্দন। নাড়ীর বিবর্ধিত বেগ।

পৃষ্ঠ।—স্বল্পবয়সের মধ্যস্থানে হুচী-বেধবৎ যাতনা। কটিতে ও বৃকক-প্রদেশে ঘূষ্টবৎ বেদনা। বৃকক-প্রদেশে প্রবল প্রচাপনী বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা ( \* রসটক্স, পলস )।

দেহ।—অতিশয় শ্রান্তি ও অবসন্নতা। চর্মে কণ্ডূয়ন ও কটক-বেধবৎ অম্লভব।

নিদ্রা।—নিদ্রার হ্রস্ববার ইচ্ছা। অস্বচ্ছন্দ, অস্থির নিদ্রা, অস্পষ্ট স্বপ্নদ্বারা উহার ব্যাঘাত।

জ্বর।—সর্বশরীরে, বিশেষতঃ অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে, ক্ষীত। শরীরের উষ্ণতার বৃদ্ধি। অম্লগ্র উত্তাপেও অতিশয় অতিভূততা। প্রচুর সর্কাদীন ঘর্ম, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

**উপচয় ।**—প্রাতে ও সন্ধ্যানে উপচয় ।

**উপশম ।**—সন্ধ্যার প্রাকালে ও উষ্ণতায় উপশম ।

**সমগুণ ।**—ক্যাছ, আইও, কালী-বাই, কালী-আইও

## কণ্ডুরাঙ্গো ।

এই গুণ্য দক্ষিণ আমেরিকার জন্মে । তথায় ইহাকে কণ্ডুর প্লাণ্ট বলে । ঔষধার্থে ইহার বন্ধলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

\* ওষ্ঠের দক্ষিণ কোণে-বেদনা বিশিষ্ট বিদারণ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ ।

**আময়িক প্রয়োগ ।**—কক্কট রোগে ( ক্যানসার ) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । কঠিন কক্কটে ( স্কিরস ) এই ঔষধের কোন ক্রিয়া দর্শে না । কিন্তু বিমুক্ত কক্কটে ও কক্কটের ক্ষতে এতদ্বারা উপকার জন্মে এবং বেদনার তীব্রতার লাঘব হয় । ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে কক্কটের হুল-বেধবৎ জ্বালাকর বেদনা নিবারণে কণ্ডুরাঙ্গো একটা অত্যাশ্চর্য ঔষধ । কক্কট রোগে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম বা মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয় । ডাঃ বার্ণেট প্রভৃতি ঐহারা ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা এতদ্বারা শরীরের একপ্রকার ধাতু-বিকৃতি ও তজ্জন্ত সামান্য উপঘাত বা ক্ষতের দূষিত ক্ষতে পরিণতি ; কঠিন-গ্রাস্ত, দুর্গন্ধ নিঃসরণশীল, নিস্তেজ ক্ষতের উৎপত্তি ; এবং পচ্যমান বা অপচ্যমান পীড়কা ও ওষ্ঠ-বিদারী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও প্রকৃত ক্যানসার উৎপন্ন হইয়াছিল না । মুখ, ওষ্ঠ ও মলদ্বারাদির অবদরণে, দুর্গন্ধ রস ক্ষরণ লক্ষণে, ধাতু-দোষ বা উপদংশ-দোষ থাকিলে কণ্ডুরাঙ্গো ফলপ্রদ । দুর্গন্ধময় দুর্দম্য প্রাচীন ক্ষতেও এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ হইয়া থাকে । মুখের কোণে ক্ষত সহকারে স্তনের শূল ও ব্যথিত অর্কুদ । বৃক্কাস্থির পশ্চাত্তাগে জ্বালাকর বেদনা, ও তথায় যেন ভুক্তদ্রব্য সংলগ্ন হইয়া থাকে এরূপ অসুভব সহ গল-নলীর সংযুক্তি । বাম কুক্ষিতে দৃঢ়তা ও নিরন্তর জ্বালাকর বেদনা সহকারে ভুক্তদ্রব্য বমন । আমাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্রাব্য । এই সকল রোগেও কণ্ডুরাঙ্গো ব্যবহৃত হয় ।

## কনভেলেরিয়া —লিলি অব দি ভ্যালি ।

লিলিয়েসী জাতীয় কনভেলেরিয়া মেজস আমেরিকা জাত এক প্রকার ওষধি । ঔষধার্থে ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ ।**

জ্বপিতে কনভেলেরিয়ার প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শিয়া জ্বপিতে ক্রিয়ার বৈষম্য ও মাত্তীয় বেগের পরিমাণের ন্যূনতা জন্মে, এবং বমন ও হিমাক্সের লক্ষণ উপস্থিত হয় । হৃদ্রোগে,

নিশেষতঃ শোথ, অতিশয় শ্বাস-ক্লম্ব, হৃৎকম্প, ক্রীণ ও অনিয়মিত নাড়ী লক্ষণাপন্ন হৃৎপিণ্ডের ক্রপাটের ও অজ্ঞাত বিধানের রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার কিংবা ক্রিয়া-বিকারজনিত শ্বাস-ক্লম্ব, কনভেলেরিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । হৃৎপিণ্ডের রস-প্রসেক ও মূত্র বৃদ্ধি করিয়া ইহা উপকার করে । ফুসফুসে রক্তের স্থিতি ও বক্ষঃ-শোথ বশতঃ যে শ্বাস-ক্লম্ব, জন্মে তাহাতেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ । অপর, গর্ভপাত কিংবা শস্ত্রোপচারের পর বস্তি-গহ্বরের রক্ত-সঞ্চয়ে, অতিশয় ভারানুভব ও বস্তি-গহ্বরস্থ বস্তুর নিয়মিত প্রচাপন, তজ্জন্ত সরলান্তে কর্তনবৎ বেদনা, ও অবিরাম অপ্রথর স্পর্শ-দেয়, চিং হইয়া শয়নে উহার আধিক্য,—এই সকল লক্ষণে কনভেলেরিয়া উপকারী ।

সমগুণ ।—ডিজিটেলিস ।

## কমোকেডিয়া ডেন্টেটা ।

এই বিষাক্ত গুল্ম সেন্টডোমিঙ্গো ও কিউবা দ্বীপে জন্মে । সেই স্থানের লোকেরা ইহাকে গুয়াও বলে । সূর্য্যোভাপে এই বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিলে সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয় । উগ্র এলকোহল সহযোগে ইহার পত্রের বা বন্ধলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

কমোকেডিয়ায় বুকুল-জাত মধু পান করিলে বিসর্পের ভায় উদ্বেদ উৎপন্ন হয় । রসটক্সের সহিত কমোকেডিয়ায় বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে । উভয় ঔষধের বেদনাই নড়িলে চড়িলে উপশমিত হয় ; উভয় ঔষধই বিসর্পে ব্যবহার করা যায় ; উভয়ই গাত্রের জ্বালা ও কণ্ঠয়ন সংযুক্ত আরক্ততা জন্মায় ; এবং দুর্বলতা, অবশ্যতা, ও অস্থিরতাদি উৎপন্ন করে । কিন্তু এই দুই ঔষধের চক্ষু-লক্ষণে প্রভেদ লক্ষিত হয় । কমোকেডিয়ায় লক্ষণে দক্ষিণ চক্ষুতে বেদনা জন্মে এবং সেই চক্ষু যেন বৃহত্তর হইয়াছে অথবা মস্তক হইতে বহির্গত হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয় । এই সকল চক্ষু-লক্ষণ উষ্ণ চুল্লীর নিকটে গেলে বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু রসটক্সের চক্ষু-লক্ষণ উহাতে হ্রাস পড়ে । চক্ষু-লক্ষণে কমোকেডিয়া ও ইউফ্রবিয়া-অফিসিনেলিস সমতুল্য । এমন কি ইউফ্রবিয়া জনিত স্বকের আরক্ত রেখা পর্যন্ত কমোকেডিয়ায় উৎপন্ন হয় । নাতিশীতোষ্ণ দেশ অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের রোগেই ইহা সমধিক উপযোগী ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

কাস ।—বাম স্তন-বস্তুর নীচে বেদনা, ও সেই বেদনার বাম স্বরাস্থিপর্যন্ত প্রসারণ ; বক্ষঃস্থলে আমবাতির ও পার্শ্ব-শুলের বেদনা ; কমোকেডিয়ায় প্রয়োগ-লক্ষণ ।

বিসর্প ।—এনাকাডিয়মের ভায় কমোকেডিয়াও ফোফার আকার উদ্বেদ, এবং দুবিত পুষ্পপূর্ণ পীড়কা ও ক্ষত জন্মায় । এই সকল ক্ষত গভীর হয়, উহার প্রান্ত-ভাগ শক্ত

থাকে ; ক্ষত হইতে একপ্রকার গাঢ়, পীতভ-হরিৎ, একরূপ বিশেষ দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পুষ্যময় স্রাব নিঃসৃত হয়, ক্ষত-স্থান একথণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁচা মাংসের স্তায় দেখায়, চারিদিকের স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকণ শব্দে আবৃত থাকে। এই সকল লক্ষণ একপ্রকার অতি দূষিত বিসর্পেই উৎপন্ন হয়। এই বিসর্প রসটম্বজ্ঞাপক বিসর্প অপেক্ষা তীব্রতর এবং সচরাচর ইহাতে ল্যাকেসিস ও আর্সেনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কমোকেডিয়া ক্ষুদ্র বিসর্পে বিশেষ উপযোগী। চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ বিধান-তন্তুর বিসর্প জনিত প্রদাহে সচরাচর যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহা অপেক্ষা কমোকেডিয়া শ্রেষ্ঠ। ডাঃ লিলিয়েস্থাল উল্লেখ করিয়াছেন যে মুখমণ্ডল ও চক্ষে জ্বালা, সন্ধ্যার প্রাকালে উহার আতিশয্য ; মুখমণ্ডলের অতিশয় ক্ষীততা, উহাতে যন্ত্রণাকর কণ্ডুয়ন ; মস্তকের বিদাহী কণ্ডুয়ন ; শিরোঘূর্ণন ও শিরোগোরব এবং তৎসহকারে সঙ্করমান বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার উপশম ;— এইগুলি কমোকেডিয়ার লক্ষণ। দ্রষ্টব্য।—মুখমণ্ডল, হস্ত, ও অন্ত্রস্থ স্থানের প্রবল কণ্ডুয়ন ও জ্বালাবিশিষ্ট অস্বস্ততা এবং বিসর্পবৎ ক্ষীততা, তৎপরে পীতবর্ণ ফোঁকা ও উপস্বক-পতন লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অভিযান্দ্য।—দৃষ্টিক্রীড়া বা পুরাতন আইরাইটিসজনিত অক্ষিপুটের স্নায়ু-শূল ; চক্ষু গুরুতর ও বৃহত্তর অশ্রুভব ; চক্ষে বেদনা এবং চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ, চক্ষু নাড়িলে চাড়িলে অথবা উষ্ণ চুল্লীর নিকটে উহার আধিক্য, কমোকেডিয়ার লক্ষণ। শিরোঘূর্ণন।—শয্যাহইতে উত্থানে শিরোঘূর্ণন ; সকল বস্তু আঁধার দেখা ; নড়িলে চড়িলে মস্তকের সমস্ত বেদনার শান্তি ও উত্তাপে উহার আধিক্য এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। ক্ষত।—কঠিন প্রান্তবিশিষ্ট গভীর ক্ষত। আটক্লিশ-বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্তনের পচা ক্ষত ডাঃ নাভারো এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ছয় সপ্তাহে আরোগ্য করিয়াছিলেন। আর এক ব্যক্তির গুল্মের সমীপবর্তী, জজ্বাংশে অবস্থিত ধিমাকাঁড়, কঠিনপ্রান্ত, গভীর, দুর্গন্ধি দূষিত পুষ্যস্রাবী, ছয়বৎসর স্থায়ী নিস্তেজ ক্ষত, ডাঃ নাভারো ত্রিশ শক্তির কমোকেডিয়া ব্যবস্থা করিয়া চারি সপ্তাহে আরোগ্য করিয়াছিলেন। একজনের বামজজ্বায় ও পদে প্রদাহ জন্মিয়াছিল, প্রদাহের সহিত প্রবল জ্বর ছিল ; ক্ষীততা অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল, বেদনা হ্রাস পড়িলে সেই স্থানের চর্ম শাদা হইয়া উঠে, উহাতে একপ্রকার চিকণ শব্দ উৎপন্ন হয় এবং আক্রান্ত স্থল বিদারিত হইয়া উহা হইতে একপ্রকার দূষিত স্রাব (রসাপি) পড়িতে থাকে ; তিনি ষষ্ঠ শক্তির কমোকেডিয়া ব্যবহারে এই রোগীকে আরোগ্য করেন। স্পেনদেশীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কুষ্ঠরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে অনেকটা ফল লাভ করিয়াছেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে গুরুত্ব অশ্রুভব, মস্তক অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। বাম শব্দ স্থানের অভ্যন্তর দিয়া সঙ্করমান বেদনা। শয্যা হইতে উঠিলে পব সকল বস্তু আঁধার



দেখা ; নড়িলে চড়িলে ও খোলা বাতাসে বেদনার উপশম। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের ক্ষীততা ; বাম কর্ণেরও বিদারণ এবং ঋতসারের চূর্ণের ত্রায় উপভুক্ত স্থান। চক্ষু।—অক্ষি-গোণকে স্পর্শ-দেহ ও গৌরব অহুভব। চক্ষুর প্রদাহ ; দক্ষিণ চক্ষে দৃষ্টি করিলে প্রদীপের আলোকের চারিদিকে একটা লাল অঙ্গুরীয়ক দৃষ্ট হয়, চক্ষু বুজিলে আর সে অঙ্গুরীয়ক থাকে না। অক্ষিগোলকদ্বয় বৃহত্তর বোধ হয়। উষ্ণ গৃহের নিকট গেলে চক্ষুর বেদনা বৃদ্ধি পায় ও চক্ষুদিয়া অধিক জল পড়ে। অক্ষিগোলকের অভ্যন্তর দিয়া মস্তক-পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত তীব্র বেদনা। মস্তকে চাপিয়া বাহির হওয়ার ত্রায় অহুভব, বোধ হয় যেন অক্ষিগোলকের শিখরদেশে কিছুতে চাপ দিতেছে। নাসিকা।—নাসিকার অসহ্য কণ্ডূন। মুখ-মধ্য।—দন্তে অবিরাম বেদনা। দন্ত যেন দন্ত-গর্হের হইতে টানিয়া বাহির করা হইতেছে এপ্রকার অহুভব। দক্ষিণ পার্শ্বের পেষণ-দন্ত যেন নড়ে এপ্রকার অহুভব। চাপদিলে দন্ত-বেদনার হ্রাস। নিম্ন হনুর দন্ত-মূলের প্রদাহ। জিহ্বায় মলিন পীতবর্ণ লেপ। নীচের ওষ্ঠের ফোঁকা ও ক্ষীততা। দন্ত-বেদনার বিরাম পড়িলে মস্তক বড় অহুভব। স্বরযন্ত্র।—গল-কণ্ডূন ও বাম গুন-বৃন্তের নীচে সতত যুহু বেদনা সহকারে রাজিতে আক্ষেপিক শুষ্ককাস ; গল-কণ্ডূনকর কাস ; দিবাভাগে খৃৎখৃৎ কাস। উদর।—উদরে অহুজ্জল আরক্তরাগ, বোধ হয় যেন উদরের অহু গৃহে একটা উত্তেদ উৎপন্ন হইবে। উদরের অহুপ্রাশে ও নাভীর উর্দ্ধে সংপ্রসারিত খাস-কষ্টজনক তরুণ বেদনা। জনেন্দ্রিয়।—রাজিতে ক্রমাগত যুদ্ধে স্তম্ভিত ও কণ্ডূন। উপহের নিম্নভাগে, ও মেট্র-জকের অভ্যন্তর পার্শ্বে ছুনিবাব কণ্ডূন। বক্ষঃস্থল।—বাম স্তনে, বৃন্তের প্রায় এক ইঞ্চি উপরে তীব্র বেদনা, ও অবশেষে এক প্রকার আলাহুভবের বিজ্ঞানতা ; এই বেদনার দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ বাহুর নিম্নে গতি। বামপার্শ্বে তীব্রবেদনা বশতঃ খাসকষ্ট। বক্ষঃস্থলের অহুপ্রাশে প্রতিনিয়ত বেদনা। বক্ষঃস্থলে আমবাতিক বা পার্শ্ব-শূলজনিত বেদনা। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে আমবাতিক বেদনা ও হুচী-বেধবৎ যাতনা, হুচী-বেধান্তে একপ্রকার আলাবিশেষ। উদ্ধাঙ্গ।—হাতে, বাহুতে ও জজ্বায় পুনঃ পুনঃ বাতের বেদনা। বাহুতে ও হাতে ফোঁকার ত্রায় উত্তেদ। নিম্নাঙ্গ।—হুই জাহুতেই তীব্র বেদনা ; জজ্বায়ের অভ্যন্তর ভাগে পদদ্বয় পর্যন্ত প্রচাপন। নড়িলে চড়িলে বেদনার শাস্তি। \* জজ্বায় ফোঁকার ত্রায় উত্তেদ, ও উঠার পচামান পীড়কায়, এবং কখন কখন বা গভীর, হুহিত ক্ষতে পরিণতি। ত্বক।—মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, এবং শরীরের অন্ত্রাঙ্গ স্থানের প্রবল কণ্ডূন, আরক্ততা ও বিসর্পবৎ ক্ষীততা, তৎপরে উহাতে পীতবর্ণ ফোঁকা ও উপভুক্ত-স্থান। মুখমণ্ডল ও বাহুর উপরিভাগে কষ্টপ্রদ আঁলা। আরক্তজরের পীড়কার ত্রায় পীড়কা। ০ বিসর্প, দক্ষ ইত্যাদি। চর্ম্মের প্রদাহ, অনন্তর গভীর, কঠিন প্রান্ত ক্ষত, উহা হইতে গাঢ়, পৃথক, হরিভাঙ পুত বর্ণ, অতি দুর্গন্ধ প্রাবল্যনিঃসরণ ; ক্ষতস্থানের কাঁচা মাংসের ত্রায় দৃশ্য। স্বক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকণ শব্দে আচ্ছাদিত।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—\* সর্বশরীরে ক্যালিটিনার জায় আরক্ততা । ( রসটঙ্ক ) ।  
\* দক্ষিণ চক্ষুতে বেদনা ও উহা যেন বাম চক্ষু অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অধিকতর বহিরাগত  
এরূপ অল্পভব । চুল্লীর নিকটে বেদনার উপচয় । চক্ষু ভারী, বৃহত্তর, ব্যথিত বোধ হয় ;  
অক্ষি-গোলকের শিখর-দেশে কোন বস্তুর প্রচাপন বশতঃ উহা যেন নিম্নদিকে ও বহির্দিকে  
সঞ্চালিত হইয়া মস্তক হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে এপ্রকার অল্পভব । মুখমণ্ডলের  
ক্ষীততা, তৎসহ চক্ষুবয়ের কোটর হইতে বহিরাগতি এবং বামচক্ষে কেবল একটা অল্পভব  
আলোক-বেদা দর্শন । নড়িলে চড়িলে বেদনার লাঘব ।

**সমগুণ ।**—এনাকার্ডিয়ম, রসটঙ্ক, ইউফরাসিয়াম অফিসিনেয়ম ।

## কর্ণস সারসিনেটা ।

কর্ণস সারসিনেটা কর্ণসপ্লেথিডা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর একপ্রকার গুহ্ম । ইহা আমেরিকায়  
উত্তর প্রদেশে জন্মে । হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সরস বকল হইতে উগ্র এককোহল  
সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**অধিকার ।**—পাণ্ডু, অতিসার, ও প্রীহার বিবর্জনসংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া-দোষ ।  
শালক সিগের মুখ-বিবরের প্রদাহ । পাণ্ডু, বদনের পীতবর্ণ, ও নিমগ্নতা সংযুক্ত পুরাতন  
বক্তৃ-প্রদাহ । মলিন মুখাকৃতি ও নিমগ্ন বদন সহকারে মলিনবর্ণ পৈত্তিক অতি দুর্গন্ধ  
অতিসার । বাহুদ্বয়ে জ্বালা ও অতিশয় দুর্বলতাসংযুক্ত রক্তাতিসার ।

**প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।**

**রক্তাতিসার ।**—মলত্যাগের পূর্বে, পরে, ও মলত্যাগকালে উদর-বেদনা ; অতি-  
শয় দুর্বলতা ও পিত্ত-প্রকোপ ; এবং সরলাস্ত্রের প্লৈয়িক বিল্লীর ক্ষত এই ঔষধের প্রয়োগ-  
লক্ষণ । **অরুণ্যিকা ।**—ফেভস অর্থাৎ মধুচক্রাকার অরুণ্যিকা রোগে শুষ্ক বা আর্দ্র  
পীড়কা ; গণ্ডমালা-দোষ ও শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, বা প্লেথ্রাক্সাণী পুরাতন কাস লক্ষণে  
কর্ণস সারসিনেটস ব্যবহৃত । **জ্বর ।**—একবার শীত একবার তাপ ; অক্ষিগোলকে  
অবিরাম বেদনাসহ বৃহৎ শিরঃপীড়া ; অস্ত্রে বায়ুর কুজন ; বক্ষঃস্থলে ও স্বস্ত্যস্থির নিদ্রে  
হঠাৎ-বেদ, দুর্বলতা ও ক্লান্তি অল্পভব ; বিবমিষা, মাংস ও রটিতে অরুচি, ক্ষুধাহীনতা,  
অস্ত্রে কাষড়ান বেদনা ; মলিন, হরিৎ, পাতলা, অতি দুর্গন্ধ মল, তৎসহ অতিশয় দুর্গন্ধময়  
প্রবৃত্ত বায়ু নিঃসরণ ;—এই সকল লক্ষণে আর্মাশয়িক ও পৈত্তিক জ্বরে কর্ণস ব্যবহৃত হয় ।  
**শিরঃপীড়া ।**—সমগ্র মস্তকে অতীব গৌরব ; হাঁটলে, মাথা নোচাইলে বা ঝাঁকিলে  
বিবর্জিত তর্জালুতা ; প্রচুর মল নিঃসরণে মস্তকের পূর্ণতাম্প্রভবের শাস্তি ; মস্তকে বেদনা  
ও দগদগ সহ মস্তকের পূর্ণতা অল্পভব, তজ্জন্তু প্রগাঢ় নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা ; এই ঔষধের  
প্রয়োগ লক্ষণ । **মানসিক রোগ ।**—আলস্ত, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিবর্তিত,

মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, মনের জড়তা, চিন্তা করিতে বা একবিষয়ে চিন্তাসংঘব করিতে অক্ষমতা, সন্ধ্যাকালে উহার আধিক্য; শিরোগূর্ন, অতিশয় ঔদাস্ত, মানসিক বাতনা, ও বিষাদ; ম্যালেরিয়া জনিত উপদাহিতা; পাণ্ডু, রক্তাতিসার, যক্ষ্ম ও গ্রীহার রোগ; কর্ণসের লক্ষণ। গণ্ডমালা।—গণ্ডমালা: জনিত অভিস্রব, অক্ষিপুটের দক্ষ; জিহ্বা, মাটি, ও মুখের ক্ষত; পুরাতন অতিসার; এই সকল লক্ষণে গণ্ডমালা দোষে এই ঔষধ ব্যবহৃত। উপক্ষত।—বালকদিগের মুখের উপক্ষত; প্রতিক্রিয়া বা আমাশয়িক উপদ্রব বশত: গালের শৈথিল্য বিলীল ক্ষত; এবং জিহ্বা, দন্ত-মূল, ও মুখের গণ্ডমালা জনিত ক্ষতে কর্ণস সারসিনেটস বিশেষ ফলপ্রদ। এই রোগের পুরাতন ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত অবস্থায়ও ইহা আরোগ্যকর। ইহার জলীয় দ্রব্যের স্থানিক প্রয়োগই অধিক উপযোগী; উপযুক্ত মাত্রায় অরিষ্ট বা তরুণ বকলের ফাণ্টেরও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। অগ্নিমান্দ্য।—মুখে তিক্তাশ্বাদ ও সকল প্রকার ঋতুদ্রব্যে অরুচি সহ বিবিধা; শ্বাসশূল উদগার সহ আমাশয়ে শূন্যতা অহুভব; অগ্নিপানীয়ের আকাজক্ষা; মল-প্রবৃত্তি সহ মুখ, গলা ও আমাশয়ে আলা; এবং আমাশয় ও উদরে দুর্বলতাহুভব, কর্ণসের লক্ষণ। অতিসার।—ডাঃ মার্সি ও অপর কয়েকজন চিকিৎসক পৈত্তিক অতিসার ও রক্তাতিসারে অতিশয় উপকারী বলিয়া এই ঔষধের প্রশংসা করেন। মার্ক-কর, এলোজ ও নল্লের দ্বায় লক্ষণে ম্যালেরিয়া-দোষ সংযুক্ত, ও গ্রীষ্মকালের রোগে এই সকল ঔষধের পরিবর্তে বিবেচনা পূর্বক ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ঔদাস্ত সহ তজ্জালুতা। মনের জড়তা, কোন বিষয়ে মনঃসংঘব করিতে অসমর্থতা। ০ আলস্ত ও শক্তিশূন্যতা অহুভব। অতিশয় নিরুৎসাহ, ও ক্ষণরাগিতা। মনোহর বিষয়েও উদাগীনতা। মস্তক।—০ তজ্জালুতা সহ সমস্ত মস্তকে অতীত্র, ও ভারী বেদনা। হাঁটলে, মাথা নোয়াইলে বা নড়িলে বিবর্তমানশীল শিরোবেদনা। ০ মস্তকে পূর্ণতা অহুভব, ও অধিক পরিমাণ মলস্রাবে উহার শক্তি। মুখমণ্ডল ও মস্তকে রক্তের সঞ্চয়। কেরাটির প্রাচীর ও পৃষ্ঠভাগে গভীর-মূল দপদপকর বেদনা। ০ সমস্ত মস্তকের অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চয়মান বেদনা। ০ পৈত্তিক শিরঃশূল। চক্ষু।—অক্ষিপুটের অভ্যন্তরদিয়া অবিরাম বেদনা। চক্ষুর গুরুমণ্ডলের গীতাভা; চক্ষুর নিম্নতা। চক্ষুর চারিদিকে ভার বোধ। চক্ষুর প্রভাশূন্যতা ও গুরুত্ব। নাসিকা।—নাসিকার শৈথিল্য বিলীল কণ্ডুয়ন। প্রত্যয়ে নাসিকার প্রতিক্রিয়া। নাসিকার অস্থিভাগে তীব্র কটক-বেধ অহুভব। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বার পাতলা গীতাভ লেপ। মুখে তিক্ত আশ্বাদ, মুখ ও গলার মধ্যে টাটানি। শীতল জলের সিপাসা সহকারে জিহ্বার শুষ্ক লেপ। শিশুদিগের মুখে উপক্ষত। ০ শিশুদিগের মুখের ক্ষত; আমাশয়।—

\* মুখে তিক্ত আশ্বাদ, সকল প্রকার ঋতুদ্রব্যে অরুচি, এবং অগ্নি পানীয় পানের শূন্যতা

ঔষধের অতিশয় প্রাশংসা করেন । নিবৃত্ত-রজস্বাদিগের যকৃতের পীড়ার আনুষঙ্গিক এই সকল রোগে এলোজ ও উপকারী ।

**ইনফ্লুয়েঞ্জা ।**—যকৃতের লক্ষণ সংযুক্ত বহুব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে, অর্থাৎ রোগীর বদনের মলিন ধূসর বর্ণ, কখন ও বা প্রকৃত পাণ্ডুরোগের জায় আতা; প্রচাপনে যকৃতের বাম খণ্ডে স্পর্শ-দেয়, চিক্ণ, অল্পজল পীতবর্ণ, কচিং বা মলিন হরিষর্ণ মল; মলিন-কপিশ মুত্র; বক্ষঃস্থলে গোরব, পার্শ্বে স্ফীতি-বেধ; দুর্বলতা, জ্বর; মস্তকের সম্মুখভাগে শিরঃপীড়া এই সকল লক্ষণে নক্স, চেলিড, ও পলস ব্যবহারে কোন ফল না দর্শাতে কার্ডিউয়স প্রয়োগে সত্ত্বর আরোগ্য জন্মিয়াছিল । সিকাগো নগরে মার্চ ও এপ্রিল মাসে এই প্রকার বহুব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা উপস্থিত হইয়া থাকে । তথায় ডাঃ হেল যকৃতের লক্ষণ দূরীকরণে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।

**ফুসফুসের রোগ ।**—যকৃতের অনুস্থতা নিবন্ধন ফুসফুসের শুষ্কতার রোগে কার্ডিউয়স বিশেষ ফলপ্রদ । যন্ত্রনাগ্রদ নৈশকাসে রোগীকে শয়ান উঠিয়া বসিতে হইলে, অথবা যকৃতদ্রোগ বশতঃ বিদ্রুত রক্ত, কিম্বা প্লেগ্মা নিগ্ধিত হইলে; এই ঔষধে তাহা আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । ক্ষয় ও খাস রোগের কাস ও এতদ্বারা উপশমিত থাকে

**পার্শ্ব-ব্যথা ।**—পার্শ্বদেশের বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বের স্ফীতি-বেধবৎ বাতনা, প্রায়শঃ পিত্ত-লক্ষণের সহিত সংস্থষ্ট থাকিলে ইউরোপে এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহৃত হয় । ডাঃ ইনম্যান বলেন যে এই স্ফীতিবেধ সহ্যভূতি বশতঃই সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে এবং যকৃত অপেক্ষা পেশীতেই অনেক সময় অনুভূত হয় ।

**প্লুরিসি ।**—প্লুরিসি রোগেও ইহার কতকটা খ্যাতি আছে । স্বয়ংভূত প্লুরিসি রোগে এতদ্বারা কোন উপকার দর্শে বলিয়া বোধ হয় না, তবে প্লুরোডিনিয়া বা বক্ষঃস্থলের পেশীর বেদনায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । কার্ডিউয়সের ক্রিয়া-পর্যাবেক্ষক সকল চিকিৎসকেরই মত এই যে এই ঔষধে একোনাইটের ছায় জ্বর ও বাতনা দূরীকৃত হয় না, কিন্তু উপশমিত হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—অবসন্নতা, বিষন্নতা, অবসাদ-বায়ু ।

**মস্তক ।**—\* চক্ষুর উপরে ও শঙ্খস্থলে কপালে মুছ গোরব । \* চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা সহ শিরোগূর্ণন ।

**আমোশয় ।**—ভিলাসি ও ক্ষুধাহীনতা । অতিশয় বিবমিষা, মুখ-গ্রাসেক, উদগার ও উদরের ক্ষীণতা । প্রবল-বিবমিষা, যন্ত্রণাপ্রদ ভ্রুকার, এবং অল্প হরিষর্ণ তরল পদার্থ বমন । জিহ্বার মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ লেপ । আমোশয়োর্দ্ধদেশে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব । ইচ্ছা-বিরুদ্ধ আহার গ্রহণের পর শূন্য উদগার । বমনের পত্রে, দুই ঘণ্টা স্থায়ী আমোশয়ের বেদনা । পর্ত্বকীর প্রান্তঃকালীন বমন ; সমস্ত দিন ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণ অবস্থায় অবস্থিতি ।

যকৃৎ ।—\* যকৃতের স্বীততা ও ব্যথিততা । দক্ষিণ কৃষ্ণির, বিশেষতঃ যকৃতের বাম খণ্ডের স্পর্শ-দেঘ ও কঠিনতা ; তথায় চাপ প্রদানে স্বাসে আয়াস ও কাসের উৎপত্তি ; কপিণবর্ণ মল ; পীতবর্ণ মূত্র ; স্বাসরোগের ত্রায় স্বাস ; প্রবল কাল সহকারে গাঢ় ও হৃৎস্থ নিষ্ঠীবন । পদের শোথ ; স্বল্প, উজ্জ্বল, পীতবর্ণ মূত্র, ও স্বাস সংযুক্ত যকৃৎ-বেদনা ।

পাণ্ডু ।—পাণ্ডু, আমাশয়ে বেদনা ও পিত্তবমনাদি সহস্রিত পিত্ত-শিলা রোগ । যকৃৎ-লক্ষণ সংযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা । পিত্তকোষের স্পর্শ-দেঘ ও স্বীততা । ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, স্বাস ও কাস সহকারে যকৃৎরোগ । যকৃৎকারের শিরার রক্তসঞ্চয় ও অবরোধ এবং উহার ফল । যকৃতের বাম খণ্ডের বিবৃদ্ধি, এবং তৎসহকারে গ্রীবার ও পৃষ্ঠের কশেরুকায় স্পর্শদেঘ ।

উদর ।—কৃষ্ণিদয়ে পূর্ণতা অল্পভব, তন্নিমিত্ত দীর্ঘ নিঃস্বাস আকর্ষণের আবশ্যকতা । উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে আঘাত । এচাপনে যকৃৎদেশে অল্পভাবিক্য । উদরে একপ্রকার অনিশ্চিত অল্প ‘অল্পভব, তজ্জন্ত গভীর স্বাস এবং জোরে নড়িলে চড়িলে উহার আধিক্য । উদরের স্থানে স্থানে কর্তনবৎ বেদনা । উদরে ও বক্ষঃস্থলে হুচী-বেধ । সমগ্র উদরে, অক্লান্তের নিকটে বেদনা ; খল্লী ; মূত্র স্বাভাবিক ; বদন মলিন ও পীতভ ; নিদ্রাশূন্যতা ; অতিশয় শীর্ণতা ; বিলেপী জ্বর ।

মল ।—গ্রন্থিল, কঠিন, কপিণ, ধীরে ধীরে নিঃসারিত মল । কোমল, পীতভ, পাতলা, ময়লা জলের ত্রায়, লেহবৎ, ও পিত্তের আর্ভাপরিশৃঙ্খ মল । কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে পর্যায়ক্রমে অতিসার ।

মূত্র ।—প্রথমে স্বাভাবিক, পরে পুরীষ হইতে পিত্ত বিলুপ্ত হইলে পিত্ত মিশ্রিত মূত্র । স্বর্ণের ত্রায় পীতবর্ণ, পরিমাণে অল্প, অধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র ; অবশেষে স্বল্প ও কপিণ মূত্র ।

স্ত্রী-জনেন্দ্রিয় ।—রজোনিবৃত্তিকালের পীড়া ; অর্দ্ধ-শিরঃপীড়া, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, ষেতপ্রদর ও স্বাস এবং তৎসহকারে জরায়ুর সহানুভৌতিক রোগ ।

স্বাসযন্ত্র ।—রাত্রিতে যন্ত্রণাপ্রদ কাস, তন্নিমিত্ত শয্যায় উঠিয়া বলিতে হয় । সাধারণতঃ যকৃৎরোগের সহিত সংসৃষ্ট, পরিকার রক্ত, অথবা রক্ত ও প্লেগ্মা নিষ্ঠীবন । হৃৎস্থ পরিষ্কার প্লেগ্মা নিষ্ঠীবন । ইনফ্লুয়েঞ্জা, ও তজ্জন্ত যকৃতের তীব্র উপদ্রব, এমনকি পাণ্ডু । যক্সা ও স্বাসরোগগ্রস্তদিগের কাস । \* পার্শ্বে হুচী-বেধ । মস্তক অবনত করিলে সপ্তম পশুঁকা-প্রদেশে হুচী-বেধনবৎ ব্যতনা, অনন্তর বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে সেই বেদনার সংপ্রসারণ, তজ্জন্ত বাহ নাড়িতে, হাঁটিতে ও মাথা নোয়াইতে প্রায় অসাধ্যতা (চেলি) । প্রথমাবস্থাপন্ন ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ অথবা ফুসফুস-বেষ্টের পুরাতন বেদনা । যকৃতের পীড়াসংসৃষ্ট স্বাসরোগের লক্ষণ ।

জ্বর ।—উত্তাপের পরে ঘর্ম, নাড়ীর পূর্ণতা, এবং জরের প্রাত্যহিক উপচয় ।

সমগুণ ।—ব্রাইওনিয়া, চেলিডোনিয়ম, চিয়োট্রাহুস, নক্সভমিকা, মাকুরিয়স, পডোফিলম, লেপ্টোপ্টা, বেঞ্জোয়িক এসিড ।

## কিউবেবা ।

কিউবেবা অধিক স্লেয়াস্রাবী মূত্র-মার্গের প্রদাহ; এবং মূত্র-ত্যাগান্তে কঠিনবৎ বাতনা ও আকুঞ্জন জন্মায়। রক্ত-মূত্র; ও প্রোট্ট-গ্রন্থির প্রদাহও ইহার লক্ষণ। ইহার ক্রিয়ায় স্লেয়াস্রাব নিঃসৃত হয়। অতএব প্রাচীন মূত্রাশয়-প্রদাহে মূত্রাশয়ের আন্তর্য-বিল্লীর স্থলস্থ জনিত উপদাহে মূত্রত্যাগান্তে কঠিনবৎ বেদনা ও আকুঞ্জন লক্ষণে, প্রধানতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মূত্র-মার্গের প্রদাহেও ইহার ব্যবহার আছে। প্রতি দশ মিনিটে এক একবার মূত্রত্যাগ, ও প্রস্রাব করিবার সময় বাতনা, কুহন ও রক্তবৎ স্লেয়া নিঃসরণ ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। মূত্রে কবাব চিনির গন্ধ ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। জৈবিক বিল্লীতে ক্রিয়া দর্শে বলিয়া কাস, প্রমেহ, শ্বেত প্রদরাদিতেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। অবিরত কাস, সান্নাছে, উত্তাপে, ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি; স্বরযন্ত্রে শল্য থাকার ছায় অসুভব সহকারে কুকুরবৎ কাস; গল-শোথ, দ্রুত ও সশব্দ শ্বাস; \* ককর্শ-কাস, বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে বায়ুনলী ছিন্ন ও বিদীর্ণ হইল; আয়াস ও বাতনা সহকারে নিঃসরণ, অথবা পীত মিশ্রিত জীষৎ হরিষর্গ, লৌহের মরিচার বর্ণ, ও রক্তের রেখাক্ত নিঃসরণ; কাসের সহিত, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, রক্তপাত; কিউবেবের লক্ষণ।

প্রমেহ।—মূত্র-পথের উপদাহ; মূত্রমার্গ হইতে অধিক স্লেয়া নিঃসরণ; মূত্রত্যাগান্তে কঠিন ও আকুঞ্জনর ছায় বাতনা; রক্ত-মূত্র; মূত্রে কিউবেবের গন্ধ; এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ।

অন্যান্য রোগ।—গাঢ়, পীতবর্ণ প্রমেহ-স্রাব বিশিষ্ট প্রোট্টাইটিস (পুরাতনও) দুর্গন্ধ, বিদাহী, পীত বা হরিষর্গ স্রাব, কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট প্রদর (বালিকা-দিগেরও); দুর্গন্ধ স্রাব সংযুক্ত দুর্দ্বা কর্ণ-গুতি (কানপাকা); নাসিকার ও গলার প্রতিশ্রাব, জীষৎ হরিৎ মিশ্রিত পীতবর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব। নাক হইতে স্লেয়া তুড়ুতুড় করিয়া গলার পতন, গলার অবদরণ ও স্বরভঙ্গ (সিনাপিস)। বর্ণশূণ্য, স্বচ্ছ, অল্পের ছায় ক্ষুদ্র কণা মিশ্রিত মল বিশিষ্ট ও অধিক পিপাসা সংযুক্ত আম-রক্ত।

## কিউরেয়ার ।

কিউরেয়ার আদিম আমেরিকদিগের বাণ বিধাক্ত করিবার বিষ। তাহার ইহাকে উয়ারা বলে। এলাকোহলে দ্রবীভূত করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—গতিশক্তিবাহিনী জায়গুলীতে কিউরেয়ারের ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং এতদ্বারা জ্ঞানশক্তির কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত কেবল গতিশক্তিই পক্ষাঘাত জন্মে। 'আর্ভান্তরিক' সেবনে কিউরেয়ার প্রবল লক্ষণ জন্মায়। সহসা জন্মার অভিশয় দৌর্লভ্য সহকারে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়। তৎপক্ষয় শক্তি বহন হইতে থাকে।

অধিকার।—ক্রিয়াশক্তিসাধিনী স্বাস্থ্যের বিকার বশতঃ বেদনাশূল পক্ষাঘাত, সন্ধ্যাস রোগের পরবর্তী অর্ধাঙ্গ, উপশাতজনিত অর্ধাঙ্গ; স্বাস্থ্যবীর্য দৌর্বল্য, অবসন্নতাজনক রোগজনিত দৌর্বল্য প্রভৃতিতে এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

দৌর্বল্য।—ডাঃ হিউজ বলেন যে অতিরিক্ত স্তন্যদান বা অবসাদকর রোগ জনিত স্বাস্থ্যবীর্য দৌর্বল্যে কিউরেয়ার সমধিক উপযোগী। বৃদ্ধদিগের স্বাস্থ্যবীর্য দৌর্বল্যেও ইহা ফলপ্রসূ। যকৃৎদ্রোণ।—একজন রোগীর যকৃৎতের সিরোসিস ছিল। প্রতিদিন পূর্বাঙ্কে দশ-এগারটার সময় তাহার পিত্ত বমন হইত। বমনের পূর্বে শীত জন্মিত। তাহার জন্মের দৌর্বল্য সংযুক্ত সহসা ভ্রমির আক্রমণ লক্ষণও ছিল। অত্যাশ্চর্য ঔষধে কোন উপকার না হওয়াতে ডাঃ ফ্যারিংটন ৫০০ শক্তির কিউরেয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে দুই তিন সপ্তাহ অবস্থতির পর বমন প্রতিরুদ্ধ হয়। তৎপরে রোগী দুই তিন মাস জীবিত থাকে। এম্ফিসিমা।—পারিস নগরের ডাঃ পিটেট এই রোগের প্রবর্তিত অবস্থার শ্বাস-কৃচ্ছ্রে কিউরেয়ারের তৃতীয় বা ষষ্ঠক্রম ব্যবহারের বিধি দেন। কোন কোন প্রকার পক্ষাঘাত জনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্রেও ইহার ব্যবহার আছে। কাস।—সর্বশরীর সঞ্চালনকর, বমনের উদ্রেকজনক শুষ্ক আফেপিক কাস; কাসের আবশ্যান্তে সচরাচর মুচ্ছার আক্রমণ; শীতল বায়ু নিঃশ্বাসনে, হাসিলে, আহার করিলে, ও নড়িলে চড়িলে কাসের বৃদ্ধি; শরবস্ত্রে জ্বালা; শরভঙ্গ ও শর-নাশ; শীত, ধূসর, হরিতাভ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ নিঃশ্বাস, বক্ষঃস্থলে প্রসারণ অসুভব ও জ্বালাকর উত্তাপ; আঘাতিত শ্বাস; দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎ-বেধবৎ বেদনা; হৃদগ্রন্থদেশে উৎকর্ষা; হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডে ছল-বেধবৎ বেদনা কিউরেয়ারের প্রয়োগ-লক্ষণ। বহুমূত্রে।—ঘনঘন পরিষ্কার মূত্রপ্রাব, তৎসহ বৃদ্ধকে খনন ও খল্লীবৎ বেদনা; আমাশয়ে সঞ্চরমান বেদনা, মুখ-শোথ; অতিশয় পিপাসা, সন্ধ্যাক্ষে ও রাত্রিতে পিপাসার বিশেষ আবির্ভাব; সশর্কর মূত্র ও অতিশয় শীর্ণতা; জীবন সংশয়কর তরুণ বহুমূত্র; কিউরেয়ারের লক্ষণ। জ্বর।—অপরাক্ষ দুই তিনটার সময় আরম্ভ জ্বর, রাত্রিতে ভাল থাকা; আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী শীত সহকারে জ্বালাকর উত্তাপ; অসংলগ্ন বাক্য; অতিশয় অবসন্নতা; অনেক সময় হস্তপদের পক্ষাঘাত; বিশেষতঃ রাত্রিতে শীতল ও রক্তাক্ত ঘর্ষ লক্ষণে প্রাত্যহিক জরে; এবং অধিরত শীত সংযুক্ত দূষিত বিষমজ্বরে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। শিরোবেদনা।—স্বাস্থ্যবীর্য শিরঃপীড়া; সমগ্র মস্তকে কর্তিত বা বিদ্ধবৎ বেদনা, ওজ্জ্বল শয়ন ও অঙ্গ-প্রসারণের প্রয়োজন; মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, তৎসহ স্পন্দন ও ঐকম্পনবৎ বেদনা এবং জ্ঞানশূন্যতা; মস্তকের পশ্চাদিকে আকর্ষণতা, তৎসহ গ্রীবার স্তম্ভতা ও হস্তবস্ত্রের আন্দোলন ও ঐকম্পন; তরল পদার্থ-পূর্ণবৎ মস্তকের বয়নাগ্রাদ পরিদোলন; সম্মুখদিকে আরম্ভ হইয়া গ্রীবা ও মুখমণ্ডল পর্যন্ত বিকীর্ণ স্বাস্থ্যবীর্য বেদনা;

উপমত্তিক প্রদেশে প্রবল আঘাত ;—এই সকল লক্ষণে কিউরেয়ার ব্যবস্থেয় ।  
 শ্বেতপ্রদর ।—স্বল্প, গাঢ়, পৃথাক, হর্গন্ধময়, খণ্ডখণ্ড শ্রাব ; জরায়ু-মুখের ক্ষত, ভগ্নে ও  
 উরুতে টাটানি ; জরায়ুতে সঞ্চরমান ও খননবৎ বেদনা ; এই ঔষধের লক্ষণ ।  
 রজোরোগ ।—অতিশয় অনিশ্চিত ঋতু, কখনও অতি বিলম্বে, কখনও বা অতি শীঘ্র  
 ঋতুর উপস্থিতি ; ঋতুকালে উদর বেদনা, শিরোবেদনা, বৃককে বেদনা, সর্বাঙ্গীন শানি ও  
 অবসাদ-বায়ুর লক্ষণে কিউরেয়ার উপযোগী । কর্ণ-বেদনা ।—কর্তনবৎ স্নায়বীয় বেদনা,  
 কর্ণ হইতে বেদনার আরম্ভ ও জজ্বা পর্য্যন্ত প্রসারণ, তজ্জন্ম শয়নের প্রয়োজন ; কর্ণে সীস  
 দেওয়ার ঠায় বা জস্তদিগের চিৎকারের ঠায় নানাপ্রকার শব্দ ; অসহ্য কর্ণ-বেদনা,  
 তন্নিমিত্ত রোগীর জ্ঞানশূন্যতা ; আভ্যন্তরিক কর্ণ-প্রদাহ বশতঃ প্রায় পাগলের ঠায় হওয়া ;  
 পৃথময় শ্রাব, কিউরেয়ারের লক্ষণ । কুষ্ঠ ।—কিপাঙ্গ বলেন যে দুর্দৃশ্য, ছুরারোগ্য  
 ফোটক ; মলিন-দৃশ্য স্বক ; চর্ম্ম হইতে রক্ত-ক্ষরণ ; নাসিকায় শুটিকা ; কেশ ও দন্তের  
 পতন ; পুষ্প্রাবসহ কর্ণ-পালির ক্ষীততা লক্ষণে কুষ্ঠরোগে কিউরেয়ার উপযোগী ।  
 অন্যান্য রোগ ।—তাণ্ডব ; অপস্মার ; ধমুস্তম্ভ ; হমুস্তম্ভ ; সংস্থাসের পর পক্ষাঘাত ;  
 জলাতঙ্কের আবেশ (স্বকের নীচে পিচকারী প্রদান) ; শ্বাস-ক্রিয়ার পক্ষাঘাতের আশঙ্কা,  
 শয়ন করিলেই শ্বাস-রুদ্ধতার উৎপত্তি ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—প্রফুল্লতা ; নির্যোধের ঠায় আমোদ-প্রমোদ ; বিষমতা ; অবসন্নতা ;  
 উন্নততা । মস্তক ।—শঙ্খবয়ে প্রচাপনসহকারে শিরোধূর্নন । কেশ-পতন ; মস্তকের  
 শুটিকা-দোষ, শিরঃপীড়া ; গৌরব ও রক্ত করণবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন মস্তকের মধ্যে  
 কিছু সিদ্ধ করা হইতেছে । চক্ষু ।—চক্ষুর দুর্বলতা ; তারার বিস্তৃততা ; পাতার  
 ক্ষীততা । কর্ণ ।—বধিরতা ; \* গর্জনশব্দ ; অতিশয় বেদনা । নাসিকা ।—নাসিকায়  
 প্রদাহ ; অত্যন্ত ক্ষীততা ; ক্ষত । মুখমণ্ডল ।—পাণ্ডুবর্ণ ; হরিতাভ ; যুতবৎ বদন ;  
 বেদনা । ঔষ্ঠদ্বয়ের উত্তপ্ততা, ক্ষীততা, প্রদাহ ও ক্ষত । স্নায়ুমণ্ডল ।—গতিশক্তি-  
 সাধিনী স্নায়ুর পক্ষাঘাত । সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা ; শীর্ণতা ; ধমুস্তম্ভ ; পক্ষাঘাত । রক্ত-  
 সঞ্চলন-যন্ত্র ।—দৃঢ়, অনিয়মিত নাড়ী ; প্রবল হৃৎকম্প । উদর হইতে শীতলতার  
 আরম্ভ ; কম্পন ; উত্তাপ, বিশেষতঃ মস্তকে, তৎসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ; শীতল, রক্তাক্ত ঘর্ম্ম ।  
 শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরবাহকের শুষ্কতা, ও ক্ষীততা ; স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা ; কৃত্রিম বিদ্বী ; স্বরের  
 স্থলতা ; শ্বাস-কষ্ট । প্রবল, সবুজ অথবা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস, কাসে শরীরে  
 ঝাঁকি লাগে । বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর উত্তাপ ; উজ্জল রক্ত বমন ।—পরিপাক-যন্ত্র ।—  
 মুখ-মধ্য ।—তালুর প্রদাহ ; দন্তের পতন, জিহ্বার প্রদাহ ; গলার প্রদাহ ও ক্ষত,  
 অতিক্রুধা, ক্রুধাহীনতা, অতিশয় পিপাসা ; তিক্ত স্বাদ । আমাশয় ।—উদগার ;



বিবমিষা, বমন; অদ্ভুত সঞ্চলন; অতিশয় যাতনা। উদর।—ক্ষীততা; বাতান্বান; অদ্ভুত সঞ্চলন; জ্বালাকর বেদনা; যকৃতের অতিশয় বিবর্ধন। মল।—ঈষৎ শুষ্ক, তরল, ওলাউঠার অমুরূপ মল, তৎসহ আমাশয়ে গুল্লী; পীতবর্ণ, রক্তাক্ত মল; কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ। মূত্রে-যন্ত্র।—বৃককে, মূত্রাশয়ে ও মূত্র-মার্গে উত্তাপ ও যাতনা; প্রদাহাদি। পরিকৃত; প্রভূত মুত্র; মলিন, স্বল্প, রক্তাক্ত মূত্র। জনন-যন্ত্র।—(পুং) উত্তেজনা; হ্রস্বলতা; প্রমেহ, উপদংশাদির জ্বায় উপদংশ লক্ষণ। (স্ত্রী) উত্তেজনা; কামোদ্ভাদ; অতি ক্ষীণ শীঘ্র ধাতু; গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে বেদনা; প্রদাহ; জরায়ু-মুখের ক্ষত; যোনি-মুখের অনৈচ্ছিক আক্ষেপিক অবরোধ, প্রদর। উপচয়।—প্রাতে ও সন্ধ্যাহে; এবং সঞ্চলনে বৃদ্ধি। উপশম।—আহারে উপশম।

সন্মণ্ডণ।—নজ-ভ্রম, চিকিৎসিয়া, কোনা, এসিড হাইড্রোসা।

## কুইব্রেকো।

কুইব্রেকো ব্রেজিল দেশীয় একপ্রকার বৃক্ষ। তথাকার চিকিৎসকেরা জরুর স্বরূপ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি রীতিতে ইহা পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সকল প্রকার ঋস-কুচ্ছে ই এই ঔষধে উপকার দর্শে বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার প্রথম দশমিক ক্রম সেবনে র্যাজমার ঋস-কষ্টও বিদূরিত হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে মণ্ডপায়াদিগের মুখদুর্গিকায় কুইব্রেকো অতিশয় উপকার করে। কুইব্রেকো “ফুসফুসের ডিজিটেলিস” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতিশয় ঋস-কষ্ট সংযুক্ত ঋস-কাস ও বক্ষঃস্থলের প্রতিজ্বায়ে; এবং শোথবিশিষ্ট হৃৎকপাটের রোগে ডাঃ হেল দশবিদু মাজার ইহার মাদার টিঞ্চার ব্যবহারের বিধি দেন।

## কোকা—ইরিথ্রক্সিলন কোকা।

কোকা গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। বলিভিয়ায় ইহা বহুল পরিমাণে কৰ্ষিত হয়। পেরু ও বলিভিয়ার লোকেরা উত্তেজনাকর ও কঠিন পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত ইহার পত্র চৰ্ষণ করিয়া থাকে। পেরু দেশের লোকেরা ইহার পত্র চৰ্ষণ বা উহার ফাণ্ট পান করিয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ পর্বত আরোহণ ও ভারী বোঝা বহন করে। কোকা সেবন না করিলে উচ্চপর্বতের বিকীর্ণ বায়ু আরোহীর অতিশয় ঋস-কষ্ট জন্মায়। দক্ষিণ আমেরিকা বাসীরা এই গুল্মকে কোকা বলে। কোকার পত্রগুলি তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া থলি পুরিয়া রাখিয়া দিতে হয়। আঠার মাস বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এক একটা বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করা যায়। কোকার পাতাগুলি দেখিতে অনেকটা চায় পাতার মত।

দ্রায়ু-শক্তির উত্তেজনাকার্যে চা ও কাফির জায় তথাকার লোকেরা কোকা সেবন করে। ঔষধার্থে ইহার সস্ত্র সংগৃহীত পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। শুক পত্রের স্থল চূর্ণ হইতেও অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুকপত্রে সম্পূর্ণ ভৈষজ্যগুণ বর্তমান থাকে না।

**ক্রিয়া।**—কোকা দ্রায়ু-ক্ষেত্রের উত্তেজনা জন্মায়, কিন্তু মদিরা, অহিফেন ও মাজ্জেমের জায় দ্রায়ু-পদার্থের রক্তাধিক্য ও ক্রিয়া-বৈলক্ষ্য উৎপাদন করে না। এই জাতীয় অত্যাশ্র পদার্থের জায় কোকারও বিধান-তত্ত্বের ক্ষয়প্রাপ্তি কমাইবার ক্ষমতা আছে, অতএব শরীরে বতক্ষণ ইহার ক্রিয়া হইতে থাকে ততক্ষণ আহার গ্রহণের প্রয়োজন থাকেনা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং মূত্রে নিরৈট পদার্থের ন্যূনতা জন্মে। ডাঃ এলেন বলেন যে ইহার গৌণফল বিশজ্জনক।

**অধিকার।**—পরিপাক-শক্তির প্রবৰ্দ্ধন, নিদ্রার উৎপাদন, দ্রায়বীয় উত্তেজনায় প্রশমন, এবং আক্ষেপের লাঘব সম্পাদনই প্রধানতঃ কোকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর, উচ্চ স্থানে আরোহণে, অথবা অতিশয় লঘু বয়স্কৃত পরিশ্রমে, শ্বাস-কষ্ট; কৃত্রিম ইন্ধ্রিয়-সেবা অথবা অতিরিক্ত ইন্ধ্রিয়-সেবা বশতঃ দ্রায়ুগুলের বৈলক্ষ্য; হৃদ্রোগে, দ্রায়ুর অতিরিক্ত ক্রিয়া; দ্রায়বীয় উত্তেজনা জনিত নিদ্রাহীনতা; বৃদ্ধদিগের সহজে শ্বাসাতাব (বেদম হইয়া পড়া); দ্রায়বীয় উত্তেজনা; এবং শ্বাস-কষ্ট, প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অত্যাশ্র লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে, তাম্বাকুট অপব্যবহারের পরে; দ্রায়বীয় সবমন শিরঃপিড়ায়; ও পেশীর দুর্বলতা জনিত পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে কোকা প্রয়োজিত হয়।

দ্রায়বীয় উত্তেজক দ্রব্যের অপব্যবহার জনিত রোগেই ডাঃ হেল এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী মনে করেন।

**প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।**

**বধিরতা।**—একজন বৃদ্ধ সৈন্তের তিনমাস স্থায়ী বধিরতা ছিল। তাহার মস্তকে শব্দ হইত এবং সে নিজে জোরে পড়িলেও শুনিতে পাইত না; তৃতীয় দশমিক শক্তির কোকা সেবনে তাহার আরোগ্য জন্মে।

**কোষ্ঠবদ্ধতা।**—একব্যক্তির আশ্বানিক অঙ্গীর্ণ সংযুক্ত কোষ্ঠ-কাঠিঁজ কোকার কাণ্ট সেবনে দূরীকৃত হইয়াছিল।

**অস্থিরতা।**—অস্থিরতার আক্রমণে কোকা অতিশয় উপকারী। যে শ্রান্তি ও দ্রায়বীয় উপদাহিতা বশতঃ উহা উৎপন্ন হয়, এতদ্বারা তাহারও শান্তি জন্মে। এইপ্রকার অস্থিরতায় রোগী কোথাও শান্তি পায় না, নিদ্রা বাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার নিদ্রা হয় না; অবশেষে তাহার গুণ্যবায়ুর জায় অবস্থা জন্মে; মূচ্ছার জায় অহুভূত হয়; এবং অন্ধকারে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করে। (ট্র্যামোনিষ্টের লক্ষণে লোক-সংসর্গ ও আলোক ভাঙ্গ লাগে)।

**স্নায়বীয়তা।**—বিভিন্ন উদ্ভেজক স্বরূপেও কোকা অতিশয় ফলপ্রসূ। মাদকসেবীদিগের রোগে মদিরাদি উদ্ভেজক দ্রব্য ব্যবহার করা অবিধেয় বিধায়; কিংবা রোগীর মাদক দ্রব্য সেবনে আপত্তি থাকিলে কোকা সুর্য্যবহুয়।

**স্বরভঙ্গ।**—কোকা স্বরযন্ত্রের বল বিধান করে। ইহার মাতৃকারিষ্ট ( মাদাঃটিঙ্কার ) পনর বিন্দুমাাত্রায় সেবনে কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে কণ্ঠ্যন, অল্প অল্প কাস, সায়ালে কাসের বিশেষ আধিক্য; এবং সন্ধ্যাকালে শয়িত অবস্থায় বায়ু-পথের প্রতিক্রিয়ার ত্রায় শুদ্ধকাল লক্ষণাঘ্নিত স্বরভঙ্গে উপকার দর্শে।

**মানসিকরোগ।**—কার্য্য করিতে একেবারে অপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত আলস্ত ও উদাস্ত; মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অবিলম্বে শব্দ না জুটাই; পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, প্রধানতঃ অতিশয় বিষমতা; ত্রাণ্ডি পানের দুর্দ্দমা প্রবৃত্তি;—এই সকল লক্ষণে কোকা ব্যবহুয়।

**অনিদ্রা।**—স্নায়বীয় কারণে নিদ্রাহীনতা, ভ্রান্ত-দৃষ্টি, প্রলাপ, কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অনিদ্রা; ভয়নিদ্রা, বারবার জাগরণ, অপ্রীতিকর স্বপ্ন, ও অবিরত ঘর্ষ; কোকার প্রয়োগ-লক্ষণ।

**শিরোঘূর্ণন।**—হাঁটিবার সময় পড়িবার আশঙ্কা; শিরোঘূর্ণন সহকারে হাঁটিবার সময় অনিচ্ছায় দ্রুত পদ-নিষ্ক্ষেপ; শিরোঘূর্ণন সহ সম্মুখদিকে মস্তকের অবনতি ও পতনশঙ্কা; বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণন অসুভব বশতঃ মানসিক পরিশ্রমে অশক্তি; এবং মস্তকের পৃষ্ঠে প্রচাপন ও শ্রান্তি সংযুক্ত শিরোঘূর্ণন লক্ষণে কোকা ব্যবহার্য্য।

**অগ্নিমান্দ্য।**—চা ও কাফির অগ্নিমান্দ্যজনিত হৃদ্যাহে কোকা ব্যবহৃত হয়। চা ও কাফির এবং সম্ভবতঃ আফিমের গৌণফলেও ইহা প্রতিহারক স্বরূপ উপকার করিতে পারে। ( পাঁচদিন পর্য্যন্ত কুড়িফোঁটা মাত্রায় ইহার অরিষ্ট সেবনে পরীক্ষাকারীর বিলক্ষণ অগ্নিশক্তি জন্মিয়াছিল )।

**চক্ষু-রোগ।**—কোকার লক্ষণে চক্ষুর সম্মুখে খেতচিহ্ন, কৃষ্ণচিহ্ন, ও অগ্নি-চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অতএব চক্ষুর কোন কোন স্নায়বীয় রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ( প্রত্যেক বস্তু শুভ্র দর্শন ক্লোরালের লক্ষণ )।

**শ্বাস-কৃচ্ছ্র।**—শ্বাস স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত্তে যন্ত্রণাপ্রদ শ্বাস-কৃচ্ছ্র, এই ঔষধে দূরীকৃত বা উপশমিত হয়। ষাঃতার্য্য বৎসামাত্র শারীরিক পরিশ্রমে সহজে বেদম হইয়া পড়ে, এক্রপ দুর্বল ব্যক্তিদিগের শ্বাস-কষ্টেও এতদ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে। ফুসফুসের বায়ুসঞ্চয়েও ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রসূ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্রও ইহা উপকারী।

— **চর্ম্ম-রোগ।**—একব্যক্তির হাতের পিঠে তিনবৎসর যাবৎ শুষ্ক অপচ্যমান পীড়কা ছিল। কালী-ব্রোম, সলফ-এসি, ক্লোর-এসি, প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে কোন উপকার দর্শিয়াছিল না, অবশেষে কোকা সেবনে উহা আরোগ্য পাইয়াছিল।

মাত্রা।—ডাঃ হেল বলেন যে খাস-কুচ্ছে কোকার মাতৃকারিষ্ট ও অত্যন্ত যোগে ঘট  
বা ব্রিঙ্কম অধিক উপযোগী।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মস্তকের মূহ উত্তেজনা; অবাস্তব দৃষ্টি (এনা, হাইও, ট্রাম)। উদ্বিগ্ন  
কল্পনা; অদ্ভুত দৃশ্য (\* ক্যান-ইও)। সজীব ভাব; মানসিক পরিশ্রমের প্রযুক্তি (এন্স,  
কফি, ল্যাক)। বিমর্ষতা, আশঙ্কাপূর্ণতা; কোপনতা; বিষন্নতা। মনের অধিকতর  
পরিচ্ছন্নতা; চিন্তের অধিকতর প্রসন্নতা। অতিশয় পরিবর্তনশীল ভাব (এক, অর, \* ইয়ে,  
\* নক্স-ম)। মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলা; শিরোধূর্ন। শিরঃপীড়া; কপালে পূর্ণতা  
ও প্রচাপনী বেদনা। সম্মুখভাগে অতীব শিরঃপীড়া; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে উহাস শাস্তি।  
এক শব্দ হইতে অল্প শব্দ পর্য্যন্ত যেন কপালের উপর একগাছি ফিতা প্রসারিত রহিয়াছে  
এপ্রকার অনুভব (জেল, চেলি, মার্ক, \* নাই-এসি) শব্দদ্বয়ে প্রচাপনী বেদনা। মস্তকের  
পশ্চাত্তাগে প্রচাপনী বেদনা (জেল, নক্স); বোধ হয় যেন এক কর্ণ হইতে অল্প কর্ণ পর্য্যন্ত  
পেঁচ-কলে অঁটিয়া রাখা হইয়াছে। চক্ষু।—চক্ষুতে চাপ ও বেদনা। চক্ষুর পাতার  
ভারিত্ব (কষ্ট, কোনা, জেল, ট্রাট-কা)। অতিশয় আলোকাভ্র ও প্রসারিত কনীনিকা  
(\* বেল)। চক্ষুর সম্মুখে অগ্নি-শিখা ও অগ্নি ফুল্লিঙ্গ দর্শন (এগা, সাইক্রে, মার্ক, \* ফস,  
\* সল)। কর্ণ।—শ্রবণ শক্তির কষ্টপ্রদ স্মৃতিভ্রতা (কফি, ওপি) কর্ণে সঙ্কীর্ণতা, গর্জন,  
ও ঘণ্টাধ্বনির শ্রায় শব্দ (সিক্স, মার্ক)। নাসিকা।—হাঁচি, নাকদিয়া পরিষ্কার জল  
নিঃসরণ। নাসা-রন্ধ্রে উত্তাপ ও উপদাহ। মুখ-মধ্য।—জাগরণান্তে মুখের শুষ্কতা।  
মুখে লবণাক্ত, আঠা আঠা, তিক্ত আশ্বাদ (\* ব্রাই, \* নক্স, \* সিক্স, \* সল)। গল মধ্য।  
—প্রধানতঃ প্রাতঃকালে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দলাদলা, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা। গল-কোষ  
ও গল গহ্বরে কণ্ডূর্ন। আমাশয়।—অতিশয় ক্ষুধা; আহারের ইচ্ছার অভাব। \*  
গুরুতর পরিশ্রম কালেও আহারের প্রার অপ্রয়োজন, অথচ বিলক্ষণ ক্ষুধা। অতিশয়  
পরিভূক্তি। পরিপাকক্রিয়ার সত্ত্বরতা। উদগার। আমাশয়ে শূন্যতাবৃত্ত (কারলস,  
হাইড্রাস, \* ইয়ে সিপি, সলফ)। উদর।—অতিশয় অন্ব-কুঞ্জন সহ উদরের  
ক্ষীততা; শূল-বেদনা; অধিক বায়ু নিঃসরণ (\* সিক্স, \* কার্কে, \* লাই, \* সল)। মল।  
—মল-বেগ, তৎপরে স্বাভাবিক মল নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ। মূত্র-যন্ত্র।—বিবর্দ্ধিত মূত্র-  
নিঃসরণ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রতাগ (ফস-এসি)। মূত্রের অতরল পদার্থের লাঘব। মূত্রে  
পীড়াভ লোহিত বা কমলারঙ্গের অধঃপতিত পদার্থ। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) তুর্ললতা;  
ইক্রিয় স্তম্ভ ভোগের স্বপ্ন সহকারে শুষ্কতাব (এগ, \* সিক্স, কোনা, ফস, ফস-এসি)। (স্ত্রী)  
—বিলম্বের পর ছড়ছড় করিয়া রক্তঃ নিঃসরণ ও তর্জ্জগ গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরণ। শ্বাস-  
যন্ত্র।—কণ্ঠনালী ও স্বরযন্ত্র কণ্ঠযুক্ত হইয়া কাসের উদ্বেক। কণ্ঠনকর কাসের ঠন

ঠান, শব্দ। পুরাতন ঐতিহ্যের জায়, আঠা আঠা, জীবৎ শুভ্র, পীতম্বর্ণ স্নেহা নিঃস্রবণ বিশিষ্ট প্রাতঃকালীন কাস। উচ্চহানে উঠিতে হাঁপাইতে হয় না। গভীর নিঃস্রবণ গ্রহণের ইচ্ছা সহকারে অবিরাম শ্বাস-ক্লান্ত। বক্ষঃস্থলে ও সমস্ত শরীরে অতিশয় স্বচ্ছন্দতা; দ্রুত গতিতে হাঁটবার ইচ্ছা সহকারে সজীবতা ও সবলতা অমূল্য। বক্ষঃস্থলের গোরব। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের দ্বায়বীয়-স্পন্দন (এসাক, কফি, ককু, ইয়ে)। নাড়ীর দুর্বলতা ও বিবদ্ধিত বেগ, ধমনীর অশিথিলতার বৃদ্ধি। দেহ।—অত্যন্ত আহার-নিদ্রা সত্ত্বেও অতিশয় শারীরিক তেজ ও সহিষ্ণুতা। দ্বায়বীয় উত্তেজনা, তৎপরে পরিশেষে দুর্বলতা, কাম্পন, ও অবসন্নতা (সিক)। পর্বতারোহণ কালে অতিশয় লঘুতা ও শ্বাসের উপদ্রব-পরিশুদ্ধতা অতিশয় শ্রান্তি, ক্লান্তি ও নিদ্রানুতা (কোকাপাতা চর্ষণ-কারীরা অন্তিমের সর্বাঙ্গীন ক্ষয়-রোগে মরে)। পুরাতন নিদ্রাশূলতা (সিমি, কফি, হাইও, ওপি)। অনাবৃত বায়ুতে ও আহারান্তে সমস্ত লক্ষণের উৎকর্ষ।

সমৃদ্ধ।—কফি। অন্যান্য দেশের লোকেরা যেমন কফি, চা, ও তাম্রকূট (দোন্ডা) সেবন করেন, দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা সেইরূপ কোকা সেবন করিয়া থাকেন।

## কোডিন।

কোডিন অহিফেনের একপ্রকার বীৰ্য। ডাঃ মার্সী ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরীক্ষা-লক্ষণগুলি অধিকাংশই মফিয়ার অরূপ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

পেশী-স্পন্দন।—এতদ্বারা চক্ষুর পেশীর বিশেষতঃ অক্ষিপুটের স্পন্দন জন্মে ও আরোগ্য হয়। ক্রোচস সেবনেও উহা কখন কখন প্রশমিত হইয়া থাকে। পাঠান্তে উভয় অক্ষিপুটের স্পন্দন ডাঃ মার্সী এই ঔষধের পঞ্চম ক্রম ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ হেল সচরাচর হাইওসায়েরাস প্রয়োগ করিয়া এই লক্ষণ দূর করিয়া থাকেন। যক্ষ্মা।—যক্ষ্মা রোগের রাত্রিকালীন কাসেও ডাঃ মার্সী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ডাঃ ফ্যারিংটন এই রোগের দিবারাত্রি বিরক্তিকর শুষ্ককাসে কোডিন উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাশয় ও সোলার প্লেসসের তীব্র স্নায়ু-শূলেও ইহার উপকারিতার কথা উল্লেখিত আছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মনঃ।—অতিশয় মানসিক উৎফুল্লতা। মন্দ মন্দ শিরোবেদনা সহকারে চিন্তের অবসন্নতা। মনোনিবেশে অশক্তি। মস্তক।—মস্তকে উত্তাপ। প্রাতে উঠবার এক পূর্বেই অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বামদিকে উহার অতিশয়, ও প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবস্থিতি।

অপরূপে দক্ষিণ শব্দেইলে দপদপকর বেদনা । নাসা-পথে সবলে বায়ু নিঃসরণে শিরোহুর্গন  
 \* প্রাতে উথানান্তে যুহু শিরঃপীড়া ও মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত উহার অবস্থিতি । ০ শ্রান্তি ও  
 অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনাজনিত শিরঃপীড়া । মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডল ও মস্তকের  
 কণ্ডুয়ন ও উত্তাপ এবং উহার সর্বশরীরে বিস্তৃতি । চক্ষু ।—\* বায়ু অক্ষিপুটের  
 আপনাপনি স্পন্দন, ঘর্ষণে কখন কখন উহার শান্তি । চক্ষু জ্বালা অল্পতব, বায়ুচক্ষু  
 উহার আধিক্য । \* পড়িতে বা লিখিতে চেষ্টা করিলে উভয় অক্ষিপুটের স্পন্দন । নাসিকা ।  
 —সম্পূর্ণ ভ্রাণাভাব । মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—ওষ্ঠরয়ের পরিণততা । অপরূপে ও সায়াক্ষে  
 সন্ধিতে নিবন্ধ, অতিশয় বেদনা ও ক্ষীণতা । পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধির তরুণ বাত । অঙ্গে  
 বিশেষতঃ পায়ে বেদনা । চর্ম্ম ।—গাত্রের শীতলতা সহ সারারাত্রি প্রবৃত্ত ঘর্ম্ম । নিদ্রা ।  
 —প্রচুর ঘর্ম্ম সহ অতিশয় নিদ্রালুতা । জ্বর ।—হৃৎপিণ্ডের বিবর্জিত ক্রিয়া ; দ্রুত ও পূর্ণ  
 নাড়ী । বিশেষ লক্ষণ ।—সমস্ত সন্ধিতে বেদনা । পদ-তলে খল্লী, দক্ষিণ পদে উহার  
 আতিশয়া, তৎসহ বায়ু পদের অঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে জ্বালা ও বেদনা । পদাঙ্গুলিতে ঝাঁজিলাগার  
 ছায় যাতনা । পদ-তলে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ সর্বশরীরে প্রবৃত্ত ঘর্ম্ম ।

সমগুণ ।—একন, এসক্লি টিউ, এসি-বেজ, কলোফা, কলচি, সিমিসি, আইরিস, পডো ।

## কোপেবা ।

কোপেবা ব্রেজিলদেশজাত কোপাইফরা বৃক্ষের তৈল ও ধূনাংসযুক্ত রস । এবসোলিউট  
 একোহলে কোপেবা দ্রবীভূত করিয়া ইহার হোমিওপ্যাথিক অরিট প্রস্তুত হয় ।  
 অতিমাত্রায় কোপেবা সেবন করিলে মূত্র-বস্ত্রের শৈথিল্যে উপদাহ জন্মে । বৃক্ক ও  
 মূত্রাশয়াদি অপেক্ষা মূত্রমার্গেই ইহার বিশেষ প্রভাব প্রকাশ পায় । অত্যাশ্রয় শৈথিল্য  
 বিল্লীর এবং চর্মেও কিয়ৎপরিমাণে কোপেবার ক্রিয়া দর্শে । এতদ্বারা স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর  
 উপদাহ জন্মে ; এবং অণ্ডের ক্ষীণতা ও বাতাদি প্রমেহের গৌণ লক্ষণও উপস্থিত হয় ।  
 ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে প্রথমে শৈথিল্যে, অনন্তর আমাশয়ে ও অস্ত্রে, এবং  
 অবশেষে চর্মে কোপেবার ক্রিয়া প্রকাশ পায় । চর্মে ইহার ক্রিয়া বশতঃ আৱস্ত ভূমির  
 উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ উদ্ভেদ ; শীতপিত্ত ; ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময় প্রাবলিশিষ্ট বিধিকা  
 ( পক্ষিগস ) উৎপন্ন হয় ।

ক্রিয়া ।—মূত্র-বস্ত্র ও জনন-বস্ত্রে ; পরিপাক-বস্ত্রে ও স্বর্কে ; বিশেষতঃ মূত্র-বস্ত্রে  
 কোপেবার ক্রিয়া দর্শে ।

অধিকার ।—মূত্র-বস্ত্রের প্রাতিভাদিক ( ক্যাটারাল ) পীড়ায় ; অতিশয়ে  
 রক্তাতিসারে, ও চর্ম্ম-রোগাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

**স্বাস।**—মস্তক অবনত করিয়া খননাদি কাজ করিবার সময় বক্ষঃস্থলে গৌরব ও শ্বাসে আসিল; বৃদ্ধাঙ্কিতে চাপ; ও মন্দ মন্দ নিঃশ্বাস কোপেবার লক্ষণ। **স্বরভঙ্গ।**—স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ প্রাতে স্বরভঙ্গ, ও কথা বলিবার সময় স্বরবন্ধে অবদরগবৎ ঝাঁতনা; নিয়ন্ত্রণে কথা বলা যায়; কিন্তু উচ্চস্বরে কথা বলিতে বেদনা লাগে; গুরু, ককর্ষ কাস, ও আশ্বাসে হরিতাভ শ্লেষ্মা-নিষ্টিবন লক্ষণে কোপেবা ব্যবহৃত হয়। **শ্বেতপ্রদর।**—প্রমেহ জনিত শ্বেত প্রদর; পীতবর্ণ পুষ্পস্রাবী প্রমেহ; রক্তমূত্র; ইহার লক্ষণ। **ডিম্বাশয়ের।** **রোগ।**—প্রমেহজনিত ডিম্বাশয়ের পীড়া; দাঁড়াইলে দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেঁশে দগদগ। **প্রফেট-গ্রন্থির প্রদাহ।**—ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ; প্রফেট গ্রন্থিপ্রদেশে জ্বালা ও পরিশুদ্ধতা অল্পভব; প্রফেট-গ্রন্থির কঠিনতা। **মূত্র-কুচছ।**—মূত্রাশয়ের অতিশয় উপদাহ; মূত্র-থল্লের প্রদাহ; মূত্র-মার্গের মুখের বিস্তৃতি ও ক্ষীণতা, এবং সমগ্র উপস্থেয় অভ্যন্তর দিয়া দগদগকর বেদনা; অবিরত নিষ্কল মূত্র-প্রবৃত্তি; ফোঁটা-ফোঁটা মূত্র-নিঃসরণ; কেণল মূত্র; হরিতাভ, আবিল ভাইওলেট ফুল বা কোপেবার গন্ধবিশিষ্ট মূত্র। **কাস।**—হৃগন্ধ, কখন কখন রক্তমিশ্রিত, প্রভূত, হরিতাভ ধূসর বর্ণ পুষ্পাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্টিবন বিশিষ্ট কুস্কুসের পুরাতন প্রতিশ্রায় রোগে কোপেবা ব্যবহৃত হয়। **অতিসার।**—অনিচ্ছায় অধিক পরিমাণে জলবৎ মল নিঃসরণ; প্রাতে উহার আধিক্য, ও ক্ষুধার অভাব, বিবিম্বা ও বমন; প্রাতে শ্বেতবর্ণ, প্রভূত আময়, আঠাশূন্য মল;—এই সকল লক্ষণে অতিসারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মলবারে প্রবল জ্বালা, কুহন ও অস্ত্রের প্রতিশ্রায়, রক্ত-পাত লক্ষণাপন্ন রক্তাতিসার। **প্রমেহ।**—মূত্রে ভাইওলেট পুষ্পের গন্ধ; অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি সহকারে পীতবর্ণ পুষ্পস্রাব নিঃসরণ; ও গাত্রে শীতপিত্ত কোপেবার প্রয়োগ-লক্ষণ। **ডাঃ ইয়েলডাম** প্রমেহ রোগের প্রদাহিত অবস্থায় এই ঔষধের প্রথম ক্রম; ১০—২০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কোপেবার বিব-ক্রিয়ায় অণ্ডের ক্ষীণতা, ও বাতাদি প্রমেহের গোণ লক্ষণও প্রকাশ পায়। প্রমেহের পরবর্তী মূত্রাশয়ের প্রতিশ্রায়েও ইহা উপযোগী। **ডাঃ হিউজ** বলেন যে বৃদ্ধা জ্বীদিগের মূত্র-মার্গ ও মূত্রাশয়-গ্রীবার উপদাহ ও উজ্জ্বলিত স্রাব নিঃসরণে কোপেবা বিশেষ উপযোগী। **চর্ম্ম-রোগ।**—কোপেবার বিব-ক্রিয়ায় শীতপিত্ত ( আটিকেরিয়া ) জন্মে, এজন্ত আটিকেরিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুষ্ক প্রভূতি কুদ্রব্য ভোজন জনিত শীতপিত্তেই ইহা উপকারী। **ডাঃ ডেসো** বলেন বালকদিগের পুরাতন শীতপিত্তরোগে একবিন্দু মাত্রায় কোপেবা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশ্লক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রবল শীত, শিরোবেদনা, ও সর্কস্কীর্ণ ঘনি; আরক্ত-উত্তপ্ত ত্বক্ সর্কস্করীয়ে শীতপিত্ত, প্রলাপ, তন্দ্রালুতা, মলিন, ইষ্টক চূর্ণের ত্রায় অধঃক্ষেপ সংযুক্ত, স্বল্প মূত্র; **ডাঃ লিলিয়েমাল** আটিকেরিয়ায় কোপেবার প্রয়োগ-লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মল ।—মানসিক পরিশ্রমে সম্যক অল্পপয়ুক্রতা ; বিমর্ষতা, জীবনে পর্য্যাপ্ত বিরক্তি ।  
 মস্তক ।—শিরোধ্বনি ; শিরোবেদনা ও মস্তকের জড়তা । মস্তকের কেশাবৃত তাগের  
 অতিরিক্ত অল্পভূতি ; কেশ-পতন । রক্ত-সঞ্চয়িত গৌরববিশিষ্ট শিরোবেদনা, কপালে  
 ও শঙ্খ-স্থলে বেদনা । চক্ষু ।—আরক্ততা ; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা । কর্ণ ।—রাত্রিতে  
 কর্ণে বেদনা, পুষ্পময় শ্রাব নিঃসরণ । নাসিকা ।—বাথিততা ; অবরুদ্ধতা । বদন ।—  
 পাণ্ডুরতা ; ক্ষীততা ; গণ্ডদ্বয়ে ছেদনকর বেদনা । রক্ত সঞ্চলন-যন্ত্র ।—হৃৎকম্প । প্রাতে  
 শীত ; অপরাহ্নে উত্তাপ ; রাত্রিতে অল্প ঘর্ম্ম । শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও  
 থরস্পর্শতা ; স্বরের ভগ্নতা ; শ্বাসের মন্দতা । স্বর-যন্ত্র কণ্ঠস্থিত হইয়া কাসের উদ্রেক ;  
 শুভ্রবর্ণ নিষ্টিবন । বক্ষঃস্থলে জ্বালাকর বেদনা । মুখ-মধ্য ।—শুষ্কতা, অধিক শ্লেষ্মা ;  
 দন্ত-বেদনা ; জিহ্বা যেন শীতল হইয়াছে এপ্রকার অনুভব ; গল-মধ্যের ক্ষীততা ও  
 ব্যথিততা । তিক্তস্বাদ । আমাশয় ।—ক্ষুধার পরিবর্তনশীলতা ; কতকটা পিপাসা ।  
 উদগার, বিবমিষা, বমন ; প্রচাপনবৎ জ্বালাকর বেদনা । উদর ।—যক্ষতে বেদনা ।  
 কুঞ্জন ও আত্মান ; ক্ষীততা ; কর্তনবৎ বেদনা ; রক্তশ্রাবী-অর্শ । মল ।—পাতলা,  
 বেদনাসংযুক্ত রক্তাক্ত মল ; প্রাতঃকালীন অতিসার ; কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ ; মলদ্বার হইতে  
 রস-ক্ষরণ । মূত্র-যন্ত্র ।—মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও মূত্রমার্গে জ্বালা ; সতত যাতনাসংযুক্ত  
 আবেগ । স্বপ্ন, রক্তাক্ত, শ্লেষ্মাময় মূত্র ; মূত্রে উগ্র গন্ধ । জননেন্দ্রিয় ।—( পুং )  
 উপদাহ ; লিপ্সা ; উদ্যম ; অণ্ডের ক্ষীততা ; দুর্বলতাাদি । ( স্ত্রী ) উপদাহ ; অতি  
 শীঘ্র শীঘ্র প্রভূত রক্ত-শ্রাব ; ভগ-কণ্ঠ্যয়ন ; জরায়ুর আক্ষেপ ; ডিম্বাশয়ে বেদনা ; প্রদর ।  
 ত্বক্ ।—দারুণ কণ্ঠ্যয়ন ও স্থানে স্থানে জ্বালা । অরুণিমা, শীতপিত্ত, পচ্যমান পীড়কাদি  
 শুষ্ক ও আর্দ্র উদ্বেদ । নিদ্রা ।—দিবাকালে নিদ্রালুতা ও তন্দ্রালুতা ; রাত্রিতে নিদ্রা-  
 শূন্যতা ; কাম বিষয়ক স্বপ্ন । দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—স্নায়বীয় দুর্বলতা ; অত্যন্ত  
 অল্পভূতি । শ্রান্তি ; দুর্বলতা ; হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ । পৈশিক দুর্বলতা ; কম্পন ;  
 স্পন্দন ; বেদনা । আমবাতিক বেদনা । গ্রীবা ও কটির শুষ্কতা । অবশতা, অঙ্গের  
 কম্পন ; ও বেদনা, জাহ্নুদ্বয়ের বিশেষ আক্রান্ততা । উপচয় ।—প্রাতে বৃদ্ধি । উপশম ।  
 —বিচরণ কালে হ্রাস । বিশেষ লক্ষণ ।—শীত ও উত্তাপ ; তৎপরে সীমাবদ্ধ মন্থরাকার  
 তালীতালীর শ্রায় উদ্বেদ, উহাতে কণ্ঠ্যয়ন ও কণ্ঠক-বেদন ; শঙ্কপাত-পরিশৃঙ্খ বিচিহ্ন  
 আকৃতি । মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও মূত্রমার্গে জ্বালা ( কাছ ) । ভগ-কণ্ঠ্যয়ন । কোষ্ঠ-রোগ ও  
 অরসহকারে বড় বড় লোহিত বর্ণ দাগ ( এপিস ) ।

সমগুণ ।—কলোস, আইরিস, কলচি, বেল, প্লম ।



## কোরাইডেলিস কৰ্মোমা ।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমেরিকায় জন্মে । ইহাকে টর্কি-করণও বলে । ইহার সরস মূলের অরিষ্ট ও শুষ্ক মূলের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় । কোরাইডেলিস পরীক্ষিত হয় নাই ।

উপদংশজনিত করোটিক কঠিন অর্কুদ ; মস্তক-ত্বকের উপদংশজ ও গণ্ডমালাজ উদ্ভেদ ; গল-গহ্বরের উপদংশজ ক্ষত ; মুখ-মধ্য ও গল-গহ্বরের পুরাতন ক্ষত ; মুখ্য ও গৌণ উপদংশ ; রাত্রিকালীন বেদনা বিশিষ্ট উপদংশজ অর্কুদ এই ঔষধে আরোগ্য করে বলিয়া উল্লেখিত আছে ।

খণিজ ঔষধের সহিত কতকগুলি উদ্ভিদ ঔষধের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায় । রসায়নশাস্ত্র-বিদ পণ্ডিতগণ বিশ্লেষণ পূর্বক আজিও ইহার কারণ নির্ধারণ করিতে পারেন নাই । পারিবারিক বো নাই । বোধ হয় কাইটোলাক্স ও মারকিউরিয়স ; আইওডাইড অব পটাস ও ট্রিলিজিয়া ; এবং অরম ও কোরাইডেলিসের চরম পরমাণুর সহিত সাদৃশ্য আছে ; তজ্জন্মই ইহাদের ক্রিয়া ও আরোগ্য-শক্তির উদৃশ্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

উপদংশ ।—উপদংশজনিত করোটিক কঠিন অর্কুদ ; গল-গহ্বরের ক্ষত ; প্রভূত বিকৃত শ্লেষ্মা নিঃস্রব ; লেপাবৃত জিহ্বা, ও দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েম্বাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । ডাঃ হেল বলেন যে ছইজন রোগীর দীর্ঘস্থির কঠিন অর্কুদে প্রায় একবৎসর পর্যন্ত অধিক মাত্রায় আইওডাইড-অব-পটাস সেবনে কোন উপকার না দর্শাতে তিনি কোরাইডেলিসের অরিষ্ট দশবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ধীরে ধীরে কিন্তু একেবারে সেই অর্কুদ অন্তর্হত হয় । তিনি মনে করেন যে প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থাপ্রাপ্ত উপদংশেই এই ঔষধ সমধিক উপযোগী । কোলিক উপদংশেও ডাঃ হেল ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দেন । গণ্ডমালা ।—গণ্ডমালা-জনিত দুর্দম্য চর্মরোগে অগ্নিমান্দ্য ও রক্তের হীনাবস্থা থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে । উপদংশ ও গণ্ডমালা সমবেত থাকিলেও ইহা ফলপ্রদ । আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায় ।—অধিক মাত্রায় কোরাইডেলিস সেবনে আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে বিকৃত শ্লেষ্মা অর্থাৎ আম নিঃস্রবণ, সর্বদা জিহ্বার অপরিচ্ছন্নতা, খাসের দুর্গন্ধ, ক্ষুধাহীনতা, ও জীর্ণশক্তির লাঘব জন্মে অতএব আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায় হাইড্রাণ্ডিসের ত্রায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হয় । সবিরামজ্বর ।—সবিরাম জ্বর জনিত ধাতু-দোষে গ্রীহা ও বহুৎ বিবর্জিত থাকিলে এবং রোগী দিনদিন জীর্ণনীর্ণ হইয়া পড়িলে কেবল কোরাইডেলিস বা কোরাইডেলিস ও হাইড্রাণ্ডিস পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে ।

## ক্যালোট্রিপিস জাইগাণ্টিয়া ।

ক্যালোট্রিপিসকে সংস্কৃতে অর্ক, বাঙ্গলায় আকন্দ, এবং হিন্দীতে মাদার বলে । পুষ্পের বর্ণ-ভেদে অর্ক দুই প্রকার । রক্তপুষ্প আকন্দ অর্ক ও শ্বেতপুষ্প আকন্দ অলর্ক নামে অভিহিত হয় । আয়ুর্বেদমতে আকন্দমূলের বৃক্ক চর্ম্মরোগ, প্লীহাদি উদরস্থিত যন্ত্রের বৃদ্ধি, ক্রমি, কাস, শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আকন্দের দুগ্ধবৎ রস অতিবিরেচক ; ইহার ফুল আশ্লেয় ও বলকর ; এবং কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যার ও অগ্নিমান্দ্যে উপকারী । ডবলিন নগরের মেঃ আইভাটস হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন । ইহার মূলের অরিষ্ট গ্রন্থত হয় । হোমিওপ্যাথিমতে নিম্নলিখিত রোগে ক্যালোট্রিপিস ব্যবহৃত হইতে পারে । বক্ষোরোগ ।—আরোগ্যশাবিহীন একজন ক্ষয়কাসের রোগী, প্রথম দশমিক শক্তির ক্যালোট্রিপিস সেবনে প্রভূত পরিমাণে ( প্রায় দশছটাক ) পীতবর্ণ পূষ্ময় নিষ্ঠীবন নির্গত হইয়া আরোগ্য লাভ করে । তাহার স্ত্রী মনে করিয়াছিল যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু হইবে । আরও তিন জনের বক্ষোরোগে এই প্রকার ফল দর্শিয়াছিল । দুইজন বৃদ্ধের ব্রঙ্কাইটিস রোগও এই ঔষধে কতকটা চরম ( ক্রাইসিস ) অবস্থা উপস্থিত হইয়া আরোগ্য হইয়াছিল । এবিষয়ে এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকমের সহিত ক্যালোট্রিপিস জাইগাণ্টিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্যালোট্রিপিসের ক্রিয়া এন্ট-টার্ট অপেক্ষা সমধিক প্রবল ও দ্রুত । মেদরোগ বা স্থূলত্ব ।—একজন রোগী তিনমাস এই ঔষধ সেবন করাতে তাহার স্থূলত্ব কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুত্ব ( ওজন ) কমিয়াছিল না । মাংস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কোন অপকার হইয়াছিল না ; বরং পেশীগুলি শক্ত ও স্পৃহিত হইয়াছিল । আরও কয়েকজন রোগীর এই প্রকার ফল দর্শিয়াছিল । গাউট ।—পদের গাউটরোগে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে । কুষ্ঠ ।—ডাঃ মার্সী লিখিয়াছেন যে হস্তের শীর্ণতা, হস্তাঙ্গুলীর ক্ষয়প্রাপ্তি ( খাইয়া যাওয়া ) ; পদাঙ্গুলীর অবশতা, চিকণতা, ক্ষীণতা ও প্রায় অনম্যতা ; পদতলের বিদীর্ণতা, পরিণুক্ততা, ও কঠিনতা ; পদ-নখের নীচে চিপটিকা, অনন্তর ক্রমে ক্রমে নখের উত্থিতি, তৎপরে বেদনাশূণ্য ক্ষতের উৎপত্তি ; জন্মার ক্ষীণতা, ত্বকের সকল স্থানেই বিদারণ ও কল্কশতা ; পদাঙ্গুলীর সন্ধির ভিতরের দিকে ক্ষতোৎপত্তি, অবশেষে স্থলিত হইয়া অঙ্গুলীর পতন ;—এই সকল লক্ষণে ক্যালোট্রিপিস ব্যবহৃত হয় । উপদংশ জনিত কুষ্ঠও এই ঔষধের অধিকার বহির্ভূত নহে । ডাঃ লিলিচেছাল বলেন সঙ্গটিক কুষ্ঠ ; আলস্ত ও নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি ; উঃসাঃের অভাব ; ঔদাস্য ও কৈশিকা নাড়ীর অবরোধ ; সর্ব্বশরীরে অসহ্য কণ্ডুয়ন ; এই ঔষধের লক্ষণ । শ্বেতকুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক নীরক্তভাষ ও রোগের প্রবর্তিত অবস্থায় এই ঔষধের অতিশয় প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ্য । এই রোগে ইহার মাদার টিকার এক হইতে পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার

ব্যবহৃত হয়। বৃক (লুপস)।—একজন যুবকের দশবৎসর স্থায়ী গণ্ডস্থলের বৃক-রোগাকার উদ্বেদ এই ঔষধের প্রথম ক্রম সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। এই যুবক চৌদ্দদিন, পর্য্যন্ত মাটিতে পা রাখিতে পারিত না।

## গসিপিয়ম হার্বেশিয়ম ।

গসিপিয়ম কার্পাসের বৃক্ষ। ইহার মূলের অরিষ্ট ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা একবার ভিন্ন ভিন্নরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। গসিপিয়মের অন্তর্ভুক্তির এক পাই-ট উগ্রকায় পানে গর্ভপাত হয় বলিয়া কথিত আছে। গর্ভশাতনার্থে আমেরিকায় এক সময় ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। অত্য়াপিও গসিপিয়মের সেই খ্যাতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এতদ্বারা হুর্কলা জীদিগের গর্ভপাত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু নির্বিশেষে সকলেরই যে গর্ভ নষ্ট হয় ডাঃ হেল একথা বিশ্বাস করেন না। ডাঃ উইলিয়মসন হোমিওপ্যাথিক রীতিতে গসিপিয়মের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা এপিস, ব্রাইওনিয়া, সিপিয়া, সিকেলি, ও স্ত্রাবিনার সমগুণ মনে করেন। ইহার পরীক্ষা-লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয় যে জী-জননেজিয়ে ও তৎসংসৃষ্ট স্নায়ুতে ইহার ক্রিয়া দর্শে। এতদ্বারা ঋতুকালে ক্ষুধাহীনতা ও বিবমিষা জন্মে এবং আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনে প্রবল বমন-চেষ্টা, মুচ্ছা-প্রবণতা, জরায়ুতে স্পর্শ-দেষ; প্রাতে জাগ্রত হইবামাত্র বিবমিষার উদ্বেক, প্রথম মস্তক তুলিবামাত্র বমন, কেবল একপ্রকার গাঢ় তরল পদার্থ ও পিত্তনিঃসরণ, এবং উর্দ্ধ ও অধঃ উভয় পথে বায়ু নির্গমন লক্ষণে গসিপিয়ম ফলপ্রদ। ডাঃ উইলিয়মসন এই ঔষধে রক্ত-বিলোপ, রক্ত শূল, ও অতি রক্তঃ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ হেল বেদনা সংযুক্ত বা বেদনাবিহীন স্তন্যরক্তস্রাবে ইহা ব্যবহার করিয়া অফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। রক্তহীনতা, আমাশয়ের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা, ও হুর্কলতাবিশিষ্ট রক্ত-বিলোপে ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। বিলম্বিত, প্রায় বেদনানশূল, এবং জরায়ুর ক্ষীণ ও অকস্মাৎ আকুঞ্চনবিশিষ্ট প্রসব-বেদনায় গসিপিয়ম ব্যবহৃত হয়। অবরুদ্ধ ফুল জরায়ু-প্রাচীরে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া গেলে এবং বল-প্রয়োগে ইহা সরাইতে না পারিলে গসিপিয়ম ব্যবহার করা যায়। স্তন ঋতু, কক্ষ-গ্রন্থির ক্ষীণতা সংযুক্ত স্তনের অর্বুদেও ইহা ফলপ্রদ। গসিপিয়মের মাতৃকারিষ্ট ও নিম্নক্রমই অধিক উপযোগী।

## গ্যালিক এসিড ।

‘মাজু’ ফলের স্ফোচক বীৰ্য্যকে গ্যালিক এসিড বলে। গ্যালিক এসিড বাতালে রাখিলে অন্নজান আশোষণ করিয়া বিসমাসিত ও মলিন বর্ণ হইয়া উঠে। শত ভাগ তত্ত্ব

জলে ও এসকোহলে এই এসিড সহজে দ্রবীভূত হয়। হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। গ্যালিক এসিড ও ট্যানিক এসিডে প্রভেদ এই যে ট্যানিক এসিডে গ্যালিক এসিড অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক। অপর মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইলে ট্যানিক এসিড পরিবর্তিত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্যালিক এসিডে পরিণত হয়। সুতরাং চিকিৎসা কার্যে এক গ্যালিক এসিড দ্বারাই উভয়ের কার্য হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বৃক্ক রোগ।**—গ্যালিক এসিড শরীর হইতে বৃক্ক-পথে নিঃসৃত হয়। অতএব মূত্রযন্ত্রের রোগে এতদ্বারা উপকার দর্শিবে বলিয়া আশা করা যায়। বাস্তবিকও মূত্রযন্ত্রের কোন কোন রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ মার্সি বলেন যে অনেকগুলি পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহের রোগী প্রথমশক্তির গ্যালিক এসিড একগ্রেণ মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া স্বাস্থ্য আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অত্যাশ্রয় ঔষধ অপেক্ষা এতদ্বারা শীঘ্র বেদনা দূরীকৃত হয়। ফিলাডেলফিয়া নগরের ডাঃ কোল্লও গ্যালিক এসিডের প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহারে কতকগুলি বৃক্ক-রোগ সুন্দররূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

**রক্তশ্রাব।**—অপ্রাদাহিক রক্ত মূত্রে ডাঃ মার্সি এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন। স্ফাল্টিনা, ব্রাইটস্ ডিজিজ, ও বৃক্কের উপঘাত জনিত বৃক্কের রক্তশ্রাবে গ্যালিক এসিড ফলপ্রসূ। ডাঃ হেল মিলিফোলিয়াম, টর্পেটাইন, হেমোমেলিস প্রভৃতি ঔষধ বিফল হইলেও এতদ্বারা অনেকগুলি রোগীর নিশ্চিত উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের একগ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রচেষ্টা গ্রহণ করতঃ একজন রোগীর অনেক সময় প্রভূত রক্তশ্রাব হইত। ডাঃ হেল অল্প কোন ঔষধে ফলপ্রাপ্ত না হইয়া গ্যালিক এসিড প্রথম দশমিকক্রম ব্যবহারে সেই রক্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। অত্যাশ্রয় যন্ত্রের রক্তপাতেও গ্যালিক এসিড ব্যবহারের বিধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাঃ হেল সে সম্বন্ধে ইহার উপকারিতায় সন্দেহ করেন। ডাঃ রডক যক্ষ্মারোগে ফুসফুসের ধমনির ক্ষত বশতঃ প্রবল রক্তপাতে যে পর্য্যন্ত না রক্ত বন্ধ হয় সে পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা অন্তর ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। ক্ষয়রোগীর ফুসফুস হইতে রক্তপাতে এই ব্যবহাররূপ গ্যালিক এসিড প্রয়োগ করিয়া আমরাও একবার ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ডাঃ হানসেন ফুসফুসের দুর্দম্য পুরাতন রক্তপাতে গ্যালিক এসিডের উল্লেখ করেন। **এল্‌বুমিনুরিয়া।**—প্রদাহের অবস্থা অতীত হইলে পর এই ঔষধে মূত্র পরিবর্তিত হইয়া সূক্ষ্ম মূত্রে পরিণত হয়। কিন্তু প্রবল রক্তসঞ্চয় জনিত এল্‌বুমিনুরিয়া বা প্রবল রক্তশ্রাবে ডাঃ হেলের মতে ইহার ষষ্ঠ বা দ্বাদশক্রম ব্যবহার। **মূখ-প্রসেক।**—এই রোগে অত্যাশ্রয় ঔষধে উপকার না দর্শিলে কখন কখন গ্যালিক এসিড সুন্দর উপকার করে। এতদ্বারা শীঘ্র মুখের জ্বল নিঃসরণ নিবারণিত ও

আমাশয়ের বল বিবৰ্দ্ধিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং কাহার কাহারও কোষ্ঠবদ্ধের পর্য্যায় শান্তি জন্মে। লণ্ডন নগরের ডাঃ উইলকিন্সন বলেন যে ট্যানিক এসিডেও কোষ্ঠকাঠিন্য আরোগ্য হয়। গ্যালিক এসিডের মুখ্যক্রিয়া বশতঃই কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার যে অজ্ঞাত বৃদ্ধক-পথে নিঃসৃত হয় না অত্রে তাহারই যক্ষ্ম ক্রিয়া দর্শে যক্ষ্মা।—যক্ষ্মারোগের প্রবৰ্দ্ধিত অবস্থায় অধিক পরিমাণে পুষ্য নিজীবন, প্রভূত নৈশদৰ্শ, ও অতিসারাদি লক্ষণে গ্যালিক এসিডের প্রথমশক্তির বিচূর্ণ যাপ্যকর বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এতৎসেবনে কিছুকাল রোগপ্রশমিত ও জীবন প্রবৰ্দ্ধিত হয়। চৰ্ম্ম-রোগ।—ত্বকের নানাস্থানে কণ্ডুনেও ইহার ব্যবহার হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু।—\* আলোকাতঙ্ক, এবং অক্ষিপুটের জ্বালাকর কণ্ডুয়ন। গল মধ্য।—\* খর-স্পর্শতা, ও গলায় অতিশয় শ্লেষ্মা নিঃশ্রব। ০ গল-গহবরের পশ্চাত্তাগে ও গলায় অভ্যন্তরে; বিশেষতঃ প্রাতে মুখ ধোওয়ার পরে শ্লেষ্মার উদ্ভব। রাত্রিতে মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের পরিশুদ্ধতা, এবং মন্দ আশ্বাস। বক্ষঃস্থল।—প্রাতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে, স্বক্ৰম্যে, ও ঘাড়ের পেশীতে অবিরাম বেদনা। উদর।—রাত্রিতে উদরে আশ্বাস ও বেদনা। মলদ্বারে আকৃষ্ট অমুভব ও বৃহদাকার মল নিঃসরণ। \* মলত্যাগের পর অত্রে এক প্রকার ত্বকার ‘ক্ষুধা’ শ্রান্তি, চৰ্ম্মণ, ও বেদনার ভ্রায় যাতনা অমুভব, এবং উহার আমাশয় পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ ও বিবমিষার উৎপাদন, তৎসহকারে তথায় স্ফোচন অমুভব। ০ মলত্যাগান্তে অর্শবালয় উপদাহ। ০ অর্শবালির ক্ষীততা, টাটানি, ও স্পর্শ-দেব। মূত্রাশয়ের অস্থচ্ছন্দতা জনক প্রসারণ, এবং স্বাদশূন্য; পরিষ্কার, বিবৰ্দ্ধিত মূত্রপ্রাব। ০ বৃদ্ধক হইতে রক্তপ্রাব। বারংবার নানাস্থানের অক কণ্ডুয়ন।

সমস্ত।—জিরেণিয়ম, কাইনে, ট্যানিন, প্রমম।

### গ্ৰাটিওলা।

গ্ৰাটিওলার নামান্তর হেজ-হিপস। ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। গ্ৰাটিওলার বিষ ত্রিা বশতঃ উত্তাপ ও নিদ্রালুতা সংযুক্ত মস্তকে রক্ত-সঞ্চার; সূক্ষ্মদেশে, উত্তাপে পরিবর্তনীয় শীতামুভব; প্রভূষে জাগিবামাত্র মস্তকের পশ্চাৎ দিকে বেদনা ও উঠিলে উহার উপশম; মুখমণ্ডল যেন ক্ষীত হইয়াছে এপ্রকার অমুভব; সমস্ত বস্ত, হ্রির্দর্শগুলি পর্য্যন্ত শুভ্রদর্শন; প্রতিদিন প্রাতে উপরের ওষ্ঠের ক্ষীততা; আহাৰান্তে আমাশয়ের অতিশয় ক্ষীততা; শীতলতার দন্ত বেদনা; আহাৰান্তে অতিশয় নিদ্রালুতা ও আলস্র; আমাশয়ে একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে পথির গড়ানের ভ্রায় চাপ ও খালধরার

ভ্রায় আকৃষ্টতা, এবং সেই সময় বারংবার উদগার ও বমন-বেগ ; হরিতের আভ্যন্তরীণ পীতবর্ণ ও জলীয় অতিসারে ; মল-দ্বারের আবদ্ধন ও কণ্ডুয়ন ; হৃগ্নকমর আমনিঃসরণ সহ সরলাঙ্গ ও মল-দ্বারের অতিশয় উপদাহ ; মূত্রত্যাগের পর মূত্র-মার্গে জ্বালা ; এবং প্রবল ক্যামোম্বাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

স্নায়বীয় রোগ ।—ডাঃ টেট বলেন যে, যে সকল রোগের লক্ষণ ক্যামোম্বাদ-জ্ঞাপক প্রায় তাহাতেই গ্রাটিওলা উপযোগী । অর্থাৎ যে সকল তরুণ রোগে ক্যামোম্বাদ ব্যবহৃত হয় তাহারই পুরাতন অবস্থায় গ্রাটিওলা-ব্যবহৃত করা যাইতে পারে । উম্বাদ, ক্যামোম্বাদ, পানাতায় প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগে এতদ্বারা উপকার দর্শে । তিনি প্রায়ই কষ্টিকমের পরে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন । অতিসার ।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গ্রাটিওলা পিচকারীর জলের দ্বারা সবেগে নিঃসৃত, পীতভ জলবৎ অতিসার জন্মায় ও আরোগ্য করে । গ্রীষ্মকালে, অধিক পরিমাণে শীতল বা অশীতল জলপানে এই প্রকার অতিসার সাধারণতঃ উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে । অতিসারে ক্রোটন টিলিয়ম, ইলেটেরিয়ম, পডোফিলম প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার সঙ্গীত লক্ষিত হয় । স্নায়ু শূল ।—ডাঃ মার্সী বলেন যে বহুকাল কফিসেবন জনিত স্নায়ু-শূলে গ্রাটিওলা ফলপ্রদ ।

## গ্রিঙিলিয়া ।

গ্রিঙিলিয়া কম্পোজিটা জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ । ইহা কালিকর্ণীয় জন্মে । গ্রিঙিলিয়া দুই প্রকার, যথা, গ্রিঙিলিয়া রোবট্টা ও গ্রিঙিলিয়া স্কোয়ারোসা । ইহাদের গাত্রে একপ্রকার ধূনা আছে । ইহারা উভয়েই একজাতীয় এবং মানবদেহে ইহাদের ক্রিয়াও সম্পূর্ণ একরূপ । শৈল্পিক বিজ্ঞীতে ও দায়ুগুণ্ডলে ইহাদের উভয়ের একপ্রকার ক্রিয়াই দর্শে ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

শ্বাস-কাস ।—( স্যাক্সমা ) ।—স্নেহাস্রাবী শ্বাসরোগে গ্রিঙিলিয়া রোবট্টা বিশেষ ফলপ্রদ । এই প্রকার শ্বাস সাধারণতঃ প্রতিশ্রাবজনিত ব্রঙ্কাইটিস হইতে উৎপন্ন হয় । প্রথমতঃ ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-নলীভূজে হৃৎস্থ স্নেহা সঞ্চিত হয় । রোগী মনে করে যে কাস উঠিলেই সে শান্তি পাইবে । অনন্তর রোগ বতাই পুরাতন হইতে থাকে ততই শ্বাস-ক্রিয়া-নিয়ামক দায়ুর অতিশয় উপদাহিতা জন্মিয়া আক্ষেপ উৎপন্ন হয় । ইহাকেই আক্ষেপিক শ্বাস-রোগ বলে । গ্রিঙিলিয়া রোবট্টা এই প্রকার শ্বাস-রোগে ও দীর্ঘ অবস্থায় স্নেহ উপযোগী । বিশুদ্ধ স্নায়বীয় শ্বাসে অর্থাৎ যে শ্বাসে বায়ু-নলীভূজগুলির

গোলাকার পেশী-তন্তুর পক্ষাঘাত বশতঃ বায়ুনলীর শিথিলতা জন্মিয়া অনায়াসে নিঃশ্বাস ও অনায়াসে প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাতে গ্রিঙিলিয়া উপযোগী নহে । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গ্রিঙিলিয়া রোবষ্টা নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত জন্মায় এবং তজ্জন্ম নিম্নিত হইবামাত্র শ্বাস-রোধ উৎপন্ন হয় ও রোগী অক্লিঞ্জন গ্রহণার্থ জাগ্রৎ হয় । কখন-কখন পুরাতন শ্বাস-রোগে, কিন্তু সচরাচর হৃদ্রোগ-সংযুক্ত শ্বাস-রোগেই এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই লক্ষণাবিত শ্বাসে গ্রিঙিলিয়া আশ্চর্য্য ঔষধ । ল্যাকেসিস, জেলসিমিয়ম, ষ্টিক্‌নিয়া প্রভৃতি ঔষধেও এই লক্ষণ আছে । ডাঃ হেল শ্বাস-রোগে গ্রিঙিলিয়ার নিম্নতম ক্রম বিন্দুমাাত্রায় ব্যবহার করেন । বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ ।— নিউমোনিয়ার পরবর্ত্তী ; প্লেগ্মা ও পুণ্ড্রস্রাবী পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও কাস এতদ্বারা আরোগ্য-হইয়াছে । মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের প্লেগ্মাস্রাবী রোগেও এই ঔষধ উপকারী হওয়া সম্ভব । চক্ষু-রোগ ।—ডাঃ ফিস কতকগুলি তরুণ আইরাইটিস রোগ গ্রিঙিলিয়া স্কোয়ারোসার আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন । ছপশব্দ-কাস ।—ছপশব্দ কাসের প্রতিষ্ঠায়ের অবস্থায় যখন অধিক প্লেগ্মা নিঃস্রব হইতে থাকে এবং তজ্জন্ম শ্বাস-কষ্ট জন্মে, তখন গ্রিঙিলিয়া, ইপিকাক বা টার্টার এমেটিক অপেক্ষা সস্তর শাস্তি জন্মায় । চর্ম্ম-রোগ ।—ডাঃ গ্যাচেল বলেন যে ইহার একভাগ অরিষ্ট দশভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্র কণ্ডুয়নে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে অত্যন্ত উপকার দর্শে । ভগ-কণ্ডুয়নেও এই ঔষধের বাহ্য-প্রয়োগ অতিশয় ফলপ্রদ । রসটক্সের বিষ-ক্রিয়ায়ও চর্ম্মে গ্রিঙিলিয়ার বাহ্য-প্রয়োগ হয় । পীড়া ।—দ্বীহার কর্ত্তনবৎ বেদনা ও সেই বেদনার কূচকী পর্য্যন্ত সংপ্রসারণ ; দ্বীহার বিবর্দ্ধন ও স্পর্শ-ষেয, মুখাকৃতির মলিনতা এই ঔষধের লক্ষণ ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তকাদি ।—বৃহৎ মাত্রায় কুইনাইন সেবনের ফলের ঞ্চায় মস্তকের অতিশয় পূর্ণতা । ঠিক তরুণ বাতের ঞ্চায় বাম চক্ষু, ও দক্ষিণ জাহ্ন-সন্ধিতে বেদনা । জাহ্নর বেদনার অলক্ষণ স্থায়িত্ব । বাম চক্ষুর বেদনার অতিশয় তীব্রতায় পরিণতি, অনন্তর দক্ষিণচক্ষু আক্রমণ ; দক্ষিণ চক্ষুর বেদনা সহকারে একই সময়ে দ্বীহা ও যকৃৎ প্রদেশে অসহ্য বেদনা, সেই বেদনার উগ্রতা বশতঃ স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে অশক্তি । তরুণ বাতের ঞ্চায় বেদনা । চক্ষুর বেদনার অক্ষি-গোলকে অবস্থিতি ও তথা হইতে মস্তকে প্রধাবন ; চক্ষু-সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি । বেদনার আমবাতিক প্রকৃতি ; স্পর্শ-ষেয সংযুক্ত বেদনা । চক্ষুর গুরুমণ্ডলের আরক্ততা । মস্তকের রক্ত-সঞ্চয়ের ঞ্চায় চক্ষুর আকৃতি । স্নায়ুগুণ ।—পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ গ্রহণে প্রথমে দর্শন-স্নায়ুতে ক্রিয়া, অলক্ষণের ম্যুদোই নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া দর্শিয়া শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা । শ্বাস-ক্রিয়ার ব্যাঘাতে নিদ্রার ব্যাঘাত । নিম্নিত হইবা মাত্র শ্বাসের অবরোধ, এবং শ্বাসরোধ বশতঃ জাগ্রৎ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই

শ্বাস-রোধের অবস্থিতি । এইগুলি গ্রিঙলিয়া স্কোয়ারোসার পরীক্ষা-লক্ষণ । ০ পুরাতন বায়ু-নলী-ভুজ-প্রদাহ ও শ্বাস । ০ স্লেয়াশ্রাবী শ্বাস । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-নলী ভুজে ছুঁহেত স্লেয়ার সঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-কষ্ট । ০ আক্ষেপিক শ্বাস । শ্বাস-ক্রিয়া-নিয়ামক স্নায়ুর উপদাহিতা নিবন্ধন আক্ষেপের উৎপত্তি । ০ শ্বাস-স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ শ্বাসকষ্ট । ০ শ্বাস-সংরোধ জন্মিয়া জাগরিত হইতে হয় বলিয়া নিদ্রা যাইতে আশঙ্কা । ০ পৃষ্ঠবংশীর স্নায়ুর অপরিপোষণ জন্ম হৃদ্রোগজনিত শ্বাস । ০ তরুণ প্রতিষ্ঠায়জনিত শ্বাস । ০ নিউমোনিয়ার পরবর্তী স্লেয়া ও পু্যাক্ত নিগ্ধবন বিশিষ্ট পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, ও কাস । ০ প্রচুর স্লেয়া নিঃসরণ সহ হৃৎপদক কাসের প্রাতিষ্ঠায়িক অবস্থা । ০ স্লেয়াশ্রাবের প্রাধান্য লক্ষণাবিত বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের রোগ । ০ প্রমেহ ও লাল-মেহ । ০ উপদাহকর ষেতপ্রদর ( স্থানিকপ্রয়োগ ) । ০ কণ্ডুয়ন, ইরিথিমার উদ্বেদ, ও মশক দংশন ( স্থানিক-প্রয়োগ ) । ০ রসটক্সের বিষ ( স্থানিকপ্রয়োগ ) । এইগুলি গ্রিঙলিয়া রোবটার আরোগ্যকর লক্ষণ ।

## চিওনাস্থাস বার্জিনিকা ।

এই ঔষের ইংরেজী নাম ফ্রিঞ্জ-টী । ইহা আমেরিকায় জন্মে । ইহার বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । যকুতে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং উহার সকল প্রকার বিকৃত অবস্থায় এতদ্বারা উপকার দর্শে । সুপরিচিত ডাঃ গ্রোস বলেন যে তিনি যকুতের বিবৃদ্ধিতে ; এবং ম্যালেরিয়া-প্রধান-প্রদেশে যকুতের ক্রিয়াবরোধে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । পাণ্ডুরোগেও চিওনাস্থাস অতীব উপকারী । ডাঃ গ্রোস যতগুলি রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন, সকলেরই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে । এতদ্বারা অনেক বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুও আট-দশ দিবসে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । এই ঔষধে পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইলে উহা আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না । তিনি উগ্র এলকোহলে প্রস্তুত অরিষ্ট তিন ঘণ্টা অন্তর ১০।১৫ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

আমাশয়ে আকুঞ্চন অল্পভব, বোধ হয় যেন কোন সজীব প্রাণী নড়িতেছে । যকুৎ-প্রদেশে, এবং কখন কখন বা প্রীহা-প্রদেশে অস্বচ্ছন্দতা অল্পভব । আমাশয় ও কুক্ষিস্থলের অস্বচ্ছন্দতাস্থভব বর্ধিত হইয়া অতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠা । আমাশয়ে আক্ষেপ বা হৃৎস্পন্দনের হ্রাস অল্পভব । স্থলান্তের শেষ বক্রাংশে বাতাস্থান জনিতবৎ অস্বচ্ছন্দতা অল্পভব । দক্ষিণ কুক্ষিতে অস্বচ্ছন্দতা, ও উহার বাম শ্রেণিদেশ পর্য্যন্ত প্রসারণ । পূর্বের পরিচ্ছন্ন জিহবার কেন্দ্রস্থানে পীতবর্ণ লেপ । শয়ন করার সময় কৃষ্ণবর্ণ, আলকাতারার স্তায় মলত্যাগ । কোন বিরোচক ঔষধ সেবনে যেক্রপ প্রবল বিরোচন জন্মে উদরে তক্রপ



অনুভব ও বিবমিষা, কিন্তু অল্প হইতে কোন শ্রাব নিঃসৃত হয় না। পৃষ্ঠবংশে সপ্তম হইতে দশম কণ্ঠের কা পর্য্যন্ত ক্ষণকাল বেদনা। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মস্তকের অতিশয় পরিচ্ছন্নতা, তৎপরদিন পরীক্ষার পূর্ব্ববর্তী মস্তকের অপরিচ্ছন্নতার পুনরাগমন। এইগুলি চিওনায়াস বার্জিনিকার পরীক্ষা-লক্ষণ।

## চিনিম আসেনিকোসম—আসেনিয়েট অব কুইনাইন ।

এই ঔষধ চিনিম আসেনিকমও উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চিনিম আসেনিকোসম বিস্তৃতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। চিকিৎসা-দৃষ্ট ফলবত্তা হইতেই প্রধানতঃ ইহার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তের উপাদান, শৈল্পিক বিধান-তত্ত্ব, ও স্নায়ু-মণ্ডল আক্রান্ত হয় বলিয়া বোধ হয়, এবং তদ্বারা জীবনীশক্তির অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত সন্ধিবাতির শ্রায় অবস্থা নিন্তেজতাজনক প্রদাহিত অবস্থা, বিশেষতঃ শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রদাহিত অবস্থা, উৎপাদিত হয়। স্ততরাং ডিপথিরিয়া ও সাংঘাতিক স্ক্যালোটিনা রোগের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই ছই রোগে এই ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ও উপকার করিয়াছেন। চিনিম আসেনিকোসম সবিরাম জরের অরূপ একপ্রকার জ্বর, ও পর্যায়শীল স্নায়ুশূল জন্মায়। ম্যালেরিয়াজনিত বহুবিধ রোগে এতদ্বারা উপকার দর্শিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় আসেনিক ও কুইনাইন উভয়েরই অল্পাধিক ফল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু লক্ষণ সমষ্টিতে উহার প্রত্যেকটি হইতে সুস্পষ্ট স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

অধিকার।—সবিরামজ্বর ও ম্যালেরিয়া জনিত অগ্নাত রোগে, এবং সাংঘাতিক আকারের ডিপথিরিয়া ও স্ক্যালোট-ফিভারেই এই ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজিত হয়। বিস্তারিত লক্ষণ নিম্নোক্ত “প্রধান প্রধান লক্ষণে” উল্লেখিত আছে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—ডাঃ হেল বলেন যে ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের হৃদম্য সবিরাম জরে তিনি এই মিশ্র ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন। এই সকল জ্বর কখনও প্রতিদিন, কখনও বা একদিন পর একদিন, কখনও সবিরাম স্নায়ুশূলারূপে প্রকাশ পায়। লক্ষণানুসারে এইপ্রকার প্রচ্ছন্ন জরের চিকিৎসা সূচকটিন ব্যাপার। অতএব একদিন সবিরাম জ্বর অগ্নদিন জ্বর না হইয়া জরের পরিবর্তে স্নায়ুশূল, উদরাময়, অজীর্ণ, রক্তাতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ উপযোগী। ম্যালেরিয়া জনিত কুচিকিৎসিত বিশিষ্ট প্রকৃতির সবিরাম জরে ও হৃদম্য প্রচ্ছন্ন জরে আসেনিক ও চায়না, এই উভয় ঔষধজ্ঞাপক লক্ষণই প্রকাশ পাইলে পর্যায়ক্রমে আসেনিক ও চায়না ব্যবহার না করিয়া ডাঃ হেল আসেনিয়েট অব কুইনাইন ব্যবহারের বিধি দেন। এই প্রকারের জরে

লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ধারিত করিতে গেলে আলেয়ার অম্লসরণের জ্ঞায় প্রায়ই প্রতিনিয়ত ঔষধ পরিবর্তন করিতে হয়, অথচ তাহাতে কোন ফল দর্শে না। এজন্ত, রোগের মূলে আঘাত করিতে হইলে প্রথমে রোগের মূল কারণানুসারে ঔষধ নির্ধারিত করিয়া তৎপরে উহার লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেই রোগ নিমূল হয়। তিনি সাধারণতঃ ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক বা দুই গ্রেণ মাত্রায় দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। কোন কোন রোগীকে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণও ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ডাঃ হল ও সিকাগোর অত্রা ত্রিচিংসকও ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। বালকদিগের রোগে, পুরাতন অস্ত্র-বৈলক্ষণ্য এবং তৎসহ শরীরের তরল পদার্থের বিনাশ ও অপোষণ জনিত দৌর্বল্য লক্ষণে ডাঃ হল ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ হল এই ঔষধের ষষ্ঠক্রমের উর্দ্ধ ক্রম কখনও ব্যবহার করেন নাই। যে সকল বালকদিগের স্নায়ুগুণ স্নায়ুমাংস তাহাদের পক্ষে এই ক্রমের বটিকা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হলকোম বলেন যে পুরাতন ম্যালেরিয়া দোষ দূরীকরণার্থ আসেনিয়েট অব কুইনাইন ও আসেনিয়েট অব আয়রণ অতিশয় উপকারী। তিনি এই ঔষধদ্বয়ের প্রথম শততমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করেন। দশমিক ক্রম নহে। শারীরিক যন্ত্রাদি অপেক্ষা স্নায়ুগুণ প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হইলে আসেনিয়েট অব কুইনাইন এবং এনিমিয়া বা রক্তহীনতার প্রাবল্য থাকিলে আসেনিয়েট অব আয়রণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

**অতিসার।**—ম্যালেরিয়া-দোষজনিত অতিসারে পাতলা, জলবৎ, অপাচিত, দুর্গন্ধ, কাল বা অপ্রগাঢ় কপিশবর্ণ, সময়ে সময়ে ময়দার জায় তলানি বিশিষ্ট বিরচন লক্ষণে চিনিম আসেনিকোজম ব্যবহৃত হয়। **ডিপথিরিয়া।**—তালু মূলে ও গল গহ্বরে কৃত্রিম বিল্লী; হৃৎ-গ্রন্থির ক্ষীণতা; হৃৎক নিখাস; অতিশয় অবসন্নতা, বিশেষতঃ রোগীর পুনরারোগ্য কালে এই অবসন্নতার অবস্থিতি, এই ঔষধের লক্ষণ। **গ্যাস্ট্রোলজিয়া।**—সোলার প্লেজগ নামক গ্রন্থি স্নায়ুগুচ্ছের উপর বক্র চাপ ও উহার ঠিক অপরদিকে পৃষ্ঠবংশে স্পর্শঘেষ চিনিম আসেনিকোজমের লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—০ নিরুৎসাহিতা; মানসিক জড়তা; নীরব ও একাকী থাকার ইচ্ছা ( \* জেল )। ০ উৎকর্ষ ও রাত্ৰিকালে প্রলাপ। ০ শিরঃশীড়ার পূর্বে কোপন ভাব।

**মস্তক।**—০ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে বিবর্তিত, অপিত ভয়প্রাপ্তি বশতঃ উৎপন্ন অর্ধ-শিরোবেদনা। মস্তকে বিশৃঙ্খলা অনুভব। মস্তকে স্মৃতি, বক্র-গতি, চিড়িক-মারা বেদনার প্রধান ও তাহাতে নিত্য ব্যাধাত। মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাত্তানের শিরঃশীড়া। ০ দক্ষিণ শঙ্খস্থানে ও চক্র উপরে দ্ব্যবীৰ্য বেদনা। ০ মস্তকের বাম্পার্শ্বে

ছেদন ও রক্ত করণবৎ বেদনা, তৎসহ চক্ষু শিখা-দর্শন, বেদনা ও অশ্রুপাত; বেদনার আবেশ সময়ে কর্ণে টুন টুন শব্দ, বিবিম্বা ও বমন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিয়মিতরূপে বেদনার আক্রমণ ( \* চিনি-সল )।

চক্ষু।—০ স্ত্রীত্ব আলোকাতঙ্ক ও অন্ধি-কোটরের পেশীর আক্ষেপ, সবলে তপ্ত অশ্রু নিঃসরণ, প্রত্যেক চক্ষুতে বৃহৎ ক্ষতের আক্রমণ; রাত্রি দুই প্রহর হইতে তিনটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; কনীনিকার প্রদাহ। ০ দুইপ্রহর রাত্রির পরে বিবর্দ্ধিত গুণমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ; অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় বাম চক্ষুর সম্মুখে শিখা-দর্শন, তৎসহ বেদনা ও অশ্রুপাত।

কর্ণ।—০ অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় কর্ণে টুন টুন শব্দ ( চিনি-সল )।

নাসিকা।—তরল প্রতিশ্রায়, প্রভূত শ্রাব। ০ ডিপথিরিয়ায় একপ্রকার পুষ ও রক্তময় পদার্থে নাসিকার অবরুদ্ধতা। ০ ডিপথিরিয়ায় নাসিকার কোণের অবদরণ ( এরম )।

মুখমণ্ডল।—০ সবিরাম জরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মলিনতা ও ক্ষীততা ( অসি, ফ্রাট-মিউ )। ০ ডিপথিরিয়ায় হনু-নিম্ন গ্রন্থি ও কর্ণ-মূল গ্রন্থির ক্ষীততা। ০ গুটিকা-রোগে ( বক্ষা ) ওষ্ঠের নীলাবৃত্ততা।

মুখ-মধ্য।—০ ডিপথিরিয়ায় জিহ্বায় গাঢ় ও কপিশবর্ণ লেপ। ০ ডিপথিরিয়া ও আলো টিনায় মুখে দুর্গন্ধ।

গল-মধ্য।—০ ঘ্রকের পাণ্ডুরতা, দ্রুত অবসন্নতা এবং শীঘ্র শীঘ্র গল-কোষের স্লেমিক বিলীত বিনষ্টতা সহকারে আরক্ত জরের ভোগকালে সাংঘাতিক গলা-বেদনা। ০ ডিপথিরিয়া; মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নিঃসরণ; হনু-নিম্ন-গ্রন্থির ক্ষীততা ও বর্ধিততা; পুষ-রক্তময় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা নাসিকার সম্যক অবরুদ্ধতা, নাসিকার কোণের অবদরণ; জিহ্বায় গাঢ় ও কপিশ লেপ; ধূসর কৃত্রিম বিলীতে উভয় তালু-মূলের আচ্ছন্নতা; উহা অন্তঃস্থত হইলে সেই সেই স্থানে অসমপ্রাপ্ত, রক্তাক্ত ক্ষত; উপজিহ্বার নিম্নার্দ্ধ বিগলিত, উপরের অর্দ্ধ কৃত্রিম বিলীতে আবৃত; গল-কোষের পশ্চাদিকের প্রাচীর কৃত্রিম বিলীতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন; তরল দ্রব্য গিলিতে অতিশয় কষ্ট, অতিশয় অবসন্নতা; নিদ্রাশূন্যতা; নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, অতিশয় দ্রুতগামিতা।

আমোশয়।—০ বক্ষারোগে, শ্বাস-রোধের আক্রমণ সময়ে দুর্নিবার পিপাসা। ০ অণ্ড ও মংস্ত ভক্ষণে অবিলম্বে বেদনাশূন্য অতিসারের উৎপত্তি। ০ অর্দ্ধ-শিরোবেদনায় বিবিম্বা ও বমন, তৎপরে নিদ্রা ( \* এণ্ট-টার্ট )।

উদর।—সবিরাম জরে বাম কুক্ষিদেশের বিবৃদ্ধি; অপচি উদরের ক্ষীততা।

মল।—০ ম্যালেরিয়া জনিত অতিসার ( \* চিনি-সল ) ; পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধময় ( \* অসি ) মল, তৎসহকারে অঙ্গের বেদনা।

মূত্র-যন্ত্র।—০ আক্ষেপিক মূত্র-রোধ।

শ্বাস-যন্ত্র।—০ ডিপথিরিয়ার স্বরভঙ্গ; তজ্জন্তু ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম বিলী বেন স্বর-

যশ্রে প্রসারিত না হইতে পারে এরূপ অনুমান । ০ ওষ্ঠ, হস্ত ও নখের নীলবর্ণ সহকারে প্রাতঃ-কালে শ্বাস-রোধের আক্রমণের আরম্ভ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি । যক্ষ্মা । শ্বাস-রোধের আক্রমণ সময়ে, সম্ভব হইলে বিষুক্ত জানালার নিকটে, সম্মুখদিকে অবনত হইয়া বসিতে হয় ( \* আস', \* কার্কো-ভেজি ) ; অথ কোন ভাবে বসিলে উহা বৃদ্ধি পায় । যক্ষ্মায় উৎকর্ষা সহ ০ শ্বাসকৃচ্ছ । ০ সপর্ধ্যায় অর সহকারে বৃদ্ধিগের অনতি-তরুণ অতিসার, সাধারণতঃ রাত্রিতে উহার আধিক্য । ০ বামপার্শ্বের শ্বাস-পেশীর পক্ষাঘাত ; পৃষ্ঠকা-মধ্য-পেশীর ন্যায়-শূল ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—\* শোথের লক্ষণ, শৈরিক রক্তাধিক্য ও শরীরের নীলবর্ণ সহকারে হৃৎশূল রোগ । হৃৎপিণ্ডে কম্পন ; পিঠে ঠেসদিলে হৃৎস্পন্দ । হৃৎপিণ্ড অবরুদ্ধবৎ অনুভূত হয় ; উহার স্পন্দন অনুভূত হয় না ; এবং ক্রিয়া নিয়মিতরূপে নিষ্পন্ন হয় না । \* ক্ষুদ্র ; অতিদ্রুত ( ২০০ ) ; অনিয়মিত ; নাড়ী । ০ বাম স্তন-দেশে প্রবল ন্যায়-শূলের বেদনা, বোধ হয় যেন আরক্ত তণ্ডু চিহ্নটা দ্বারা উহা ছিন্ন হইতেছে ; পৃষ্ঠকা-মধ্য-পেশীর ন্যায়-শূল ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । ০ যক্ষ্মারোগে হস্ত ও নখের নীলবর্ণ । যক্ষ্মারোগে ০ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুষারবৎ শীতলতা ।

দেহ ।—০ অতিশয় অবসন্নতা । ০ অপস্মারবৎ আক্ষেপ ।

নিদ্রা ।—০ শ্বাস-রোধের আবেশের পর গভীর নিদ্রা । ০ অস্থির নিদ্রা ; নিদ্রা-হীনতা ।

জ্বর ।—০ সবিরাম অর ; সর্বদা পূর্বাঙ্কে শীত, কিন্তু ঠিক এক সময়ে শীত নহে ; কখন বা প্রতিদিন একবার ; আবার একদিন পর একদিন , কখন বা ঘর্ম্ম সহকারে, কখন বা ঘর্ম্ম বতীত জ্বরের আবেশের পরিসমাপ্তি ; জ্বরের আবেশের পূর্বে শিরঃপীড়া, জ্বন্তণ ও অঙ্গমর্দ । সায়াহ্নে অস্থিরতা সহ তরঙ্গ-গতিতে অর্থাৎ ঝলকে ঝলকে শীত ; রোমাঞ্চ ; শয্যায় কোন শীতল স্থানে হাত পা নাড়িলে, অপর, নড়িলে চড়িলে, ও উহার বিষয় ভাবিলে বৃদ্ধি । শীতের পর মধ্য-রাত্রির প্রাকালে উত্তাপ ; নাড়ীর পূর্ণতা ও সবলতা ; গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি । উত্তাপের পর ঘর্ম্মশূন্যতা, কিন্তু শ্রাতে দুর্বলতা ও ভগ্নতা অনুভব এবং প্রাতরাহ্নে অপ্রবৃত্তি । ০ ডিপথিরিয়া ও সাংঘাতিক স্কার্লেটিনায় অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত প্রবল জ্বর । সর্বশরীরে শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম ।

ত্বক্ ।—শুষ্ক ত্বক, ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, তৎসহ দ্রুত অবসাদ । সপর্ধ্যায় ফোটক ও ত্রণশোথ, উহাতে মস্তকের উপদ্রবের শাস্তি ।

উপযোগিতা ।—রস-প্রধান-ধাতু ( হাইড্রোজিনয়েড কনস্ট্রিক্টশন ) ।

সমগুণ ।—এপিস, আস' এরাণ, চিনি-সল, সিদ্ধ

## চিলোন গ্লাত্রা ।

চিলোন গ্লাত্রা একপ্রকার ক্ষুদ্র মার্কিন বৃক্ষ । ইহার সর্বাংশই অতিশয় তিক্ত । ইহা নিয়মিতরূপে পরীক্ষিত হয় নাই । ডাঃ হেলও অত্যন্ত কতিপয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই ঔষধ চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে বহুতে ইহার ক্রিয়া দর্শে । আমাশয়ের দুর্বলতাজনিত অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী । ক্ষুধাহীনতা, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুর্বলতা সংযুক্ত পাণ্ডুরোগ বিন্দুমাত্রায় ইহার অরিষ্ট সেবনে সত্ত্বর বিদূরিত হয় । কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্তী সবিরামজ্বরে এবং কুইনাইনজনিত ধাতু-বিকার ও প্রচ্ছন্ন জ্বরাদিতেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ । মূল অরিষ্ট কিছু অধিকদিন পর্য্যন্ত সেবন করা আবশ্যক ।

## জগলাঙ্গ সাইনিরিয়া—বটারনঃট ।

বটারনঃট বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে । ইহার বহুল ক্যাথারটিক অর্থাৎ বিরেচক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্ত জগলাঙ্গ সাইনিরিয়াকে কখন কখন জগলাঙ্গ ক্যাথারটিকাও বলে । জগলাঙ্গ সাইনিরিয়ার অন্তঃকলের অরিষ্ট ও বীৰ্য্য জগলাণ্ডিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় । ইহার বীৰ্য্যের নাম জগলাণ্ডিন ।

ক্রিয়া ।—জগলাঙ্গ সাইনিরিয়ার মূলের অভ্যন্তর বহুল চর্মে লাগাইলে ফেঁকা পড়ে ও পচ্যমান পীড়কা উৎপন্ন হয় ; ফলের হরিৎ বহুলের রস চর্মে লাগিলে তীব্র উপদাহ জন্মায় এবং চক্ষে পড়িলে উগ্র প্রদাহ উৎপন্ন করে । জগলাঙ্গ সাইনিরিয়ার বিষক্রিয়ায় পরিপাক-যন্ত্রের উপদাহ ও বিশৃঙ্খলা জন্মে এবং যুগপৎ অত্যন্ত যন্ত্রের, বিশেষতঃ মস্তকের অস্বাভাবিক লক্ষণ উপস্থিত হয় । এই ক্রিয়া কিছুকাল অবস্থিতির পর গাত্রে নানাপ্রকার পীড়কা উৎপন্ন হইয়া অনিক দিন থাকে । চর্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া ডাঃ বার্ণেট ইহাকে ভেজিটেবেল আসেনিক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শঙ্খ-বিষ বলেন ; এবং ডাঃ মার্টিন বিবিধ পুরাতন চর্মরোগে জগলাঙ্গ সাইনিরিয়ার অতিশয় প্রশংসা করেন । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জগলাঙ্গ জাতীয় সমস্ত ঔষধের বিষক্রিয়ায়ই রক্তের মলিনতা, ও আলকাতরার জ্বায় কৃষ্ণবর্ণ জন্মে, এবং রক্তশ্রাব হয় । অপর, উহারা সকলেই চর্মে উত্তেজ উৎপন্ন করে । জগলাঙ্গ রিজিয়া বা ওয়ালনঃট নিয়মিত কালের অনেক পূর্বে উপস্থিত ও কেবল কাল সংবত রক্তশ্রাবী রজোদোষে ব্যবহৃত হয় ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

‘শিরোবেদনা ।—মস্তকের পশ্চাদিকের শিরঃশীড়ায় জগলাঙ্গ সাইনিরিয়াই একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । তীব্র সঞ্চরমণ বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ । এই লক্ষণে মস্তিক বা

পৃষ্ঠবংশীয় রক্তরোগে ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের স্ক্রীভ বৈদনায তিনি ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাঃ হেল প্রাক্তঃকালীন শিরঃপীড়ায় নলভমিকা, আইরিস, ব্রাইওনিয়া; ও চেলিডোনিয়ম বিফল হইলে জগলাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পরামর্শ দেন। পাণ্ডু—জগলাঙ্গ সাইনিরিয়। নলভমিকার জায় পাণ্ডুরোগ জন্মায়। অতএব রক্তদ্রব্যাংশে হঠাৎ বেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ দক্ষিণ নিয়ে বেদনা, রোগীর রাতি তিনটার সময় নিদ্রা হইতে জাগরণ ও তৎপরে নিদ্রাশুভতা, এবং এই সকল লক্ষণের সহিত সচরাচর পূর্ববর্ণিত শিরঃপীড়ার বিস্তারিতা; পৈত্তিক, বা পীতাত্ত হরিৎ মল, মলদ্বার-জ্বালা, ও কুহন;—এই সকল লক্ষণে পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। শোথ—বক্ষঃস্থলের শোথে স্বকে ডাঁশের কামড়ের জায় রক্তবর্ণ চিহ্ন থাকিলে জগলাঙ্গ ব্যবহেয়। হৃদশূল।—বিচরণ সময়ে, বিশেষতঃ 'আধা-রাস্তা বা দ্রুতগমনে, কিম্বা পর্বতোপরি আরোহণে বক্ষঃস্থর পশ্চাতে বেদনা; ব্রুদ্বার পশ্চাতে তীব্র বেদনা, বক্ষঃস্থলের বেদনা বশতঃ হাঁটিবার সময় শ্বাস-রোধের উপক্রম, ও তজ্জন্ত রোগীর স্থির হইয়া দণ্ডায়মান;—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিগিয়েস্থাল জগলাঙ্গ সাইনিরিয়। ব্যবহারের বিধি দেন। পামা (একজিমা)।—স্বাগেটিনা রোগের আরম্ভ রোগের জায় ত্বকের লোহিতবর্ণ; সর্বশরীরে, ও স্থানে স্থানে প্রবল কণ্ডুয়ন; অতিপরিশ্রমে শরীর উত্তপ্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি; এই ঔষধের লক্ষণ। মুখ-দুঃখিকা।—ডাঃ মার্সী বলেন যে একনি রোজেশিয়া নামক মুখদুঃখিকায় এই ঔষধের প্রথম দশমিক শক্তির দুই কোঁটা ১৮ ড্রাম জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ড্রাম পরিমাণে প্রত্যহ তিনবার সেবন; ও প্রতিদিন দুইবার স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। অতিসার।—জ্বাবারের জায় এতদ্বারা অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। ডাঃ হেল পৈত্তিক অতিসার ও রক্তাতিসারে ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—চিন্তের অগ্রক্ষমতা; নিরুৎসাহ। শ্রান্তিসহ শিরোবুর্গন। মস্তক।—উঠিবারাত্র যত্ন শিরোবেদনা, উখানাস্তে উহার নিবৃত্তি। রাতিতে মস্তকের পূর্ণতা। ০ মস্তকের কেশাবৃত্ত অংশে উদ্বেগ। চক্ষু।—অক্ষিপুটের ও চক্ষুর চারিদিকে পচ্যমান পীড়কা সহ প্রদাহ। কর্ণ।—গিলিতে কর্ণে আকৃষ্ট বা কণ্ডুয়িতবৎ গভীর বেদনা। নাসিকা।—বায়ু নাসারন্ধ্রের শক্তি। নাকের শুষ্কতা। মুখমণ্ডল।—এরিথিমাবৎ আরক্ততা। মুখ-মধ্য ও গলমধ্য।—ওই ওষ্ঠ ও আগ্রমুখ সহকারে গলা-বাধা। গল-কোষের পরিণুক্ততা সহ জিহ্বাগ্রের স্পর্শ-দেব। \* গল-মধ্য ক্ষীতবৎ অহুত্ব, ও উহার দক্ষিণ পাশ্বে বেদনা। ০ সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা সহ গল-মধ্যের পুরাতন প্রদাহ। যুগ্মে তাক্সাদান সহ ক্ষুধাহীনতা। আমাশয়।—প্রাতে বিবমিষা; উদর-বেদনা সহ

বমন ও বমনোজম । ০ আমাশয়ের উপদাহিতা সহ অগ্নিমান্দ্য ; আগ্নামি । আমাশয়ে শূন্যতা অসুভব, এবং রক্তকরণবৎ বেদনা । উদর ।—বামপার্শ্বে বৃক্কের নিকটে গভীর-মূল বেদনা, উদরোর্দ্ধে দেশে বেদনা । উদরোর্দ্ধে উত্তাপ ও বেদনা । আহারান্তে উদরের আত্মান ও বেদনা । অস্ত্রের শৈথিল্যিক ত্রিলীয় উপদাহ ও প্রদাহ, তৎপরে ক্ষতাসার । মল ।—পলাণ্ডু-গন্ধ পাতলা মল । মলত্যাগান্তে কুহন ও জ্বালা । ০ অতিসার-পূর্বে কোষ্ঠবদ্ধ । বিরচন সহকারে স্তুতীত্র ও অবসাদকর উদর-বেদনা । শিবির-বাসী সৈন্যদিগের অতিসার । স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী ।—কাসিনে নিগ্ধবন ব্যতীত বায়ুনলীতে ঘড়ঘড় শব্দ । অতিশয় আঠাআঠা ভাপসাগন্ধের স্লেয়া নিগ্ধবন । বক্ষঃস্থল ।—বামপার্শ্বে বেদনা, চাপদিলে উহার বৃদ্ধি । ফুসফুসে কৰ্জনবৎ বেদনা সহ বক্ষঃস্থলে অতিশয় রাতনাফুসফুসের রক্তসঞ্চয় । দক্ষিণ স্বক্কাস্থির নীচে হৃদী-বেদনবৎ বেদনা । ০ অতিশয় শীর্ণতা বিশিষ্ট গণ্ডমালা জনিত ক্ষয় । পৃষ্ঠ ।—অবনত হইলে কটিতে বেদনা । কটির কশেককায় বেদনা । কটিদেশে সঞ্চরমান বেদনা । উর্দ্ধাঙ্গ ।—বাহুতে ও মণিবন্ধে মচকানবৎ বেদনা । দক্ষিণকক্ষে অতিশয় বেদনা, ও মায়ুর গতি-পথে বাহুপর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ । দক্ষিণ কক্ষে অবিয়াম বেদনা । নিম্নাঙ্গ ।—উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বে ও পদদ্বয়ে উত্তাপ, এবং বাম কুচকীতে রাত্রিতে থল্লীবৎ বেদনা । চর্ম্ম ।—\* ফ্যালটিনার ছায় আরক্ত রাগের উদ্ভেদ । \* দেহ-কাণ্ড ও শরীর শাখায় স্বকের বিসর্প জনিত প্রদাহ । \* মুখমণ্ডলের ইরিথিমা জনিত রক্তবর্ণ । \* সামান্য পামার ছায় উদ্ভেদ । \* পচ্যমান উদ্ভেদ ।

সমগুণ ।—ব্রাইও, কলোস, ক্রোটন-টিগ, পডো, আইরিস, সলফার, এসটজ ।

## জাকারাণ্ডা ।

জাকারাণ্ডা বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে । ডাঃ মুর ইহা প্রথমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । ব্যালানোরিয়া বা উপগ্রমেহ রোগে এবং লিঙ্গের লোহিতবর্ণ উপদংশ ক্ষতে, কিম্বা উপদংশ সঙ্গত ক্ষতে এই ঔষধ পরম উপকারী ।

জাকারাণ্ডা কারোবা ব্যতীত আর একপ্রকার জাকারাণ্ডা আছে, উহাকে জাকারাণ্ডা গোয়াল্যাণ্ডাই বলে । কলম্বিয়ার ডাঃ বগোট্টা বলেন যে তরুণ ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগে পলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট, তালু-মূলের ক্ষীণতা, হীনতা, কিন্তু কসিসের উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকায় আচ্ছন্নতা, গিলিতে অতিশয় বেদনা লক্ষণে শেযোক্ত জাকারাণ্ডা উত্তম ঔষধ । একন, বেল, মার্ক, ও ফাইটো ব্যর্থ হইলে পর ইহার আভ্যন্তরিক ও ঔষধপ্রদানে উত্তম ফল দর্শে । প্রতি দ্বিতীয় ঘণ্টায় তিনবিন্দু যাত্রায় ব্যাবস্থা করিতে হয় । অধিক প্রদর-স্রাব সংযুক্ত জরায়ুর প্রতিক্রিয়ায়ও অভাঙ্গ অনেক ঔষধ বিফল হইবার

পরে তিনি এই ঔষধের উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। এই রোগে তিনি ইহার মাদার টিঞ্চর তিনবিন্দু মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবহার করেন এবং প্রাতে ও রাত্রিতে প্রথম দশমিক শক্তির ঔষধ জলে মিশ্রিত করিয়া খোনিতে পিচকারী দিয়া থাকেন। অধিক জ্বাৰ বিশিষ্ট চক্ষুর প্রতিশ্রায়ে তৃতীয় দশমিক ক্রম সর্বোৎকৃষ্ট।

## জিজিয়া অরিয়।—গোল্ডেন আলেকজাণ্ডার।

জিজিয়া অরিয়াকে এক্ষণ থ্যাম্পিয়ম অরিয়ম বলে। কিন্তু পুরাতন জিজিয়া নামেই ইহা অধিক পরিচিত ও উল্লিখিত হইয়া থাকে। থ্যাম্পিয়ম সাইকিউটা, ইথুসা, ইনাস্টি প্রভৃতি বিবাক্ত উদ্ভিদের শ্রেণীভুক্ত একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ইহা আর্দ্র নদী কূলে উৎপন্ন হয়। উগ্র এলকোহল সহযোগে ইহার সরস মূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ডাঃ মার্সি এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে ইহা শিরোবেদনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বদন ও চক্ষুর দায়ু-শূল, ডিম্বাশয়ের দায়ুশূল, শ্বেতপ্রদর, কাস, ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কাস।—বক্ষঃস্থলে স্তম্ভী-বেধ বিশিষ্ট শুষ্ক কাস; বক্ষঃস্থলের পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অহুভব, ও খাস-কষ্ট; সায়াক্লে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি জিজিয়ার লক্ষণ। অপস্মার।—মুখমণ্ডল ও দেহশাখার পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চলন লক্ষণে জিজিয়া অরিয়। ৩৮ ক্রম ফলপ্রদ। তাণ্ডব।—ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে তাণ্ডব রোগের সঞ্চলন নিদ্রাকালেও থাকিলে জিজিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। শ্বেত-প্রদর।—পৃষ্ঠবংশ বা মস্তিষ্কের উপদাহ সংযুক্ত পুরাতন শ্বেত-প্রদরে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডিম্বাশয়ের রোগ।—বাম ডিম্বাশয়ের সবিরাম দায়ুশূলে জিজিয়া প্রয়োজিত হয়। অবসাদ-দায়ু।—আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট অবসাদ-দায়ু। হিষ্টিরিয়া।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—চিন্তের অবসাদ, ও জীবনে বিরক্তি। চিন্তের অবসাদ, তৎপরে অতিশয় প্রকল্পতা। একবার হস্ত একবার ক্রন্দন। মস্তক।—মস্তকের চতুর্দিকে অশিথিলতা অহুভব। মস্তকের সমগ্র বাম পার্শ্বে তরুণ অবিরাম বেদনা। মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রাধান্য, ও পূর্ণতা অহুভব। মস্তক-শিখরে প্রচাপন। দক্ষিণ শঙ্খস্থলে তীব্র বেদনা ও তৎসহকারে বিবমিষা। বিবমিষা সহ শিরোবেদনা; পৈত্তিক বমন-প্রবৃত্তি। জ্যোতিঃ, ক্ষয়, ও কর্ণ শব্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। পৃষ্ঠ-বেদনা সহকারে \* দক্ষিণপার্শ্বে জ্বাৰী বেদনা। ও অঙ্গ ও তিস্ত বমন সহ অর্ধ শিরোবেদনা। ও মস্তকের দায়ুশূল। চক্ষু।—



চুই চক্ষুরই আরক্ততা ও আলোকে অহুতবাধিক্য। দক্ষিণ অক্ষি-গহবরে তীব্র বেদনা, অক্ষি-গোলক সঞ্চালনে, মস্তক অবনমনে ও পদ-বিক্ষেপে উহার আতিশয্য। ০ উভয় অক্ষি-গহবরের অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা। চক্ষু হইতে পীতাত; পুষ ও শ্লেষ্মামিশ্রিত নিঃস্রব নিঃসরণ, ও তদ্বারা অক্ষিপুটের সংরোধ। দক্ষিণ চক্ষুর বিশিষ্টরূপে আক্রান্তি। নাসিকা।—নাসারন্ধ্রে ও চক্ষুতে জ্বালা ও টাটানি। শ্লেষ্মা নিঃসরণ। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের অবরোধ ও স্পর্শ-বেধ। ০ হাঁচি ও জলবৎস্রাব নিঃসরণ সহ মস্তকের প্রতিক্রিয়া। পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ বিশিষ্ট পুরাতন প্রতিক্রিয়া। মুখমণ্ডল।—বদনের ক্ষীততা ও পাণ্ডুরতা। গণ্ডস্থলের আরক্ততা ও উত্তাপ। গণ্ডস্থিতে রক্তকরণের জ্বার বেদনা। ক্ষুধা ও স্বাদ।—অন্ন ও উত্তেজক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা। জিহ্বার মধ্যভাগে দ্রব ও শুষ্কলেপ, অগ্র ও প্রান্তভাগের আরক্ততা। শীতল বা উষ্ণ পানীয় দ্রব্যে অহুতবাধিক্য। আমাশয়।—বিবমিষা; অন্ন ও পৈত্তিক বমন। আমাশয়ে চাপ প্রদানে বিবমিষা ও মুচ্ছার উদ্রেক। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) সঙ্গম-শক্তির আধিক্য। ০ রতিক্রিয়ার পর অতিশয় শ্রান্তি। (স্ত্রী) বিদাহী ষেতপ্রদর; প্রভূত প্রদরস্রাব। আকস্মিক রজোবিলোপ। একদিন প্রভূত রজঃস্রাব, তৎপরে বিদাহী ষেতপ্রদর। ০ বিলম্বিত ও বিলুপ্ত রজঃ সহকারে ষেতপ্রদর। ০ বাম ডিম্বাশয়ের সবিরাম দ্বায়ু-স্থল। বক্ষঃস্থল।—বক্ষঃস্থলে সঞ্চরমান বেদনা সহবর্তী শুষ্ককাস।—দক্ষিণ পার্শ্বে, ফুসফুস-বেষ্টে হৃদী-বেধ, কাসিলে, বা দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে উহার আধিক্য। পিত্ত-কাস-মধ্য-পেশীতে চাপ দিলে বেদনার উদ্রেক। বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্ব হইতে স্বক্কাহি পর্য্যন্ত প্রসারিত তীব্র বেদনা। শ্বাসরোগের জ্বার শ্বাস ও উত্তান ভাবে থাকিতে অশক্তি। ০ অশিথিল কাস ও তৎসহযোগে বক্ষঃস্থলে হৃদী-বেধ, সায়াক্ষে ও রাত্রিতে উহার আতিশয্য। পৃষ্ঠ।—দক্ষিণ স্বক্কাহির নিম্নে মুহুমুহু অবিরাম বেদনা। বক্ষের সম্মুখভাগ হইতে স্বক্কাহি পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত সঞ্চরণশীল হৃদী বেদনা। কটিতে টাটানি, ও জ্বালাকর বেদনা। নিতম্বে অতীব বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—(উর্দ্ধাঙ্গ) উভয় বাহুর পেশীর খঞ্জতা। (নিম্নাঙ্গ) উভয় কুচবিতে আকর্ষণ অহুতব। পেশীর বৎসামাত্র প্রমত্তে জজ্বার অস্বাভাবিক শ্রান্তি অহুতব। জ্বায়ুমণ্ডল।—আক্ষেপ। ০ অপস্মার। নিদ্রা।—সমস্ত প্রবৃত্তির জটতা, তৎপরে নিদ্রার প্রবল ইচ্ছা। নিদ্রাকালে আক্ষেপিক স্পন্দন। জ্বর।—জ্বর লক্ষণ, তৎসহকারে বক্ষঃস্থলে তীব্র হৃদী-বেধবৎ বেদনা, শিরোবেদনা, পিপাসা, ও মুখ-শোণ সহ জ্বর। একবার শীত একবার উত্তাপ এবং তৎসহকারে দুর্বলতা বিবমিষা, ও দক্ষিণ শঙ্খস্থানে বেদনা। অক্ষিগোলকের আরক্ততা, জিহ্বার শুষ্কতা ও আরক্ততা, এবং শীতল জ্বলের পিপাসা। মুখমণ্ডলে ও মস্তকে ঝলকে ঝলকে তাপাবশ, এবং তৎপরে বর্ম। মুখমণ্ডল ও উর্দ্ধাঙ্গের আক্ষেপিক স্পন্দন সহ শীত, তৎপরে উত্তাপ। গণ্ডস্থলের আরক্ততা, মস্তকের উত্তাপ এবং গ্রীবার ও শঙ্খস্থলের ধমনীর

দ্রুতমান স্পন্দন। ত্বক্ ।—কপালে, মণিবন্ধে ও জন্মবার কণ্ঠস্থনলীল অপচায়ান পীড়কা। এক গালের আয়ততা ও অপর গালের পাণ্ডুরতা। সমগ্র শরীরের খেতবর্ণ ও ক্ষীত আকৃতি।

সমগুণ ।—এগেরিকস, ইথুসা, বেলেডোনা, সিকিউটা, ইনাছি, ট্রামোনিয়ম, সোলেনম।

## জিঞ্জিবার — জিঞ্জার ।

জিঞ্জিবারেসী জাতীয় জিঞ্জিবার নামক উদ্ভিদ এসিয়া খণ্ডে জন্মে। ইহার শুকনুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া ।—মস্তক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুসমুহের অভ্যন্তরদিয়া স্নায়িক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-বস্ত্র ও শ্বাস-বস্ত্রের স্নায়িক ঝিল্লীতে জিঞ্জিবারের প্রধান ক্রিয়া দর্শে ও উহাদের উপদাহ এবং প্রাতিশ্রায়িক প্রদাহ জন্মে। পরিপাক-বস্ত্রে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার লক্ষণ ও শ্বাস-বস্ত্রে স্বর-বস্ত্রের উপদাহ, স্বরভঙ্গ, এবং কাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আময়িক প্রয়োগ ।—মস্তকের প্রাতিশ্রায়; নাসিকার প্রাতিশ্রায়; চক্ষুর শুষ্ক মণ্ডলের প্রদাহ; পুতিনস্ত; শ্বাস-কাস; অগ্নিমান্দ্য; মত্তপায়ীদিগের বমন; অতিসার; অস্ত্রের পুরাতন প্রাতিশ্রায়, প্রভৃতি যোগে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে জিঞ্জিবার ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক ।—মস্তক অতিরিক্ত বৃহত্তর অহুত হয় ( আর্জ-নাই, সিমি, ঘন )। মস্তকের সমুখভাগে চক্ষুর উপরে ও নাসা-মূলে শিরঃপীড়া ( হাইড্রাস, কালীবাঁই ); পরিশ্রম করিলে ও ঈদৃশ শিরঃপীড়া। বাম চক্ষুর উপরে শিরঃপীড়ার আধিক্য; ক্রমবধি উপর অবিরাম বেদনা, তৎপরে বিবমিষা; শেষে দক্ষিণ চক্ষুর উপরে বেদনা ও মস্তক-পশ্চাতের বাম ভাগে প্রচাপন; উষ্ণ গৃহে আধিক্য, কিন্তু শীতল, আর্দ্র বায়ুতে, এবং নড়িলে চড়িলে অথবা বসিয়া থাকিলেও অবিরতি। শীতল আর্দ্র বায়ুতে বিচরণকালে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে, মস্তকে গুরু চাপ। চক্ষু ।—চক্ষু জ্বালা ও বস্ত্রণা; আলোকে অহুতবাধিক্য; চক্ষু বাসুকা থাকার ভ্রায় অহুতভব ( \* আস', \* কঠ, \* সল )। নাসিকা ।—নাসিকার প্রাতিশ্রায়, জলবৎ শ্রাব, হাঁচি, অনাবৃত বায়ুতে উহার আধিক্য। পশ্চাতের রন্ধ্রে শুষ্কতা ও প্রতিবন্ধকতা, তৎসহ গাঢ় স্লেয়া নিঃসরণ। মুখমণ্ডল ।—বাম নিম্ন হস্তে ও দন্তে আকর্ষণের ভ্রায় বেদনা। ঋতুর পূর্বে অবসর মুখাকৃতি ও চক্ষুর নীচে নীলবর্ণ। মুখমধ্য ।—প্রান্তে মুখে আঠা আঠা বিষস আবাহ। আমাশয়ের বিশৃঙ্খলার ভ্রায় রোঙ্গিণীর নিকট

তাহার মুখের হর্ষক। গল-মধ্য।—বিবর্জিত শ্লেষা নিঃসরণ; জরের অবিচ্ছিন্নতা।  
 আমাশয়।—অতিশয় পিপাসা; মুখের শুষ্কতা। ০ রুটি ভাহারের পর শিরঃপীড়া ও  
 আমাশয়ে চাপ। উদগার ও অতিসার। বিবমিষা। পুরাতন মত্ৰপায়ীদিগের শেউলিয়  
 জ্বর পদার্থ বমন। ক্ষীণ পরিপাক-ক্রিয়া, আমাশয় প্রস্তরের ছায় ভারী। উদর।—  
 দণ্ডায়মান কালে উদরের অভ্যন্তর দিয়া আকৃষ্টক উদর-বেদনার সঞ্চরণ; অল্পক্ষণ পরেই  
 মল-প্রবৃত্তি। অতিশয় আশ্বান; কোষ্ঠবদ্ধ। বাম শ্রোণীদেশে তীব্র বেদনা। মল।—  
 ০ মলিন জলপান বশতঃ অতিসার; কপিশ আমশ্রাব; প্রাতঃকালে আধিক্য; আমাশয়ের  
 বিশৃঙ্খলা হইতে; ও ০ আর্দ্র গীতল বায়ু হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি। মলদ্বার ও উর্দ্ধাংশ পৃষ্ঠে  
 জ্বালা, আরক্ততা, ও কণ্ডুয়ন। মূত্রে-যন্ত্র।—গাঢ়, ঘোলা; মলিন-কপিশ, উগ্র-গন্ধ;  
 মূত্র। মূত্রত্যাগকালে মূত্র-মার্গের মুখে বেদনা। জননেদ্রিয়।—(পুং)। বিবর্জিত  
 সম্ভোগ-লিপ্সা; রাত্রিতে স্বপ্ন দোষ। (স্ত্রী)।—নির্দারিত সময়ের অনেক পূর্বে অত্যন্ত  
 অধিক পরিমাণে রক্ত-শ্রাব; মলিন, সংযত, উপদাহকর রক্ত। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরভঙ্গ।  
 স্বরযন্ত্রের নিম্নে যাতনা অসুভব। তৎপর কাস, ও শ্লেষা নিঃস্রাব। যাতনা সংযুক্ত  
 শ্বাসক্রিয়া; রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়; প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুই  
 তিন ঘণ্টা পর্যন্ত আধিক্য; ০ শ্বাস-কাস। গলার বামভাগে স্বরযন্ত্র কণ্ডুয়িত হইয়া  
 ফুসফুসে বেদনা সহকারে; ও শ্বাস-কষ্ট সহকারে; শুষ্ক কাসের উদ্বেক; প্রাতে প্রচুর  
 শ্লেষা নিঃস্রাব। বক্ষঃস্থলে স্থচী-বেধ; ফুসফুস-বেগে বেদনা (ব্রাই, কালী-কা, স্কুল)।  
 হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে হৃৎ-বেধন ও প্রচাপনবৎ বেদনা। পৃষ্ঠ।—দুর্বলতার  
 জ্বর পৃষ্ঠ-বেদনা, বসিয়া থাকিলে ও কিছুতে ঠেস দিলে উহার আধিক্য; পৃষ্ঠের নিম্নাংশের  
 পঙ্গুতা, বোধ হয় যেন আঘাতিত হইয়াছে, অথবা বিচরণ বা দণ্ডায়মান বশতঃ উহা  
 জন্মিয়াছে; শুষ্কতা অসুভব হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—জড়তা, গুরুতা, ও খঞ্জতা অসুভব;  
 অবশতা। আমবাতিক আকর্ষণী বেদনা। সন্ধিগুলি দুর্বল, আড়ষ্ট, ও খঞ্জ অসুভব হয়।  
 পায়ের বেদনা সংযুক্ত ক্ষীণতা। দেহ।—০ মুখে ফেণোদগম; বিষম মূত্রশ্রাব;  
 আক্ষেপ। শ্রান্তি, দুর্বলতা, শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা। স্নায়বীয়তা, রাত্রিতে চাঞ্চল্য  
 অসুভব। নিদ্রা।—নিদ্রালুতা ও অবসন্নতা। নিদ্রাশূন্যতা, রাত্রি তিনটার সময় জাগরণ  
 পরে পুনরায় প্রাতে নিদ্রার আক্রমণ (\* নক্স)। জ্বর।—সন্ধ্যাকালে গীত; বিষম  
 বায়ুতে গীত। একই সময়ে গীতোত্তাপ।

বিসমগুণ।—নলভমিকা।

## জিম্নোক্রেডস ক্যানডেসিস ।

কফির সহিত এই বৃক্ষের ফলের সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমেরিকায় ইহাকে কফি-বৃক্ষ বলে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বীজের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। জিম্নোক্রেডসের বিষ-ক্রিয়ায় গলা বেদনা জন্মে। এজন্ত গলার ঈষৎ নীলবর্ণ বিশিষ্ট গলা-বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। ডাঃ হেরিং তালু-মূল-প্রদাহের আনুষঙ্গিক বা অনুবর্তী কাসে; মুখমণ্ডলের বিসর্পে (অন্ত ঔষধে উপকার না দর্শিলে); আরক্ত জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, সন্নিপাত-লক্ষণাপন্ন বা বিসর্প-প্রকৃতির সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরের ব্যাপক আক্রমণে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন।

## জিরেনিয়ম ম্যাকুলেটম ।

জিরেনিয়ম এক প্রকার কুপ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। জিরেনিয়মের মূলে ৭০০০ গ্রেণে ১৩৬ গ্রেণ ট্যানিক এসিড, ও ১২০ গ্রেণ গ্যালিক, এসিড আছে। এলোপ্যাথেরা ইহা সঙ্কোচক স্বরূপ ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে (ক) সকল সঙ্কোচক ঔষধেই মুখ্যতঃ শরীরের কোন স্থলের পেণী-তন্তুর আকৃষ্টন জন্মায় এবং গ্রন্থি ও শৈল্পিক বিধান-তন্তুর স্রাব হ্রাস করে। এজন্ত রোগের ফল স্বরূপ ঈদৃশ অবস্থা জন্মিলে মুখ্য সাদৃশ্যে সম-মতে সঙ্কোচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (খ) সকল সঙ্কোচক ঔষধই গোণতঃ পেণী-তন্তুর দুর্বলতা ও শিথিলতা জন্মায়, এবং গ্রন্থি ও শৈল্পিক বিধান-তন্তুরও তক্রপ অবস্থা উৎপন্ন করে, সুতরাং উহাদের স্রাব নিঃসরণ অতিশয় বদ্ধিত হয়। এজন্ত, পূর্নোক্ত মুখ্যক্রিয়া হইতে উৎপন্ন শরীরের ঈদৃশ অবস্থায় গোণ সাদৃশ্যে সম-মতে সঙ্কোচক ঔষধ ব্যবহার করা যায়। ডাঃ হেলের মাত্রাবিষয়ক মত অনুসারে মুখ্য লক্ষণে উচ্চক্রম ও গোণ লক্ষণে নিম্ন ক্রম বা মূল ঔষধই তিনি ব্যবহার করিতে বলেন।

প্রদাহ প্রশান্ত হইবার পর শৈল্পিকঝিল্লী হইতে অস্বাভাবিক স্রাব নিঃসরণ; প্রতিষ্ঠায় জনিত ওজিনা (বাহু প্রয়োগ); অঙ্গের প্রাচীন প্রতিষ্ঠায় (আভ্যন্তরিক প্রয়োগ; ষোনির খেত-প্রদর (বাহু প্রয়োগ); ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব; প্রমেহ ও লালামেহ (পিচকারী); বহুহৃত ও ব্রাইটস ডিজিজ, মুখের উপক্ষত ও পায়দজনিত লাল স্রাব; শিথিলতা ও দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক স্রাব; বৃক্ক হইতে রক্তস্রাব; গল-গহ্বর ও নাসিকার পশ্চাৎ রক্তের শৈল্পিক ঝিল্লী হইতে প্রতিষ্ঠায় জনিত প্রভূত স্রাব নিঃসরণ; পুৰাতন অতিসার ও রক্তাতিসার; এই সকল রোগ ও উপসর্গ এই ঔষধে আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লেখিত আছে। ডাঃ হেলের মতে পূর্নোক্ত রোগে "জিরেনিয়ম মুলমাকুলেটম, সাধারণতঃ বাহু ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক, কারণ এই

ঔষধের গৌণক্রিয়ায় ঐ সকল রোগ উপশম হইতে পারে। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে বালকদিগের উদরাময়ে জিরেনিয়ম একটা সফল ঔষধ। অবিরত মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কিয়ৎকাল মল নিঃসরণে অশক্তি, তৎপরে বেদনা বা চেষ্টা ব্যতীত মল-তাগ, মুখের শুষ্কতা, ও জিহ্বার অগ্রভাগে জালা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, ও ফুসফুসাদি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রভূত রক্তপাতেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

## জেবোরাঙী ।

পাইলোকার্পাস পিনেটস ক্রুটেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই ক্ষুদ্র ব্রজিল দেশে। দক্ষিণ আমেরিকায় কতকগুলি বর্ষা-নিঃসারক উদ্ভিদের সাধারণ নাম জেবোরাঙী। পাইলোকার্পাস ত্রুতিশয় বর্ষা জন্মায় বলিয়া ইহাকেও সচরাচর জেবোরাঙী বলে। পাইলোকার্পাসের বীৰ্য্য পাইলোকার্পিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জেবোরাঙীর সরস পত্র ও মূল হইতে অরিষ্ট; এবং পাইলোকার্পিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—লালাশ্রাবী ও শ্বেদশ্রাবী গ্রন্থিতে জেবোরাঙীর প্রবল ক্রিয়া দর্শে এবং ঐ সকল গ্রন্থির উপদাহ ও অত্যন্ত শ্রাব নিঃসরণ উপশম হয়। স্নায়ু-মণ্ডল, রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র, এবং স্বকোষ ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্বারা চক্ষু বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়।

জেবোরাঙীর বিষ-ক্রিয়ায় সত্ত্বর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়; শঙ্খহলের ধমনী অধিকতর বেগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে; অনন্তর মুখে ও বদনে একপ্রকার উত্তাপ অনুভূত হইয়া লাল নিঃসরণ আরম্ভ হয়। কিয়ৎকালের মধ্যেই কপাল আর্দ্র, ও বদন অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠে; তৎপরে কপোলে, কপালে, ও শঙ্খ-হলে মালায় ভায় বর্ষা বিন্দু সকল প্রকাশ পায়। লালা-শ্রাব বিবর্দ্ধিত হয়, অধিক পরিমাণ লালায় মুখ পূর্ণ হইতে থাকে ও অবিরত থুথু ফেলিতে হয়; এই সময় বদনে ও গ্রীবার বর্ষা জন্মে; অনন্তর সর্ব্বশরীরে আরক্ত ও আর্দ্র হয় এবং গাত্রে সুখগ্রন্থ একপ্রকার উষ্ণতা অনুভূত হইতে থাকে; কুরেক মিনিটের মধ্যে সর্ব্বশরীরে বর্ষা উপশম হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হয়। ইতিমধ্যে অশ্রুত লক্ষণও উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ অক্ষিপুটের আর্দ্রতা, তৎপরে ক্রমে ক্রমে অশ্রুপ্রাবের আধিক্য জন্মে এবং উহা অপাঙ্গে সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে গণ্ডস্থল বাহিয়া পতিত হয়; তখন নাসিকা হইতেও অধিক শ্রাব নির্গত হইতে থাকে ও নাসাপথে অশ্রুজলের সমাগমে উহা বিবর্দ্ধিত হয়; অধিকন্তু গল-কোষ, কণ্ঠনালী ও খাস-নলীর গ্রন্থিগুলিরও ক্রিয়াতিশয্য জন্মে। ঔষধ সেবনের প্রায় তিন গোড়য়া ঘণ্টার মধ্যে এই সকল লক্ষণ তীব্রতার চরম সীমায় উপস্থিত হয় এবং ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে। লালা বিষক্রান্তভাবে প্রবাহিত হইবে বলিয়া একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রোগী এক এক মিনিটে দশপনর বার থুথু ফেলে; লালা এক ক্ষতবেগে নিঃসৃত হইতে থাকে যে সে প্রায় কথা বলিতে পারে না;

লালা-স্রাবী গ্রন্থি গুলি বৃহত্তর ও মুখ উচ্চতর হইয়া উঠে । শরীর ঘর্ষে অভিযুক্ত হয় ; কয়েক মিনিটের মধ্যে এক একবার গাত্র-বস্ত্র ভিজিয়া যায়, এবং রোগীর এক প্রকার স্বচ্ছন্দতা, বা দুর্বলতা অমুভূত হইতে থাকে । অতিশয় পিপাসা জন্মে । কনিষ্ঠিকা অল্প অল্প আকৃষ্ট হয় । ক্রমে ক্রমে নিঃশ্রবণ-প্রক্রিয়ার আতিশয্যের হ্রাস পড়ে ; এবং সোওয়া ঘণ্টা বা তিনপোওয়া ঘণ্টার মধ্যে রোগীর অশ্রুস্রাব, নাসাস্রাব ও শ্বাস-নলীর নিঃশ্বাস কমিয়া যায়, পরিশেষে লালা-স্রাব ও ঘর্ষ-স্রাবেরও লাঘব জন্মে, এবং আক্রান্ত শরীরংশগুলি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় । ঘর্ষ ও লালা-নিঃসরণ রহিত হইলে রোগী অবসন্ন ও তন্দ্রালু হইয়া পড়ে । এক্ষণ, যে সকল স্থান হইতে এত প্রভূত পরিমাণ স্রাব নিঃসৃত হইল তাহার, বিশেষতঃ মুখ-মধ্য ও গল-কোষের অতিশয় পরিণুক্ততা জন্মে অপিত, রোগীর সমধিক পিপাসা হয় । অনেক সময় ইহার ক্রিয়ায় অন্তের শৈল্পিক বিপ্লী উত্তেজিত হইয়া এক প্রকার উৎকট অতিসার উৎপন্ন হয়, মূত্র অতিশয় বৃদ্ধি পায়, এবং জরায়ুর ও বোনির স্ফেদ্রাস্রাব বর্দ্ধিত হয় ।

জেবোরাঙীর ক্রিয়ায় রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষমতা বিবর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু ধমনীর দৃঢ়তা ও গাত্রের উষ্ণতার লাঘব জন্মে ।

অধিকার ।—তরুণ রোগের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় অথবা বক্ষাদি রোগের প্রাচীন অবস্থায় অতি ঘর্ষে ; লালাস্রাব, ও নিকট দৃষ্টি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় । এন্ট্রোপিয়া, ফাইসটিগমিয়া, এমিল নাইট্রাইটের সহিত জেবোরাঙীর তুলনা হইতে পারে ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

প্রতিশ্রায়া—ঈষৎ জ্বর ; বিষকৃত লালাস্রাব ; নাসিকা হইতে স্রাবনিঃসরণ ; অশ্রুক্ষরণ ; শিরঃপীড়া ; নাসা-রক্ত, ও অস্থিতে স্পর্শ-দেয় ; প্রচুর ঘর্ষ ; অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ; অকারণে একবার বিমর্ষতা, একবার প্রফুল্লতা ; অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধ ; জেবোরাঙীরলক্ষণ । অতিসার ।—পীতবর্ণ, জলবৎ, বেদনাশূন্য, সবেগে নিঃসৃত অতিসার ; অতিসার জন্ত এক প্রকার শুলোদরতা অমুভব, কিন্তু বেদনার অভাব ; উদগার ও হিকা ; বিবমিষা, ও আকস্মিক বমন ; এই ঔষধের লক্ষণ । ঘর্ষ ।—প্রভূত ঘর্ষস্রাব ও লালা-স্রাব ; শরীরের অধিকাংশ গ্রন্থি বিধান হইতে প্রচুর নিঃশ্রব নিঃসরণ ; কপালে ও বদনে ঘর্ষের আরম্ভ, অনন্তর সর্বশরীরে উহার বিস্তৃতি, ও দেহ-কাণ্ডে অত্যন্ত আধিক্য ; ঘর্ষান্তে গভীর অবসাদ ; কেবল বামভাগে ঘর্ষ ; এই সকল লক্ষণে বিকৃত ঘর্ষে জেবোরাঙী ব্যবহৃত হয় । তরুণ রোগের পরবর্তী আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ঘর্ষ এতদ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত ও বক্ষার নৈশঘর্ষ উপশান্ত হয় । ডাঃ মরেল ইহার মূল অরিষ্ট পনর বিম্বু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বক্ষার ঘর্ষস্রাবের কতকগুলি রোগীর বিলক্ষণ উপকার করিয়াছিলেন । এই ঔষধের ক্রিয়া ধীরে ধীরে দর্শে । একবার এতদ্বারা ঘর্ষস্রাব রুদ্ধ হইলে বহুসংখ্য আর ঘর্ষস্রাব

হয় না । **স্তন-দুগ্ধ** । —ডাঃ ব্রিংগার তত্ত্বাবধি বর্জনার্থে জেবোরাণ্ডী ব্যবহার করেন ।  
**জরায়ু-রোগ** । —ডাঃ হেল বলেন যে যে সকল স্ত্রীলোকের গাত্র-স্বক রুদ্ধ, ও বর্ষাশ্রাব  
 শুল্ক, মুখ পরিশুদ্ধ, এবং সাধারণতঃ গ্রন্থিগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থ ; বাহ্যিকের সচরাচর  
 অতি অল্প পরিমাণ রক্তশ্রাব হয়, ও রক্তের পরিমাণের স্বল্পতাহুসারে ধার্মিক রক্তপূর্ণতার  
 লক্ষণ প্রকাশ পায় ; তাহাদিগকে ঋতু প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পূর্বে হইতে  
 জেবোরাণ্ডীর কয়েকবিন্দু অরিষ্ট প্রতিদিন চারিবার সেবন করিতে দিলে স্বাভাবিক  
 রক্ত নিঃসৃত ও স্বন্দ নির্গত হইয়া থাকে । প্রসবাত্তিক আশ্রাবের স্বল্পতা বা সংকল্পতা  
 বশতঃ স্তন্য নিঃসরণ রহিত হইলে জেবোরাণ্ডী প্রয়োগে জরায়ুর আশ্রাব পুনরায় বিনির্গত  
 ও প্রচুর পরিমাণে স্তন্য ক্ষরিত হয় । কোন কোন জর্ষণ চিকিৎসক অনিয়মিত প্রসব  
 বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহার করেন । প্রসব-কার্য্যে কলোফাইলমের ভ্রায় ইহার ক্রিয়া  
 দর্শে । জর্ষণদেখে বিচর্চিকা, উপদংশাদি চর্ম্ম-রোগ চিকিৎসায় চর্ম্মের নীচে পিত্তকারী  
 দিয়া পাইলোকার্পিন প্রয়োগ করাতে চারিজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইয়াছিল ।  
 একজন অকাল প্রসব নিবারণ, এবং প্রকৃত প্রসবকালে জরায়ুর ক্রিয়া নিয়মিত ও উদ্বেজিত  
 করিবার নিমিত্ত জেবোরাণ্ডী ব্যবহারের উল্লেখ আছে । **বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ** । —  
 জেবোরাণ্ডীর বিষক্রিয়ায় বায়ুনলী-ভুজের শ্রাব-নিঃসরণ বর্ধিত হয়, শ্বাসের ত্রুততা,  
 বক্ষঃস্থলে বেদনা ও গৌরবাদি জন্মে । একজন ব্রুকাইটিস রোগে ডাঃ ক্যারিংটন ইহা  
 ব্যবস্থেয় বলেন । ডাঃ হেল বলেন যে যখন কখন কোন এক ব্যক্তির প্রবল পরিশ্রমের  
 পর বিমুক্তভাবে বর্ষাশ্রাব হইতে লাগিল ; তাহার মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীর আরক্ত রাগে  
 রঞ্জিত হইল ; চক্ষু লোহিত ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল ; এবং অধিক পরিমাণে লালা নির্গত  
 হইতে লাগিল । সে কোন শীতল স্থানে বাইয়া বসিল ; সত্বর তাহার শীত বোধ হইল ।  
 অল্পকণ পরেই তাহার গাত্র-স্বক উত্তপ্ত ও রুদ্ধ, মুখ-মধ্যঃ ও গল-মধ্যঃ পরিশুদ্ধ হইয়া  
 আসিল এবং শ্বাস-কষ্ট সংযুক্ত অল্প অল্প শুষ্কতা প্রকাশ পাইল । এই দৃষ্টান্তে আত্যন্তিক  
 ভরণ রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় এরূপ স্থলে সাধারণতঃ একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
 কিন্তু ডাঃ হেল প্রথম দশমিক শক্তির জেবোরাণ্ডীই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করেন ।  
 জেবোরাণ্ডীর সদৃশ মুখ্য ও গৌণ লক্ষণপন্ন রোগীদিগের পক্ষেই তিনি এই ঔষধ সম্পূর্ণ ব্যবস্থেয়  
 বলিয়া উল্লেখ করেন ।

**বুকক-রোগ** । — তরুণ ও পুরাতন বুকক-প্রদাহে এবং তজ্জনিত শোথে স্তন্যবৃদ্ধি  
 করিয়া জেবোরাণ্ডী উপকার করে বলিয়া কোন কোন জর্ষণ চিকিৎসক উল্লেখ করেন ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন, মস্তিষ্কাদি** । — মনের বিশৃঙ্খলা ; কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি । **অঙ্গার-শিরোদূর্ধ্বন** ।  
 অতিশয় নিদ্রাপ্রতা, গাত্র নিদ্রা ; অস্থির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা ; বহুপ্রাণের বহু স্বপ্ন । —

প্রভূত বর্ষ। মস্তকাদি।—মস্তক।—শূণ্যতাহতব। শিরঃপীড়া; লম্বুথকপালে ও মস্তকের গন্টাভাগে মুহুমুহ দপদপকর বেদনা। চক্ষু।—দৃষ্টির অস্পষ্টতা; দুর্বলতা; কনীনিকার অতিশয় আকৃষ্টতা। মুখমণ্ডল।—মুখের প্রদীপ্ততা; পাণ্ডুরতা। স্নায়ুমণ্ডল।—স্নায়ুর ও রক্তবহানাড়ীর শিথিলতা। রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র।—নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রথম বৃদ্ধি, তৎপরে ধীরতা। গাত্র-তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি; শীত; কম্প; উত্তাপ; প্রভূত বর্ষ। শ্বাস-যন্ত্র।—বন্ধঃস্থলে হৃদী-বেদন প্রকৃতির বেদনা। পরিপাক-যন্ত্র।—মুখ-মধ্য।—পরিপাকতা; উত্তাপ; প্রভূত লালানিঃসরণ; গল-মধ্যের শুষ্কতা, ক্ৰিয়াক্রান্ততা। ক্ষুধার বিলুপ্তি, অতিশয় পিপাসা; তিক্ত স্বাদ। আমাশয়।—উদগার; বিবমিষা, বমন; মল মল ভারবৎ যাতনা। উদর।—শূণ্যতা, অল্পে যেন কিছু নাই এরূপ অহুতব। মল।—তরল, পাতলা, প্রবলবেগে নিঃসৃত; পীতবর্ণ, লেইয়ের মত; মল। কোষ্ঠাবরোধ। মূত্র-যন্ত্র।—মূত্র-মার্গে জালা; পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ। মূত্র বিবর্জিত; হ্রাসপ্রাপ্ত। উপচয়।—প্রায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

সমগুণ।—ইপি, একট-টার্ট, মার্ক, বেল, এট্রোপ।

## জ্যাট্রোফা ।

জ্যাট্রোফা কারকাস ইউকরবিয়সী জাতীয় উদ্ভিদ এবং রিসিনস ও ইউকবিয়ার সমগুণ। জ্যাট্রোফার বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। জ্যাট্রোফার বিষ-ক্রিয়ার প্রথমে বিবমিষা ও বমন জন্মে। সহজে অধিক পরিমাণে অন্নাদি বা জলবৎ অণুলালময় পদার্থ বমন হয়। বমনের সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপরে বিরচনা হয়। অল্পপ্রস্থ-স্থলান্নে বেদনা, উদরে আটোপ, ও আত্মান জন্মে। জজ্বা-পৃষ্ঠে খল্লী উপস্থিত হয়। হৃৎকম্প প্রকাশ পায়। জ্যাট্রোফার জলবৎ বিরচন শ্রোতের জ্বায় সবলে নির্গত হয়। বমন-বিরেচনের প্রাচুর্য্য সঙ্গেও রোগীর কোন প্রকার উৎকট রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তাহার স্বক শীতল বা নীলবর্ণ, ক্লান্ত বা শীতল ঘর্ষ-সিক্ত; নয়ন নিমগ্ন; নাসিকা শীতল বা শুষ্ক, বদন বিকৃত বা পাণ্ডুর; এবং স্বর ক্ষীণ বা তন্ন হয় না। কোন প্রকার উৎকর্ষ ও অহুত হয় না। বরং রোগী এই অতিসারে শরীরের স্তম্ভপ্রদ উষ্ণতা ও লঘুতাই অহুতব করে। এজন্ম আতিসারিক ওলাউঠার পূর্ববর্তী অতিসারে ক্রমশঃ বিবমিষা পরিবর্জিত হইয়া বমনে পরিণত হইলে জ্যাট্রোফা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আকস্মিক বমন লক্ষণে ইউকরবিয়া উপযোগী। পূর্ব-লক্ষণ ব্যতীত সহসা বমন; যুগপৎ বমন-বিরেচন; বেদনা, অজ্ঞ-ক্ৰন্দন, ও আত্মানের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞানতা; খল্লী, ও হৃৎকম্পের অভাব;—এই কয়েকটি ইউকরবিয়ার প্রভেদক লক্ষণ। জ্যাট্রোফা ও ইউকরবিয়া ওলাউঠার পূর্বরূপ অবস্থায়ই



স্বাব্যবহেয়। রোগ বিকসিত হইয়া পড়িলে এই দুই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, তখন রিসিনসই উপযোগী। সময়ে সময়ে অতিসারেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মল-শ্রাবের পূর্বে ও পরে পেটডাকা, মধ্যে মধ্যে বোতল হইতে জল ঢালিবার ন্যায় শব্দ, মলশ্রাবান্তেও উহার অনিবৃত্তি; বহুবার মলশ্রাবের পরেও চেপ্টা উদর; এবং শীতল জলে হাত রাখিলে রোগ-লক্ষণের উপশম অতিসারে জ্যাট্রোফার প্রয়োগ-লক্ষণ। অতিসারে সাধারণতঃ ইহার যথাক্রম প্রযুক্ত্য। বিবমিষা ও বমন সংযুক্ত; প্রাতঃকালে আরক্ত; অনাবৃত বায়ুতে নিবৃত্ত ও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশে প্রত্যাবৃত্ত শিরোবেদনায়; এবং সমগ্র মূত্র-মার্গের প্রদাহসংযুক্ত, প্রবল মূত্রবেগ বিশিষ্ট, মূত্রাশয়ের উপদাহও এই ঔষধের ব্যবহার আছে।

## জ্যাছোকজাইলম ফেক্সিনিয়ম—প্রিক্লিএশ।

কটেসী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। আদিম আমেরিকেরা ইহাকে হাটোলা বলে। তাহার ইহার মূলের ছালের কাথ উদর-বেদনা, প্রমেহ, উপদংশ, বাত, আন্তরিক বেদনা, দন্ত-বেদনা ও ক্ষতাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও কেহ কেহ কোন কোন রোগে জ্যাছোকজাইলমের বীৰ্য্য জ্যাছোকজাইলিন প্রয়োগ করেন। ডাঃ রিফাইনেল বলেন যে জ্যাছোকজাইলিন গুল্মে মেজেরিয়ম ও গোয়াই-একমের সমতুল্য এবং পুরাতন বাতে অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ কিং বলেন যে ইহার বহুল “উত্তেজক, বলকর, পরিবর্তক, ও লালা-নিঃসারক” এবং ফল উত্তেজক, আশ্বের ও আক্ষেপ-নিবারক। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে সিনসিনেটি প্রদেশে জ্যাছোকজাইলমের ফলের অরিষ্ট ব্যবহারে অনেকগুলি উৎকট ওলাউঠার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাঃ পেইন বলেন যে এক হইতে দুইগ্রেণ মাত্রায় জ্যাছোকজাইলিন বিকীরণশীল উত্তেজক ঔষধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি এতদ্বারা বিস্তর পক্ষাঘাতের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরেও তৎকর্তৃক এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে জ্যাছোকজাইলমের সরস বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোষ্টন নগরের ডাঃ কলিস হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমাণ্ডলে জ্যাছোকজাইলমের ক্রিয়া দর্শিয়া অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাধিনী স্নায়ুর ও অল্পপরিমাণে গতি-শক্তি-সাধিনী স্নায়ুর উপদাহ ও উত্তেজনা জন্মে। গোণতঃ উভয় শ্রেণীর স্নায়ুরই পক্ষাঘাত বা স্তম্ভতা উপশম হয়, এবং উহার ফল স্বরূপ জীবনীশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ জন্মিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান গ্রহণ-যন্ত্রের ক্রিয়া ও শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার ঔপদাহিক ক্রিয়ায় শৈথিল্য, পেশী ও গ্রন্থির

বিধান-তত্ত্ব বিশিষ্টরূপে প্রভাবিত হয়। জী-জননেজিয়ে জ্যাছোকজাইলমের ক্রিয়ায় শীঘ্র শীঘ্র অধিক রজঃনিস্থত হয়, এবং তৎসহকারে দারুণ ন্নায়বিক বেদনা থাকে, অর্থাৎ ন্নায়বিক রজঃকৃচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**অধিকার।**—ন্নায়বিক রজঃকৃচ্ছ ( নিউরালজিক ডিসমেনোরিয়া ), বিশেষতঃ ক্রীণা, ন্নায়ু-প্রধানা, নারীদিগের রোগে, প্রচুর আর্ন্তব, ও নিম্নোক্ত লক্ষণের বিद्यমানতায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। পা ভিজিয়া রজোলোপ; হিষ্টিরিয়া জনিত অবসাদ ও দুর্বলতা, বিবমিষা ইত্যাদি। প্রসবান্তিক বেদনা। ন্নায়ু-শূল, বিশেষতঃ সায়েটিকা; গ্রীষ্মকালে উহার আতিশয্য; সন্মুখভাগের ক্রুরাল ন্নায়ুর ন্নায়ু-শূল। ওভেরির ন্নায়ু-শূল, বামপার্শ্বে আধিক্য, উরুপর্ধ্যস্ত প্রসারণ। মুখ-মণ্ডলের ন্নায়ু-শূল। পক্ষাঘাত। ক্লোরোসিস।—এই সকল রোগে জ্যাছোকজাইলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**রজোলোপ ( এমেনরিয়া )।**—ডাঃ মার্গী বলেন যে জ্যাছোকজাইলমের অধিষ্টে রজোলোপ, ডিম্বাশয়ের ন্নায়ু-শূল, ও রজঃশূলের শান্তি জন্মে।

**চিকিৎসিত রোগী।**—( ১ ) পঁচিশ বৎসর বয়স্কা একজন কুমারীর তিন, চারি, বা পাঁচমাস অন্তর ঋতু হইত। ঋতুস্রাবের সময় তাহার অসহ্য যাতনা জন্মিত। অত্যন্ত বিষয়ে তাহার শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ছিল। একবার দুইমাস ঋতু বন্ধ থাকিতে সে ডাঃ কলিসের চিকিৎসারীনে আইসে। তিনি তাহাকে প্রথম দশমিক শক্তির জ্যাছোকজাইলম পাঁচ বিন্দু মাত্রায় প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেন। তিনদিনে তাহার বেদনাপরিশুষ্ণ ঋতু প্রকাশিত হয়। ( ২ ) আর একটা ন্নায়ু-প্রধানা কুমারীর ঋতুকালে পা আর্দ্র হওয়াতে রজঃ রুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় মাসে নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ অতীত হইলে ডাঃ কলিসের ব্যবস্থানুসারে সে প্রতিদিন তাহার তিন ঘণ্টা অন্তর পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রথম দশমিক শক্তির জ্যাছোকজাইলম সেবন করে, পরদিন তাহার ঋতু প্রকাশ পায়। ( ৩ ) বত্রিশ বৎসর বয়স্কা, দশটি সন্তানবতী একজন স্থলাঙ্গী জীলোকের পাঁচ মাস ঋতু হয় নাই। ইহার পূর্বের বারেও তিন চারি মাস তাহার রজঃ রুদ্ধ ছিল, জ্যাছোকজাইলম প্রথম ক্রম প্রতিদিন তিনঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করাতে চারিদিনে সে পুনরায় ঋতুমতী হইয়াছিল। ( ৪ ) অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা একজন কুমারীর একবৎসর রজঃ রুদ্ধ ছিল। তাহার বদন, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মুখ-গহ্বর ও চক্ষুর শুষ্ক মণ্ডলের পাণ্ডুরতা ( ফেকাসে রং ); মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ( ফুলফুলভাব ), চক্ষুর চারিদিকে কাল মণ্ডল; ক্ষুধামান্দ্য; উদরের ক্ষীণতা; মূত্রের অপরিচ্ছন্নতা, স্বল্পতা, ইষ্টক-চূর্ণের ত্রায় অধঃক্ষেপ ক্ষরণ; হস্ত পদাদির শোথ, অতিশয় দুর্বলতা, শ্বাস-কষ্ট, এবং একপ্রকার নীরক্তাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। অত্যন্ত ঔষধ বিফল হইলে পর ডাঃ উইলিয়মস প্রথম ক্রমের জ্যাছোকজাইলম ব্যবহা

করাতে চারিদিকে সেই রোগিণীর ঋতু প্রকাশিত হয়; অনন্তর ক্যালকেরিয়া ও কিরম ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ( ৫ ) আর একজন রোগিণীর পাঁচমাস ঋতু রুদ্ধ ছিল। তাহার বদন ও জন্মার শোথ, দায়বীরতা, শব্দে বিবেচ, গুন্দবীরুর ভাব; প্রকল্পিত স্বর, যত্ন-ভয়, রক্তশূন্য আকৃতি, কোষ্ঠবন্ধ; ও ঘন ঘন, স্বল্প, মলিন মূত্র-নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণও ছিল। ডাঃ উইলিয়মসের চিকিৎসায় প্রথম ক্রমের জ্যাছোক-জাইলম সেবন করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ( ৬ ) অপর এক জনের দক্ষিণ ডিরাশয়ের উপর তীব্র বেদনা; অবিরত শিরোবেদনা, উদরের নিম্নদেশে আবেগ ও অশিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন পাঁচ মাস স্থায়ী রক্তজালোপ রোগ ছিল। জ্যাছোকজাইলম প্রথম ক্রম সেবনে সত্ত্বর তাহার শিরোবেদনা দূরীভূত এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই ঋতু প্রত্যাবৃত্ত হয়। ( ৭ ) ঋতুকালে পা ভিজিয়া কোন রোগীর ঋতু রুদ্ধ হয়। ছয় মাস পর্যন্ত ঋতু হয় না। অধিকন্তু শীর্ণতা, কাস; মলিন ঘূসর নিগ্ধবন; পাণ্ডুরবদন, নৈশ ঘর্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম ক্রমের জ্যাছোক-জাইলম প্রয়োগে অল্পকালের মধ্যে ইহারও রোগের শাস্তি জন্মে। ঋতু-প্রধান রোগিণীদিগের রক্তজালোপে এই ঔষধ অধিক উপযোগী; রক্ত-প্রধানদিগের রোগে কখন কখন এতদ্বারা উপকার দর্শে না।

শ্বেত প্রদর।—ডাঃ রডক বলেন যে ঋতু-প্রধান ক্রীণাদীদিগের রক্তজালোপ বা রক্ত-কৃচ্ছ সংকটে শ্বেতপ্রদরে এই ঔষধ ফলপ্রসূ; এবং জীজননেত্রিয়ার রোগে ইহা অতিশয় উপকারী। ডাঃ মার্সী বলেন যে ইহার তৈল দুই হইতে চারি বিন্দু মাত্রায় উত্তেজক স্বরূপ ক্রিয়া করে এবং শ্বেত প্রদর ও প্রবল বেদনাবিশিষ্ট, অতিরিক্ত রোগে উপকার দর্শায়। ডাঃ লিলিয়েহাল ঋতু প্রকাশিত হইবার সময় শ্বেতপ্রদরের অতিশয় আধিক্যে জ্যাছোকজাইলম উপযোগী মনে করেন।

রক্ত-কৃচ্ছ ( ডিসমেনরিয়া )।—ডাঃ কলিস হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার পদ্ধতি অনুসারে দুই জন জীলোককে অধিক মাত্রায় ( ১০-২০ বিন্দু মাদারটিকার ) জ্যাছোকজাইলম সেবন করাইয়া ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একজনের একপ্রকার অবসন্নতা ও দুর্বলতা; জাহ্নতে বেদনা সহকারে নিম্নভের দুর্বলতা; আশাশ্রমে গৌরব সহকারে অল্প অল্প বিবমিষা; বারংবার শীতাহুভব সহকারে বিবমিষা ও অঙ্গ-বেদনার বৃদ্ধি; বর্ধাসময়ের একসপ্তাহ পূর্বে ঋতুর প্রকাশ ও ঋতুনিঃসর্গে অতিশয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অপরের করোটিতে একপ্রকার অশিথিলতা, শব্দ-হ্রলে বেদনা, দায়বীরতা, দক্ষিণ জাহ্নর কম্পন, বর্ধাসময়ের দুই দিবস পূর্বে প্রভূত পরিমাণে ঋতুপ্রাব এবং তৎসহকারে ভয়কর বস্ত্রণা ও বেদনাদি লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি রক্ত-কৃচ্ছ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং এতদ্বারা অনেকগুলি রোগিণীকে রোগ-মুক্ত করেন। ডাঃ উইলিয়মসও রক্ত-কৃচ্ছ ( বাধক

বেদনার) ইহার অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে কোন কোন চিকিৎসক জ্যাছোকজাইলম প্রয়োগ করিয়া একেবারেই কোন ফলপ্রাপ্ত হন নাই। প্রকৃত দ্বায়ুশূল প্রকৃতির রজ-শূলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; রক্ত-সঞ্চয় জনিত রোগে ইহা ফলপ্রসূ নহে। আবার, দ্বায়ুশূলে যে ঔষধে এক সময়ে উপকার দর্শে অল্প সময়ে তদ্বারা উপকার দর্শে না। দ্বায়ুশূলের মুখ্য কারণের সহিত ঔষধের ঠিক সাদৃশ্য না থাকিলে তদ্বারা দ্বায়ুশূল উপশমিত ভিন্ন দূরীকৃত হয় না। বোধ হয় এই কারণেই কোন কোন চিকিৎসক রজ-শূলে এই ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারিতা ও কেহ কেহ ইহার সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা দেখিতে পাইয়াছেন। বামচকুর উপরে শিরঃপীড়া, ঋতুর পূর্বদিন শিরঃপীড়া আরম্ভ; মস্তকে পূর্ণতা, ও উহার চারিদিকে দৃঢ়রূপে বন্ধনের স্থায় অহুভব, চকুর রক্তসঞ্চয় ও অতিশয় আলোকাতঙ্ক, মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উষ্ণতা; উদরে যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ, বোধ হয় যেন উদরস্থ সমস্ত পদার্থ সবলে নিঃসারিত হইবে; পৃষ্ঠে ভগ্নবৎ বেদনা; কট্যস্থির স্থিতিতে বেদনার আরম্ভ ও জাহ্নু পর্য্যন্ত উহার গতি; বেদনাবশতঃ রোগিণীর চিৎকার ও সকল প্রকার অবস্থাতেই অশান্তি; অত্যন্ত, গাঢ়, প্রায় ক্রমবর্ণ, রজ্জ্ববৎ বা খণ্ড খণ্ড একদিন পর একদিন, ছই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব; কটিতে স্ত্রীত্ব বেদনা সহকারে অতি শীঘ্র, অতি প্রভূত রজঃ নিঃসরণ;—এই সকল লক্ষণে \* ক্ষীণকায়, দ্বায়ু-প্রধানা জীলোকের দ্বায়ুশূল প্রকৃতির রজ-শূলে ডাঃ লিগিয়েটাল জ্যাছোকজাইলম ব্যবহৃত করেন। ডাঃ মার্সী বলেন যে উক্তর দ্বায়ুর মধ্যস্থিত বেদনা প্রসারিত হইলে অর্থাৎ ডিম্বাশয়িক রজ-শূলে এই ঔষধ উপকারী। তিনি “উক্তর দ্বায়ুর অভ্যন্তর দিয়া বেদনার সম্প্রসারণ” ইহার বিশেষ লক্ষণ মনে করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে অতিরিক্তরোগের সহিত রজশূল সংশ্লিষ্ট থাকিলেই তিনি জ্যাছোকজাইলম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইহার ১দ—৩দ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

প্রসবাস্তিক বেদনা।—রজ-শূলের অত্যন্ত ঔষধের স্থায় এই ঔষধও প্রসবাস্তিক বেদনার অতিশয় উপকারী। ডাঃ মার্সী বলেন যে হেঁতাল ব্যাধায় জ্যাছোকজাইলম বিশেষ ফলপ্রসূ।

স্ফাল্‌টিন।—জ্যাছোকজাইলমের বীর্ঘ জ্যাছোকজাইলিন এসোনিয়ার স্থায় সর্বাঙ্গীন উত্তেজক বলিয়া ডাঃ মার্সী ইহাকে উদ্ভিজ্জ এসোনিয়া বলিয়া থাকেন। ইহার প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ ছই গ্রেণ মাত্রার অর্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবনে স্ফাল্‌টিনার বিলুপ্ত উত্তেজ পুনরায় প্রকাশিত হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—স্বাভাবিকতা, ভীততা অহুভব। মানসিক অবসাদ ও হর্ষলতা। মস্তক।—মস্তক পূর্ণ ও ভারী অহুভব। ধাঁধালাগা অহুভব, মস্তকের পশ্চাৎবেদনা। বিবমিধা সহকারে দক্ষিণ চকুর উপর দগদগকর শিরঃপীড়া। অবিরাম বেদনা ও দগদগবৎ বেদনার

সহসা আবেগ, বোধ হয়। যেন সন্তকের শিখরদেশ পতিত হইবে। নাসা মূলের উপরে দগদগ সহ চক্ষুর উপরে বেদনা। মস্তকের কেশাবৃত অংশের অশিখিলতা। নাসিকা।—দক্ষিণ নাসারন্ধ্র পূর্ণ বোধ হয়। শ্লেয়াশ্রাব; শুষ্ক ও রক্তাক্ত শব্দ নিঃসরণ। মুখ-মণ্ডল।—বাম পার্শ্বের নিম্ন হস্ততে বেদনা। মুখ-মধ্য।—মুখ-বিবরে, গহ্বরে ও গলার অভ্যন্তরে গোলমরিচের আশ্রাদ। গল-মধ্য।—গলা-বেদনা, ও দুঃশ্বেদ্য শ্লেয়া নিষ্ঠীবন। গিলিবার সময় গলার বামভাগে থোপার ছায় অল্পভব, ও দক্ষিণ ভাগে উহার পরিবর্তন। আমাশয়।—ক্ষুধাহীনতা; উদগার বিবমিষা। বারংবার শীত সহকারে গুরুত্ব অল্পভব। পূর্ণত্ব বা প্রচাপন অল্পভব; চঞ্চলতা। মূত্রে।—০ নায়বীয় নারীদিগের প্রচুর, পাতলা রঙ্গের মূত্র। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—ডিষ্টাশয়ের বেদন; জনন-যন্ত্রের ও জজ্বার দ্বায়ু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ। ভয়ঙ্কর যাতনা ও বেদনা; শিরোবেদনা; নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ঋতুশ্রাব; উরুর সম্মুখভাগের নিম্ন পর্য্যন্ত বেদনা; অতি-নায়বীয়তা, সহজে চমকিত হইয়া উঠা ও হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ করা; দ্বায়বীয় রজ-শূল (বাধক বেদনা)। ০ পূর্বোক্ত প্রকৃতির প্রসবাস্তিক বেদনা, তৎসহ প্রভূত প্রসবাস্তিক শ্রাব। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, গলায় ককর্ষতা অল্পভব। দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা; বক্ষঃস্থলে অশিখিলতা অল্পভব জন্মন প্রবৃতি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—জননেন্দ্রিয় ও জজ্বার দ্বায়ুর গতিপথে দারুণ দ্বায়ু-শুলের বেদনা। নিম্নাঙ্গের অতিশয় দুর্বলতা। অঙ্গ দ্বায়বিক, চিড়িক মারা বেদনা; অবশতা ও দুর্বলতা। দেহ।—কণ্টক-বেধনবৎ অল্পভব, তড়িত প্রয়োগের ছায় মূহ আঘাত। শৈথিল্য বিলীতে গোলমরিচের ছায় যাতনা; প্রতিশ্রাব।

সমগুণ।—বেলে, সিমি, জেল।

## টার্ণরা এক্সোডিসিয়েকা

এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলে জন্মে। আদিম আমেরিকেরা ইহাকে ডেমিয়ানা বলে। এই ডেমিয়ানা নামেই ইহা সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক রীতি অনুসারে ডেমিয়ানা পরীক্ষিত হয় নাই। তথাপি ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ডেমিয়ানা হেলোনিয়াস, এলিট্রিস, ট্রীকনিয়া, ফসফরিক এসিড, ও হাইপো-ফসফাইটসের সমগুণ বলিয়া বোধ হয়। এই বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের স্তব্ধতা, আংশিক ধ্বজভঙ্গ; দ্বায়বীয় অবসন্নতা জনিত সঙ্গম শক্তির লাবণ্য; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের দ্বায়ুদৌর্বল্য; বৃদ্ধদিগের অব্যবহিত মূত্র; দৌর্বল্য জনিত শুক্রমেহ; প্রোটোগ্রাফির পুরাতন শ্রাব নিঃসরণ; এই সকল রোগ এই ঔষধে আরোগ্য হয় বলিয়া

উল্লিখিত আছে। ডাঃ হেরিং বলেন যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার “অধোভাগ অথবা বাহির হইয়া ডেমিয়ানার জন্ম হইবে,” অর্থাৎ আগে ইহার প্রয়োগ হইয়া পরে পরীক্ষা হইবে। এজ্ঞা ডাঃ হেল এই ঔষধ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত চিকিৎসকদিগের বিশ্বাসযোগ্য উক্তিও উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

ডাঃ ক্যান্ডওয়েল কয়েক বৎসর এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেকগুলি ধ্বজতজ রোগের রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি ডেমিয়ানার সার ও অরিষ্ট উভয়ই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে অরিষ্ট অপেক্ষা সারই ভাল প্রয়োগরূপ। ক্যান্ডওয়েল বলেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রে ডেমিয়ানার অত্যন্ত প্রভাব দর্শে। অনতিমাত্রায় এতদ্বারা মূত্র-শ্রাব ও কাম-প্রবৃত্তি প্রবৰ্দ্ধিত হয়; অল্পমাত্রায় বস্তিগহ্বরস্থিত সমস্ত যন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং সেই সকল যন্ত্রের শক্তি ও নিঃস্রবণ-ক্রিয়ার আতিশয্য জন্মে। মেক্সিকোর লোকেরা ডেমিয়ানার এক, আউঙ্গ শুক পাতা এক পাই-ট জলে ভিজাইয়া ফাট প্রস্তুত করে ও উহা একদিনে সেবন করিয়া থাকে। এইরূপে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিলেই সুন্দর ফল দর্শে ইহার কামোত্তেজনী শক্তি সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। প্রচলিত ফসফরাস, আর্গট-অব-রাই, ক্যান্সেরাইডিস, স্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি ঔষধ অপেক্ষা ডেমিয়ানা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। ফাট ব্যবহার সর্বদা সর্বত্র সুবিধাজনক নহে বলিয়া সচরাচর ইহার তরল সার (ফ্লুইড এক্সট্রাক্ট) অর্কড্রাম বা একড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপযুক্ত মাত্রায় (একড্রাম হইতে চারিড্রাম) কতিপয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিলে এই ঔষধে নিশ্চিতরূপে ফল দর্শে না। বাহাদের যন্ত্র-গত দোষ আছে তাহাদের এতদ্বারা কোন উপকার হয় না। কোন ঔষধেই হয় না। ডেমিয়ানা তিক্ত ও বিষাদ। এজ্ঞা দুইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। ডাঃ গ্রোস বলেন যে, যে কারণেই কেন সংসর্গ-শক্তির হ্রাস বা অভাব উৎপন্ন হউক না কেন, প্রজনন-শক্তির লাঘব ও তজ্জন্ত নিরপত্যতা সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ রোগ। এবং চিকিৎসকদিগের ও এই রোগের প্রতি তদ্রূপ প্রগাঢ় মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ডেমিয়ানা স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ার অতি উৎকৃষ্ট ও অবধারিত উত্তেজক ও বলকর ঔষধ। কিন্তু ইহা যথোপ-যুক্তরূপে প্রস্তুত না হইলে এতদ্বারা উপকার দর্শে না। যাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই তাহাদের ঔষধেরই দোষ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ পোক বলেন যে ডেমিয়ানা অল্প-পথে পরিবর্তক এবং মূত্র যন্ত্র ও জননযন্ত্রে বলকর স্বরূপ ক্রিয়া করে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্নায়বীয় বলকর ঔষধ। স্ট্রিকনিয়ার ভায় মস্তিষ্কে ও স্নায়ু-কেন্দ্রে ডেমিয়ানার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহা বিষাক্ত নহে। এতদ্বারা স্নায়ু-কোষের পরিপোষণের উত্তেজনা ও রক্ত হইতে উহার উপাদান সমীকরণের সামর্থ্য জন্মে। গ্রীবা-পৃষ্ঠের মজ্জা ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার সহিত ডেমিয়ানার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান-জনন স্নায়ু অপেক্ষা

গতি-জনন-মাসুতেই ইহার অধিকতর ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। এজন্য ধ্বজভঙ্গের জায় পক্ষাঘাতও এই ঔষধে উপকার জন্মে। তিনি দুইজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী এতদ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। ধ্বজভঙ্গে অর্থাৎ উপস্থের অসম্যক বা সম্যক অনুষ্ঠানে ও তজ্জন্ত প্রজনন ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতায়, কোন প্রকার বিধান-বিকার বা নির্মাণ-বিকার না থাকিলে ডেমিয়ানা প্রায় অমোঘ। তবে ঔষধের কৃত্রিমতা বা প্রস্তুত-দোষ থাকিলে এতদ্বারা উপকার না দর্শিতে পারে। ডেমিয়ানা কোষ্ঠবৃদ্ধিও রাখে। ডাঃ মেলোরি বলেন যে বৃদ্ধ ও দুর্বলীভূত ব্যক্তিদিগের বিধান-বিকার পরিশূন্য অব্যবহিত মূত্রে ডেমিয়ানা প্রায় অব্যর্থ। ডাঃ হানসেন ধ্বজভঙ্গে ডেমিয়ানার প্রথম দশমিক শক্তির ঔষধ দশ হইতে কুড়ি বিন্দু মাত্রায় প্রত্যাহ সেবন করিতে বিধি দেন।

**চিকিৎসিত-রোগী।—**(১) একজন বলিষ্ঠ নববিবাহিত স্ত্রীর যুবক ক্রমাগত ছয়মাস অত্যন্ত অতিরিক্ত ইঞ্জিয় সেবা করাতে ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত হয়। দুইমাস ডেমিয়ানা সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। (২) পতিত হইয়া একজন কেরানীর পৃষ্ঠবংশে আঘাত লাগে তাহা হইতে তাহার ধ্বজভঙ্গ জন্মে। তাহার একেবারেই সংসর্গের প্রবৃত্তি বা শক্তি ছিল না। এক ড্রাম মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার দেড়মাস পর্য্যন্ত ডেমিয়ানার ফ্লুইড এক্সট্রাক্ট (তরল) সেবনে তাহার বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কিন্তু ঘন ঘন স্ত্রীসংসর্গ করাতে আবার তাহার শক্তি লাঘব হয়। পুনরায় কয়েক সপ্তাহ ডেমিয়ানা সেবন করিয়া সে আরোগ্য লাভ করে। (৩) একটা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক গুল্মবায়ুগ্রস্তা বিবাহিতা যুবতীর একেবারেই সন্তোগ-লিপ্সা ছিল না। তাহার জননেন্দ্রিয়গুলি সকলই স্তব্ধ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। তিন মাস ডেমিয়ানা সেবন করিয়া লুপ্ত প্রবৃত্তি পুনরুদ্ধার হয়। অধিকন্তু শরীরের সবলতা ও সুস্থতা জন্মে। (৪) একজন পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক মৃতদার ব্যক্তির তিন বৎসর পর্য্যন্ত উপস্থের শুষ্কতা ছিল। ডেমিয়ানা সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। তৎপরে সে পুনরায় বিবাহ করে। (৫) একজন বিষ্ময়জনক বৎসর বয়স্ক বায়ু-প্রধান ধাতুর লোকের কয়েক বৎসর স্থায়ী শুক্রমেহ রোগ (স্পার্শ্বে টোরিয়া) ছিল। চারি বৎসর যাবৎ সে স্ত্রী-সংসর্গেও অসমর্থ ছিল। ডেমিয়ানা সেবনে তাহার শুক্রমেহ আরোগ্য হয় ও সংসর্গে সামর্থ্য জন্মে। (৬) চব্বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবকের শুক্রমেহ রোগ ছিল। দিবসে ও রাত্রিতে, বিশেষতঃ মল-মূত্র ত্যাগান্তে তাহার শুক্রপাত হইত। তাহার দুর্বলতা, স্নায়বীয় উপদাহিতা; চিত্তের একপ্রকার উদাসীনতা, আত্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ; দৃষ্টি ও শ্রুতি শক্তির ক্ষীণতা; স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হৃৎকম্পের আবেশ, শিরঃপীড়া, শিরোবুর্নাদি লক্ষণও ছিল। একবৎসর এই ঔষধ সেবনে তাহার উপকার দর্শে। ডাঃ হেলের গ্রন্থে ডেমিয়ানার ঈদৃশ উপকারিতার আরও অনেকগুলি গৃহস্থ পংখ্যীত হইয়াছে, বাহ্যিক ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না।

## টিউবারকিউলাইনঃম ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষজ্য-তত্ত্বের কতকগুলি ঔষধ প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগজ পদার্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা, কক্কু-বিষ হইতে সোরিগম, উপদংশ-বিষ হইতে সিফিলাইনম, বসন্ত-বিষ হইতে ভেরিওলাইনম, প্রমেহের বিষ হইতে মেডোরাইনম, রুম্ব তিমিবসা হইতে এম্বুগ্রিসিয়া, ও আর্গট অব রাই নামক শস্তের ছত্রক হইতে সিকেলি করনিউটম প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল ঔষধকে রোগজ ঔষধ (Nosodes) বলে।

যদিও এই সকল ঔষধের ঔষজ্য-গুণ, পরীক্ষায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে তথাপি কুসংস্কার বশতঃ ইহাদের ব্যবহারে বিলক্ষণ আপত্তি হইয়া থাকে। সোরিগম, সিফিলাইনম প্রভৃতি ঔষধ ঘৃণিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনেকেই উহা ব্যবহার করিতে চান না। এরূপ আপত্তি অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। কেননা, এইসকল ঔষধত আদত অবস্থায় অথবা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ রোগজ ঔষধগুলি উচ্চক্রমেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিশততম শক্তির সোরিগমের বা সিফিলাইনমের পরমাণুতে ঘৃণা জন্মিবার কি থাকে? এই সকল ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে আর একটা গুরুতর আপত্তি ও শুনা যায়। কোন কোন প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন যে এই সকল ঔষধে রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। বরং আইসোপ্যাথির সহিত হোমিওপ্যাথি বিজড়িত করিয়া হোমিওপ্যাথির উন্নতির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। হোমিওপ্যাথি চিন্তা-প্রসূত চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান,—ভ্রমোদর্শনের ফল। হানিম্যান সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াই এইসকল ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। এক্ষণে অল্পমিতি বা উপমিতি দ্বারা নয়, কিন্তু পরীক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা হোমিওপ্যাথির সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আইসোপ্যাথির মূল-স্বত্র এই যে “বাহ্যতে রোগ জন্মায় তাহাই উচ্চক্রমে ব্যবহার করিলে সেই রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।” যথা, বসন্তের পুথের উচ্চক্রম সেবনে বসন্ত আরোগ্য হয়। অগ্নি দাহের জ্বালা অগ্নিরতাপে নিবারিত হয়। আইসোপ্যাথিতে ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথির জ্বালা আগে সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইয়া পরে রুম্ব শরীরে প্রয়োজিত হয় না। নিউইয়র্ক নগরের ডাঃ সোয়ান বলেন যে কাহারও যদি শারীরিক প্রকৃতি এরূপ থাকে যে ইবেমি ফল খাইলেই তাহার অন্থ করে তবে ইবেমির ক্রম প্রস্তুত করিয় সেবন করিলে তাহার সেই প্রকৃতি দূরীকৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই তিনি প্রকৃত আইসোপ্যাথি বলিয়া উল্লেখ করেন। ডাঃ ফ্যারিংটনও উহাই বিস্তৃত আইসোপ্যাথি বলিয়া সমর্থন করেন। কিন্তু রোগজ ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঠিক ঐ প্রকারে ব্যবহৃত হয় নাই। এই সকল পদার্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার রীতি অনুসারে প্রথমে সুস্থশরীরে পরীক্ষিত, অনন্তর পরীক্ষা-লক্ষণানুসারে রুম্ব শরীরে প্রয়োজিত হইয়াছে। রোগে উহাদের ফলবদ্ধ ও উপকারিতা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই অজ্ঞান



আণুবিক পদার্থের জায় রোগজ পদার্থগুলিও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপে পরিণত ও পরিগণিত হইয়াছে। আইসোপ্যাথিক ঔষধের জায় বিনা পরীক্ষায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় উহার্য্য পরিগৃহীত হয় নাই।

টিউবারকিউলাইনম এই সকল রোগজ ঔষধের একটা। ব্যাসিলাইনমও উহারই রূপান্তর। ডাঃ ফিক ও সোয়ান যক্ষ্মাগ্রস্ত ফুসফুসের পুষ্কর নিম্নবন হইতে এবং ডাঃ হিথ্ অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট ব্যাসিলঃ টিউবার কিউলোসিস বিশিষ্ট টিউবার কিউলাস ( গুটিকাদৃষ্ট ) ফুসফুস হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এজন্য ফিক ও সোয়ানের ঔষধ টিউবার কিউলাইনম এবং হিথের ঔষধ ব্যাসিলাইনম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় প্রস্তুতিই নির্ভর যোগ্য ও ফলপ্রসূ।

উপযোগিতা।—যে সকল ব্যক্তির মুখাকৃতি পাতলা, নয়ন নীলবর্ণ, শরীরের বর্ণ গোঁর ; হৃদ্যদের বক্ষঃস্থল দীর্ঘ, ক্ষৌণ, চেষ্টা, ও অপ্রসারিত ; মানসিক শক্তি অকাল-পক, শরীর দুর্বল ; এবং হৃদ্যদের গুটিকা-ধাতু ; তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যখন কোন রোগীর কুল-দোষে গুটিকা রোগের ( টিউবারকিউলার ডিজিজ ) বিবরণ জানা যায়, এবং \* অত্যন্ত স্ননির্বাচিত ঔষধও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে তখন রোগের নাম বাহাই কেন না হউক, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অধিকার।—টিউবারকিউলার মিনিজাইটিস, টিউবারকিউলোসিস পলমোনম, টিউবার কিউলোসিস আর্থ্রাইটিস, ব্রাইটিস ডিজিজ, প্রভৃতি রোগে সাধারণতঃ এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

বিশেষ লক্ষণ।—\* \* রোগের লক্ষণের অবিরত পরিবর্তন। ফুসফুস, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যক্ৰ, আমাশয়, স্নায়ুগুণ প্রভৃতি যন্ত্রের একটীর পর আর একটির অক্রান্ততা,—সহসা উত্তর আরম্ভ ও সহসা উত্তর বিরতি। \* \* সহজে শর্দি লাগে। ০ কি প্রকারে কোথায় শর্দি লাগে তাহা ঠিক করিতে পারা যায়না। বিমুক্ত বায়ুর প্রতি-নিঃশ্বাস গ্রহণেই বেন শর্দি লাগে এরূপ বোধ হয় ( হিপ )। \* \* ক্ষত ও স্ফুট শীর্ণতা ; ভালরূপে আহার করিলেও মাংসের ক্ষয়প্রাপ্তি ( এব্রোটি ; কাক, কোন, আইও, জাটি )। বিষন্নতা, আশাশূন্যতা, গিমর্ষতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা, ক্ষণরাগিতা, নীরবতা, নিরানন্দতা, স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি কিন্তু এক্ষণ প্রায় উন্নততা। গৃহের সমস্ত বস্তুই অপরিস্রুত বোধ হয়, বেন কোন অপরিস্রুত স্থানে অবস্থিতি করা বাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—শিরঃপীড়া।—পুরাতন ও গুটিকা জনিত শিরঃপীড়া, দাক্ষ, তীব্র, কঠিনবৎ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে মস্তকের পশ্চাত্তাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা বোধ হয় যেন মস্তকের চারিদিকে একটা লোহার পতর রহিয়াছে ( এনাক, সলফ, ) অতিশয় স্ননির্বাচিত ঔষধও বেদনা কেবল বাধ্য থাকে মাত্র। বিভ্রালয়ের বাসিকাদিগের শিরোবেদনা।—অ্যারনে বা স্যামাক মানসিক শ্রেমে বেদনার অতিশয় ; অ্যুরে চক্ষু রাখিয়া কার্য্য

করাতে বৃদ্ধি, চসমা চোখে থাকিলেও অল্পপশম; গুটিকা-দোষের পূর্ববৃত্তান্ত। মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর বা উহার ভূমিদেশের প্রদাহ,—তৎসহ রস-প্রসেকের আশঙ্কা, রাত্রিতে ভ্রান্ত দৃষ্টি (ধাঁধাঁ-দেখা); নিদ্রা হইতে চিংকার পূর্বক জাগরণ; যখন এগিস, হেলি বা সলফ স্থনির্বাচিত হইলেও ফলপ্রদ হয় না। স্ফোটক।—নাসিকায় ক্রমাগত দারুণ বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহের উৎপত্তি; \* হরিদ্বর্ণ হর্গন্ধ পুয় (সিকেলি)। প্লাইকা পলোনিকা।—এই কেশ-রোগে বোরাক্স ও সোরিগম বিফলাস্তে এই ঔষধে কএকজন রোগী চির আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অতিসার।—আকস্মিক, অনিবার্য; প্রত্যাঘাতালী অতিসার (সলফ); ভালরূপে আহার গ্রহণে ও শরীরের শীর্ণতাপ্রাপ্তি (আইও, ট্রাট); ময়লা, কটা, জলবৎ, হর্গন্ধ মল; অতিবলে উহার নিঃসরণ; অতিশয় দুর্বলতা ও প্রভূত নৈশ ঘর্ষ। রক্তোরোগ।—নির্দারিত সময়ের অধিক পূর্বে; অতি প্রভূত; অতিরিক্ত দীর্ঘকালস্থায়ী; প্রারম্ভে ধীরগতি; ভয়ঙ্কর রক্ত-কৃচ্ছ, সংযুক্ত; ও গুটিকা-দোষের ইতিবৃত্ত বিশিষ্ট; ঋতু। পামা (একজিমা)। সমস্ত শরীরের উপর গুটিকাজনিত পামা; দারুণ কণ্ডুয়ন, রাত্রিতে গাত্র-বস্ত্র উন্মোচনে, ও স্নানে উহার আধিক্য; অধিক পরিমাণে শাদা শাদা ভূমির ভায় শব্দ-পাত; কর্ণের পশ্চাতে, চুলে, চর্ম্মের বলিতে অবদরণ ও স্পর্শ-দেহ সহ রস-ক্ষরণ; চর্ম্মের অগ্নিবৎ আরক্ততা। দক্ষ। ফুসফুসের রোগ।—ফুসফুসের, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের শিখর-দেশে গুটিকা সঞ্চয় (ফস, সলফ, থেরে)। ক্ষয়-কাশ রোগে ডাঃ সোয়ান ও ডাঃ বিগলার এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কয়েকজন রোগীর আশ্চর্য উপকার দর্শাইয়াছিলেন। ডাঃ সোয়ান চারি সপ্তাহে সাতদিন পর পর এক এক মাত্রা ঔষধ মাত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরের ডাঃ বার্ণেটও এতদ্বারা কতকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। রোগজ ঔষধগুলি উচ্চক্রমেই ব্যবহৃত হয়। নিম্নক্রমে অপকারের সম্ভাবনা আছে।

সম্বন্ধ।—(১) সলফার ও সোরিগমের সহিত টিউবারকিউলাইনমের অল্পপূরক সম্বন্ধ। (২) যখন সোরিগম বা সলফার, অথবা অল্প কোন স্থনির্বাচিত ঔষধে স্থায়ী উপকার দর্শনা তখন টিউবার ব্যবহৃত হয়; হে-ফিভার ও ম্যাজনা রোগে ধাতু দোষ সংশোধনার্থে সোরিগমের পরে টিউবার প্রয়োজিত হয়। (৩) গুটিকাজনিত রোগে, রক্ত-সঞ্চয় বা প্রদাহের তরুণ আক্রমণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। (৪) টিউবার প্রয়োগে আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগীর শরীরের স্থূলত্ব জন্মাইবার জন্য হাইড্রাটিস প্রয়োজিত হয়।

## টিলিয়া টিফোলিয়েটা — ওয়েকারয়াশ ।

কটেনী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে । ইহার মূলের সরস বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ।**—পরিপাক-পথের শৈল্পিক বিল্লীতে টিলিয়ার বিশেষ ক্রিয়া বশতঃ অজীর্ণ ও পৈত্তিক উপসর্গের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, এবং যকৃৎ, আমাশয় ও অন্ত্রে ; অপিচ গোণতঃ কুস্কুমে, রক্ত-সঞ্চয় জন্মে । ইহার ক্রিয়া প্রবলভাবে দর্শনা, কিন্তু আন্তে আন্তে পরিব্যাপ্ত হয় ও অনেকগুলি পুরাতন অস্বাভাবিক অবস্থার উৎপত্তি করে ।

**অগ্নিকার ।**—লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে পিত্ত-প্রকোপ ; অজীর্ণ ; আমাশয়-শূল ; যকৃৎের রক্ত-সঞ্চয় ; যকৃৎের পুরাতন প্রদাহ ; অতিসার ; কোষ্ঠবদ্ধ ; প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে । পুরাতন যকৃৎরোগে ও পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় প্রধানতঃ টিলিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**যকৃৎরোগ ।**—ফারিংটন বলেন, যে যকৃৎের রক্ত-সঞ্চয়ে, দক্ষিণ কুক্ষিতে ভার ও চাপানুভব ; যকৃৎের বিরুদ্ধি ; এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশয় লক্ষণে টিলিয়া উপযোগী । যকৃৎের রোগে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার সহিত টিলিয়ার সাদৃশ্য আছে । ডাঃ মার্সী বলেন যে দক্ষিণ কুক্ষিতে তীব্র বেদনা ; দুই কুক্ষিতেই অবিরত গুরুত্ব অনুভব, ও হাঁটবার সময় এক প্রকার অকর্ষণবৎ বেদনা ; বেদনার নিম্নদিকে সঞ্চরণ ; যকৃৎের ভূমিদেখে, বা স্নীহ প্রদেশে ক্ষতনা ; টিলিয়া সেবনে প্রশমিত হয় । ডাঃ নিকল বলেন যে যকৃৎের রোগের আত্মসঙ্গিক বিসর্প ও শীতপিত্ত জনিত উদ্বেদেও এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ । ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি পৈত্তিক শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়ের বেদনা, যকৃৎের রক্তসঞ্চয়, পুরাতন যকৃৎ-প্রদাহ, এবং পুরাতন বিসর্প রোগে টিলিয়ার উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন । **শিরঃপীড়া ।**—মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে ঘৃষ্টবৎ অনুভব টিলিয়ার লক্ষণ । শিরোবেদনায় ইপিকাকের লক্ষণের সহিত টিলিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । ইহার লক্ষণেও ইপিকাকের দ্বারা “মস্তিষ্ক ও করোটা ঘৃষ্টবৎ অনুভব, মস্তকের সকল অস্থির অভ্যন্তর দিয়া জিহ্বা মূল পর্য্যন্ত বেদনার প্রবিষ্টতা, ও বিবমিষা” লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় । ডাঃ মার্সী বলেন যে টিলিয়া তরুণ পৈত্তিক শিরঃপীড়ার ত্রিক সদৃশ ঔষধ । অতিভোজন ও বিরক্তি বশতঃই সচরাচর এই প্রকার শিরোবেদনা উৎপন্ন হয় । সর্বদা মাংসাহারে মস্তিষ্কের উপদাহিতা জন্মে, এজন্য এই রোগগ্রস্ত রোগীর মাংস ভোজন উচিত নহে । **অন্যান্য রোগ ।**—পুরাতন বাত ; রক্তাতিসার, কোষ্ঠবদ্ধেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দৃষ্ট হয় ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—অসামর্থ্য জন্ম নয়, কিন্তু ক্রান্তি বশতঃ মানসিক কার্যে অপ্রবৃত্তি । পিত্ত-প্রকৃপ্ততার ভায়ে অতিশয় মানসিক বিশৃঙ্খলতা । স্মৃতির দৌর্বল্য; ভুল হয়, বুদ্ধি যেন ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে; অতি যত্নে স্মরণ রাখা যায় ।

মস্তক ।—বিশৃঙ্খলতা; শিরোগর্ধন; মাথা ঘুরাইলে অথবা সহসা নড়িলে চড়িলে উহার বুদ্ধি । সমুখভাগে আস্তান্ত বস্ত্রণাশ্রদ শিরঃপীড়া, তৎসহ আরক্ত বদন ও ব্যস্ত ভাব । অবিশ্রান্ত অল্পশ্র শিরঃপীড়া, হাঁটিলে উহার আধিক্য । মস্তকের পশ্চাভাগে শিরঃপীড়া, তথা হইতে সমুখভাগে, চক্ষুর উপরে উহার গতি । মস্তকের ভূমিদেগে ঘুটবৎ চাপ অনুভব ।

কর্ণ ।—উচ্চ আলাপ বা গোলমালে অসহ্যতা । কর্ণে টুন্ টুন্ শব্দ; অল্প অল্প মাথা-ঘোরা । দক্ষিণ কর্ণের উপর লাল ক্ষতে শাদা ফোকা, উহা হইতে জলবৎ রস নিঃসরণ; শেষে উপরক পতন অথবা পুষ ও মামড়ির উৎপত্তি; ফোটক ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ চক্ষুর চারিদিকে কম-পাণ্ডুর আকৃতি । মুখমণ্ডল পীত; উহার স্বক শুষ্ক ও শক্ত ।

মুখ-মধ্য ।—ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তে অনুভবাবিকা; মাটীতে ঘা; দাঁত দীর্ঘাভূত অল্পভূত হয়, ( মার্ক, নাই-এসি ) । জিহ্বার শাদা লেপ; জিহ্বার ক্ষীততা; পীতবর্ণ; কঙ্কশর্তাহুভব; আরক্ত ও উন্নত জিহ্বা-কণ্টক; কপিশ-পীত, শুষ্ক জিহ্বা । প্রাতে মুখে অল্প; তিক্ত আশ্বাদ; আহারীয় দ্রব্যের স্বাদশূন্যতা । প্রভূত লাল, রাজিত্তে লাল-পতন ।

আমাশয় ।—অতিক্রোধ; অল্পদ্রব্য আহারের স্পৃহা ( এণ্ট-টার্ট, সিঙ্ক, ভিরে ) । পূর্কের প্রিয়দ্রব্যে অরুচি । মাখন ও বসাদ্রব্যে বিরক্তি ( হিপ, \* পল ) ; অপর, আমিষ আহারে ( এলম, আর্গ, কার্কো, গ্রাফ, পল ) ; ও স্নাতোগ্য পিত্তকে অপ্রবৃত্তি । আহারান্তে ও প্রাতঃকালে বক্রৎ ও আমাশয়ের লক্ষণের আতিশয়া ( \* নক্স ) । অল্প বা তিক্ত; পচা অণ্ডের ভায়ে আশ্বাদিত ( আর্গ, এণ্ট-টার্ট, \* সোরি, সিপি, ) ; উদগার । বিবমিষা, তিক্ত জলোদগম; মস্তকের বিশৃঙ্খলতা; শিরোগর্ধন; কপালে ঘর্ষ; পিত্ত-প্রকোপ । পরিমিত আহারের পরেও গুরুত্ব ও পূর্ণত্ব অনুভব । উদরোদ্ধে জালাজ্বনক যাতনা; কষ্টপ্রদ বমন . আমাশয়ের পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । আমাশয়-গহবরে প্রস্তরের ভায়ে চাপ ( \* আস', \* ব্রাই, \* নক্স, \* পলস ) ; লঘু আহারে উহার বুদ্ধি ।

উদর ।—যকৃতের ক্ষীততা, প্রচাপনে স্পর্শ-দেষ, এবং অপ্রথর অবিরাম বেদনার উৎপত্তি । যকৃতদেগে গৌরব ও যাতনা; অল্পত বেদনা ও ভারিত্ব, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপশম, বামপার্শ্বে ফিরিলে এক প্রকার আকর্ষণ অনুভব । যকৃতে তীব্র, কর্তনবৎ বেদনা, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আধিক্য । উদরে স্পর্শ-দেষ ও যাতনা । নাভী প্রদেশে জরপিণ্ডের স্পন্দনের সমকালে সংঘটিত স্পন্দন । অল্প-কৃজন ও অল্প হইতে বায়ু-নিঃসরণ সহকারে উদর-বেদনা ।

মল।—অধিক কুস্থনে নিঃসারিত কুজ কঠিন মল। পৈতিক, পাতলা, মলিন, দুর্বল মলবিশিষ্ট অতিসার।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে ও ত্যাগান্তে মূত্র-মার্গে যাতনা; স্বপ্ন ও দাহক মূত্র (\* একন, \* এপিস, \* আস')। অল্প পরিষ্কার, অথবা গাঢ় লোহিতাভ গীতবর্ণ মূত্র; উপদ্রব, ফসফেট ও ইউরেট অধঃক্ষেপ।

শ্বাস-যন্ত্র।—শ্বাস-রোধ অল্পভব সহকারে ফুলফুলে প্রচাপন; বক্ষঃস্থলের প্রাচীর অভ্যন্তরের দিকে যেন নিমগ্ন হইবে এপ্রকার অল্পভব।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত তীব্র বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—জাগরণান্তে পেশীসমূহে ও সন্ধিস্থানে অবিরাম বেদনা ও ঘৃষ্টবৎ অল্পভব; আকর্ষণবৎ বেদনা, আমাশয় ও বকৃত্তের লক্ষণ সহকারে বিশিষ্টরূপে উহার বিজ্ঞমানতা।

দেহ।—অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা; মানি। দুর্বলতাল্পভব। অবসাদ, কোপনতা; পিত্ত-প্রধান রোগীদিগের জায় বিবমিষা ও শ্রাস্তি অল্পভব। শৈল্পিক বিল্লীতে কণ্টক-বেধনবৎ যাতনা।

জ্বর।—গীত, কম্প, অগ্নির নিকটে ঘাইবার ইচ্ছা। সর্বাঙ্গীন শুষ্ক উত্তাপ; বদনে ও হস্তদ্বয়ে উহার আধিক্য। উত্তপ্ত তাপাবেশ ও শিরঃশীড়া; মস্তকের উত্তপ্ততা; সম্মুখ ভাগে অল্প অবিরাম বেদনা। নিদ্রা হইতে জাগিবার পর প্রচুর ঘর্ম, মলত্যাগকালে কপালে ঘর্ম।

উপশম।—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে; সঞ্চালনে; উষ্ণগৃহে বিচরণে; প্রাতে; নিদ্রা-হইতে জাগরণান্তে; ও আহারান্তে; বৃদ্ধি।

উপচয়।—অনাবৃত বায়ুতে উপশম।

সমগুণ।—বার্ক, হাইড্রাস, মার্ক, নক্স, পডো।

## টেরেণ্টিউলা হিম্পনিকা—টেরেণ্টিউলা।

লাইকোসা টেরেণ্টিউলা একজাতীয় লতা। জীবিতাবস্থায় ঔষধার্থে ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া ও অধিকার।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় নায়ুমওলে টেরেণ্টিউলার ক্রিয়ায় অপরোক্ষ ফল দর্শে, উহার অভ্যন্তর দিয়া ইহা অস্থিরতা এবং অতিশয় মানসিক ও শারীরিক অবসাদ সহকারে সুস্পষ্ট কোরিয়ার লক্ষণ জন্মায়। অত্যন্ত কামোত্তেজনা বশতঃ যে প্রকার কোরিয়ার লক্ষণ উপস্থিত হয় টেরেণ্টিউলা জনিত কোরিয়ার লক্ষণ তদপেক্ষা উগ্রতর ও ভয়ঙ্কর। গীত বাতের প্রভাবে ইহার অবশেষ প্রশান্ত, এবং কখন কখনবা সম্পূর্ণরূপে

দূরীকৃত হয়, কখন কখন বা। রোগের একেবারে আরোগ্যও জন্মে। ইহাই এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। এরূপ উল্লেখিত আছে যে ইহার রোগী বাস্তব তালেতালে শরীর সঞ্চালন করে, এবং অনেক সময় একরূপ নৃত্য করিয়া থাকে। এজন্য কোরিয়া রোগেই প্রধানতঃ এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। অত্যন্ত উৎকট আকারের কোরিয়াও এতদ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। তিষ্টিরিয়া, ও তজ্জ প্রকৃতির অত্যন্ত দায়বীর পীড়ায়ও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ এলেন বলেন যে এই সকল রোগে ও অত্যন্ত প্রকার মানসিক উপদ্রবে টেরেণ্টিউলার আরোগ্যকারিণী শক্তি অতিশয় ক্ষীণ মূলের উপর নির্ভর করে, কেননা, যে সকল মানসিক লক্ষণ এই মাকড়সার কামড়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে উহা রোগীর কল্পনাগ্রস্ততও হইতে পারে। এই ঔষধের বিশেষ দায়বীর লক্ষণানুসারে কামোন্মাদ, রজক্ৰুচ্ছ, রজোবৈবৰ্মা, ও জী-জননৈন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার রোগে ইহার ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠবংশের উপদাহ; মণ্টিপেল স্ক্যারোসিস; ও কোরিয়ার অরূপ আক্ষেপ সংযুক্ত সবিরাম জরে টেরেণ্টিউলা ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

হৃৎশূল।—খাসের হাঁসফাঁস শূল, ও অবসন্নতা সংযুক্ত হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের গতির ক্রমতা ও বিরতি; ভীতবৎ হৃৎকম্প; শ্বাস-রোধ, এবং যেন মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে রোগীর এরূপ অনুভব। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাক্ষয়।—জন্মের হ্রস্বতা, তজ্জ হাঁটবান সময় মাটিতে সমভাবে পড়া ফেলিতে অসামর্থ্য; বিচরণে আয়াস; জাহ্নুপাতিয়া বসিতে অক্ষমতা; ইচ্ছামত জন্ম নাড়ীতে-চাড়ীতে কষ্ট; টেরেণ্টুলার লক্ষণ। \*তাণ্ডব।—কোরিয়া রোগে দক্ষিণ বাহ ও দক্ষিণ জন্মের সমধিক সঞ্চালন; রাত্রিতেও আক্ষেপের অবিরতি; আমবাতিক উপসর্গ বা উহার অবিস্তমানতা লক্ষণে টেরেণ্টুলা ব্যবহৃত হয়, ডাঃ মার্সী বলেন যে, রোগীর লসিকা-প্রধান ধাতু হইলে টেরেণ্টুলার দুইশত ক্রম ও মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা সলফার ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে। মূত্রাশয়-প্রদাহ।—তীব্রজ্বর, আমায়িক বিশৃঙ্খলা, অত্যন্ত যাতনা, এবং একবিম্বু মূত্রত্যাগেও অসামর্থ্য; মূত্রাশয়ের ক্ষীণতা ও কঠিনতা; আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ অতিশয় কুশ্বন, ও তজ্জ রোগীর হ্রস্বতা; মলিন-আরক্ত, কপিশ, দুর্গন্ধ, প্রস্তুর-রেণুর দ্বারা অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট কেবল বিম্বু বিম্বু মূত্রপাত। অপস্মার।—গুণ্যবায়ু বিমিশ্রিত অপস্মার; রোগাবশেষের পূর্বে শিরোধ্বনন অনুভব; তৎপরে আক্ষেপ ও হৃৎপিণ্ডে অতিশয় যাতনা। শিরোবেদনা।—অতিশয় অনুভবাবধিক্য; মৎসামাত্র উত্তেজনার কোপনতা, তৎপরে মানি ও বিমর্ষতা; তীব্র শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিকে সহস্র স্রষ্টী বিদ্ধ হইতেছে, \* বালিশে মস্তক ঘর্ষণে উহার উপশম; গাত্রের উত্তাপ; হৃদপ্রদেশে অবরুদ্ধ যাতনা, সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডে মোচড়ানবৎ অনুভব। হৃদ্রোগ।—বন্ধহলে অতিশয় পৌরব, খাসের হাঁস ফাঁস শূল; অপরিজ্ঞাত কারণে

হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের মরমর ধ্বনি ও স্পন্দন, তৎসহকারে পর্যায়ক্রমে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলনের দ্রুততা ও বিরতি; ভীতিজনিতবৎ হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডে যাতনা; হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলন অল্পভব; শ্বাস রোধ; অবিরত বায়ুর অভাব অল্পভব; সহসা হৃৎপিণ্ডের সঞ্চলনের বিরতি ও রোগীর মুক্তা-ভয়; হৃৎপিণ্ড যেন ঘূর্ণণ ও মেচড়াণ হইতেছে একরূপ অল্পভব, তৎসহ বক্ষঃস্থলে বেদনা ও সর্কাদীন ঘর্ম; হৃৎপিণ্ডে নিষ্পেষিত বা প্রচাপিতবৎ রেদনা; বৃহদ্ধমনীতে ও বাম স্কন্ধস্থি ও নীলা-শিরার (জুগুলার ভেন) নীচে, হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর প্রবল দপদপ সহকারে পূর্কোক্ত প্রকার বেদনা; বক্ষঃস্থলে বাতের বেদনা ও নাভীপ্রদেশ পর্যায় উহার সম্প্রসারণ। **ব্রজোরোগ**।—প্রভূত রজঃ; তৎসহকারে স্থানে স্থানে বারংবার আক্ষেপ; বিরক্তচিত্ততা, মানি, ও গভীর অসন্তোষ; অতিসত্ত্বর ঋতুর আগমন, ঋতুশ্রাবের আরম্ভে কটিদেশে বেদনা এবং ঋতুর বিরতির সহিত উহার বিরতি; ঋতুর পর; অতিশয় ভগ-কণ্ডুয়ন; গুহ্মবায়ু। **উন্মাদ**।—বিমর্ষতা, শোক, বিষণ্ণতা, সকল বিষয়েই বিরক্তি; তিক্ত উদগার ও পুনঃ পুনঃ জন্তণ সহ গুহ্মবায়ু; শয়নে ও গীতবাঞ্চে উপশয়, হস্ত ও জঙ্ঘার অস্থিরতা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না, অবিরত সঞ্চলন; উদরোর্ত্তে সর্বদা অতিশয় উত্তাপ; হাস্ত পরিহাসে প্রবৃত্তি; চাতুরি, \* শৃংগালের স্তায় সহসা দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে চেষ্টা, তৎপরে হাস্ত ও ক্রমা-প্রার্থনা। **স্নায়ুশূল**।—অতিশয় অল্পভবাবিক্য, পৃষ্ঠবংশে যৎসামান্য স্পর্শে বক্ষঃস্থলে আক্ষেপিক বেদনা ও হৃদ-প্রদেশে রাতনার উৎপত্তি; তীব্র শিরঃপীড়া, সর্কশরীরে জ্বালা। **পক্ষাঘাত**।—পক্ষাঘাত; সর্কশরীরে পিপীলিকা। **ইটার** ন্যায় হুড়হুড়ি অল্পভব; মস্তকের পৃষ্ঠভাগে প্রবল বেদনার সহিত রোগের আরম্ভ, তৎপরে দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখার অবশতা এবং গতিশক্তির সম্পূর্ণ বিরতি। **গর্ভিণী-রোগ**।—ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পিপাসা; সর্কাদীন অবসন্নতা; আহারান্তে ও শয্যা হইতে উঠিলে বমন; \* কাঁচা দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা। **আম্বাত**।—শীতল জ্বলে পা রাখিলে নিবৃত্তি, তৎপরে ইপানি, উৎকর্ষা, হৃৎপিণ্ডে ধলি, বা মোচড়ান বেদনা; পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত নাড়ী; বৃহদ্ধমনীর পূর্ণতা, অশিথিলতা ও স্থলীবেধবৎ বেদনা; প্রাতে ও রাত্রিতে হাতপায়ের শীতলতা। **জননেন্দ্রিয়ের রোগ**।—**সঙ্গম-লিম্পার** উত্তেজনা; গুরুশ্রাব; উন্নততা-প্রায় কায়ুকতা; কৃত্রিম মৈথুনের পরবর্ত্তী মুক্তাশয়ের মুখশারীগ্রস্থির পীড়া, অবসাদবায়ু, ও অপ্রফুল্লতা; কৃত্রিম মৈথুন জনিত প্রতিনিয়ত গুরুপাত, তৎপরে বুদ্ধির বিকলতা, অকারণ হাস্ত, ও ক্রমিক শীর্ণতা প্রাপ্তি। **ক্লীলোকের** কামোন্মাদ; জরায়ুর দায়ু-শূল, তৎসহকারে বিমর্ষতা ও নিরাশিতা, প্রতিক্রিষ্ট তাণ্ডব; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের রক্তাধিক্য ও স্পর্শাধিক্য; প্রবাহন (কুহন) জনক বেদনা সংযুক্ত জরায়ুর তত্ত্বময় অর্কবৃন্দ; মুত্রোত্তপ্ত ও মণ-কণ্ট লক্ষণাপন্ন জরায়ুর স্থান-চ্যুতি; উদর-নিঃ-প্রদেশে ও গর্ভাশয়ে জ্বালা সহকারে অতিশয় গৌরব অল্পভব, বোধ হয় যেন যথেষ্ট স্থান নাই, উপরের দিকে প্রচাপন, ভগ-কণ্ডুয়ন, ঘনঘন রক্তশ্রাব, অস্বাভাবিক বেদনাদায়ক

পাণ্ডু বর্ণ বদন ; সর্কদা শ্রান্তি । শিরোঘূর্ণন — নানা প্রকার শিরোঘূর্ণন, শিরোঘূর্ণনের  
প্রাণ্য বশতঃ ভূমিতে পতন, কিন্তু চৈতন্তের বিজ্ঞানতা ; ভ্রমি, মানি, উৎকার, বিবমিষা,  
আমাশয়ের ক্ষীততা, গল-রোধ ও বমনোত্তম, ভুক্তদ্রব্য বমন ; প্রাতের আহারের পর মুখের  
বিরসতা সহ শিরোঘূর্ণন ; কোন বস্তুতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে শিরোঘূর্ণন সহকারে শিরঃপীড়া ;  
বৃহৎ-মস্তিষ্কে তীব্র বেদনা সহ শিরোঘূর্ণন, তৎসহকারে উপস্থের অসম্যক উদ্বেক ও  
উপজিহ্বার স্ফুটন। ভগ-কণ্ডুয়ন । — জ্বী-অঙ্গের শুষ্কতা ও উত্তাপ ; হ্রনিবার কণ্ডুয়ন,  
রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, তৎসহ পাতলা, বিদাহী, গীতবর্ণ প্রদর-শ্রাব ; গাঢ়, খেতবর্ণ  
অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন । — অতিশয় দ্বায়বীর উত্তেজনা ; গুরু-বায়ুর লক্ষণ ; অবসাদ ; উদ্ভাদ । মস্তক ।  
— শিরোঘূর্ণন ; মস্তকের বিশৃঙ্খলা ; স্ফুপ্তি । — মস্তকের রক্ত সঞ্চয় ; গৌরব ও ভড়তা ।  
রক্ত-সঞ্চয়জনিত, ও দ্বায়বীর শিরঃপীড়া ; বোধহয় যেন মস্তক হাহুড়ি দ্বারা আঘাতিত  
হইতেছে । চক্ষু । — চক্ষুর বেদনা ; দুর্বলতা ; আরক্ততা ; প্রদাহ । কর্ণ । — গুণ্ গুণ্  
শব্দ সংযুক্ত বেদনা ; প্রভূত শ্রোত্র নিঃসরণ । নাসিকা । — হাঁচি ও শর্দি ; অধিক রক্ত-  
পাত । মুখমণ্ডল । — পাণ্ডুর, ঘূর্ণ ; ভয়-ব্যঞ্জক বদন , বেদনা । গুষ্ঠস্থের অরের জ্বালা ।  
স্নায়ুমণ্ডল । — স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা তৎপরে দুর্বলতা । আক্ষেপ ; টঙ্কার ;  
অপস্মার ; পক্ষাঘাত । রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র । — তারবৎ ; ও অনিয়মিত নাড়ী ; জ্বপিণ্ডের গৌরব ।  
সর্কাদীন শীত ; সর্কশরীরে পর্যায়ক্রমে জ্বালাকর উত্তাপ ও তুষারসদৃশ শীতলতা ; দৌর্বল্যকর  
ঘর্ষ । শ্বাস-সন্ত্র । — শ্বসনযন্ত্রের বেদনা ও কঙ্কশতা ; শ্বরের ভগ্নতা বা বিলুপ্ততা ; শ্বাসের  
কষ্টসাধ্যতা । বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে শুষ্ক কাস । বক্ষঃস্থলের বেদনা ; ভার ; ও  
আকুঞ্চন । পরিপাক যন্ত্র । — মুখ-মধ্য । — মুখ-বিবরের শুষ্কতা ; দন্তমূলের রক্তশ্রাব ;  
জিহ্বার ক্ষত ; গল-মধ্যের বেদনা, ক্ষীততা, প্রদাহ, ও আকুঞ্চন । ক্ষুধা-শৃঙ্খতা ; অধিক  
পিপাসা ; মুখের বিরসতা, ও মন্দ স্বাদ । আমাশয় । — বিবমিষা, বমন ; বেদনা ; অস্বচ্ছন্দতা,  
পেশীর সঙ্কোচন । উদর । — নাভী-প্রদেশে তীব্র বেদনা ; উদরে ও সরলাঙ্গে প্রবল জ্বালা ।  
মল । — প্রভূত অতিসার ; প্রবল আবেগ সহকারে মলিন, দুর্গন্ধ, রক্তাক্ত মল নিঃসরণ ;  
কোষ্ঠ-রোধ । মূত্র-যন্ত্র । — বৃককে ও মূত্রাশয়ে বেদনা ; মূত্রত্যাগে আত্মস ; অসাড়ো মূত্র-  
নিঃসরণ । জনন-যন্ত্র । — ( পুং ) উত্তেজনা ; উদগম ; অতিশয় অনুরূতি । ( স্ত্রী ) ইন্দ্রিয়-  
লিপ্সার অতীব উত্তেজনা , নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত পূর্বে অধিক ঋতু-শ্রাব ; জরায়ুর বেদনা  
ও আক্ষেপ ; ভগকণ্ডুয়ন ; প্রদরশ্রাব । দেহ ও অঙ্গ । — দুর্বলতা ও বেদনা ; অস্থিরতা ,  
আকোচন ; আক্ষেপ ; পক্ষাঘাত । ঘাড়ের ত্রুষ্কতা ও স্পর্শ-দ্বেষ ; পৃষ্ঠে, বিশেষতঃ ত্রিকস্থানে



বেদনা। সকল অঙ্গের দুর্বলতা; আমবাতের বেদনা; অস্থিরতা; পিপীলিকা হাঁটার ছায়  
 হুড়হুড়ি; পক্ষাঘাত। ত্বক।—কণ্ডুয়ন; জালা; হুড়হুড়ি। কাল-শিরা-পড়া দাগ;  
 বেদনাশূল ফোঁকার ছায়, বিশেষতঃ পচামান উদ্ভেদ। নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; নিদ্রাশূন্যতা;  
 দ্বায়বীয় অস্থিরতা; অস্থির নিদ্রা; অধিক স্বপ্ন-দর্শন। উপচয়।—রাত্রিতে ও প্রাতে বৃদ্ধি।  
 উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে, ও সঞ্চলন-কালে হ্রাস।

সমগুণ।—ষ্ট্রাম, মাইগেল, সিমি, এগেয়।

## ট্রি অষ্টিয়ম পাফেলিয়েটম

ট্রি অষ্টিয়মের নামান্তর ফিবার-রুট বা জর-মূল। ইহা আমেরিকায় জন্মে ইহার মূল  
 ৩ ফল হইতে, অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। একোনাইট ও, মারকিউরিয়সের সহিত এই ঔষধের  
 অনেকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শূলবেদনা।—পিত্ত-শূল; আমাশয়ে নিবন্ধ আধান; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপ  
 ও তীব্র বেদনা। উদর বেদনা সংযুক্ত অতিদার; উদরোর্দ্ধদেশে স্পর্শ-দ্বেষ্ট এই ঔষধের  
 লক্ষণ। ইহার তৃতীয় শক্তির কতিপয় বটিকা অর্দ্ধ বাটা জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন  
 করাইলে কলোসিহের ছায় সম্বর বেদনার শাস্তি জন্মে। জ্বর।—জর সহকারে পৈত্তিক  
 শিরঃপীড়া, ও পৈত্তিক বমন লক্ষণে শরৎকালীয় জরে ট্রি অষ্টিয়ম ব্যবহৃত হয়।  
 শিরোঘূর্ণন।—মধ্যরাত্রে উঠিবার সময় অত্যন্ত নিদ্রালুতা সহ শিরোঘূর্ণন, নিদ্রালুতা  
 অথচ দুই প্রহর রাত্রির পরে প্রগাঢ় নিদ্রার অভাব লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। সম্মুখ কপালের  
 শিরঃপীড়ায়ও এই ঔষধ উপকারী। অন্যান্যরোগ।—গলাবেদনা ইনফ্লুয়েন্সা ও  
 সামান্য শর্দিতে এই ঔষধ ফলপ্রসূ। ত্র্যকলিন নগরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ট্যালমেজ  
 ট্রি অষ্টিয়মের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ফুসফুসের সহিত ইহার ক্রিয়ার  
 অব্যবহিত সম্বন্ধ আছে। এতদ্বারা শরীরের সর্বত্র বেদনা ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়, অঙ্গ-  
 প্রত্যঙ্গেই উত্তাপের বিশেষ আধিক্য জন্মে। তিনি ফুসফুসের অপরোক্ষ রক্ত-সঞ্চয় জনিত  
 অপকার এই ঔষধে সুন্দররূপে নিবারণ করিয়াছেন। তৃতীয় অপেক্ষা যষ্ঠক্রমেই অধিক  
 উপকার দর্শিয়াছিল। ইহা কখন কখন একোনাইটের ছায় ঘর্ষ উৎপাদন করে। পৈত্তিক  
 জরে এই ঔষধে উত্তম উপকার করে, এবং যত্নেতেও ইহার ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।  
 স্নায়ু-শূলের বেদনা এতদ্বারা প্রশমিত হয় এবং কফি; হাইওসায়েরাস, বা ট্রিমোনিয়মের  
 ছায় স্নায়ু-মণ্ডলের শাস্তনা জন্মে বলিয়া বোধ হয়। শীতলতা ও নৈশঘর্ষ নিবারণে ট্রি অষ্টিয়ম  
 ভিনেট্টম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলজাত ঔষধ হইতেই পুষ্করীক রোগে উপকার দর্শে, মূলজাত

হইতে নহে। কেবল মূলজাত ঔষধ তিনি এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস রোগেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমবেত ফল ও মূলজাত ঔষধেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সামান্য শর্দিতে অতিশয় উপকার দর্শে। ওজিনা অর্থাৎ পুতিনস্ত্র রোগে ইহা প্রায় অব্যর্থ। তিনি ট্রি অষ্ট্রিয়ম, ব্যান্টিসিয়া ও এরম ব্যবহার করিয়াই ওজিনা রোগগ্রস্ত অধিকাংশ রোগী আরোগ্য করিয়া থাকেন। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশের পার্শ্বশূলেও ইহা উপযোগী। গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় এতদ্বারা প্রসব-বেদনার শাস্তি জন্মে। শ্বাস-রোগে ছুৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যে ট্রি অষ্ট্রিয়ম কলপ্রদ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অত্যন্ত স্নায়বীয় উপদাহিতা; মৃত্যু-ভয়। মস্তক।—শিরঃপীড়া, মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে উহার আধিক্য। মস্তকের পৃষ্ঠভাগে বেদনা, ও গুরুত্ব অম্লভব; পদদ্বয়ের নীতলতা ও স্তম্ভতা। উঠিয়া বসিলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি। বাম শঙ্খস্থলে রক্ত করণবৎ বেদনা। ০ বমন-সংযুক্ত পৈত্তিক শিরঃপীড়া। গল মূধ্য।—গলার অভ্যন্তরে গল-কোষের ক্ষীততাৎবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, এবং গিলিতে অন্নবহা-নালীতে বেদনা। ০ ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত গলা-বেদনা। আমাশয়।—উদরোর্দ্ধে গুরুভারের ছায় অম্লভব। উদরোর্দ্ধে বেদনা, জলপানে ও শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্তনে উহার বৃদ্ধি। \* উথানে বিমমিষা, অনন্তর অধিক পরিমাণে বমন ও আমাশয়ে খল্লী। উদর।—বেদনা বাতীত অধিক পাতলা মলস্রাব। \* বেদনা বাতীত জলবৎ ও ফেণিল মলস্রাব, তৎপরে দুর্বলতা। পূর্বাঙ্কে সাতটার সময় অল্প হইতে মলস্রাব। সায়াহ্নে অধিক ঘন ঘন মলস্রাব। ০ পিত্ত-শূল। ০ তীব্র উদর-বেদনা সহকারে অতিসার। বক্ষঃস্থল।—ছুৎপিণ্ডের ক্ষতমান স্পন্দন, এবং বাম স্তনের নিম্নে দীর্ঘ বেদনা। ০ শ্বাসকাসের উপদ্রব। পৃষ্ঠ।—গ্রীবাণ ও পৃষ্ঠে বেদনা। অবনত হইলে পৃষ্ঠে বাতের বেদনা। বামদিগের নিতম্বে বেদনা ও স্তম্ভতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—উপরের ও নীচের সমস্ত সন্ধির স্তম্ভতা। উত্থান-চেষ্টায় জাহ্নব্বয়ের স্তম্ভতা। জঙ্ঘায় আকর্ষণ ও আকৃঞ্চনবৎ অম্লভব। পদদ্বয়ের নীতলতা ও স্তম্ভতা। ০ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাত। ত্বক।—কপালে, বাম চক্ষুর উপরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে, এবং দক্ষিণ বাহুতে ফোকার ছায় উদ্ভেদ। চর্মে প্রবল 'কণ্ডু'য়ন বিশিষ্ট উদ্ভেদ। ০ আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা বশতঃ নীতপিত্ত। জ্বর।—উত্তপ্ত গাত্র ও বিবদ্ধিত পিপাসা সহ জ্বর। শরীরের সর্বত্র অবিরাম বেদনা। ০ টাইফয়েড ও আমাশয়িক জ্বর। ০ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শিরোবেদনা ও বমন সংযুক্ত প্রবল পিত্ত-জ্বর।

সমগুণ।—ইস্কিউ, আর্গিকা, ব্রাইও, চেলিড, ক্যামো, আস', ইপিকাক, নল্ল।

## ডিপথিরিগঃম ।

ডিপথিরিগঃম হোমিওপ্যাথিক এণ্টিটক্সিন । ইহা ডিপথিরিয়ার বিষ হইতে প্রস্তুত একটি রোগজ ঔষধ ।

### লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ ।

গণ্ডমালা-ধাতু-দুগ্ঠ এবং সোরা বা টিউবারকিউল অর্থাৎ কচ্ছ বা গুটিকা-দোষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গল-মধ্য ও শ্বাস-যন্ত্রের শৈল্পিক বিলীর প্রতিশ্রায়-জনিত রোগের প্রবণতায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

দুর্বল বা অবসন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন, স্মৃতরাং ডিপথিরিয়ার বিষে অত্যন্ত অমুভূতিবিশিষ্ট রোগী ; প্রধরন্ত হইতেই রোগের আক্রমণের সাংঘাতিকতা ( ল্যাক-ক্যান, মার্ক-সারে ), ইহার লক্ষণ ।

যাতনাহীন ডিপথিরিয়া ; প্রায় বা সম্যক্রূপে কেবল বিষয়-নিষ্ঠ লক্ষণের প্রকাশ ; রোগী এতই দুর্বল, উদাসীন ও অবসন্ন যে সে কোন বিষয়ের অভিযোগ করেনা ; নিদ্রা বা সুপ্তি, কিন্তু ডাকিলে সহজেই জাগরিত হয় ( ব্যাপ্ট, সলফ ) । তালু-মূল ও তালু-তোরণের মলিন লোহিত ক্ষীততা ; কর্ণ-মূল ও গ্রীবার গ্রন্থির অতিশয় ক্ষীততা ; শ্বাস ও গলা, নাসিকা ও মুখ হইতে নিঃসৃত শ্রাবের অতি দুর্গন্ধ ; জিহ্বার ক্ষীততা, অতিশয় আরক্ততা ও স্বল্প লেপাচ্ছন্নতা ।

ডিপথিরিয়ার বিল্লী পুরু, মলিন ধূসর, বা ঈষৎ কপিশমিশ্রিত কাল ; গাত্রতাপ নূন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা নিম্ন, নাড়ী দুর্বল ও দ্রুত, হস্ত-পদ শীতল, এবং রোগীর সুস্পষ্ট দুর্বলতা ; অর্ধ-বুদ্ধিশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা ; চক্ষুর নিম্ভ্রভতা ও বিমূঢ়তা ( এপিস, ব্যাপ্ট ) ।

আক্রমণের আরম্ভ হইতেই নাসিকা হইতে রক্তপাত অথবা গভীর অবসন্নতা ( এইল, এপিস, কার্ক-এসি ) ; রোগের প্রায় সূচনা হইতেই হিমাদ্র ( ক্রোটে, মার্ক-সারে ) ; নাড়ীর দুর্বলতা, দ্রুততা এবং জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার অতিশয় নিমগ্নতা ।

বেদনা ব্যতীত গলাধঃকরণ করা যায় বটে, কিন্তু তরল পদার্থ বমন বা নাকদিয়া নিঃসরণ হইয়া পড়ে ; শ্বাসের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ।

স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় ক্লোর, কালী-বাই, বা ল্যাক-ক্যান বিফল হইলে ; এবং ডিপথিরিয়ার পরবর্তী পক্ষাঘাতে, কষ্ট, জেল, বিফল হইলে ; ডিপথিরিগ ফলপ্রদ ।

যখন প্রথম হইতেই রোগীর বিপত্তির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, এবং \* অত্যন্ত স্নানির্কাচিত ঔষধে ও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন এই ঔষধের প্রয়োগ হয় ।

ডাঃ এলেন পঁচিশবৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত লক্ষণগুলি এই ঔষধের নির্ভর যোগ্য পরিতালক লক্ষণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া এতদ্বাধ্যা উহাদের আরোগ্য সাধন করিয়াছেন ।

সকল রোগজ-ঔষধের জায় ইহাও ত্রিশ শতকের নীচে চিকিৎসায় কার্যকর নহে ।

শক্তির আধিক্যে ইহার আরোগ্য-কারিতা বিবর্ধিত হয়। দুইশত শক্তি হইতে সহস্র ও লক্ষ শক্তিতে ইহার ব্যবহার হয়। \* \* এই ঔষধের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নিম্নপ্রয়োজন ও অবিধেয়। আদিত এণ্টিটক্সিনের জায় হোমিওপ্যাথিক ক্রমে ইহা হইতে কোন প্রকার বিপজ্জনক পরিণাম জন্মে না।

পঁচিশবৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ এলেন বলেন যে প্রতিষেধক ঔষধস্বরূপও ডিপথিরিণ সুন্দর কাজ করে। এক পরিবারের একজনের ডিপথিরিয়া হইলে অত্বেরা এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ-মুক্ত থাকে।

## ডোরিফোরা।

ডোরিফোরা বা কলোবেডো পোটটো বংগ ক্যাছেরাইডিস জাতীয় একপ্রকার কীট। চন্দ্রে লাগাইলে ফোকা পড়ে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে গোল আনুতে এই কীট পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে সমগ্র কীটের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই কীটের বিষ সম্যক্রূপে পরীক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার বিষ-লক্ষণ ক্যাছেরিস অপেক্ষা অধিকতর এবং ল্যাকেসিস অপেক্ষা অল্পতর সাংঘাতিক। মূত্র-কৃচ্ছ্র ও প্রমেহ রোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক-বিপ্লবী প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু-প্রদাহ, অস্ত্র-প্রদাহ, বিসর্প, এবং শোথাদিতেও মূত্র-লক্ষণানুসারে ডোরিফোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ হেল প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত মূত্র-রোধ; মূত্রত্যাগে কষ্ট; মলিন অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট ও অতিশয় বাতনা সহকারে নিঃসারিত, মলিন লোহিত অধিক পরিমাণ মূত্র; জ্বালা ও হলবেধবৎ বাতনা সংযুক্ত \* মূত্র-কৃচ্ছ্র; ০ লাল-মেহ ও প্রমেহ; ডোরিফোরার মূত্র-লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ লিলিয়েহাল লিঙ্গমুণ্ডে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা, এবং উহার ক্ষীণতা ও নীলাক্ত আরক্ততা; মূত্রমার্গের প্রদাহিত অবস্থা, ও মূত্র-তাগকালে তীব্র বাতনা লক্ষণে প্রমেহ রোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি-দেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে দশবৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের মূত্র-মার্গের প্রদাহ স্থানিক উপদাহ বশতঃ উদ্রিক্ত হইলে ডোরিফোরা ব্যবহেয়। ( হাইও )। কষ্টকর আয়ামিত মূত্র শ্রাব। গুষ্ঠ ও কটিতে বেদনা। তীব্র অঙ্গ-কম্প। এই কয়টি ডোরিফোরার বিশেষ লক্ষণ।

## ডোলিকোস — কাউইচ্চ।

লিগুমিনোসী জাতীয় এই লতা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জন্মে। বাঙ্গলায় ইহাকে আলকুণী ও সংস্কৃতে বানরা বা কপি-কচ্ছ্র বলে। ইহার ফলের গাত্রের শূঙ্গা ( শুঁয়া ) হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। — বক্ততর উপর ডলিকোসের ক্রিয়া দর্শিয়া এক্রণ অবস্থা জন্মে যে তাঁহা হইতে পাণ্ডু, কোষ্ঠবদ্ধ ও শুভ্র মল উৎপন্ন হয়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—শুভ্রমল ; ও অতিশয় গাঢ় কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট পাণ্ডুরোগ। দন্তোদগম কালে অথবা কৃমিজনিত নায়বীয় পীড়া। গর্ভকালে কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডু ও অজ্ঞাত উপদ্রব। কণ্ডুয়ন, জ্বালা ও টাটানি সংযুক্ত হার্পিজ জোষ্টার। অপর, তৎপরবর্তী নায়বীয় বেদনা। ফ্যারিংটন বলেন দন্তোদগম-রোগে যদি জ্বর লক্ষণ থাকে তবে ডলিকোস ব্যবহারের পূর্বে সর্বদাই একমাত্র একোনাইট প্রয়োগ করা কর্তব্য ; এই সতর্কতা উপেক্ষা করিলে উচ্চক্রমে ডলিকোস ব্যবস্থা করিলেও আক্ষেপের উৎপত্তি হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**চক্ষু।**—গীতবর্ণ চক্ষু (চেলি, সিক, আইও, প্লম)। **মুখ-মধ্য।**—০ দন্তোদগম কালে শিশুদিগের দন্ত মূলের স্পর্শ-ধেব। মাড়ির দ্বীততা ; উহাতে নায়বীয় বেদনা ; রাস্তিতে বেদনার আতিশয্য। **গল মধ্য।**—দক্ষিণ তালু-মূলের নিকটে চৌচ ফুটিয়া থাকার জ্বর বেদনা ; গিলিবার সময় উহার আধিক্য। **মল।**—০ দন্তোদগম-কালে ও গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। \* জ্বর মল (\* বেল, ক্যাক, \* হিপ, পড)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—০ \* রাস্তিতে শয়ন করিলে কাঁস (\* হাইও)। **দেহ।**—০ হার্পিজ জোষ্টারের পরবর্তী নায়বীয় বেদনা (রাগন)। **ত্বকু।**—দৃশ্যমান উদ্বেদ ব্যতীত সর্ব শরীরের প্রবল কণ্ডুয়ন। বাহ্যতে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোনা (কটিবন্ধবৎ দক্ষ) সদৃশ শুষ্ক দক্ষ উদ্বেদ।

**সমগুণ।**—ক্যাক, চেলি, হিপ, রাগন, পড, রস, সল।

## থিরিডিয়ন—অরেঞ্জ স্পাইডার।

থিরিডিয়ন একপ্রকার লুতা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে কমললেবুর বৃক্ষে এই মাকড়সা পাওয়া যায়। ইহার সজীব দেহ হইতে অরিশট প্রস্তুত হয়।

**ক্রিয়া।**—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় নায়ুয়ণ্ডলে থিরিডিয়নের ক্রিয়া জন্মে এবং শিরোবেদনা, শিরে-ধ্বন, ও নায়ু শুলের উৎপত্তি হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত প্রতিক্রিয়িত ক্রিয়া জনিত আমাশয়িক উপদ্রবও বিদ্যমান থাকিতে পারে।

**আময়িক অধিকার।**—শিরঃপীড়ায়, বিশেষতঃ সবমন শিরঃপীড়ায় ; এবং দুর্গন্ধি, গাঢ়, দ্রবং হরং মিশ্রিত গীতবর্ণ শ্রাব বিশিষ্ট নাসিকার প্রতিজ্ঞায়ে ; থিরিডিয়ন ফলপ্রদ। সামুদ্রিক বিষমিষা ; নায়বীয়া নারীদিগের চক্ষু বজ্রিলে ভয়ানক বিষমিষা। প্রবল শিরঃপীড়া, বিষমিষা ও বমন সংযুক্ত শর্দিগন্ধি রোগ। নায়ু-শূল। হিষ্টিরিয়া। রক্ত-কৃচ্ছ। পৃষ্ঠবংশের উপদ্রব। যকৃতের ব্রণশোথ। থাইসিস ফ্লোরিডা, প্রারম্ভাবস্থায়। বাম বক্ষের উর্দ্ধভাগে, পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া প্রবল স্রুটি-বেদ। রক্তোনিবৃত্তি জনিত উপদ্রব। গণ্ডমালা, (অজ্ঞাত ঔষধ বিফলস্তে) ; রেকাইটিস ; কেরিজ ; ক্রিসোসিস, (দোষের মূল আক্রমণ করিয়া কারণ উচ্ছেদার্থে) ;—এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**শিশুর ক্ষয়রোগ ।**—শিশুদিগের শরীর-ক্ষয়, অস্থি-ক্ষত ( কেরিজ ), গণ্ডমালা জনিত গ্রন্থির বিবর্জন ; অবিরত অনিচ্ছারিত পানাহারের আকাঙ্ক্ষা ; পরিশ্রমাস্তে শ্রান্তি ; দুর্বলতা ও অস্থ-কম্প থিরিডিয়নের প্রয়োগ-লক্ষণ ।

**গণ্ডমালা ।**—গণ্ডমালা, অস্থিপুতি, অস্থি-ক্ষত, অস্থি-কোমলতা প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত ঔষধ বিফল হইলে রোগের মূল কারণ বিনাশার্থে থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয় । গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগে সলফার, ক্যালকেরিয়া, লাইকোপোডিয়ম প্রভৃতি সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ বিফল হইলে ডাঃ বারক থিরিডিয়ন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । ডাঃ ফেরিংটন মনে করেন যে থিরিডিয়ন দ্বারা যখন অস্থি আক্রান্ত, এবং নাসিকার পীতাত বা পীতাত হরিষর্গ গাঢ় ও দুর্গন্ধময় স্রাব দ্রবীভূত হয় তখন অস্থি-ক্ষত সংযুক্ত ওজিনা ( পিনস )'রোগেও এতদ্বারা আরোগ্য হইতে পারে ।

**শিরঃপীড়া ।**—সামুদ্রিক বিবমিষার দ্বায় বিবমিষা ও বমন, এবং তৎসহকারে কম্পকর শীত ; অর্কীঘাত ; প্রতিনঞ্চলনের প্রারম্ভে শিরোবেদনা, অল্পমাত্র গোলমালেও অসহিষ্ণুতা ; সম্মুখকপালে বা চক্ষুর পশ্চাতে, মস্তকের পৃষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত শিরঃপীড়া, মস্তকের গুরুত্ব, বোধ হয় যেন মস্তকোপরি আর কিছু স্থাপিত রহিয়াছে ; মস্তকের শিখর-দেশ যেন রোগিণীর নিজের নয়, উহা শরীরের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও উর্দ্ধে তুলিতে পারা যায় এরূপ অনুভব ; থিরিডিয়নের লক্ষণ । ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে তিনি এতদ্বারা শব্দে বিদ্রোহ, বিবমিষা, ও সঞ্চলনে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন অতি তীব্র শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছেন । ডাঃ হেল বলেন যে জীলোকদিগের “চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তিশিখা দর্শন” লক্ষণাপন্ন শিরঃপীড়া ; ও শিরঃপীড়া পরিশুভ্র কেবল “দীপ্তি-শিখা-দর্শন” এতদ্বারা আরোগ্য হয় । শিরঃপীড়ার থিরিডিয়নের সহিত স্পাইজিলিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । স্পাইজিলিয়ার লক্ষণে বামচক্ষুর উপরে তীব্র স্নায়বীয় বেদনা জন্মে । এই বেদনা গ্রীবা-ব পশ্চাভাগ হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকের উপর দিয়া আসিয়া বামচক্ষুর উপরে অবস্থিত করে । স্পাইজিলিয়ার সবমন শিরঃপীড়া আয়ুর্কৌদোক্ত সূর্য্যাবর্তের সদৃশ, অর্থাৎ উহা সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নকালে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত, এবং সূর্য্যাস্তে জন্মে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । থিরিডিয়ন এই প্রকার শিরোবেদনা জন্মাইলে মস্ত সেবনে তাহা প্রশমিত হয় ।

**অর্কীঘাত ।**—প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়, অসহ্য শিরোবেদনা, তৎসহকারে সামুদ্রিক বিবমিষার দ্বায় বিবমিষা ও বমন, কম্পকর শীত, অত্যন্ত শব্দে বৃদ্ধি ; সম্মুখকপাল হইতে পশ্চাত্তকপাল পর্য্যন্ত দপদপ ; আমাশয়ে বিবমিষা, শরিত্ত অবস্থা হইতে উত্থানে উপচর ; চক্ষুর পশ্চাভাগে কঠিন, গুরু, অতীব প্রচাপন থিরিডিয়নের লক্ষণ ।

**যকৃদ্ভোগ ।**—যকৃতের ত্রণশোথে, যকৃৎ-প্রদেশে প্রবল জ্বালাকর বেদনা, ও স্পর্শে

উহার আতিশয্য ; বমনোত্তম ও পিত্তবমন ; মুখ ও জিহ্বা অবশ ও আঠাআঠা ;—এই সকল লক্ষণে থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয় ; এই ঔষধে শিরোগূর্ণন ও বিবমিষা প্রশমিত হয় ।

**গুল্মবায়ু ।**—ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে নবযৌবনা ও নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের হিষ্টিরিয়া রোগে মস্তকে অতিশয় বেদনা ; আত্ম-নির্ভরের অভাব ; শিরোগূর্ণন ও বিবমিষা এবং উহা বিবদ্ধিত হইয়া বমনে পরিণতি ; অত্যন্ত গোলমালে শিরোবেদনার বৃদ্ধি ; হৃৎপিণ্ডের নিকটে উৎকণ্ঠা ; বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে প্রবল সূচী-বেধ ; শ্রমাস্তে মুচ্ছা ;—এই সকল লক্ষণ থাকিলে থিরিডিয়ন ব্যবস্থা করা যায় ।

**কর্ণ-বেদনা ।**—অত্যন্ত কলরবেও বেদনা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক শব্দ যেন রোগিণীর সমগ্র শরীর, বিশেষতঃ দন্তগুলি ভেদ করে, ও তৎসহকারে তাহার মাথা ঘোরে ; চুই কর্ণেই জলপ্রপাতের ত্রায় শব্দ হইতে থাকে ; কর্ণদ্বয়ের পশ্চাত্তাগ এতই চুলকায় যে নখাঘাতে রোগিণীর উহা তুলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয় ;—ঈদৃশ লক্ষণে কর্ণ-বেদনার থিরিডিয়ন ব্যবহৃত হয় ।

**যক্ষ্মা ।**—থাইসিস ফ্লোরিডা রোগের প্রারম্ভাবস্থায় নৈশ-কাস, বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগে, বামবক্ষের নিম্নে, গলাপর্য্যন্ত অল্পভূত প্রবল সূচী-বেধ ; দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের অতি-প্রবৃত্তি ; হৃৎপিণ্ডের সমীপে উৎকণ্ঠা ; শিরোগূর্ণন সহকারে মন্দ-গতি নাড়ী ; রাত্রিতে তুমারবৎ শীতল ঘর্ষ এবং শিরোগূর্ণন ও মুচ্ছাকল্পতা লক্ষণে কালকেরিয়া বা লাইকোপোডিয়মের পরে এই ঔষধ উপযোগী । ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে থিরিডিয়ন প্রয়োগে এই দ্রুতগামী ভয়ঙ্কর রোগের গতি প্রতিকল্প হয় । বাম বক্ষের উর্দ্ধাংশের অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবল সূচী-বেধ এতদ্বারা নিবারিত হয় । ডাঃ বালোঁ এতদ্বারা অল্প ঔষধে অদম্য একপ্রকার উৎকট পার্শ্ব-বেদনা আরোগ্য করিয়া থাকেন ।

**শিরোগূর্ণন ।**—বিবমিষা সংযুক্ত শিরোগূর্ণন, এবং মস্তক অবনত করিলে ; একটু মাত্র নড়িলে চড়িলে, চক্ষু মুদিত করিলে ; ও গোলমালে উহার আতিশয্য ; শিরোগূর্ণন ও বিবমিষা বর্দ্ধিত হইয়া বমনে পরিণতি ; চক্ষুর বেদনা জনিত দৃষ্টিশূন্যতা সংযুক্ত শিরোগূর্ণন ; রাত্রির আবেশকালে অত্যন্ত মাত্র নড়িলে চড়িলে শিরোগূর্ণনের পুনরুপস্থিতি ; শ্রান্তিবশতঃ নয়ন বিমুদিত হইতে থাকিলে শিরোগূর্ণন ও বিবমিষা থিরিডিয়নের লক্ষণ ।

**বিবমিষা ।**—জাহাজের আন্দোলন হইতে নিমুক্ত থাকিবার জন্য চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ভয়ঙ্কর বিবমিষা জন্মিলে দ্বায়বীর জীদিগের সামুদ্রিক বিবমিষায় থিরিডিয়ন ব্যবহার করা যাইতে পারে । একজন জীলোকের প্রসূতাবস্থায় প্রথম সন্তাহের শেষভাগে প্রবল বিবমিষার আবেশ উপস্থিত হয়, কিছুদিন পরে দৃষ্টতঃ উহার শান্তি জন্মে, কিন্তু তৃতীয় সন্তাহে বজ্রাদি ধৌত করাতে সহসা আবার বিবমিষা ও বমন আক্রমণ করে ; তৎপরে চক্ষু বুজিলেই তাহার আশাশয়ে বিবমিষা, অতিশয় পাণ্ডুরতা, ও চিন্তা-বিলোপ প্রকাশ পাইত ; ত্রিশ শস্ত্রি থিরিডিয়ন আশ্রয় করিয়া সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র অতীত হয় । সহজে চমকিত হইয়া উঠিতে হয় ( ককু, দিপি, দিলি ) । কার্যে অপ্রবৃত্তি । মস্তক ।—বিমম্বা সহ শিরোঘূর্ণন, বমনও হয় ; মাথা অবনত করিলে, অল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে ; চক্ষু মুদিত করিলে, জাহাজে আরোহণে ; ও শীতল ঘর্ম সহকারে ; উহার আতিশয্য । মস্তক স্থল বোধ হয় ; উহা আর একজনকে বলিয়া মনে হয় ; যোগিনী উহা তুলিতে পারে না । নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে শিরঃপীড়া । মস্তকের পশ্চাত্তাগ পর্যন্ত প্রসারিত দপদপ সহকারে সম্মুখভাগে প্রবল শিরঃপীড়া । শিরঃপীড়া কিন্তু যোগিনী উহার বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারেনা, নিজেও পরিষ্কাররূপে বোঝেনা । বাম চক্ষুর উপরে ও কপালের অল্পপ্রাঙ্গে দপদপ ; শয়নান্তে উত্থানে ; গৃহে লোক হাঁটিলে ; ও বৎসামাস্ত গোলমালে ; উহার বৃদ্ধি । চক্ষুর পশ্চাত্তাগে শক্ত, গুরু, অতীব প্রচাপনের ভায় শিরঃপীড়া । চক্ষু ।—থাকিয়া থাকিয়া বারবার চক্ষু বুজবার সময়েও, চক্ষুর সম্মুখে অবগুষ্ঠন থাকার ভায়, আলোক-শিখার প্রকম্পন । কর্ণ ।—দুই কর্ণেই জল-প্রপাতের ভায় শব্দ । নাসিকা ।—ও পুরাতন প্রতিশ্রুতি ; দুর্গন্ধ, গাঢ়, পীতবর্ণ বা পীতমিশ্রিত হরিষর্গ প্রাণ । মুখমণ্ডল ।—প্রাতে বেড়াইবার সময় বদন অচল অমুভূত হয় । মুখ-মধ্য ।—শীতল জলে দন্তের অমুভবাবিক্য ( এণ্ট-জুড, ক্যাক-কা, টাঁফ ) । প্রতি শব্দই দন্তে প্রতিধ্বনিত হয় । মুখে লবণাক্ত আশ্বাদ ; মুখ অবশ ও আঁঠা আঁঠা অমুভূত হয় । আমাশয় ।—অতিথয় পিপাসা ; অল্প পানীয় দ্রব্যের আকাজ্জক ; ত্রাণি অথবা তামাক সেবনের প্লহা ; অনিশ্চিত আহার বা পানের প্রবৃত্তি । প্রাতে উঠিবার পরে ; শব্দে ; শিরোঘূর্ণন সহকারে ; চক্ষু বুজিলে ; সামুদ্রিক বিবমিষার অমুরূপ ( ককু, পেট্রো ) ; চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি দেখিয়া ; সঞ্চলনে ; আলাপনে ; ও দ্রুতবেগে গাড়ীতে আরোহণে ; বিবমিষা । উদর ।—যক্ষ্মদেশে প্রবল জ্বালাকার বেদনা ; স্পর্শে উহার আধিক্য ; উদগার, পৈত্তিক বমন । ও বহুতের ভ্রণ, উহাতে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষার শাস্তি । সংসর্গের পরে, নড়িলে চড়িলে কুচকীতে বেদনা । মল ।—প্রতিদিন, অধিক চেষ্টায় নিঃসারিত ক্ষুদ্র, কোমল মল । জননেন্দ্রিয় ।—( পুং ) লিম্বার লাঘব ; মধ্যাহ্নের নিদ্রাকালে স্বপ্ন-দোষ । ( স্ত্রী ) ।—ও বয়ুধাবস্থায় হিষ্টিরিয়া ; নিবৃত্ত-রজস্বাদিগের হিষ্টিরিয়া । শ্বাস-যন্ত্র ।—গভীর শ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি ; দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের প্রবৃত্তি ( \* ইয়ে ) । বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে, বাম স্বন্ধের নীচে প্রবল স্ফূর্তি-বেধ, উহার প্রকার মध्ये প্রবেশ । ও সম্মুখদিকে মস্তকের, ও উর্দ্ধদিকে জাহ্নুর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ সহকারে প্রবল কাস । দেহ ।—দৌর্বল্য, অঙ্গ-কম্প ; ঘর্মপ্রাণ । প্রত্যেকবার শ্রমের পরে মুচ্ছা । শব্দ ও প্রতিধ্বনি যোগিনীর সমগ্র শরীরের, বিশেষতঃ দন্তের অভ্যন্তর দিয়া প্রতিধ্বনিত হয় এবং শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি ককু, অনন্তর সেই শিরোঘূর্ণন বিবমিষা জন্মায় । নিদ্রাকালে জিহ্বার অগ্রভাগ দংশিত হয় । জ্বর ।—মুখে ফোণা সহকারে কম্পকের শীত ; শিরোবেদনা, তৎসহ বমন । অস্থি বেদন



বিচ্ছিন্ন হইবে এক্রপ অস্থি-বেদনা, শীতলতা, উষ্ণ হইতে পারা যায় না। হাঁটুবার পরে সহজে বর্ণ-নিঃসরণ।

সমগুণ।—একন, আরে, বেল, ক্যাঙ্ক, গ্রাফ, ইয়ে, লাই, শিজি, সিপি।

বিষমগুণ।—একন, গ্রাফ মধু।

## থাপসি বাসা প্যাটোরিস—শেপার্ডস পাস'।

এই সর্ষপজাতীয় উদ্ভিদ এক্রপ ক্যাপসেলা বাসা প্যাটোরিস নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ঔষধার্থে সমগ্র গুল্মের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্তরোধক বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি আছে। ট্রিলিয়ম, হেমেমেলিস ও ক্রোকসের জায় রক্তবহা নাড়ীতে থাপসিয়ার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়। মূল অরিষ্ট ও নিম্নক্রমেই এই ঔষধে অধিক উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।—এতদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত নাসিকার অপ্রবল রক্তপাত; রক্তমূত্র; জরায়ুর প্রভূত রক্তশ্রাব; জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তাজনিত ঋতু-বিলম্ব; জরায়ুর প্রবল বেদনা; বয়ঃ-সন্ধি সময়ে গর্ভশ্রাব বশতঃ জরায়ুর খল্লী, এবং এমন কি জরায়ু-গ্রীবায় রক্তটিকা সংযুক্ত জরায়ুর রক্তশ্রাব; তিন বৎসর স্থায়ী অতিরঞ্জ-রোগ, প্রাতি ঋতুতেই অধিক রক্তশ্রাব, প্রথম দিন কেবল রক্তের চিহ্ন দর্শন, দ্বিতীয় দিন প্রভূত রক্তপাত, তৃতীয় উদর-বেদনা, বমন, সংযত রক্তখণ্ড নিঃসরণ; এবং দশ হইতে পনের দিন পর্য্যন্ত রক্তশ্রাব; জরায়ু-গ্রীবায় রক্তটিকা জনিত রক্তশ্রাব; গর্ভপাতের পরবর্ত্তী রক্তশ্রাব;—এই সকল রক্তশ্রাব এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। ডাঃ লিডাম শিথিলা স্ত্রীদিগের ঋতুকালে অত্যধিক রক্তশ্রাবে থাপসিয়া ব্যবহারের বিধি দেন। বাস্তবিক ক্রীণরক্ত ব্যক্তিদিগের রক্তশ্রাবেই ইহা উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ডাঃ হেল রক্তশ্রাবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। ডাঃ হানসেন লিখিয়াছেন যে অশ্রুর লক্ষণ সহকারে বৃক্ক হইতে রক্ত-পাত; ঋতুর পূর্বে ও পরে; প্রদরশ্রাব এবং বৃক্কের শস্তরে ও মূত্রের ইউরিক এসিড-দোষে; থাপসি উত্তম ঔষধ। ওভেরির অর্কদুজনিত শোথে, মূত্রের ইষ্টক-চূর্ণের জায় বর্ণ ও অথ-মূত্রের জায় গন্ধ লক্ষণেও ইহা ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।—শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে প্রভূত শৈরিক রক্তশ্রাব; \* রক্ত মলিন ও সংযত। প্রবল খল্লী ও জরায়ুজ উদর-বেদনাসহ; হরিৎপাণ্ডু রোগে; গর্ভ-পাত, গর্ভ-শ্রাব বা প্রসবের পরে; ও বিরজ-কালে জরায়ুর ক্যান্সার সহকারে; জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব (ফস, অষ্ট)। নিয়মিত কালের অনেক পূর্বে অতিশয় অধিক পরিমাণে, অধিক দিন পর্য্যন্ত (আট, দশ, পনের দিন) ঋতু-নিঃসরণ; আন্তে আন্তে উহার আরম্ভ, প্রথম দিন কেবল চিহ্ন; দ্বিতীয় দিন উদর-বেদনা, বমন ও বড় বড় ঋতু

সংযুক্ত, রক্তশ্রাব ; এক পর্যায়ের পর অপর পর্য্যায়ে অধিকতর রক্তপাত । জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ রক্তশ্রাব অথবা ঋতুর বিলম্ব ; উহাতে অবসন্নতা জন্মান, ঋতুর এক পর্যায় না ঘাইতে ঘাইতেই অপর পর্যায় উপস্থিত হয় । প্রদর,—রক্তাক্ত, মলিনবর্ণ দুর্গন্ধ শ্রাব ; ঋতুর কয়েক দিন পূর্বে ও পরে উহার উপস্থিতি ।

সমগুণ ।—সিনাপিস, ভাইবারনম, অষ্টিলেগো ।

## নাজা—কোরা ।

নাজা এক প্রকার সর্প-বিষ । ইলাপাইডী জাতীয় এই গোথুর সর্পের বিষ বিষ-গ্রহি আকুঞ্চন পূর্বক নিষ্কাশন করিয়া লইয়া সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—ল্যাকেসিস ও অস্ত্রান্ত সর্প-বিষের ত্রায় মাত্তিক-পৃষ্ঠকশীয় স্নায়ুগুণে নাজারও প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে, ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ু এবং জিহ্বা ও গলকোষের স্নায়ুই সমধিক আক্রান্ত হয় । এজন্যই শ্বাস-কষ্ট, হৃৎপিণ্ডের গোঁরব এবং রক্তের বিসমাসিত ও তরলতর অবস্থা জন্মে ; এবং গাত্রের কালিমা, রক্তশ্রাব ও অস্ত্রান্ত সর্প-বিষের সাধারণ লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

আময়িক অধিকার ।—শ্বাস-কাস ; আক্ষেপিক শ্রবঃ ; পাণ্ডু ; হৃৎশূল ; হৃৎকষ্ট-প্রদাহ ; আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ ; স্নায়ু-শূল ; হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের নিকটে বেদনা সহ বাম ডিম্বাশয়ের স্নায়ু-শূল ; হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ ; স্নায়বীয় পুরাতন হৃৎকম্প ; হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ সহকারে সহানুভৌতিক ও ঔপদাহিক কাস ; শ্রবঃস্তরের আক্রান্ততা, ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা সংযুক্ত, ল্যাকেসিসের অনুরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট, ডিপথিরিয়া ; ক্ষত ; প্রথমাবস্থা অতিক্রমের আরম্ভ, আক্রান্ত স্থানের শুষ্কতা, শয়নকালে বা নিদ্রান্তে শ্বাস-রোধের আক্রমণ, ও শ্বাস-কাসের লক্ষণ সংযুক্ত, হে-ফিভার ( ওষধিগন্ধজ্বর ) ; জলাতঙ্ক ; পাদিউরা ;—এই সকল রোগে নাজা ব্যবহৃত হয় । ল্যাকেসিস প্রয়োগোপযোগী অবস্থায় নাজাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ল্যাকেসিসের ত্রায় সাধারণতঃ তত ব্যবহৃত হয় না ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

হৃদ্রোগ ।—ডাঃ রসেল বিবেচনা করেন যে আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহে ; এবং তৎপরবর্তী হৃৎকপাটের বিধান-বিকারে ; আকস্মিক প্রবল দপদপ ও হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণের শব্দ লক্ষণে নাজা অতিশয় উপকারী । হৃদ্রোগে উপদাহকর সহানুভৌতিক কাসই তিনি এই ঔষধের বিশেষ\* প্রয়োগ-লক্ষণ মনে করেন । ডিপথিরিয়া ।—এইরোগে রোগীর হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা ; গাত্রের নীলবর্ণ ; নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইলে

খাবিখাওয়া ; নাজীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা ও সপর্ধ্যায় দোষ লক্ষণে ডাঃ প্রেট্টন নাঙ্গা ব্যবহারে অতিশয় সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্বরবস্ত্র আক্রমিত হইলে ; এবং রোগী গল-রোধ অনুভব করিয়া হস্তদ্বারা গল-দেশ ধারণ করিলে ; তাহার মুখ-গহ্বর যমিন আরক্ত ; খাসে দুর্গন্ধ ; হ্রস্ব, স্বরভঙ্গবিশিষ্ট কাস ; এবং তৎসহকারে স্বরবস্ত্রে ও কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে অবদরণ অনুভব লক্ষণ থাকিলে নাঙ্গা ব্যবহারে উপকার দর্শে। **সবিরামজ্বর।**

—ডাঃ মার্সী বলেন যে, স্বল্পবিরাম জ্বরের পরবর্ত্তী সবিরাম জ্বরে নাঙ্গার তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ সেবনে কাহারও কাহারও বিলক্ষণ উপকার জন্মে। **হৃদশূল।**—গল রোধানুভব ও কথা বলিতে অশক্তি ; দ্বায়বীয় পুরাতন হৃৎকম্প ; পুরাতন হৃৎক্লি ও হৃৎকপাটের রোগ ; শকটারোহণের পর অতিশয় হৃদেদনা ও বাম স্বকাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার সংপ্রসারণ ; নিঃশ্বাসগ্রহণে বেদনার ব্যতিক্রম-বিহীনতা ;—এই সকল লক্ষণে হৃদশূলরোগে নাঙ্গা ব্যবহৃত হয়। **ক্রূপ।**—আক্কেপিক ক্রূপ রোগে গাঢ় স্লেথায় স্বরবস্ত্র ও কণ্ঠনালীর সংরোধ, কাসিয়া কষ্টে সেই স্লেথ্যা নিষ্টিবন ; স্বরবস্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে অবদরণ অথবা কেশাবস্থিতি অনুভব, তজ্জন্তু কণ্ডুয়ন, কাস ও স্বরভঙ্গ ; অবশেষে খানিকটা হ্রস্বেচ্ছ স্লেথ্যা নিষ্টিবন ; আয়াসিত শ্বাস ; এবং কতিপয় ঘটিকা নিঃশ্বাসগ্রহণার্থে মুখবিকশিত করিয়া রাখা ;—এই সকল লক্ষণে নাঙ্গা ব্যবহৃত হয়। **উন্মাদ।**—আফ্রিকা নিবাসী এক ব্যক্তি এই সর্প ধরিতে চেষ্টা করাতে দংশিত হয়। তাহার শরীর ক্ষীত হইয়া উঠে, প্রলাপ জন্মে, ও বাঁচিবার আশা থাকে না ; অবশেষে সে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ডে অতিশয় বাতনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কিছুকাল পরে একদিন সে কুঠার হস্তে কাষ্ঠ ছেদন করিতে যায়, সহসা সে সেই কুঠার দ্বারা আপনার মস্তক দিখণ্ড করিয়া ফেলে। সে পাগল হইয়াছিল। অতএব নাঙ্গা আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ জন্মায়। সুতরাং অবাস্তবিক বিপদ বিষয়ীণী চিন্তা ; ভয়ঙ্কর স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রান্তে অতীত শিরোবেদনা, ও হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড় ; মুখ-গহ্বরের অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিশোধ ; গল-রোধ অনুভব সহকারে গল-দেশ ধারণ, ও মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ লক্ষণাবিত আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **অন্যান্যরোগ।**—গল-নলীর আক্কেপিক আকুঞ্জন ; ডিম্বাশয়ের অনিশ্চিত বেদনা, বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে প্রবল খল্লীবৎ বেদনা ; পুষ্টবংশের বেদনা ও হৃৎকম্প সম্বলিত, এবং জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিকারজনিত বিষন্নতাবিশিষ্ট শিরঃপীড়া ; এবং ওলাউঠার পতনাবস্থায় শ্বাস-কষ্টবিহীন শ্বাস-কষ্টে তাঙ্গার ব্যবহার আছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**হ্রস্ব।**—০ আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট উন্মাদ ( অর, নঙ্গ )। প্রলাপ। বিষমত্ব ও গভীরতা, অস্থির-প্রতিজ্ঞতা, বিষাদ-বায় ; ক্লান্ত অপকার ও দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবনা

সহকারে বিবমিষা । আমাশয়ে জালা অহুভব । ০ বিবমিষা ও কুখামান্যসহ আমাশয়ে শুষ্ক স্পন্দন । অতিশয় দুর্বলতা ও উদগার সহ বিবমিষা । আমাশয় ও উদরে দুর্বলতা অহুভব । মন্দ আশ্বাদ ও মুখ-শোষ সহ আমাশয়ে পূর্ণতা ও গৌরব । মল-প্রবৃত্তি সহ মুখ-মধ্য, গল-মধ্য ও আমাশয়ে জালা ও যন্ত্রণা । উদর ও মল ।—পেটডাকা সহ পেটকামড়ানি । সরলাস্ত্রে নিম্নাভিমুখে প্রচাপক বেদনা ও মল-নিঃসরণ, মলদ্বারে টাটানি ; নাভীপ্রদেশে কামড়ানি সহ কুহন । অস্ত্রের পূর্ণতা, ও অস্বচ্ছন্দতা সহ মল-বেগ । মল-তাগকালে উদরের বেদনার অধিকতর তীব্রতা । অস্ত্রে অনবরত পুটপাট । বায়ুদ্বারা উদরের ক্ষীততা, এবং প্রভূত মলিন ও পৈতিক মলনিঃসরণে উহার শাস্তি । মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কয়েক খণ্ড আম ব্যতীত আর কিছু নির্গত হয় না, এবং মলদ্বার টাটান । ০ সরলাস্ত্রে জালা সহ পাতলা স্বল্প মল । ০ নাভীপ্রদেশে কামড়ানি সহ পাতলা, স্বল্প ও আমময় মল নিঃসরণ । \* কুহন ও জালা সহ পাতলা, পৈতিক, অধিক মলশ্রাব । ০ হুঁগন্ধি বাহু নিঃসরণ সহ মলিন, হরিৎ, পাতলা, প্রভূত অতি দুর্গন্ধময় মলশ্রাব । ০ স্বাভাবিক রকম গাঢ় মলিনবর্ণ প্রচুর মল । সরলাস্ত্রে প্রচাপন সহ কঠিন শুষ্ক স্বল্প মল । ০ সরলাস্ত্রের স্নায়িক ঝিল্লীর ক্ষতসংযুক্ত রক্তামাশয় । ০ পৈতিক বিশৃঙ্খলা । \* অতিশয় দুর্বলতা ও দ্রাব্যবীয় উত্তেজনা সংযুক্ত অতিসার । মুত্র ।—স্বল্প ও আরক্ত, অথবা পাণ্ডুর মুত্র ; মুত্রাশয়-প্রদেশে পূর্ণতা অহুভব । পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগে প্রবৃত্তি । জননেন্দ্রিয় ।—শক্তির লায়বসহ সার্লাস্ত্রে ও রাত্রিতে বিবর্জিত সঙ্কম-প্রবৃত্তি । বক্ষঃস্থল ।—বুকে ও পিঠে স্থচী-বেধ । বক্ষঃস্থলে কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট আরক্ত স্ফন্দ উদ্বেদ । বুকে ও পিঠে ঘৃষ্টবৎ অহুভব । বক্ষঃস্থলের কেন্দ্র হইতে উদরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সঞ্চরমান বেদনা । বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগে অবরোধ অহুভব । পৃষ্ঠ ।—তজ্জালুতা ও আলস্ত্র সহ কটিতে অতীব বেদনা । নিতম্বদেশে স্পর্শ-দ্বেষ, সন্মুখাদিকে বা পার্শ্বে অবনত হইলে উহার আধিক্য । উর্দ্ধাঙ্গ ।—হাতে ও বাহুতে জালা ও কণ্ডুয়ন অহুভব । তরল মলশ্রাবাস্ত্রে হস্তদ্বয়ের শীতলতা । নিম্নাঙ্গ ।—জজ্বার দুর্বলতা ও শ্রান্তি অহুভব । জজ্বার ও উরুতে কণ্ডুয়ন ; পদদ্বয়ে জালা । তরল মলশ্রাবের পর পদদ্বয়ের শীতলতা । ত্বক্ ।—মস্তক, জজ্বা ও পদের কণ্ডুয়ন, চুলকাইলে বা ঘর্ষণ করিলে উহার বৃদ্ধি । প্রধানতঃ রাত্রিতে পৃষ্ঠ, জজ্বা, ও পদের চর্ম্মে কণ্ডুয়নের আবেশ । স্তনে কণ্ডুয়নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্ত উদ্বেদ । স্বকে আঠাআঠা বহল ঘর্ম্ম । জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে কণ্ডুয়ন । জ্বর ।—ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ, তৎপরে ঘর্ম্ম । শীতাহুভব, অনন্তর ক্ষণহারী তাপাবেশ । মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয় । একবার উত্তাপ একবার শীত, তৎপরে শীতল ঘর্ম্ম । পৈতিক স্বল্প-বিরামজ্বর, এবং আলস্যবৃত্তিক আমাশয়িক ও আন্ত্রিক লক্ষণের বিস্তারিততা । নিদ্রা ।—অতিশয় নিদ্রালুতা, ও ঘর্ম্মশ্রাব-প্রবণতা । মানসিক ও শারীরিক নিশ্চেষ্টতা সহ অতিশয় নিদ্রা-প্রবৃত্তি । বিবমিষাদি সহ জড়তা ও নিদ্রালুতা অহুভব । মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুহু মুহু বেদনা সহ দিবাভাগে নিদ্রালুতা

ও দুর্বলতা । বিশেষ লক্ষণ ।—প্রাতে জাগরণ ও উথানান্তে দুর্বলতা । আহার-কালে আমাশয়-গহ্বরে বেদনা, তৎসহ বায়ুজন্ত উদরের ক্ষীততা । আহারের অব্যবহিত পরে পাতলা, বায়ুসংশ্লিষ্ট মলিন মলত্যাগে পূর্বোক্ত লক্ষণের উপশম । উদরে কুহনবৎ বেদনাসহ পূর্বাঙ্ক পাঁচটার সময় মল-বেগ । মল-দ্বারে জ্বালা । মলিন, পাতলা, অতিদুর্গন্ধ, পৈশ্চিক মল । শীতলতা, অনন্তর উত্তাপাবেশ ও ঘর্ম ।

সমপ্ত । — চায়না, হাইড্রাটিস, ইউপ-পার্কো, নক্সডমিকা, ।

## কর্ণস ফ্লোরিডা ।

কর্ণস ফ্লোরিডা আমেরিকার অরণ্যজাত একপ্রকার সুন্দর ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ইংরেজীতে সচারচর ইহাকে ডগউড বলে । ইহার সরস বহুল হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

কর্ণস ফ্লোরিডার বহুল অতিশয় তিক্ত । আমেরিকার সামান্য লোকেরা ইহা বলকর স্বরূপ ব্যবহার করে এবং কুইনাইনের পরিবর্তে সবিরাম জরেও প্রয়োগ করিয়া থাকে । অধিক মাত্রায় কর্ণস সেবনে মস্তকে পূর্ণতা, কিঞ্চিৎ বেদনা, দ্রুতনাড়ী, ও আমাশয়িক উপদাহ জন্মে ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

জ্বর ।—ম্যালেরিয়া জনিত ও কুইনাইন অপব্যবহৃত হ্রঃসাধ্য সবিরাম জরে অরাক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে হইতে নিজালুতা, শিরোগোরব, মুহু মুহু শিরোবেদনা জ্বরের আবেশকালে বিবমিষা, বমন, এবং কখন কখন বা জলবৎ বা পৈশ্চিক অতিসার ; শীতাবস্থায় শীত, ও আঠাআঠা স্বক ; তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, ও তৎসহ দপদপ । সুপ্তি, বুদ্ধি-বিশৃঙ্খলা, এবং বমন ; এই সকল লক্ষণে বিরামকালে এই ঔষধের মাত্রার ঠিকার পাঁচ বা দশবিন্দু মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ; এবং জ্বরকালে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রম প্রতিঘণ্টার ব্যবহার করিলে এতদ্বারা সাধারণতঃ আরোগ্য জন্মে । অগ্নিমান্দ্য ।—প্রাচীন অগ্নিমান্দ্য রোগে মুখে "অন্ন জল উঠা" প্রধান লক্ষণ হইলে কলম্ব, চিলোন, চায়না, ও নক্সডমিকার জ্বায় এই ঔষধেও অতি সুন্দর উপকার দর্শে ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—মস্তকে পূর্ণতা ও বেদনা অল্পভব, তৎসহ আমাশয়িক বিশৃঙ্খলা । দ্রুত-নাড়ী ও অল্পে প্রবল বেদনা সহ তীব্র শিরোবেদনা । অবিরত নিদ্রা-প্রবৃত্তি সহ মস্তকের পূর্ণতা । আমাশয় ।—বিবমিষা, বমন, আমাশয়ে বেদনা, তৎসহ শিরঃপীড়া । ০ অল্পে অন্ন জলোদগম ; কষ্টে ও ধীরে ধীরে পরিপাক । উদর ।—বিরেচন সহ অল্পে প্রবল

বেদনা । জ্বর ।—গাত্র-তাপের আধিক্য, উষ্ণ ঘর্ম, মস্তকে পূর্ণতা । ০ জ্বর আসিবার পূর্বে কয়েকদিন নিদ্রালুতা ; ধীরে ধীরে ভাবোদয় ; মুহু মুহু ভারবৎ শিরঃপীড়া ; বিবমিষা, বমন, ক্ষুধাহীনতা ; কখন কখন পৈত্তিক বা জলবৎ অতিসার ; শীতল আঠাআঠা ত্বক্বিশিষ্ট শীত ; বিবমিষা, বমন ও অস্ত্রের প্রবল বেদনা ; প্রবল শিরোবেদনা সহ তাপ ; উত্তপ্ত অথচ আর্দ্র গাত্রত্বক্ ; স্থপ্তি ; মস্তকের পূর্ণতা ; ক্ষত ও কঠিন নাড়ী ; বুদ্ধিবৃত্তির বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি ।

## কসমোলিন ।

পরিষ্কৃত, পরিষ্কৃত, ও ঘনীভূত পেট্রোলিয়মকে কসমোলিন বলে । সাধারণতঃ ইহার বাহুপ্রয়োগ হয় । কসমোলিনের তৃতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ সেবন করাইয়া ডাঃ প্যাক ফার্লন এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তাহাতে সকল পরীক্ষাকারীরাই ক্ষুধামান্দ্য ; উদরোচ্ছ্বাদে অস্বচ্ছন্দতা ও যাতনা ; উদগার, মুখে অম্লজলোথান, ও উদরাময়ের সম্ভাবনা ; কাহারও কাহারও জলবৎ, দুর্গন্ধি অতিসার ; অতিশয় উদাগীনতা ও শ্রান্তি ; এবং পুনঃ পুনঃ প্রভূত মূত্রস্রাব লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল । অপিচ, চর্ম্মের পরিপুষ্কতা, কণ্ডুয়ন, ও যৎসামান্য নথঘর্ষণে ফুলিয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণও উপস্থিত হইয়াছিল । কসমোলিন শীতপিত্ত, পামা, বিচর্চিকা, দ্রুত প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় । বাস্তবিক যে সকল চর্ম্মরোগে চর্ম্মের পরিপুষ্কতা ও উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে তাহাতে এতদ্বারা দ্বিগুণিত ও অনেক সময় আরোগ্য জন্মে । ডাঃ হেল বলেন যে এই ঔষধের বাহু প্রয়োগে তিনি দশ দিবসে দুইজন উৎকট হার্পিস জোষ্টারের ( দ্রুতবিশেষ ) রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । পামা ( একজিমা ) রোগে কসমোলিন আশ্চর্য্য ঔষধ । সকল জাতীয় পামায়ই ইহা অত্যন্ত উপকারী । উচ্চশক্তির পেট্রোলিয়মও ঈদৃশ ফলপ্রদ । কসমোলিন স্থানিক প্রয়োগ করিলে পামায় জ্বালাযন্ত্রণা ও কণ্ডুয়ন দূর হয় । কেবল যে চর্ম্মরোগেই ইহার বাহু প্রয়োগ হয় এমন নহে কিন্তু অগ্নিদাহ, ফোকা, কাটা ঘা, ঘর্ষণ, মচকান ; বাত, ও অর্শাদিতেও কসমোলিন ব্যবহৃত হয় । একভাগ অরিণ্ডে, দশভাগ কসমোলিন মিশ্রিত করিয়া অর্গিকা, ক্যালোথুলা, হেমেমেলিস, হাইড্রাস্টিস প্রভৃতির মলম প্রস্তুত হয় । বাইট গ্রেণ কার্বলিক এসিড এক আউন্স কসমোলিনে মিশ্রিত করিয়া কার্বলেটেড কসমোলিন প্রস্তুত হয় । ইহা অতিশয় উগ্র । পুরাতন ও নিস্তেজ চর্ম্ম-রোগ ভিন্ন এরূপ উগ্র কার্বলেটেড কসমোলিন ব্যবহৃত হয় না । এই প্রথম দশমিক শক্তির মলমের একপ্রকার আবার এক আউন্স কসমোলিনে মিশাইয়াই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

## কার্ডিউয়স মেরিএনস—ব্রুসেড থিস্ল।

এই ঔষধি দক্ষিণ ইউরোপে জন্মে। ইহার সুপক বীজ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—যক্কতে ও যক্কদ্বারের শিরায় এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ ইহার সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায় বলিয়া বোধ হয়।

অধিকার।—যক্কদ্রোগ ; পাণ্ডু ; গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমন ; পিত্ত-শিলা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

যক্কদ্রোগ।—কার্ডিউয়স চিত্তের অবসাদ ; ভ্রমি ; কপালে, চক্ষুর উপরে ও শঙ্খদ্বারে মুহু গোরব সংযুক্ত বেদনা ; চিত্তার বিশৃঙ্খলা ; মুখে তিক্ত আশ্বাদ, বিবমিষা, মুখ-প্রসেক, উগার, উদরের ক্ষীততা, বমনোত্তম, অন্ন হরিৎ পদার্থ বমন, এবং অপর অনেক গুলি পিত্ত-লক্ষণ উৎপন্ন করে। ডাঃ লিডবেক বলেন যে এই ঔষধে নিশ্চয়ই এই সকল লক্ষণ দূরীকৃত হয়। যক্কতের ক্ষীততায় ও ব্যাধিতায়ও কার্ডিউয়স উপকারী। এতদ্বারা বায়ুনলীভূজের উপদাহ সংযুক্ত যক্কতের বিবৃদ্ধিও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। যক্কতে বেদনা, ও তৎসহ পায়ের শোথ ; শ্বস ও সমুজ্জল মূত্র, এবং শ্বাস ইহার লক্ষণ। স্মৃতরাং যক্কতের গীড়াজনিত শোথে এতদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। ডাঃ মার্সী বলেন যে যক্কতে কার্ডিউয়সের অব্যবহিত ক্রিয়া দর্শে এবং ইহার প্রথম দশমিক ক্রম সেবনে যক্কতের ক্ষীততা, স্পর্শ-দেহ, ও কঠিনতা দূরীকৃত হয়।

বমন।—গর্ভবতীদিগের প্রাতঃকালীন বমনে, ভুক্তদ্রব্য সমস্তদিন অজীর্ণ অবস্থায় থাকিলে ডাঃ লিডবেক এই ঔষধে উপকার জন্মে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পিত্তশিলা—পাণ্ডু, আমাশয়ে বেদনা, পিত্তবমন ইত্যাদি লক্ষণাবিত পিত্তশিলাগ্রস্ত হইজন রোগী কার্ডিউয়সের অর্দ্ধ আউন্স অরিষ্ট এক পাইন্ট জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। একজন রোগীর পিত্তকোষের বেদনা ও ক্ষীততাও এই ঔষধে সত্ত্বর দূরীকৃত হইয়াছিল।

পাণ্ডুরোগ।—অতীত শিরোবেদনা, মুখে তিক্ত আশ্বাদ, জিহ্বার মধ্যভাগে শুভ্রতা এবং প্রান্ত ও অগ্রভাগে আরক্ততা ; বিবমিষা ও অন্ন, হরিৎ তরল পদার্থ বমন ; পৈত্তিক মল, শ্বর্ণের শ্বায় পীতবর্ণ মূত্র ; এবং যক্কদেশে অস্বচ্ছন্দতা জনক একপ্রকার পূর্ণতা ;—এই সকল লক্ষণে পাণ্ডুরোগে কার্ডিউয়স ব্যবহৃত হয়। যাহারা খনি খনন করে তাহাদের যক্কতের পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগে ও কখন কখন শ্বাস-কাসে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

রক্তোনিবৃত্তি।—ডাঃ রিল রক্তোনিবৃত্তিকালে পীড়ায়, যথা, যক্কদ্রোগের সহিত সংসৃষ্ট অর্দ্ধশিরোবেদনা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, শ্বেতপ্রদর, ও শ্বাস প্রভৃতি রোগে এই

( নঙ্গ, ইয়ে ) অতিশয় বিস্মৃতি ; বিমনস্কতা ( এনা, এপি, কারল, নঙ্গ-ভ, কস এসি ) ।  
ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিহীনতা ; সংজ্ঞাশূন্যতা ।

মস্তক ।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা ও জড়তা । সমুখভাগে অগ্রথর শিরঃপীড়া ।  
শব্দদ্বয়ে দপ দপ ও বেদনা । মস্তকে উত্তাপ ও রক্ত-সঞ্চয় ।

চক্ষু ।—চক্ষুর স্থিরতা ও একদৃষ্টি ( \* বেল, ষ্ট্রাম ) ; বিস্মৃত বিকাশ ও আলোক-  
জ্ঞান পরিশূন্যতা ( \* ওপি, হাইও \* ষ্ট্রাম ) । অক্ষিপুটের গৌরব ( কোনা, জেল, ত্রাট-  
কার্ক ) । দৃষ্টিজ্ঞানের বিলোপ ।

নাসিকা ।—পাতলা, বিদাহি শ্রাব ; এবং নাসিকার স্পর্শ-দেব, উত্তাপ ও ক্ষীততা  
বিশিষ্ট উগ্র প্রতিষ্ঠায় ।

মুখমণ্ডল ।—পাণ্ডুর হৃদয় কদাকার ; হরিতাভ পীতবর্ণ ; \* সীস-বর্ণ ; মুখমণ্ডল ।  
মুখমণ্ডলে দ্বায়বীয় বেদনা, কখন কখন উহার চক্ষে ও শব্দস্থলে গতি । শুষ্ক বলসান ও  
বিদারিত ( আস', ল্যাক ) ; উত্তপ্ত ও ক্ষত সংযুক্ত ; ওষ্ঠ । হৃদয়ের অদ্ভুত সংলগ্নতা  
( সিকু, ইয়ে, হাইও, লরো, \* নঙ্গ ) ।

মুখ-মধ্য ।—বিস্মৃত বিকসিত মুখ-বিবর ; শীতল জিহ্বা ( ক্যাম্ফ ) । চৰ্ব্বণকর  
দন্ত-বেদনা ; দন্ত-মূলের উত্তপ্ততা, ক্ষীততা ও স্পর্শে ব্যথিততা । জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ  
লেপ ; জিহ্বার শুভ্রতা, শুষ্কতা, পিপাসাহীনতা ( নঙ্গ-ম ) । জিহ্বার বল্গায় ক্ষত ।  
মুখের অতিশয় পরিশুদ্ধতা, ( আস', ব্রাই, নঙ্গ-ম ) মুখে ফেণা নিঃসরণ ( সিকু, ককু, কুপ,  
লরো, ) । বিরস, তিক্ত, অন্ন, ধাতব আবাদ ( ককু, ইঙ্ক, মার্ক, ) । বাক্রোধ ( ডল, কষ্ট,  
জেল, হাইও, লরো ) ।

গল-মধ্য ।—গলায় অধিক জ্বেগ্না । গলায় চাপ ও অবরোধ । গলায় ধরস্পর্শতা ও  
অবদরণ । গল-রোধ অল্পভব সহকারে গলা ধারণ ( এক, আইও ) । গলমধ্য ও  
গল-গহ্বরের পরিশুদ্ধতা ও আকৃষ্টন । গলার বাম পার্শ্বে স্পর্শ-দেব ও কণ্টক-বেধন ।  
গলনলীর সংযুক্তি ; আয়াস-সাধ্য বা অসাধ্য নিগীরণ । গল-গহ্বরের মলিন-লোহিত বর্ণ  
( \* এই-ল্যাম্ব, ব্যাপ্ট, ফাইটো ) ।

আমাশয় ।—ক্ষুধা-হীনতা । মদিরাদি উত্তেজক দ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু  
উহাতে অস্থখ বৃদ্ধি পায় । উল্কার ; বৃক-জ্বালা, প্রাপ্তি অল্পভবসহ বিষমিষা ; বমন ।  
আমাশয়ে অপরিপাকবৎ অন্বচ্ছন্দতা ; আহারান্তে প্রস্তুত চাপাশ্লভব ( \* আস', \* ব্রাই,  
\* নঙ্গ, \* পল ) ।

উদর ।—উদরে কাটুনি, কামড়ানি, ও মোচড়ানির শ্রায় বেদনা । পেট-ডাকা ও  
পেট-বেদনা সহকারে অধিক পেট-ফাঁপা ।

মল ।—সহসা মল-বেগ । পৈত্তিক অতিসার । কোষ্ঠবদ্ধ ।



**মুদ্র-যন্ত্র** ।—মুদ্রাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা ও চাপ । মুদ্র হইতে প্লেগ্মা মিশ্রিত লোহিতবর্ণ অধঃক্ষেপ পতন ।

**জননেন্দ্রিয়** ।—( পুং ) বিবর্জিত সন্তোগ-প্রবৃত্তি । স্বপ্ন-দোষ । ( স্ত্রী )—বাম ডিম্বাশয়ে খালধরার আয় বেদনা । পাতলা, জ্বৎশুভ্র প্রদর । হৃৎক্সাবের হ্রাসপ্রাপ্তি ।

**শ্বাস-যন্ত্র** ।—স্বরযন্ত্রে অশিথিলতা ও পূর্ণতা সহকারে কাস । স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে উপদাহ ও স্ফুটন । স্বরভঙ্গ ; হ্রস্ব, ভগ্ন কাস । শুক্ল, ধূতুক কাস ; রক্তনিগ্ধবন ( এক, ফির, হেম ) । অতি ধীর, অগভীর ও প্রায় অননুভবনীয় ; এবং আয়াসিত ও কষ্টকর শ্বাস ; মুখ ব্যাদান পূর্বক শ্বাসত্যাগ । বক্ষঃস্থলে অস্বচ্ছন্দতা এবং অতীব, গুরু বেদনা । কর্তনবৎ বেদনা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আতিশয্য ( \* ব্রাই ) । শ্বাস-কাস জনিত বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন ; তৎপরে প্লেগ্মা নিগ্ধবন ।

**হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী** ।—হৃৎপিণ্ডের নিকটে অবসাদ ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব । হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা । হৃৎপিণ্ডের চাক্ষু্য ও স্পন্দন । হৃৎপিণ্ডের শ্রুতমান স্পন্দন ( \* স্পিজি ) । নাড়ীর সঞ্চলন-কাল ও বলের ধীরতা ও অনিয়মিততা ( \* ডিজি ) ; হৃৎক্ল ও হৃৎবৎ ; অপ্রাপ্য-প্রায় নাড়ী ( এক, আস' ) ।

**গ্রীবা ও পৃষ্ঠ** ।—গ্রীবা ও পৃষ্ঠে আমবাতিক বেদনা । স্বল্পস্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা । জঘনে অবিরাম বেদনা । কটিতে তরুণ চৰ্চণকর বেদনা ।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** ।—অঙ্গে সহসা শক্তির অবসাদন । অঙ্গে আমবাতিক বেদনা ।

**দেহ** ।—আলস্ত ; শ্রান্তি, নিশ্চেষ্টতা । ০ শারীরিক যন্ত্রগুলি, বিশেষতঃ ডিম্বাশয় ও হৃৎপিণ্ড একত্র আকৃষ্ট অনুভূত হয় । মানসিক ও শারীরিক শক্তি উভয়েরই অবসাদন । উদ্ভেজক দ্রব্য সেবনে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি ; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে উপশম প্রাপ্তি ।

**ত্বক** ।—চর্মে কীটচারণা, কণ্ডুয়ন, ও স্ফুটন অনুভব । চর্মের ক্ষীততা, বিচিত্র চিহ্ন, মলিন বেগুণি সীসবর্ণ । প্রদাহিত ভূমিতে বড় বড় অপচ্যমান উদ্ভেদ । প্রদাহিত ভূমিতে অতিশয় কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল ফোকা । ০ গ্যাংগ্রীণ ।

**নিদ্রা** ।—জড়গ ; অতিশয় নিদ্রালুতা । অস্থির, উপজ্ঞত নিদ্রা । স্পষ্ট স্বপ্ন ।

**জ্বর** ।—শীতল ও পতনাবস্থাপন্ন শরীর ( কার্বো, ক্যাম্ফ ) । শরীর-শাখার অতিশয় শীতলতা ; পদদ্বয়ের বরফের আয় শীতলতা, ( টাবে ) । মুখমণ্ডলে জ্বালাকর উত্তাপ অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা, উত্তাপ ও সজ্বরতা অনুভব । বিমুক্ত ঘর্ম ।

**সমগুণ** ।—\* এপিস, \* আস', ক্যাক্ট, ক্রোট, হিপ, \* ল্যাক, মার্ক, নাই-এসি, ফক্স, সল, স্পিজি, ।

**বিষমগুণ** ।—উত্তাপ, মদিরা, লবণ ।

## হুফার লুটিয়ম—ইয়্যালো পণ্ড-লিলি ।

হুফার লুটিয়ম ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিত প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—অস্ত্র-প্রণালীর নিম্ন-ভাগে এবং পুরুষের জননেদ্রিয়ে হুফার লুটিয়মের প্রধান ক্রিয়া দর্শে ।

আময়িক অধিকার ।—প্রাতঃকালের অতিসার ; অস্ত্র ও হুলাস্থের পুরাতন প্রদাহ ; ইঞ্জিয়-দৌৰ্বল্য ; পুংশক্তিহীনতা ; ও শুক্রমেহ রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

অতিসার ।—সিকাগো নগরের ডাঃ শিপম্যান বলেন যে তিনি দশ বৎসর যাবৎ বেদনা শূল্য প্রাতঃকালীন অতিসারে কৃতকার্যতার সহিত হুফার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন । এডেনবারা নগরের ডাঃ ব্লেক বলেন যে এই ঔষধের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারে কয়েকজন রোগীর অস্ত্র বেদনা সংযুক্ত প্রাতঃকালীন অতিসার আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । ডাঃ লিলিয়াহাল বলেন যে অতিসারে, বিশেষতঃ চারিটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত প্রত্যহকালের অতিসারে ; তরল, জ্ষৎ পীতবর্ণ, দুৰ্গন্ধময় মলশ্রাব ; জননেদ্রিয়ার দুৰ্বলতা বিশিষ্ট পুরাতন প্রাতঃকালীন অতিসারে ; মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জালা-যন্ত্রণা ; আরক্ত ও পরিচ্ছন্ন জিহ্বা, পাণ্ডুর বা পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ; ক্ষুধাহীনতা ; এবং অবসন্নতা লক্ষণে হুফার লুটিয়া ব্যবস্থেয় । অস্ত্র-প্রদাহ ।—ডাঃ পিট্টেট বলেন যে ক্ষুদ্রাস্ত্র ও অস্ত্রাস্ত্রের তরুণ বা পুরাতন প্রদাহে (এণ্টারো-কোলাইটিস) প্রত্যুষে রোগের লক্ষণ বর্দ্ধিত হইলে এবং সাধারণতঃ জননেদ্রিয়ার শক্তির ক্ষীণতা থাকিলে হুফার উপযোগী । মুত্র-রোগ ।—ডাঃ মার্সী বলেন যে মুত্রে আরক্ত রেণু অধঃক্ষেপ (তলানি) জন্মিলে ও উহা আধার-পাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে ; এবং ক্ষীণ ও বেদনাবিশিষ্ট লিঙ্গোদ্রেক সহকারে দক্ষিণ অণ্ডের বেদনা লক্ষণে হুফার ব্যবহৃত হয় । শুক্র-মেহ ।—\* সন্তোগ-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি অশ্রীল কল্পনাগও উপস্থের অহুদ্রেক , নিদ্রাকালে এবং মল ও মুত্রত্যাগ সময়ে অনিচ্ছায় শুক্রপাত লক্ষণাপন্ন জনন-বস্ত্রের দুৰ্বলতা জনিত শুক্রমেহে এই ঔষধ ফল প্রদ ।

চিকিৎসিতরোগী ।—(১) টাইফয়েড জ্বর হইতে আরোগ্যোন্মুখ একব্যক্তির স্বপ্নদোষবশতঃ দুৰ্বলতার আধিক্য হওয়াতে প্রতিদিন সায়াহ্নে ষষ্ঠ শক্তির হুফার এক এক মাত্রা সেবনে কয়েক দিবসের মধ্যে স্বপ্নে শুক্রপাত রুদ্ধ হইয়াছিল । (২) এক ব্যক্তির নয়বৎসর যাবৎ শুক্রমেহের পীড়া ছিল । তাহার স্বপ্নে, মলত্যাগকালে, ও প্রস্রাব করিবার সময় অনিচ্ছায় উপস্থের সম্পূর্ণ অহুদ্রেক সহকারে শুক্রপাত হইত । সে পাণ্ডুর ও ক্ষীণ ছিল এবং কয়েক মাস এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ওপিয়ম প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত

হইয়াছিল। ডাঃ পিটেট তাহাকে হুফার সেবন করিতে দেন। প্রথমদিন সন্ধ্যাকালে তাহার মস্তভার গ্রায় শিরোগূর্ণন সংযুক্ত শিরঃপীড়া জন্মে এবং তৎসহকারে স্পর্শ-দেষ, বিবিম্বা; মুখের তিক্ততা, উদরোরুদ্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরদিন প্রাতঃকালে সর্কশরীর গদাঘাতিতবৎ বেদনা অহুভূত হয়। এই ঘৃষ্টবৎ বেদনার সহিত হুফার জনিত, প্রাতি পদবিক্ষেপে বিবিক্ত মস্তকের ও বক্ষঃস্থলের ঘৃষ্টবৎ বেদনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এইরোগী প্রতিদিন দুইবার করিয়া হুফার সেবন করিত, কিন্তু সায়াঙ্কে পূর্বসেবিত অহিফেণ জনিত মস্তভার গ্রায় তাহার শিরোগৌরব, শিরোগূর্ণন, ও মুখের তিক্তাস্বাদ জন্মিত। একমাস পর্য্যন্ত সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইবার হুফার সেবন করে, তাহাতে তাহার পাণ্ডুরতা দূরীকৃত, সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত, জীর্ণ-শক্তি বিবিক্ত। শুক্রক্ষরণ স্থগিত, উপস্থের উদগম প্রত্যাবৃত্ত ও সঙ্গম-প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়; এবং চিকিৎসার ত্রিশ দিবস অতীত না হইতে হইতেই শ্রান্তি ব্যতীত সম্যক সংসর্গের সামর্থ্য জন্মে। (৩) ২৮ বৎসর বয়স্ক একজন যুবকের তিনমাস পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন অতিসার ছিল। পাঁচটার প্রাক্কালে তাহাকে উঠিয়া কয়েকবার বহির্দেশে বাইতে হইত; উদরে কখনও কোন প্রকার বেদনা ছিল না। একপক্ষ পর্য্যন্ত ব্রাইওনিয়া ও সিপিয়া ব্যবহারে কোন ফল দর্শিয়াছিল না। অতিসারের প্রকৃতি পূর্বরূপই ছিল, যৎসামান্য আহার-দোষে উহা বদ্ধিত হইত। হুফার প্রয়োগে এই রোগী সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। (৪) একুশ বৎসর বয়স্ক একজন সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের উদর-বেদনা সংযুক্ত প্রাতঃকালীন অতিসার হইয়াছিল। পূর্বাঙ্ক চারিটা হইতে ছয়টার মধ্যে তাহার দুই তিনবার এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে একবার দান্ত হইত। আটদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা ছিল। একদিন রাত্রিতে একমাত্রা হুফার সেবনে তাহার অতিসারের শান্তি জন্মিয়াছিল। (৫) তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন বাদকের তিনবৎসর যাবৎ ক্ষুদ্রাজ ও অক্ষাঙ্কের প্রদাহ রোগ ছিল। অমিতাহার, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা ও সাংসারিক আপদবিপদ বশতঃ তাহার এই রোগ জন্মিয়াছিল। অনেক প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সে ডাঃ পেটিটের নিকট উপস্থিত হয়। তখন তাহার উত্তম, কখন কখন বা অধিক ক্ষুধা, পুনঃ পুনঃ বিদাহী উপকার; প্রাতি রাত্রিতে উদর-বেদনা ও অঙ্গ-কুঞ্জন; পূর্বাঙ্ক পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত কয়েকবার তরল বা কোমল, পীতভ, অন্ন বা দুর্গন্ধি মলশ্রাব; অত্যন্ন অমিতাচারে উহার আতিশয্য ও দুই একদিবস শয্যাশায়িতা; ভয়নিদ্রা; করতলে উত্তাপ; জ্বতনাড়ী; সময়ে সময়ে বাম বুকপ্রদেশে যুহু বেদনা ও স্পর্শ-দেষ;—এই সকল লক্ষণ বর্তমান ছিল। হুফারের প্রথম কয়েক মাত্রা সেবনেই পূর্ব পূর্ব চিকিৎসা অপেক্ষা তাহার অধিক উপকার দর্শে এবং দুই মাসে সে আরোগ্যলাভ করে। (৬) তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন মণিকারের একপক্ষ যাবৎ অতিসার ছিল। পূর্বাঙ্ক পাঁচটা-ছয়টার সময় তাহার কয়েকবার বিরচন হইত। উদরে বেদনা ছিল না, মলদ্বারে ত্রীকপ্রকার জালা অহুভূত হইত এবং

সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা ছিল। হুফার ব্যবহারে দুই দিবসেই তাহার অতিসার অবরুদ্ধ হয়। (৭) সাইক্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন লোক তিন মাস যাবৎ পীড়িত ছিল। তাহার জিহ্বা শুভ্র, মুখ আঠাআঠা, আমাশয়ে একপ্রকার কঠকর দুর্বলতা অনুভব, পরিপাক-ক্রিয়ার ক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। এই রোগীর একপ্রকার আখ্যান-শূল ও ছিল। প্রধানতঃ অতি প্রত্যবে এই উদর বেদনা উপস্থিত হইত ও তৎসহকারে তরল বা কোমল, অন্ন-গন্ধ মল ঘিরেচিত হইত। কয়েক বৎসর তাহার জননেজিয়ার ক্রিয়ারও বিশৃঙ্খলা ছিল; মধ্যে মধ্যে “স্বপ্ন দোষ” হইত; সর্বদা মুক্ত ও মূল্যধারে কণ্ডূয়ন জন্মিত; সংসর্গের প্রবৃত্তি বড় একটা ছিল না, উদ্বেকের ক্ষীণতা ও অন্নতা ছিল; জীসংসর্গের পরদিন অতিসার, উদর-বেদনা, পরিপাকের উপদ্রব, ও সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা সকলই বৃদ্ধি পাইত। ডাঃ পিটেট এই রোগীকে হুফার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আটদিন পরে জানা গিয়াছিল যে সে ভাল হইয়াছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—কপালে ও শঙ্খস্থলে প্রচাপনী শিরোবেদনা, বিষুক্ত বায়ুতে উহার বিরতি। বামদিকের সম্মুখাংশের সমুন্নতস্থানের পশ্চাতে অপ্রথর, গভীর, কঠনবৎ বেদনা। প্রতিপদবিক্ষেপে মস্তিকে বেদনাবিশিষ্ট, ঘৃষ্টবৎ আঘাত। চক্ষু।—অক্ষি-কোটরে অতীব বেদনা ও ভার অনুভব। চক্ষুর সম্মুখে, বিশেষতঃ কঠিন কাসের পরে, উজ্জল স্ফুলিঙ্গ দর্শন। মল।—উদর-বেদনা-পূর্ব্ব কোমল মল; প্রাতে উহার আধিক্য। প্রাতে পীতবর্ণ অতিসার। মল-ত্যাগের পরে মলদ্বারে জালা ও যন্ত্রণা (\* আস', \* সলফ)। সরলান্নে সূচী-বেধের ছায় যাতনা। \* বেদনাশূন্য প্রাতঃকালীন অতিসার (\* পড)। মূত্র-যন্ত্র।—মূত্র হইতে অধিক পরিমাণে জৈব লোহিত বর্ণ বালুকা-পাত (সিঙ্ক, ছাট-মিউ, লাই, ফস,) উহা আধার-পাত্রে লাগিয়া থাকে। পুং-জননেক্রিয়।—সন্তোগ-লিম্বার সম্পূর্ণ অবিঘ্নমানতা (এগনস), অঙ্গীল চিন্তায়ও উপস্থের উদ্বেক জন্মোনা (এগে, \* এগ, কোনা); উপস্থের কুঞ্চিততা; মুকের শিথিলতা। উপস্থের শেষভাগে বেদনা সহকারে দুই অণ্ডেই সূচীর কঠনবৎ যাতনা। নিদ্রাকালে, মলত্যাগ-কালে, ও মূত্র-কালে অনিচ্ছায় গুরুপাত সহকারে (এগে, এগ, কোনা, ফস, ফস-এসি) ধ্বজভঙ্গ। ত্বক।—নাগ্যস্থানে ডাঁশের কামড়ের ছায় অনুভব। বিচারিকা সূদৃশ, কণ্ডূয়নকর উদ্বেদ।

সমগুণ।—এগ, আস', ব্যারা, কোনা, জেল, পড, ক্রম, সলফ।

## নেফেলিয়ম - এভারলাফিং ।

কম্পোজিট জাতীয় নেফেলিয়ম আমেরিকা জাত এক প্রকার শাক জাতীয় উদ্ভিদ। সরস অবস্থায় ঔষধার্থে ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

### ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমাণ্ডলে নেফেলিয়মের ক্রিয়া দর্শিয়া মুখমাণ্ডলে ও নিম্নাঙ্গে স্নায়বীয় বেদনার উৎপত্তি হয়। “বজ্জণ-স্নায়ু-পথে দারুণ বেদনা; গৃধ্রসীর পরিবর্তে সময়ে সময়ে অবশতাস্থভব, অনন্তর; পদ-চারণায় অতিশয় শ্রান্তি” এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে সাস্টেটিকা অর্থাৎ গৃধ্রসী রোগে ইহার সফল প্রয়োগ হয়। এতদ্বারা পদাঙ্গুলীর আমবাতস্থদৃশ বেদনাও আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। চকোলেটের স্থায় কপিশবর্ণ স্বল্পস্বাদ, বস্তি-গহবর প্রদেশে যাতনা, এবং বজ্জণ স্নায়ু-পথে বেদনা বা অবশতা লক্ষণে; অপর, হৃদয় মুখ মুখ দুষ্কি, ত্বকের নিম্নে অর্কুদ, ও মুখমাণ্ডলে বিবিধ বর্ণের চিহ্ন লক্ষণে; রক্ত-কৃচ্ছুরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া উপকার দর্শিয়াছে। মলদ্বার ও সঙ্গমেক্রিয়ের চারিদিকের এরিথিমায়ও (অরুণিমা) ইহার ব্যবহার আছে।

সমগুণ।—ক্যামো, কলোস, জ্যাছ।

## ন্যাট্রম আসে নিকেটম - আসে'নেট-অব মোডা।

থাট্রম আসে'নিকেটমের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ঐচ্ছিক বিলীতেই বিশিষ্টরূপে থাট্রম আসে'নিকেটমের ক্রিয়া দর্শে, এবং তথায় এতদ্বারা উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয় ও অগ্রবল প্রাতিশ্রায়িক প্রদাহের উৎপত্তি হয়। রক্তেও কিয়ৎ পরিমাণে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পরিপোষণের ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগীর দুর্বলতা ও শীর্ণতা উৎপন্ন হয়। ইহার সর্বাঙ্গীন ক্রিয়ার সহিত আসে'নিক অপেক্ষা থাট্রম মিউরিয়টিকমেরই অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—নাসিকা, গল-কোষ, বায়ুনলী-ভুজ, আমাশয়, মূত্রাশয় অথবা অন্ত্রের পুরাতন প্রাতিশ্রায়িক অবস্থায়; চক্ষুর শুক্রমাণ্ডলের প্রদাহে; অক্ষিপুটের দানাময়-তায়; আমবাতে; স্নায়ুশূলে; গৃধ্রসীতে; ও শোথে এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। অতিশয় অবসন্নতা, গলার অভ্যন্তরের মলিন বেগুনিবর্ণ, অতিশয় ক্ষীণতা, অনধিক বেদনা, জলের কোষের স্থায় আলম্বিত অলিজিহ্বা, ক্ষীণ সপর্ধ্যায় নাড়ী, ও শীতল আঠা আঠা ঘর্ষাবৃত শীতল গাত্র লক্ষণে ডিপথিরিয়া রোগে অনেক সময় থাট্রম আসে' উপকারী। সবিরোধি জ্বরে; এবং ফুসফুসের ক্ষয় রোগে শীর্ণতা, নৈশ ঘর্ম, ও বিলেপী জ্বরে; এই ঔষধ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—স্নায়বীয় অস্থিরতা ( \* এক, \* আর্স, \* ক্যাম্ফ ) । মন একাগ্র করিতে পারা যায় না ; মনের জড়তা, অনাবিষ্টতা ( জেল, \* নক্স, \* ফস-এসি ) ; বিস্মৃতি ( এনা, এপি ) ।

মস্তক ।—মস্তকের বিশৃঙ্খলতা অল্পভব ; মস্তকের গুরুত্ব, জড়তা । সমগ্র মস্তকে উত্তাপ ও পূর্ণতা অল্পভব । প্রাতে জাগরণান্তে মস্তকের সম্মুখভাগে ও নাসা-মূলে অতীব বেদনা, দিবাভাগে উহার উগ্রতা ; অধ্যয়ন করিতে বা কথা বলিতে অপ্রবৃত্তি । অক্ষি-কোটর ও অক্ষি গোলকের উপরে ক্রুর অন্ত্রগ্রস্থে অবিরাম বেদনা । মস্তক-শিখরে দপদপ সহ কপালে পূর্ণত্ব ( ব্রাই ) । নড়িলে চড়িলে মস্তক কম্পন ( বেল ) ।

।—দৃষ্টির দুর্বলতা ; দেখিবার সময় দৃষ্টবস্তুর অল্পকাল অপরিচ্ছন্ন দেখা যায় ; চক্ষে আলোক সহ্য হয় না ( এক, \* বেল, \* মার্ক \* সল ) । ০ পড়িবার বা লিখিবার সময় চক্ষু নীচ শ্রান্ত হইয়া পড়ে ও বেদনা করে ( মিরিকা, ছাট্র-মিউ, ফস, \* রুটা, সিপি ) । দুর্বল চক্ষু রক্ষা করিবার জন্ত যেন অক্ষিপুট অবশ্রা সংরুদ্ধ করিতে হইবে এরূপ অল্পভব । অক্ষিপুটের নিম্নলিখন-প্রবণতা ; শ্রাব্যতঃ যতদূর বিস্মৃতি ততদূর মেলিতে পারা যায় না ( কই, কোনা, জেল, ছাট্র-কার্ক ) । অক্ষি-গোলক ও অক্ষি-পুটের রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় রক্ত-সঞ্চয়, সমগ্র অক্ষি-কোটর প্রদেশের স্বীয়তা ; অক্ষি-কোটর প্রদেশের ( \* আর্স \* রস, ফস ) বিশেষতঃ অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধদেশের ( \* এপি, \* কালী-কা ) শোথ । ০ অত্যন্ত শৈত্য বা বাতাস লাগিলে চক্ষুর গুরুমণ্ডলের রক্ত-সঞ্চয় ( এক ) ; গুরুমণ্ডল পরিণত ও ব্যথিত । কাষ্ঠের ধূমের স্রাব চক্ষে বাতনা ; বিমুক্ত বায়ুতে গেলে চক্ষে বাতনা ও অশ্রুস্রাব । নিম্ন অক্ষি-পুটের অভ্যন্তর ভাগের দানায়িতা । চক্ষুর শ্রান্ত-ভাগের পুরাতন প্রদাহ ; প্রাতেকালে অক্ষিপুটের সংযোজনা । জাগরণান্তে ক্র, চক্ষু-কোটর ও শ্রাবস্থলের অভ্যন্তর দিয়া অবিরাম বেদনা । প্রাতে চক্ষু-লক্ষণের উপচয়, ও সন্ধ্যার প্রাকালে উপশম ।

নাসিকা ।—স্রাবের অসম্পূর্ণতা বা বিলোপ । নাসিকা ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবরুদ্ধতা অল্পভব । নাসিকার অধিরত অবরুদ্ধতা, রাত্রিতে ও প্রাতে উহার আধিক্য ( নক্স-ভম ) ; রাত্রিতে হাঁ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে হয় ( এম-কার্ক ) । শক্ত, পীতবর্ণ নাসা-স্রাব ; নাসিকার পশ্চাত্তাগের রক্ত হইতে কাসিয়া স্রাব নিঃসরণ ; নাসিকার পশ্চাৎ রক্ত হইতে ফোঁটা ফোঁটা স্লেমা পতন ( হাইড্রাস, কালী-বাই ) । নাসিকা হইতে জীবাণু নীলবর্ণ শক্ত স্লেমাখণ্ড নিঃসরণ, তৎপরে শৈথিল্য বিস্তারিত অবদরণ অল্পভব । নাসিকায় গুল চিপিটিকা ; উহা দূরীভূত করিলে রক্ত নিঃসরণ । নাসিকার শৈথিল্য বিস্তারিত স্থূলতা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু শ্বাসত্যাগে কষ্ট হয় । নাসা-মূলে ও কপালে আকুঞ্চনী বেদনা ; প্রতিশ্রাব ( এক, \* কালী-বাই, মার্ক-আইও ) ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা ( ব্যাপ্ট, বেল ) ; এবং স্থূলস্থূলতা

অমুভব। হৃদয় অস্থি ক্ষীতবৎ বৃহৎ বোধ হয়। মুখমণ্ডলের ক্ষীততা, শোথ (জল-ভার); অক্ষি-গহ্বর-প্রদেশে উহার আধিক্য (আর্স, এপিস, রস,); প্রাতে জাগরণান্তে আতিশয্য।

মুখ-মধ্য।—মুখের কোণের বিদারণ; অপচ দৃঢ়তা। চর্মগ-পেশীর শুষ্কতা, হৃদয় সঞ্চালনে বেদনা। লেপাবৃত; পীতবর্ণ আবরণ বিশিষ্ট; গাঢ় লাল, কুঞ্জন সংযুক্ত, সম্মুখ ভাগ বিদারিত; বৃহৎ, আর্দ্র, বিদীর্ণ লোলিত (\* মার্ক); জিহ্বা।

গল-মধ্য।—গিলিতে ও নিঃশ্বাস টানিতে গল-গহ্বরের শুষ্কতা, প্রাতে ও শর্দি লাগিবার পর উহার মন্দাবস্থা। গল-গহ্বর ও গল-কোষের আরক্ততা ও চিক্ণতা। তালু-মূল, গল-গহ্বর ও গল-কোষের ঈষৎ বেগুণিবর্ণ ও শোথ; পীতবর্ণ শ্লেষ্মায় তালি-পড়া (মার্ক-আইও); ০ ডিপথিরিয়া। অলিজিহ্বা, তালু-মূল ও গল-কোষের স্থূলতা; উপরিভাগের অসমতা, ক্ষীততা, ঈষৎ বেগুনি মিশ্রিত আরক্ততা, ও পীতভ ধূসর শ্লেষ্মায় আবৃততা, কাসিয়া কাসিয়া এই শ্লেষ্মা নিঃসারিত হয়।

আমশয়।—এক একবার অল্প অল্প করিয়া বারংবার জলপান (আর্স, হাইও); অতিশয় পিপাসা, কিন্তু জলপানে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি। অল্প উদগার। বিবমিষা, নীতল জল পানে উহার বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণ অল্প জল বমন, আহ্বারের পরে উহার বৃদ্ধি। আমশয়ে ক্ষতবৎ অমুভব; উষ্ণ দ্রব্যে জ্বালামুভব জন্মায়, এবং আমশয়ে উহার প্রবেশ অমুভূত হয়। পরিমিত আহ্বারও ভারী বোধ হয় (\* লাই, \* নক্স);—পূর্ণতা অমুভব। উদরোর্দ্ধি দেশে স্পর্শ-দেয় ও নিমগ্নতা অমুভব।

উদর।—নীচ্র নীচ্র বাষ্পের উৎপত্তি (কার্বো, লাই), কেবল মলত্যাগকালে উহার আতিশয্য; বায়ু বশতঃ ও মলত্যাগের পূর্বে উদর বেদনা।

মল।—পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ (\* এণ্ট-ফ্রুড, সিমি, কার্ডিউ, নক্স, পড)। পাতলা, নরম, মলিন মল, মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা (\* সলফ)। ঈষৎ পীতবর্ণ, জলবৎ; প্রভূত, বেদনাশূল, প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া পরিত্যক্ত (সলফ); উদর-বেদনা পূর্ব, ও মলত্যাগান্তে বেদনা উপশমিত (কলোস), মল।

মূত্র-যন্ত্র।—প্রচুর মূত্র সহকারে বৃককে অতীব অবিরাম বেদনা। মূত্রাশয় প্রদেশে ক্ষতবৎ অমুভব, মূত্র-ত্যাগকালে উহার আধিক্য। পুনঃ পুনঃ পরিত্যক্ত, পরিষ্কৃত, অধিক মূত্র; উত্তাপ প্রয়োগে ফসফেটের অধঃপতন; কিয়ৎ পরিমাণে উপস্থকের শব্দ, হাঁচ ও বসা-বিন্দুর অবস্থিতি।

শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে মলিন শ্লেটের বর্ণ, স্বল্প শ্লেষ্মা, আয়াসে উহার স্থলন। স্বরযন্ত্র হইতে বৃদ্ধাস্থির নিঃস্রব্দে পর্য্যন্ত সারাদিন ভারাক্রান্ত বা পরিপূর্ণিত অমুভব। প্রাতে বায়ু-নলীতে বন্ধুরতা ও উপদাহ, তৎসহ অল্প অল্প কাস। ত্রিঃশ্বাস দ্বারা ধুমপ্রহণের শ্রায় ফুসফুস শুষ্ক-স্নগ্ধবৎ (বারা, ব্রোম)। বক্ষঃস্থলের মধ্যাংশে ও উপরের তৃতীয়াংশে অশিথিলতা, ও গোরব অমুভব সহকারে শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থল পূর্ণ ও ভারাক্রান্ত অমুভব; পরিশ্রমে ও

পূর্ণ নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার আধিক্য। সপ্তম পশু'কার্য নীচে সম্মুখের দিকে তীব্র বেদনা।  
কণ্ঠস্থি প্রদেশের উর্দ্ধাংশে প্রচাপনে স্পর্শ-দেব।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—যৎসামান্য পরিপ্রমে হৃৎপিণ্ডের নিকটে যাতনা। অনিয়মিত,  
আয়তন-পরিবর্তন শীল, স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা ধীরতর নাড়ী ( ডিজি, ক্যান-ইণ্ড, ওপি )।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার স্তব্ধতা ও স্পর্শ-দেব। স্বক্কাহিষয়ের মধো, পৃষ্ঠে; এবং  
নিতম্বদেশে; বেদনা ও স্পর্শ-দেব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগত দ্বায়বীয় বেদনা। সন্ধি সমূহের স্তব্ধতা  
অহুভব ( \* রস ) ; সঞ্চরণশীল বেদনা, সন্ধিস্থানে ও বামপার্শ্বে উহার আধিক্য। নিম্নাদে  
শুষ্ক অহুভব; শ্রান্তি ও ঘৃষ্টতা অহুভব। যে পর্য্যন্ত অস্থিরতা, ও অস্বচ্ছন্দতা না জন্মে  
সে পর্য্যন্ত জন্মার নিম্নে সম্মুখভাগে অবিরাম বেদনা।

দেহ।—অস্থিরতা, দ্বায়বীয়তা, অতিশয় চেষ্টা ব্যতীত শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে  
পারা যায় না ( \* রস )। সর্বশরীর শ্রান্ত অহুভূত হয়; চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা  
হয়। শীতল বাতাসে অধিকতর অহুভবাধিক্য, সহজে শক্তি লাগে ( ক্যাঙ্ক-কা, \* কালী-কা,  
\* সিলি )। বাম জন্মায়ই বেদনার অধিক আক্রমণ। শোথ ( \* এপিস, আস', রস )।  
পূর্বে মাংস-বৃদ্ধির পরে সুস্পষ্ট শীর্ণতা ( \* আইও, ট্রাট-মিউ )

নিদ্রা।—তন্ত্রাপূর্ণ, ভারী, অস্থির নিদ্রা; ভীতবৎ জাগরণ।

চর্ম্ম।—শব্দ সংযুক্ত উদ্বেদ, পাতলা, শাদা শব্দ, তুলিয়া ফেলিলে চর্ম্মের জীবৎ  
আরক্ততা, শব্দ থাকিলে কণ্ঠ্যনের উৎপত্তি, পরিপ্রম জনিত উষ্ণতার উপচয়।

জ্বর।—শীত, বস্ত্রাবৃত থাকিবার বা অগ্নির নিকট যাইবার ইচ্ছা। রাত্রিতে শীত,  
তৎপরে জ্বালাকর, শুষ্ক উত্তাপ। স্বক উত্তপ্ত ও শুষ্ক। উপরিভাগ শীতল, ও শীতল,  
আঠা আঠা ঘর্ম্মাক্ত ( আস', ক্যাঙ্ক, \* ভিরাট )।

উপচয়।—প্রাতে আহ্বারান্তে।

উপশম।—বিয়ুক্ত বায়ুতে বিচরণ কালে।

সমগুণ।—আস', লাই, কালী-বাই, হাইড্রাস, নক্স, ট্রাট-মিউ, \* ভিরাট-এব।

## পপিউলস টি মিউলয়ডিস।

পপিউলস আমেরিকার এম্পেন বৃক্ষ। পপিউলসের বীর্ধ্যকে পপিউলিন বলে।  
পপিউলসের বন্ধলের অরিষ্ট, এবং পপিউলিনের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। সুস্থশরীরে পাঁচ হইতে  
দশ গ্রেন মাত্রায় পপিউলস সেবন করিলে আমাশয়ে উষ্ণ ও কটু অহুভব জন্মে,  
তৎপরে সমস্ত গাত্রে একপ্রকার উত্তাপ অহুভূত হইতে থাকে, ও প্রভূত পরিমাণে সূত্র  
নিঃসৃত হয়। অনন্তর দুই ঘণ্টা পরে পরে এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়া চর্ম্মশ



পঞ্চাশ গ্রেণ পর্যন্ত থাওয়া হইলে এতদ্বারা বিবমিষা, বমন, আমাশয়ে ভয়ানক জ্বালায়ুভব সহকারে অল্প অল্প পৈত্তিক বিরচন, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব, মূত্রাশয় ও মূত্র-মার্গে উপদাহ, তৎসহ মস্তকের একটু পূর্ণতা, এবং সর্কাজীন স্নায়বীয় উত্তেজনা উৎপন্ন হয়। পপিউলস হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে সম্যকরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ডাঃ হেল এতদ্বারা আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায় জনিত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ কো বলেন যে আত্মান ও অল্পত্ব সংযুক্ত অজীর্ণ রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রত্যাগে যাতনা, মূত্রের উত্তাপ ও বিদাহিতা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় এই সকল মূত্র লক্ষণ নিবারণ এই ঔষধের প্রধান গুণ। মূত্রাশয়, মূত্র-মার্গ ও প্রস্টেট গ্রন্থির পীড়ায় পপিউলস বিশেষ ফলপ্রাপ্ত। ডাঃ হেল প্রস্টেটের (মূত্রাশয়ের দ্বারাবরক গ্রন্থি) পীড়ায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূত্রাশয়ের আবেগই (টেনেসমস) তিনি মূত্রাশয়াদির রোগে এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ মনে করেন। তিনি এই যন্ত্রণাপ্রদ “আবেগ” (কুহ্নন) লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রক্ত ও পুষ্মিশ্রিত স্বল্প মূত্রবিশিষ্ট, মূত্রাশয় ও প্রস্টেট গ্রন্থির পীড়াগ্রস্ত তিন জন রোগীকে পপিউলস ১৫ ক্রম পাঁচ-বিন্দুমাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিয়া যাতনার শাস্তি জন্মাইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয়ের আবেগ ২৫ ক্রমে সত্ত্বর উপশম পড়িয়াছিল। স্বল্প-মূত্র, উহাতে অধিক পরিমাণে স্লেম্মা ও পুষের বিচ্ছিন্নতা এবং মূত্রের শেষ কয়েক বিন্দু ত্যাগ করিবারাত্র অথবা তাহার একটু পূর্বে অতিশয় কুহ্নন; মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায়, (বিশেষতঃ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের) তৎসহ-মূত্রত্যাগে জ্বালা, অথবা সম্পূর্ণ মূত্র-রোধ; পুরাতন, লাল-মেহ—এই সকল লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েছাল সিষ্টাইটিস অর্থাৎ মূত্রাশয়ের প্রদাহ রোগে পপিউলসের প্রয়োগ উল্লেখ করেন। মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায়; মূত্রে অধিক স্লেম্মা ও পুষ, দারুণ আবেগ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের রোগ। উদর-চ্ছেদ বা ডিম্বাশয়-চ্ছেদের পরে মূত্রাশয়ের আবেগ (হান-সেন)।

## পলিগোনম পঞ্চটেটম্ — স্মার্ট উইড্ ।

এই উদ্ভিদ ইউনাইটেড স্টেটসের প্রায় সর্বত্রই নিম্নভূমি ও সজল স্থলে উৎপন্ন হয়। ইহার একজাতীকে পলিগোনম হাইড্রোপাইপার বা ওয়াটার পেপারও কহে। ডাঃ হেল উভয় জাতই এক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার স্বাদ অতিশয় কটু ও তীব্র। সময় ও উত্তাপে ইহার ভৈষজ্য-গুণ বিনষ্ট হয়। ঔষধার্থে উগ্র এলকোহল সহযোগে পলিগোনমের পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—রৈখিক ঝিল্লী, স্নায়ু মণ্ডল, এবং তন্তুময় বিধানে পলিগোনমের ক্রিয়া দর্শে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**উদর-বেদনা ।**—উদরে কর্তন বা মোচড়ানবৎ বেদনা, অস্ত্রের সমস্ত আধেয় যেন ভয়লীভূত হইয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এরূপ অস্ত্র-কূজন, তজ্জন্তু বিবমিষা ও বমন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি, এবং সবলে নিঃসারিত তরল মল, ও তৎসহকারে কটি-বেদনা ;—পলিগোনম এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে, সুতরাং এইরূপ লক্ষণাপন্ন উদর-বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । ডাঃ পেইন পূর্বোক্ত লক্ষণে আট আউন্স জলে ইহার পনর ফোঁটা অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই ড্রাম একবারে একজন রোগীকে সেবন করাইয়াছিলেন । ঔষধ সেবনান্তে রোগীর উদরের অভ্যন্তর দিয়া একপ্রকার উষ্ণতা অনুভূত হইয়া লক্ষণগুলির হ্রাস পাইয়াছিল, প্রায় একঘণ্টাপরে সমগ্র বোগ অনুভূত হইয়াছিল, কেবল উদরে প্রচাপনে স্পর্শ-দেব অবশিষ্ট ছিল, উহাও ক্রমে ক্রমে দূর হইয়াছিল । অস্ত্র-শুলে উদরে ইহার অরিষ্টের বাহ্য প্রয়োগেও উপকার দর্শে ।

**রজোরোগ ।**—কতকগুলি চিকিৎসক পলিগোনম রজঃনিঃসারক ঔষধের শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করেন এবং স্ত্রী-রোগে পলসেটিলার সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে এরূপ প্রকাশ করেন । ডাঃ এবারেল বলেন যে পলিগোনম উষ্ণতা ও সমস্ত শরীরে একপ্রকার স্ফুটন ; কটি ও কুচকীতে অল্প অল্প অবিরাম বেদনা ; এবং বস্তি গহবরে একপ্রকার গুরুত্ব ও অশিথিলতা জন্মায় । তিনি প্রায় কুড়িজন বিলুপ্তরজ্জ্বা রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহাদের সকলেরই অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল । কাহার পক্ষে ছয় সাত দিবসের অধিক ইহা ব্যবহার করিতে হয় নাই । তিনি অত্যাশ্রয় ঔষধ অপেক্ষা রজোরোগে পলিগোনম অধিক ফলপ্রদ মনে করেন । তিনি ইহার মূল অরিষ্ট একড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । ডাঃ মার্সী ইহার মূল অরিষ্ট তিনবিদু মাত্রায় দিনে দুইবার ব্যবহার করিতে বিধি দেন । ডাঃ স্মল ছয় সাতদিবস বিলম্বে প্রকাশিত, বহুগা ও বেদনা সংযুক্ত ঋতুতে চারিঘণ্টা অন্তর পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । ডাঃ হানসেন যুবতীদিগের রজঃলোপে পলসেটিলার পরে পলিগোলম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করেন ।

**মূত্রাশয়-প্রদাহ ।**—মূত্রাকালে মূত্রাশয়ের গ্রীবার আকূজন, অবরোধ, ও কর্তনবৎ বেদনা অনুভব, মূত্রত্যাগান্তেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি ; মূত্রাশয়ে বেদনা ; বারংবার প্রবৃত্ত, পরিষ্কার, শাদা, বা পলাল বর্ণের মূত্রপ্রাব লক্ষণে পলিগোনম ব্যবস্থা করা যায় ।

**অর্শ ।**—অধিক পরিমাণ মলপ্রাব, তৎপরে মলদ্বারে টাটানি ; মলত্যাগকালে কূজন, ও আময় লেহবৎ প্রাব লক্ষণে পলিগোনম ব্যবহৃত হয় । মলদ্বারের অভ্যন্তরে কণ্ডুয়নশীল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র উন্নতি ; ও অর্শ-বলিতে কণ্ডুয়ন ও জালা লক্ষণাপন্ন অর্শরোগে ডাঃ মার্সী ইহার প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবস্থা করেন । মলবার-কণ্ডুয়নেও এই ঔষধ চারিবিদু মাত্রায়, জলসহযোগে প্রতিদিন দুইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

**শূল্য-বায়ু ।**—অল্প অল্প শিরোবর্ধন, শরীর-শাখায় তড়িৎপ্রয়োগের জ্বা

কম্পন অল্পভব; অবিরত মৃত-প্রবৃত্তি; রজোবিলোপ; সমগ্র শরীরের অভ্যন্তর দিয়া উদ্ভ্রতা ও এক প্রকার সুড়সুড়ি বা টনটন অল্পভব লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েছাল পলিগোনম ব্যবহারের বিধি দেন। যুগিরোগে ও আমেরিকায় এই ঔষধের ব্যবহার আছে। ক্ষত।—অধঃশাখার অগভীর ক্ষতে; এবং পুরাতন নিস্তেজ ক্ষতে পলিগোনম হাইড্রোপাইয়ার কলপ্রদ। সিকাগো নগরের ডাঃ অল নিবৃত্ত-রক্তকা জীলোকদিগের অধঃশাখার ক্ষতে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি ইহার মূল অরিষ্টের কুড়িবিদ্যুৎ অর্ধ টমলার (গ্রাস) জলে মিশ্রিত করিয়া দুইড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান ও চারিভাগ জলে একভাগ অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া পটীভিজাইয়া ক্ষতে লাগান। পলিগোনম পল্‌টেটমেরও এইপ্রকার ক্ষত আরোগ্যকর গুণ আছে। ইহা সচরাচর ময়দার পেষ্টিশের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। তৎপরে ক্ষতে কেবল সামান্য মোমের মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদাহাদি।—আভ্যন্তরিক প্রদাহ; বাতকটক, ঘৃৎন, পুরাতন বিসর্পাদিতে পলিগোনমের বাহুপ্রয়োগ হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—পূর্ণতা অল্পভবসহ স্পন্দনকর শিরোবেদনা। অক্ষি-গহ্বর পর্য্যন্ত প্রসারিত কপাল ও মস্তক-পার্শ্বের বেদনা। শিরোবর্ণন সংযুক্ত অতীর শিরঃপীড়া। হৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দনসহ ক্যারটিড ধমনীর দপ দপ। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—গলার অভ্যন্তরে পরিণুক্ততা ও অবদরণ অল্পভব। জিহ্বা ক্ষাতবৎ অল্পভব, জিহ্বার মূল হইতে আমাশয় গহ্বর পর্য্যন্ত একপ্রকার জালা। মুখে জালাসহ পাতলা, জলবৎ, প্রচুর লালস্রাব। আমাশয়।—আমাশয়ে দপদপকর ও কর্তনবৎ বেদন। জল-পিপাসা, অথচ জলপানে বিবামাশয় উৎপত্তি। দক্ষিণ স্বক্কাস্থির নিয়ে তীব্রবেদনা এবং সেই বেদনার বক্ষঃস্থল ও আমাশয়-গহ্বর পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহকারে হৃৎপিণ্ডের গুরু স্পন্দন ও ক্যারটিড ধমনীর দপদপ। আমাশয়ে জালা, তৎপরে আমাশয়-গহ্বরে শীতলতা অল্পভব। উদর ও মল।—অধিক মল, তৎপরে মলদ্বারে টাটানি অল্পভব। অবিরত মল-প্রবৃত্তিসহ অস্ত্রের নিম্নাংশে কর্তনবৎ বেদনা। মলত্যাগে কুহন ও আমময় লেহবৎপদার্থ নিঃসরণ। অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় বায়ু-নিঃসরণ সংযুক্ত বিফল মল-প্রবৃত্তি। পীতাত হরিষ্মণ মল। \* কর্তনবৎ, ছুরিকাঘাতের ছায়, কামড়ান বেদনা, তৎসহ অতিশয় অঙ্গ-কুঞ্জন, বোধ হয় যেন অঙ্গই সমস্ত পদার্থ তরল হইয়া আন্দোলিত হইতেছে ও নীচ হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে, তজ্জগৎ বিধমিষা ও বমন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি; কটবেদনাসহ সবলে তরল মল-স্রাব। ০ ওলাউঠা, ও শিশু-বিসৃচী। ০ সরলান্ত্রে জালা ও টাটানিসহ রক্তাতিসার। ০ আশ্বান, আশ্বানিক উদর বেদনা। সরলান্ত্র ও মলদ্বার।—মলদ্বারের অভ্যন্তর ভাগে কণ্ডুয়ন-শীল আকৃষ্টবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নতি; একপ্রকার অর্শবলি। নিম্নান্ত্রে, সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে দ্বিবৎ বেদনা। ০ বলির কণ্ডুয়ন ও জালাবিশিষ্ট অর্শ। ০ মলদ্বার-কণ্ডুয়ন (ধোতরুণে)।

মুত্র-যন্ত্র ।—মূত্র-তাগের অতি-প্রবৃতি । \* উদরে কুজন ও বেদনাসহ প্রচুর পরিষ্কার মুত্রপ্রাব । \* মুত্র-কালে কৰ্জনবৎ বাতনা, ও মূত্রাশয়ের গ্রীবার অবরোধ অনুভব, মুত্র-তাগের অনেকক্ষণ পর পর্যাস্তও উহার অবস্থিতি । স্বল্প ও আরক্তমূত্র । মূত্রাশয়ের গ্রীবার ও মুত্রমার্গে উপদাহ সহ বিবাক্তিত মুত্র-প্রবাহ । ত্রিকস্থানে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, অধিক মুত্রপ্রাবে ও উহার অনিবৃতি । ০ মুত্র-কৃচ্ছ । ০ মূত্রাভাব । জনন-যন্ত্র ।—( পুং ) বাম শুক্রবাহী রজ্জুতে ও অণুকোষে বেদনা, তৎসহ অণুকোষে স্পর্শ-দ্বেষ; তৎপরে দক্ষিণ শুক্রবাহী রজ্জুতে ও অণুকোষে চিড়িকমাদা বেদনা । মূত্র-তাগকালে মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থিতে বেদনা ও জ্বালা । লিঙ্গ-মুণ্ডে ও মূত্র-মার্গের মুখে কণ্ডূয়ন, এবং সর্বদা মূত্র-তাগের ইচ্ছা । মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থিতে স্পন্দনজনক বেদনা ও মূত্র-মার্গের অভ্যন্তর দিয়া উহার সম্প্রসারণ । ( স্ত্রী ) উষ্ণতা ও সমগ্র শরীরে একপ্রকার শীৎকার ( টিথগ্ন ) অনুভব । \* কুচকীতে ও কটিতে অবিরাম বেদনা এবং বস্তি গহ্বরের অভ্যন্তরে গৌরব ও অশিথিলতা অনুভব । রজোবিলোপ । বিলম্বিত রজঃ । স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী ।—বৃক্কাস্থির উর্দ্ধাংশের নিম্ন কণ্ডূয়িত হইয়া উদ্ভিক্ত শুষ্ককাস, তৎসহ স্বরযন্ত্রের পরিশোধ । বক্ষঃ ও হৃৎপিণ্ড ।—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা সহকারে হৃৎপিণ্ডের ও নীলা ধমনীর ( ক্যারটিডস ) গুরু স্পন্দন । হৃৎপ্রদেশে স্নাত্তর সঞ্চরমান বেদনা ও উহার দক্ষিণ স্কন্ধ-ফলক পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ । গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—গ্রীবার বামপার্শ্বের পেণীর অভিশয় খণ্ডতা, উহার স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারণ, ও সঞ্চালনে বেদনা । দেহ-শাখা ।—সর্বশরীরে জ্বালা ও টনটন, জজ্বায়, পদে, ও প্রাকোষ্ঠে উহার আধিক্য । পদদ্বয়ে অভিশয় উত্তাপ ও জ্বালা, দেড় ঘণ্টা উহার অবস্থিতি, তৎপরে সহসা পদের অগ্নীতিকর শীতলতা । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির অভ্যন্তর দিয়া চিড়িকমাদা বেদনা । ত্বক্ ।—কটির চারিদিকে কটিবন্ধাকার দ্রব্রবৎ, প্রায় তিন ইঞ্চি বিস্তৃত আরক্ত উদ্বেদ এবং উহাতে কণ্ডূয়ন, জ্বালা, ও বেদনা । স্থানিক প্রয়োগে চর্মের আরক্ততা । জ্বর ।—পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ । নিদ্রা ।—অস্থির নিদ্রা ও অগ্নীতিকর শ্রান্তিজনক স্বপ্ন, এবং জাগরণান্তে ঘ্রানি । দেহ ।—মস্তকোপরি অল্প অল্প ঘূর্ণন অনুভব, অল্পক্ষণ পরে বাহ্যতে ও জজ্বায় ভেড়িৎপ্রয়োগের ভ্রাম্য স্পন্দন অনুভব । স্কন্ধে নিতম্বদেশে, উদর-নিম্ন-প্রদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি প্রভৃতিতে স্পন্দন ও সবিরাম বেদনা । একস্থান হইতে স্থানান্তরে বেদনার গতি । বিদ্বাং সঞ্চরণ বা উদীচী-উষ্ণর ( অরোরা ) শিখা-স্মারক বেদনা । সর্বশরীরে, হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত একপ্রকার শিড়িশিড় ও উষ্ণতা অনুভব । ০ আভ্যন্তরিক প্রদাহ । ০ বাতকণ্টক ও ঘৃষ্টরূপ এবং তজ্জনিত খরতা । ০ পুরাতন বিসর্পের প্রদাহ । ০ প্রাচীন ও নিস্তেজ ক্ষত । ০ অপস্মার ।

সমুপগুণ ।—এসেরম, এমোনিয়ম-কার্ব, কলোকাইলম, ক্যাপ্সিকম, পলসেটিল, সেনেগা, মিনিসিও, জ্যাছোকজাইলম ।

## পলিনিয়া সর্বিলিস—গোয়ারাণা ।

পলিনিয়া সর্বিলিস ব্রেজিল দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষারোহী গুল্ম । ইহার বীজের চূর্ণকে গোয়ারাণা বলে । তথায় ইহা ফোকোরার নামে ব্যবহৃত হয় । ইহাতেও চা ও কফির উপকার যিনের সদৃশ একপ্রকার উপকার আছে । ইহার বীজের বিচূর্ণ ও অরিষ্টে প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—সহায়তাতিক স্নায়ুগুণেই ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় । ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় উক্ত স্নায়ুগুণের অবসাদন জন্মে ।

অধিকার ।—সবম্ন শিরঃপীড়া ; উদরাময় ; বম্বা রোগের অতিসার ; শিঙ-বিস্টী ; ক্লোরোসিস ; পক্ষাঘাত, স্নায়ুশূল প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

অতিসার ।—সবুজবর্ণ, প্রভূত, কিন্তু গন্ধশূন্য অতিসার লক্ষণে ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিদ্রি দেন । শিরোবেদনা ।—ডাঃ লিলিয়েস্থাল অর্ধ-শিরোবেদনায় ; আমাশয়িক লক্ষণ সংযুক্ত সমুখ মস্তকের বেদনায়, বিশেষতঃ অতিরিক্ত চা বা কাফী পায়ীদিগের জেদ্ব বেদনায় নিদ্রালুতা, তদ্রালুতা, মুখ-রাগ, শিরোগোরব, অব্যায়ম প্রভৃতি লক্ষণে ; এবং পরিপোষণ-স্নায়ুর দুর্বলতা বিশিষ্ট স্নায়বীয় শিরোবেদনায় পলিনিয়া ব্যবস্থা করেন । লণ্ডন নগরের ডাঃ উইল্কস ও মনষ্ট্রীল নগরের ডাঃ ওয়ার্ড দক্ষিণ শঙ্কস্থলে আরক্ত সবম্ন শিরোবেদনায় ইহার বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন । এইপ্রকার শিরঃপীড়া প্রতিরোধার্থ অব্যাপক ট্রিস প্রাতে প্রথম আহারগ্রহণের অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে ইহার অল্প কয়েক গ্রেণ ব্যবস্থা করিতেন । ডাঃ অকফোর্ড পলিনিয়া বীজের প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ সমগ্র মস্তক ব্যাপ্ত, এবং অতিশয় বিবিধা ও বমনবিশিষ্ট শিরোবেদনায় সর্বাপেক্ষা উপকার করিতে দেখিয়াছেন । নিদ্রালুতা ।—আহারান্তে অব্যায়মী অর্থাৎ ছাত্র ও সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের মুখ-রাগ সহকারে যে দুর্বল্য তদ্রালুতা, নিদ্রালুতা, ও শিরোগোরব জন্মে তাহাতে এই ঔষধে উপকার করে বলিয়া উল্লিখিত আছে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ

মস্তক ।—শিরোঘূর্ণন । বর্ণ-নাদ । মুখমণ্ডলের আরক্ততা । একদৃষ্টি । নাড়ীর একটু বৈষম্য । স্বকের অর্জিতা । প্রলাপ । শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা । স্নায়বীয় শিরোবেদনান্তে অতিশয় শ্রানি । গাত্রে কণ্টক-বেধ ও শীতলতা অল্পভব । প্রফুল্লতা । অনিদ্রমিত, আচরণ । মানসিক অল্পভবাধিক্য । বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা । অবিরত কঠিন পরিশ্রম করিবার ক্রান্তাভাবিক প্রবৃত্তি । রাত্রি নয়টা হইতে শয়নকাল পর্যন্ত মস্তকের বিশৃঙ্খলা । রাত্রি হইপ্রহরের সময় নিদ্রা হইতে জাগরণ ও কপালের অল্পগত্রে অশিথিলতার অভিযোগ ;

শীঘ্রই আবার নিদ্রাবেশ, কিন্তু পরদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে শিরোবেদনার অবিদ্যমানতা। শিরঃপীড়ার জন্ত বৃহৎ মাত্রায় সেবনে উহার বৃদ্ধি। প্রায় অসহ্য বেদনা, ও প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রলাপ। প্রতিনিয়ত অক্ষিপুট্পন্দন। নিদ্রাশূন্যতা। ০ সবমন শিরোবেদনা। ০ অর্ধ-শিরোবেদনা। বক্ষঃস্থল।—ঋসরোগে ব্যবহারে উহার উপচয়। ঋস-কণ্ঠের এতই বৃদ্ধি যে কিছু অবলম্বন করিয়া বহুকণ্ঠে ঋস-ত্যাগ। মুখমণ্ডলের প্রথমে আরক্ততা, অনন্তর নীলাক্ততা, চক্ষুর উজ্জ্বলতা ও একদৃষ্টি। হৃৎপিণ্ড।—হৃৎস্পন্দনের সংখ্যার ন্যূনতা। দেহ।—অস্থিরতা, অধীরতা, উৎসাহপূর্বক কার্য করিতে অপারগতা। অপরাহ্নে ও সায়রাহ্নে মস্তকে, বিশেষতঃ শব্দদেশে যন্ত্রণাপ্রদ পূর্ণতা ও দপদপ। ০ আমবাতিক ও স্নায়বীয় কটবেদনা।

সমগুণ।—এগের, কফি, সাইপ্রি, কোকা, আইরিস, পলস, স্কট, ভেলেরা,

## পলিপোরস অফিসিনেলিস

পলিপোরস লার্চ বৃক্ষজাত এক প্রকার ছত্রক। ইহা সকল দেশেই উৎপন্ন হয়। ইহাতে শতকরা ৭২ ভাগ ধূনা, কিঞ্চিৎ বেঙ্গোয়িক এসিড ও বিবিধ লাবণিক মিশ্র পদার্থ আছে। পলিপোরস বিদাহী। শৈল্পিক ঝিল্লীতে লাগিলে তথায় উপদাহ জন্মায়। আমেরিকার রকি পর্বতবাসী আদিম নিবাসীরা ইহা বিরোচক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। কুড়ি বা ত্রিশ গ্রেণ মাত্রায় ইহার বিরোচন-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় চল্লিশ গ্রেণ যথোপযুক্ত মাত্রায় বিভক্ত করিয়া সেবন করিলে এতদ্বারা ক্ষয়রোগের নৈশ ঘর্ম নিবারিত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে এই ছত্রকের অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার পলিপোরস শুভ্রবর্ণ পাইন বৃক্ষের কাণ্ডে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাকে পোলিপোরস পাইনিকোলা বলে। ইহার সাধারণ গুণ লার্চবৃক্ষজাত ছত্রকের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকের মত এই যে ঐকাক্ষিক প্রকৃতির সবিরাম জরেই পলিপোরস পাইনিকোলার উত্তম ফলবত্তা দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

জ্বর।—হৃদ্মা সবিরাম জরে, অথবা অচিকিৎসিত, কুচিকিৎসিত ও কুইনাইন অপব্যবহৃত বিষম জরেই পলিপোরসের প্রধান প্রতিপত্তি। ডাঃ লর্ড এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, যে সকল রোগীরা পূর্বে কুইনাইন সেবন করিয়াছিল তাহাদের জরেই তিনি ইহার বিশেষ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জরে অত্যন্ত চিকিৎসকেরাও এই ঔষধের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা ইহার জ্বরশৃঙ্খলের অতিশয় প্রশংসা করেন, কেহ কেহ বা একেবারেই ইহার আরোগ্যকারিতা

শক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু পলিপোরসের ভৈষজ্যগুণ সম্বন্ধে ডাঃ বার্ট ও ডাঃ হেল যাহা বলেন তাহাই প্রামাণিক বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ডাঃ বার্ট বলেন যে তিনি ঐঐ ঔষধ যখন প্রথম ছয় মাস ব্যবহার করেন তখন একশত সবিরাম জরের রোগীর মধ্যে পাঁচজন ব্যতীত আর সকলেই ইহা সেবনে আরোগ্য লাভ করে। যে পাঁচ জনের কোন উপকার জন্মে না, তাহাদের চারিজনের ত্রাহিক ও একজনের ঐকাহিক জ্বর ছিল। কিন্তু পরবর্তী শরৎকালে আবার যখন ব্যাপক আকারে জ্বর হইতেছিল তখন পলিপোরস ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে না। পাঁচজনের মধ্যে একজনের অধিক আরোগ্য লাভ করে না। সুতরাং তিনি তিন মাস পর্য্যন্ত এই ঔষধ একেবারেই ব্যবহার করেন নাই। তৎপরে আবার ব্যবহারে পূর্ববৎ সফল দর্শে। তাঁহার ধারণা এই যে দীর্ঘকালস্থায়ী, অধিক পরিমাণে কুইনাইন ও অগ্নাত ঔষধ সেবিত সবিরাম জরে অগ্নাধিক যক্ষ্ম ও উদরের উপসর্গ, ও নীরক্ততা; হৃকের ললিন- পাণ্ডুরোগবৎ বর্ণ, তরল মলশ্রাব বা কোষ্ঠবদ্ধতা; তৃতীয়ক বা ঐকাহিক জ্বর; বিরামকালে শিরঃপীড়া; মুখে তিক্ত আশ্বাদ জিহ্বার ষ্ঠেত বা পীতবর্ণ লেপ বা রক্তশৃঙ্গ আকৃতি; ক্ষুধাহীনতা; উদর-ঘন্ত্রে, বিশেষতঃ যক্ষ্মেত অগ্নবিস্তর বেদনা; রোগীর অতিশয় দুর্বলতা; জ্বরের আবেশান্তে ঘর্ম্মাভাব বা অগ্ন ঘর্ম্ম;—এই সকল লক্ষণেই পলিপোরস ফলপ্রদ। সবিরাম জরে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে; জ্বর প্রতিদিনই আসিলে; এবং অগ্ন ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব থাকিলে পলিপোরস ভাল কাজ করে। জ্বরকালীন বা জ্বরের আবেশান্তে রোগীর অধিক ঘর্ম্মশ্রাব হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে না। রোগীর ভূতদ্রব্য মলের সহিত অপরিপাচিত অবস্থায় নির্গত হইলে পলিপোরস সুব্যবস্থেয়। এতদ্বারা অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত অতিসার অতি সত্ত্বর আরোগ্য হয়। স্বল্পবিরাম জরেও জ্বরের অধিক তীব্রতা না থাকিলে ডাঃ বার্ট এই ঔষধি প্রয়োগ করিয়া সুন্দর ফললাভ হইয়াছেন। তরুণ ঐকাহিক জ্বরে, স্বল্পবিরাম জ্বরের স্থায় জ্বর অধিকক্ষণ থাকিলে এবং বিরামকালে রোগীর অতিশয় শ্রানি, ক্ষুধাহীনতা বা ঘন ঘন ক্ষুধা; অগ্নাধিক আশায়িক লক্ষণ, তৎসহকারে অপ্রবল শিরঃপীড়া ও অতিশয় আলস্ত বিদ্যমানে; জ্বরের আবেশ সময়ে অগ্নবিস্তর আশায়িক উপসর্গ, বমন বা বমনাভাব, তীব্র শিরোবেদনা, তৎসহ গৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা; সাধারণতঃ অপ্রবল ও অগ্নকালস্থায়ী শীত, অনেকক্ষণস্থায়ী তাপ, তৎপরে অনধিক ঘর্ম্ম; আসেনিকাদি জ্ঞাপক জ্বরের স্থায় জ্বরের আবেশ সময়ে কখনই তত তীব্র পিপসা নহে, কিন্তু শীত ও তাপাবস্থায় রোগী জল চাহিতেও পারে না চাহিতেও পারে, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসাপরিশৃঙ্খতা,—এই সকল লক্ষণে পলিপোরস উপযোগী। রোগীর যদি প্রবল শীত, তীব্র উত্তাপ, প্রভূত ঘর্ম্ম, আশায়িক লক্ষণের অবিদ্যমানতা, এবং ঘর্ম্মশ্রাবান্তে সুস্থতা লক্ষণ থাকে তবে পলিপোরস দ্বারা তাহার জ্বর আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। অব্যাপক প্রকৃতির ঐকাহিক ও তৃতীয়ক জ্বরে, বিশেষতঃ ঐকাহিক জ্বরে পলিপোরস অত্যন্তকৃত ঔষধ এবং কুইনাইনের সমকক্ষ। কিন্তু

ব্যাপক আকারের সবিরাম জরে ইহার প্রতি তত নির্ভর করিতে পারা যায় না । রোগীর অল্পবিস্তর পাণ্ডুলক্ষণ থাকিলে পলিপোরস হৃদয়ের উপযোগী হয় । অপর, ক্ষয়-রোগগ্রস্ত-দিগের প্রায় সকল প্রকার বিষম জরেই এই ঔষধে উপকার দর্শে । রোগীর পিত্ত-প্রধান ধাতু হইলেও ইহা বিশেষ উপযোগী । ডাঃ বার্ট এতদ্বারা ঘৌকালীন ঐক্যাহিক জরও উত্তমরূপে আরোগ্য করিয়াছেন । পূর্বাহ্নের জরেই পলিপোরস ভাল কাজ করে, সায়াহ্ন ও রাত্রির জরে এই ঔষধে তেমন উপকার দর্শে না । শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের জরেই ইহা ফলপ্রদ, শরৎকালের জরে এই ঔষধে বড় উপকার করে না । হানসেন বলেন যে মস্তকে রক্তের প্রধাবন, শিরোগূর্ণন, উত্তপ্ত ও আরক্ত মুখমণ্ডলের কণ্টক-বেদন, অল্পভব, অনধিক ঘর্ম্ম, বিরাম-কালে পাণ্ডু, সম্মুখ-কপালে শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠ-রোধ ; এই সকল লক্ষণে সবিরাম জরে পলিপোরস ফলপ্রদ ।

শিরঃপীড়া ।—পলিপোরস সেবনে প্রতিদিন একই সময়ে সমাগত সবিরাম শিরঃপীড়া আরোগ্য হয় । মুখমণ্ডলের সবিরাম ঝায়শূলেও এই ঔষধে উপকার করে । একজন চিকিৎসক উল্লেখ করিয়াছেন যে একটি নিবৃত্ত রক্তাক্ত স্ত্রীলোকের পৈত্তিক শিরঃপীড়া বিন্দুমাত্রায় এই ঔষধের মাদারটিংচার সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল ।

পাণ্ডু ।—ডাঃ বার্ট বিশ্বাস করেন যে যকৃততে লেপ্টোগ্রার ক্রিয়ার জ্বায় পলিপোরসেরও ক্রিয়া প্রকাশ পায় । এবং পাণ্ডুরোগে এতদ্বারা উত্তম ফল দর্শে ।

অতিসার ।—ম্যালেরিয়া জনিত বহুধাপী অতিসার ও রক্তাতিসারে ( ডিসেন্ট্রি ) ডাঃ হলকোম, উড, ও অত্মাত্ম চিকিৎসকেরা পলিপোরসের উপকারিতা স্বীকার করেন । ব্যাপক সবিরাম জরের সহিত অনেক সময় হৃদম্য অতিসার ও রক্তাতিসার বিত্তমান দৃষ্ট হয় । কখন কখন জরের আবেশ অর্থাৎ শীত, উত্তাপ, ও ঘর্ম্মের পরিবর্তে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম প্রকৃতির অতিসার বা রক্তাতিসার প্রকাশ পাইয়া থাকে । জ্বদূশ অতিসারে ম্যালেরিয়া বিনাশক বা পর্যায়নিবারক ঔষধ ভিন্ন অত্ৰ কোন ঔষধে উপকার দর্শে না । অতিসারে সচরাচর যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাতে কোন উপকার না পাইয়া ডাঃ হেল চায়না, কুইনাইন, আর্সেনিকম, ও জেলসিমিয়ম প্রয়োগেই এই প্রকার অতিসার আরোগ্য করিয়া থাকেন । তিনি মল, ও বেদনাদি বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রোগের পর্যায়শীলতা অনুসারেই ঔষধ ব্যবস্থা করেন এবং সবিরাম জরের জ্বায় চিকিৎসা করেন । অনেক সময় রোগের পর্যায়শীলতা এতই প্রচ্ছন্ন থাকে যে সবিশেষ সূক্ষ্মানুসন্ধান ব্যতীত তাহা জানিতে পারা যায় না । এই প্রকার অতিসার ও রক্তাতিসারেই পলিপোরসে অনেক রোগীর উৎকৃষ্ট আরোগ্য জন্মে ।

মূত্র-রোগ ।—পলিপোরসে বেঞ্জোইক এসিড আছে বলিয়া এতদ্বারা মূত্ররোগে ও আমবাঙ্গিক রোগেও উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ।



যক্ষ্মা।—প্রভূত নৈশ ঘর্ষ ও জলবৎ অতিসার বিশিষ্ট ক্ষয়-রোগে পাঁচ প্রেণ মাত্রার ইহার ব্যবহার হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—নিরুৎসাহিতা, বিমর্ষতা, নিরাশ-চিন্ততা, কোপনতা। অনামনস্কতা ও স্মৃতিহীনতা।

মস্তক।—\* অর সহকারে মৃদু মৃদু সম্মুখ কপালের শিরঃপীড়া। মস্তক লঘু ও শূন্যগর্ভ অনুভব, তৎসহকারে সম্মুখ কপালে গভীর শিরঃপীড়া ও মুচ্ছাভাব। ০ যকৃতের বিধান-বিকারজনিত সবমন শিরঃপীড়া। ০ পর্যায়শীল শিরঃপীড়া। কপালে অশিথিলতা অনুভব, এবং সমস্তদিন শঙ্খদ্বয়ে শিরঃপীড়া। ০ পৃষ্ঠবংশে শীতানুভব সহকারে প্রতিমাসে সবমন শিরঃপীড়া।

মুখমণ্ডল।—০ মুখমণ্ডলের পর্যায়শীল দারুণত্ব। ০ মুখমণ্ডলের সবিরাম দারুণত্ব, —উপরের দন্ত শ্রেণীতে, বাম হনু ও শঙ্খস্থানে একপ্রকার জ্বালাকর বেদনা, বেলা দুই প্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত সেই বেদনার অবস্থিতি।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—\* মুখে তিক্ত, ত্বকারজনক আত্মদ। \* অনধিক শিপিপাস। \* জিহবার স্বেত বা পীতবর্ণ লেপ। গলার অভ্যন্তরে অবদারণ অনুভব।

আমাশয়।—বিবিধা ও কখন কখন পিত্তবমন। পিত্ত-প্রধান ধাতু; আমাশয়ে বিবিধা; আমাশয়ের শীতলতা। সারাহ্নে আমাশয়ে পিপ্তবৎ অনুভব। আমাশয়-প্রদেশে জ্বালাকর যাতনা।

উদর।—উদরস্থ যন্ত্রে, বিশেষতঃ যকৃতে অল্প-বিস্তার বেদনা। \* সবিরাম অতিসার অথবা রক্তাতিসার (আমরক্ত)। অস্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, অথবা তরল লেহবৎ আমময় মল। অস্ত্রে কতকটা অস্বচ্ছন্দতা, এবং তীব্র পেটকামড়ানি। অস্ত্রে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়, এবং যেন অতিসার জন্মিবে এপ্রকার অনুভব, তৎপরে যৎসামান্য মলশ্রাব। উদরের অস্বচ্ছন্দতা, ও তরল মলশ্রাব।

মূত্র।—মূত্র গাঢ় ও প্রগাঢ়বর্ণ, অথবা আরক্ত ও স্বল্প। প্রভূত মূত্রশ্রাব, প্রতিনিয়ত মূত্র-ত্যাগ প্রবৃত্তি।

মল ও মলদ্বার।—বেদনা-শূন্য তরল লেহবৎ মল। কেবল আম, অথবা আমরক্ত, ও পিত্তমিশ্রিত মল, তৎসহকারে অতিশয় প্রান্তি এবং সোলার প্রেক্সস নামক দারুণ গুচ্ছে যাতনা। অজীর্ণ দ্রব্যমিশ্রিত অতিসার। পাতলা, পীতবর্ণ মল, মলশ্রাবান্তে বেদনা। অতিশয় বাতায়ান সংযুক্ত মল-প্রবৃত্তি। স্বেলে নিঃসারিত প্রভূত তরল মল। ০ পুরাতন রক্তাতিসার ও অতিসার।

জ্বর।—\* প্রতিদিন বারবার পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ। জ্বরের বিস্তারিত বড়ই অল্পকাল স্থায়িত্ব; প্রায় অবিরাম জ্বর। \* অল্প ও হ্রস্ব শীত; দীর্ঘ-তাপ; তৎপরে

ষৎসামান্য বর্ষ। ক্ষয়ীদিগের শীতোত্তাপ বিশিষ্ট বিলেপীকর। \* জ্বর ও বৃহৎসন্ধিতে অবিরাম বেদনা সহ সারারাত্রি অস্থিরতা। \* বারংবার জ্বরের উত্তাপাবেশ সহকারে পৃষ্ঠবংশে শীত। একদিন সমস্ত অপরাহ্নে ও রাত্রিতে জ্বর। \* স্বক্, বিশেষতঃ করতল তপ্ত ও ক্লম্ব। দুই দিন রাত্রিতে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রভূত ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ। শীতাবস্থায় জ্বন্তণ ও অঙ্গমর্দনের প্রবৃত্তি। পৃষ্ঠ দিয়া শিড়শিড় করিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত অল্প অল্প শীতের উৎখতি; এবং ক্ষয়দ্বয়ের মধ্যভাগে উহার আধিব্য। তৎপরে কয়েক মিনিট স্থায়ী সর্বাঙ্গীন শীতানুভব। ০ সবিরাম, স্বল্প-বিরাম ও পৈত্তিক জ্বর।

**পৃষ্ঠ ও কটি।**—বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিতে এবং পৃষ্ঠ ও জজ্বার অস্থিতে স্নাতীক অবিরাম বেদনা সহকারে অতিশয় অবসাদ। সমস্ত বৃহৎসন্ধিতে অতিশয় অবিরাম যাতনা। তীর পৃষ্ঠ-বেদনা, পৃষ্ঠের অতিশয় শুষ্কতা, কিঞ্চিংকাল বসিলে উঠিতে অতিশয় কষ্ট।

**বিশেষ লক্ষণ।**—সমস্ত বৃহৎ সন্ধিতে বেদনা। মস্তক লঘু ও শূন্য-গর্ভ অনুভব। উদরোদ্ধভাগে শূন্যতানুভব সহকারে ক্ষুধাহীনতা। যকৃততে স্নাতীক আকর্ষণবৎ বেদনা সহকারে আমাশয়ে জ্বালাকর যাতনা। জল, পিত্ত, আম, কাল পুরীষময় পদার্থ বিশিষ্ট মল, মলত্যাগান্তে অতিশয় প্রাপ্তি। (লেপ্টা)। অপরিপাচিত পদার্থ বিশিষ্ট অতিসার। স্বল্প, রক্তবর্ণ মূত্র। অতিশয় অবসন্নতা। জ্বন্তণ ও অঙ্গ-মর্দনের প্রবৃত্তি। আর্দ্র, শীতল কালে বৃদ্ধি। উষ্ণ শুষ্ক ঋতুতে হ্রাস।

**সমগুণ।**—এগেরিকস, ব্রাইওনিয়া, চায়না, কর্ণস, জেলসেম, নক্স ভগ, ইপিকাক, পডোফাইলম।

## পলিমনিয়া ইউভিডেলিয়া।

এই বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে। ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। গ্ৰীহারোগে ও জরায়ুর বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার মূল অরিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম দশ বিন্দুগাত্রায় তিন চারিবার সেবন, এবং এক ভাগ অরিষ্ট ও দুইভাগ গ্লিসিরিন মিশ্রিত মলম গ্ৰীহাতে মর্দন, ও ঋতুকালে ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি রাত্রে প্রসবদ্বারে তুলার ছিপী করিয়া সংলগ্ন করিতে হয়। পুরাতন গ্ৰীহাদিতে অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইউভিডেলিয়া পরীক্ষিত হয় নাই।

## পাইপার মিথিফিকম—কাভাকাতা।

পাইপার মিথিফিকম বৃক্ষ প্রশান্তমহাসাগরে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। সেই স্থানের আদিবাসীরা এই বৃক্ষকে কাভাকাতা বলে। তথায় ইহার মূলের ফাণ্ট কাফির খ্রীষ

পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপেও কাভাকাতা পরীক্ষিত হইয়াছে। ঔষধার্থে ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—কাভাকাতার ক্রিয়ায় মত্ততা জন্মে। সংযত আকারে সেবন করিলে প্রায় তখনই মত্ততা উপস্থিত হয়। কিন্তু সচরাচর ব্যবহার্য মাত্রায় সেবন করিলে প্রায় কুড়িমিনিট পরে মাদকতা প্রকাশ পায়। বর্দ্ধিত মাত্রায় কাভাকাতার মূল মদিরামত্ততা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; বিমর্ষতা, নীরবতা, ও নিদ্রালুতাপূর্ণ একপ্রকার মত্ততা জন্মায়। অভ্যস্ত কাভাপায়ীরা প্রতিদিন ইহা সাত আটবার পান করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের এমন একরূপ নায়বীয় কম্পন উৎপন্ন হয় যে তজ্জন্ত প্রায়ই বাটী ধরিয়া ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া চুমুক দিতে পারে না। কাভার মত্ততা দুই ঘণ্টার অধিক থাকে না। কিন্তু কয়েক দিন পরে পরে পান করিলে ছয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; যাহারা কখন কখন পান করে তাহাদের মত্ততা বার ঘণ্টাও বৃহিতে পারে। আর্জহুলে যে মূল জন্মে তাহাহইতে প্রস্তুত পানীয় পান করিলে প্রগাঢ় নিশ্চেষ্টতা, ও যৎসামান্য গোলমালে উত্তেজনা জন্মে। অনেক সময় অত্যধিক বা অত্যল্প মাত্রায় কাভা সেবনে নিদ্রার পরিবর্তে অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ ও লক্ষন-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট একপ্রকার মাদকতা উপস্থিত হয়, কিন্তু একমুহূর্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা যায় না।

কাভার ক্ষুদ্রমাত্রাজনিত ক্রিয়ার সহিত কফির ক্রিয়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতেও কফির ত্রায় প্রথমে প্রফুল্লতা ও উৎসাহিতা জন্মে; কঠিন পরিশ্রম করিলেও শ্রান্তি জন্মিবে না বলিয়া বোধ হয়। ইহার ক্রিয়ার চরমসীমায় মস্তক বৃহত্তর, প্রায় যেন কাটিয়া পড়িবে, এপ্রকার অল্পভূত হয়। শিরোঘূর্ণনও জন্মে, চক্ষু বুজিলে বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেই শিরোঘূর্ণনের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের, বিশেষতঃ উহার ভূমিদেশের নাড়ীগুলি পূর্ণ ও আবদ্ধবৎ বোধ হয়। এই পর্য্যন্তই কফির সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অনন্তর পাইপারের ক্রিয়ায় এতদ্বিপরীত, মস্তিষ্কের দোর্দল্যজ্ঞাপক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে, অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন করা বা অনেকরূপ অনিদ্রিত থাকার ন্যায় মস্তিষ্কের শ্রান্তি অল্পভূত হয়। মস্তকে একপ্রকার গৌরব, ও মুহু, অবিরাম বেদনা জন্মে, এবং অধ্যয়নে, চিন্তনে বা অন্যবিধ মানসিক পরিশ্রমে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। ইহার উদ্দীপন বা অবসাদনস্বচক মানসিক লক্ষণগুলি বিবস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করিলে উপশমিত হয়। অপর, পাইপার ক্যাটালেপ্সি রোগের ন্যায় আক্কেপও জন্মায়। এতদ্বারা মন বিশ্রান্ত ও সামান্য অনুরোধে বশীভূত হয়; এবং সকল প্রকার বাহ্য সংস্পর্শেই অল্প-বাহিক্য জন্মে।

অধ্যাপক পবলার বলেন যে কাভামূলের দ্বিবিধ প্রধান গুণ দৃষ্ট হয়। যথা, এতদ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় ও মত্ততা জন্মে; এবং মূত্র উৎপন্ন ও শ্লেষ্মাস্রাব সংকল্প হয়। প্রজনন-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হান স্নায়ু-কেন্দ্রে কাভার বিষ-ক্রিয়ার প্রভাবে অতিশয় প্রেমাঙ্কুরে

জন্মে, কিন্তু উপহের দুর্দম্য উদ্বেগাদি দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কাভার দ্বিতীয়প্রকার ক্রিয়ায় মূত্র-বস্র ও জনন-বস্রের প্রদাহের শাস্তি জন্মে এবং মূত্র-মার্গ ও মূত্রাশয়ের পূর্ব ও প্লেগ্মায়ময় স্রাব হ্রাসপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ হয়। টেরিবিস্থিনার ত্রায় একপ্রকার স্নগন্ধি তৈল ও ধূময় উপাদান হইতে সম্ভবতঃ কাভার এই শেষোক্ত গুণ সমুৎপন্ন হয়।

**অধিকার।**—প্রথমে মানসিক উত্তেজনা, শেষে অবসাদ লক্ষণাপন্ন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। বিবদ্ধিত তালু-মূল, কর্ণ-বেদনা, ও অস্থিরতা সংযুক্ত দন্ত-বেদনা। ওদ্বারা মুখমণ্ডলের সমগ্র পার্শ্বের আক্রান্তি। প্রায়শঃ শব্দী লাগিয়া উহার উৎপত্তি। আমোদিত হইলে উপশান্তি। অতিশয় অস্থিরতা সংযুক্ত স্নায়বীয় শূল-বেদনা; রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্তন। মূত্রে ইউরিক এসিড নিঃসরণ। তরুণ প্রমেহ, আক্ষেপিক মূত্রাশয়-প্রদাহ, মূত্র-মার্গ-প্রদাহ, অণ্ড-প্রদাহ এবং সকল প্লেগ্মিক রিজীর প্রাতিশ্রাব্যিক ( ক্যাটারাল ) পীড়া। ব্রাইটস ডিজিজ। পামা। কুষ্ঠ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**মূত্রমার্গ-প্রদাহ।**—মূত্র-মার্গে কাভার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া মূত্র-মার্গ-প্রদাহের অতিশয় প্রদাহিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও সমধিক উপকার করে। ডাঃ সুইটজার বলেন যে কাভা প্লেগ্মিক রিজীর বল বিধান করে। তিনি অষ্ঠার মাস স্থায়ী একজন পুরাতন প্রমেহের রোগীকে অত্যন্ত ঔষধ বিফল হইলে ৪০ বিন্দুমাাত্রায় কাভার অগ্ৰিষ্ট সেবন করিতে দেন; তাহাতে সে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করে। তাহার বহুদিনের এক প্রকার পুরাতন কাস ছিল তাহাও এই সঙ্গে উপশমিত হয়। হানসেন বলেন যে এতদ্বারা মূত্র-স্রাব বিবদ্ধিত, মূত্র-কালে জাগ্রকর বেদনা প্রশমিত এবং প্রমেহের স্রাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তরুণ প্রমেহে একবাটী জলে কাভার ২০ বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন চারিবার ব্যবহারের বিধি আছে। তিনি কয়েকজন খেতপ্রদরের রোগীগণকেও এই ঔষধ সেবন করাইয়া সফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাভা সুবাসিত ও সেবনে বিষাদ নহে এবং এতদ্বারা পরিপাক-ক্রিয়াও কোন প্রকার উপদ্রব জন্মে না। বেদনা।—স্নায়ুশূল প্রকৃতির বেদনায় ডাঃ গ্রিসওল্ড এই ঔষধ বিস্তার ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে পাইপার অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনার শাস্তি জন্মায়। রোগী যখন বাতনায় ছটফট করিতে ও মোচাড় পাড়িতে থাকে, বারবার অবস্থান পরিবর্তন না করিয়া পারেনা, অথচ অবস্থান পরিবর্তনে তাহার অধিক শাস্তি জন্মে না; কিন্তু অত্যন্ত হইলে ক্ষণকাল উপশম বোধ হয়; ওখন পাইপার ব্যবহার করিলে আশ্চর্য ফল দর্শে। বিষয়াস্তরে মনোনিবেশে বেদনার শাস্তি লক্ষণে শিরোবেদনায়ও ইহা ব্যবহৃত হয়। রজঃ-কুচ্ছ।—ঋতুর প্রথম দিন স্ত্রীতর বেদনা, মুখমণ্ডলের স্রবৎ পাণ্ডুবর্ণ, ও সর্কাসীনা শ্রান্তি; বিবৃমিষা এবং উদরের ও জরায়ুর দুইপাশেই বেদনা, তৎপরে অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা লক্ষণে

ডাঃ লিলিয়েস্থাল রজোরোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। মানসিক রোগ।— শিরশীড়াতে অবাস্তব-বস্তু-দৃষ্টি ও অশ্রদ্ধভাব; শিরোধূর্ন ও চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দর্শন, কর্ণ-নাদ, কল্লিতভাব ও প্রবল উল্লম্বন-প্রবৃত্তি; এই সকল লক্ষণে উন্মাদরোগে ইহার ব্যবহার আছে।

চিকিৎসিত রোগী।—( ১ ) আঠার বৎসর বয়স্কা একজন অবিবাহিতা যুবতীর স্তনে ৬।৭ মাস ধাবৎ একপ্রকার জ্বালাকর বেদনা ছিল। তৎসঙ্গে তাহার কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ; মধ্যাহ্নের ও সায়াহ্নের আহারের পর উদরের ক্ষীততা, এবং চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে উহার বিরতি; মুখমণ্ডলের স্বকের খর-স্পর্শতা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে স্তনের বেদনা বৃদ্ধি পাইত; এবং আহার করিতে আরম্ভ করিলে ও আহার করা সমাপ্ত হইলে উহা পাঁচ-দশ মিনিট উপশমিত থাকিত। এজন্ত বেদনার শাস্তি নিমিত্ত রোগিণী বারবার আহার করিত। চিংহইয়া শুইয়া থাকিলেও বেদনার হ্রাস পড়িত। কোন নূতন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, একটু উত্তেজনা জন্মিলে, যথা ভজনালয়ে বা শিক্ষালয়ে অবহিতি কালে, ও অবস্থান পরিবর্তনেও বেদনা উপশমিত হইত। রোগিণী পাঁচ মিনিট কাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিত না। অত্যাঁজ ব্যবস্থের ঔষধ ব্যৱহারে কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়া ডাঃ গ্রিসওল্ড “কোন নূতন বিষয়ে মনোনিবেশে,” “অবস্থান পরিবর্তনে,” ও “উত্তেজনায়” উপশম, এই তিনটি বিশেষ লক্ষণানুসারে অর্দ্ধবাটী জলে পানর বিন্দু পাইপার মিথিষ্টিকম মিশ্রিত করিয়া দুইঘণ্টা অন্তর দুইড্রাম মাত্রায় তাহাকে সেবন করিতে দেন। পাঁচ ছয় দিবস ঔষধ ব্যবহারে রোগিণীর বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আত্মান, বদনের বন্ধুরতা, সকলই দূরীকৃত হয়। তৎপরে একসপ্তাহ ঔষধ প্রয়োগে বিরত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ আংশিক প্রত্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু পুনরায় সেই ঔষধ ব্যবস্থা করাতে রোগিণী সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করে। ( ২ ) প্রমেহের শ্রাব অবরুদ্ধ হইয়া এক ব্যক্তির অণ্ড-প্রদাহ উৎপন্ন হয়। যাতনায় রোগী ছটকট করিতে ও গড়াগড়ি পাড়িতে থাকে; নানাপ্রকারে অবস্থান পরিবর্তন করিয়াও শাস্তি পায় না। একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক চব্বিশ চণ্টা পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসা করেন এবং সম্ভবতঃ ষষ্ঠেইমাত্রায় মাদক ঔষধ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। ডাঃ গ্রিসওল্ড অর্দ্ধগ্লাস জলে অর্দ্ধড্রাম পাইপার মিথিষ্টিকম মিশ্রিত করিয়া উহার চতুর্থাংশ তাহাকে সেবন করান; দশমিনিট পরে আরও দুই ড্রাম সেবন করিতে দেন, তৎপরে রোগীর বেদনা উপশম পড়িতে থাকে, অনন্তর আরও দুই তিন মাত্রা সেই ঔষধ প্রয়োগ করাতে সম্পূর্ণরূপে তাহার বেদনা দূরীকৃত হয়; কিন্তু অণ্ড-প্রদাহ আরোগ্য করিতে একোনাইট, ক্রিমেটস, মার্ক-আইওড প্রভৃতি আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ( ৩ ) পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা একজন বণিকের উদরের বামশাণ্ডে পেয়ণবৎ অবিরাম বেদনা জন্মিয়াছিল। বেদনা একবার উপরের দিকে ও একবার নীচের দিকে

যাতায়াত করিত । বেদনা সহকারে উদগার, বিবমিষা, বমন, অল্প অল্প আশ্বান, ও কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণও বর্তমান ছিল । প্রচাপনে বেদনা উপশমিত বা বিবদ্ধিত হইত না ; রোগী একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে পারিত না ; কখনও সম্মুখদিকে অবনত হইয়া হাঁটিত, কখনও বা চিং হইয়া শুইয়া থাকিত ও এপাশ-ওপাশ করিত ; আবার কোন সময় বা হামাগুড়ি দিত এবং সম্মুখদিকে ও পশ্চাদিকে ছলিত । তাহার সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ষণপাত হইতেছিল । যদিও রোগী না নড়িয়া চড়িয়া থাকিতে পারিত না, কিন্তু এইপ্রকার অবস্থান-পরিবর্তনে যাতনায় অধিক শাস্তি জন্মিত না । ডাঃ গ্রিসওল্ড প্রথম শক্তির ছইড্রাম পাইপার চারিআউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ছইড্রাম মাত্রায় এই রোগীকে সেবন করিতে দেন । দ্বিতীয় মাত্রা সেবনের অল্পক্ষণ পরেই রোগীর বেদনার শাস্তি জন্মিতে থাকে এবং তৃতীয় মাত্রা প্রয়োগান্তে তাহার বেদনা ক্রমে ক্রমে অন্তঃস্থত হয় । এই বেদনায় বাম বৃক্ক ও মূত্রবহানালী আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কয়েক দিবস পরে রোগীর মূত্রে রেণু দৃষ্ট হইয়াছিল । সম্ভবতঃ অশ্মরি নির্গমন বশতঃই ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল । কিন্তু যে কারণেই বেদনা উৎপন্ন হউক পাইপার সেবনে উহার অতি সম্বর শাস্তি জন্মিয়াছিল ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—অধিকতর সজীবতা অনুভব ; প্রকুলতা ; কার্য্য-প্রবৃত্তি ; অধিক কার্য্য করিলেও অশ্রান্তি । মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও পরিশ্রান্তি লক্ষণ । **মস্তক ।**—প্রত্যুষে শয্যায় শয়িত অবস্থায়ও শিরোবুর্ন ও কপালে গুরুত্ব । অপরাহ্নে পাঁচটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত অসাধারণ শিরোবুর্ন, আন্দোলনানুভব ও মুচ্ছাকল্লতা । শিরোবেদনা, বিষয়াস্তরে মনোনিবেশে উহার ক্ষণিক বিরতি । মস্তিষ্কে অতিশয় শ্রান্তি অনুভব সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ, কিন্তু দাঁড়াইলে ভাল বোধ । শিরোবেদনা ও নিদ্রালুতার আতিশয়া বশতঃ কার্য্যের ব্যাঘাত । কপালের পূর্ণতা সহ সারারাত্রি মস্তকের বেদনা । দিবাভাগে এই বেদনার ক্রমে ক্রমে পশ্চাদিকে মস্তিষ্কের ভূমিদেশে ও দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কাংশে গমন ; এবং অত্যল্প সঞ্চালনে উহার হ্রাস ও অধিক সঞ্চালনে বৃদ্ধি । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অল্পমাত্রা মানসিক শ্রমে ক্ষণকাল বেদনার উপশম, কিন্তু ক্রমাগত একবিষয়ে পরিশ্রমে বৃদ্ধি । ঈষাবর ও মস্তিষ্কের ভূমি-দেশের রক্তবহা নাড়ীর পূর্ণতা, বোধহয় যেন রক্তদ্বারা আবদ্ধ হইয়া রক্ত সঞ্চালন অবরুদ্ধ হইয়াছে । মস্তকের সমগ্র পশ্চাত্তাগ, ঘাড় ও মস্তিষ্কের পশ্চাৎদেশের রক্ত-সঞ্চয় ; অভ্যন্তরভাগে অল্প অল্প বেদনা ও বহির্ভাগে প্রচাপনে স্পর্শ-দ্বেষ ; এবং স্নায়ুগুণ্ডলের ঐ সকল স্থান উহাদের স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বড় অনুভব । **চক্ষু ।**—পড়িবার সময় দক্ষিণ চক্ষুর দর্শন-স্নায়ুর পথে একপ্রকার বেদনা । চক্ষুর গুরুগুণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা । পরিচ্ছদ পরিধান সময়ে শিরোবুর্ন সংযুক্ত

এক প্রকার দৃষ্টিহীনতার আবেশ, চক্ষু অবরুদ্ধ করিলে, এবং মস্তকে চিত্ত-সংযম ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে সেই শিরোগ্রন্থনের লাঘব; শিরোগ্রন্থনের পরে তখনই সম্মুখকপালে শোণিতের গতি ও তজ্জন্ত গৌরবানুভব; অনন্তর সত্ত্বর পশ্চাৎকপালে ও মস্তকের ভূমিদেহে তজ্জপ অনুভব ও শীঘ্র উহার বিলোপ। **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলে একপ্রকার অদ্ভুত পূর্ণতানুভব, বোধ হয় যেন অভ্যন্তর হইতে বহির্দিকে প্রচাপন জন্মিতেছে। **মুখ-মধ্য**।—শীতলজল, শীতলবায়ু, দন্ত-কাষ্ঠ, ও প্রক্ষালনাদিতে দন্তের অতিশয় অনুভব-ধিক্য। জিহ্বা কোমল রোম বা মধুগলে আবৃতবৎ অনুভব। **আর্মাশয়**।—অতিশয় আগ্রহ ও ব্যস্ততা সহকারে আহার গ্রহণ। আহারের এক ঘটিকা পূর্বে অল্পউদগার, আর্মাশয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে উহার আন্দোলন ও কুজন, কিন্তু গল গহ্বরে পুনঃ পুনঃ উত্থান। **উদর**।—প্রতিদিন পূর্বাঙ্ক নয়টার সময় উদর-বেদনা। \* নড়িলে চড়িলে অথবা ক্ষুদ্র কোন বিষয় চিন্তা করিলে উদর-বেদনার শাস্তি। প্রত্যাহ সায়াক্ষে যেন মল ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ অনুভব। সারাদিনই মল-প্রবৃত্তি। অনুভব। **মূত্রযন্ত্র**।—মূত্রত্যাগে মূত্র-মার্গে জ্বালা। প্রথম পরিত্যাগকালে মূত্র উত্তপ্ত অনুভূত হয় ও মূত্রমার্গে জ্বালা জন্মায়। ০ প্রমেহ, লাল-মেহ। **জনন-যন্ত্র**।—পরীক্ষার প্রথমভাগে কয়েক বৎসর অপেক্ষা অধিক কামুকতা। প্রাতে অধিক পরিমাণে রেতঃপাত। স্বপ্নশূন্য রেতঃপাত। অধিক পরিমাণ শুক্র শরীরে লাগিয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ। **দেহ**।—শরীর ও মনের পর্যায়ক্রমে অবসাদ ও ক্ষুণ্ণি; স বলতা অনুভব, প্রায় অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার হ্রাস অতি সহজে সহজে পেশীর ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদন; পেশীর ক্রিয়ার আধিক্য কিন্তু উহার অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমাবেশের অল্পতা; অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে হাঁটা; জঙ্ঘা ও পা যেন দোড়িয়া যাইতেছে এপ্রকার অনুভব; জ্ঞাতসারে ইচ্ছা করিয়া সঞ্চরণ নিয়মিত করিতে হয়; অত্যাশ্র বিষয় সম্পূর্ণ স্মৃষ্ণ ও সজীব বোধ হয়। **উপশম**।—অনাবৃতবায়ুতে ও নড়িলে চড়িলে উপশম। **ত্বক**।—কুষ্ঠ রোগের হ্রাস চর্মে বড় বড় শব্দ, শব্দগুণি, পড়িয়া গিয়া স্থায়ী খেতবর্ণ চিহ্ন, সেই সকল চিহ্নের সচরাচর ক্ষতে পরিণতি। ত্বকের, বিশেষতঃ হস্তপদাদির স্থূলত্বকের শুষ্ক, বিদারিত, শব্দযুক্ত ও ক্ষতগ্রস্ত অবস্থা।

**বিশেষ লক্ষণ**।—চিত্তের প্রফুল্লতা ও উদ্দীপনা মস্তকের রক্তবাহ নাড়ীর পূর্ণতা, অংগের মস্তকের দৌর্বল্য ও অনুগ্রহ শিরোবেদনা। \* বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে বেদনার লাঘব। \* বাহ সংস্কারে অতিরিক্ত অনুভূতি। \* প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মল-প্রবৃত্তি। কুষ্ঠ রোগের হ্রাস বড় বড় শব্দে ত্বকের আচ্ছন্নতা। শব্দ পড়িয়া গেলে সেই স্থানে শুভ্রবর্ণ চিহ্নের বিস্তারিতা, উহাতে প্রায়ই ক্ষতের উৎপত্তি। \* বেদনায় অবস্থান-পরিবর্তনের জন্ত অস্থিরতা।

## পাইরোজেন

পাইরোজেন রোগজ ঔষধ। হুর্গন্ধ পচা পুষ হইতে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সোয়ান ইহার পরীক্ষা করেন। তাঁহার পরীক্ষায় সেপ্টিসিমিয়া ও পায়িমিয়ায় পাইরোজেনের সমধিক উপকারিতা প্রতিপন্ন হয়।

পাইরোজেনের লক্ষণে আসেনিকের লক্ষণের স্থায় অবসন্নতা, ব্যাকুলতা ও অতিশয় অস্থিরতা ; ইউপেটোরিয়মের স্থায় অস্থি-বেদনা ; আর্ণিকার স্থায় গাত্রবেদনা ; রসটক্সের স্থায় চাঞ্চল্য, ল্যাকেসিসের স্থায় বাবদুকতা ; এবং কফিয়ার স্থায় ইন্ধ্রিয়ক্রিয়ার অতিরিক্ত তীব্রতা ও চিত্তের ক্ষুণ্ণি ও প্রফুরতা দৃষ্ট হয়।

উপযোগিতা।—প্রসবাস্তিক বা শত্রু-ক্রিয়ার পরবর্তী ; জল-প্রণালী প্রভৃতির দূষিত বাষ্পজনিত ; ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড বা টাইফস জরের ভোগ-কালে উৎপন্ন, \* সেপ্টিসিমিয়ায় অত্যাৎকষ্ট স্থিতিকাচিত ঔষধেও একেবারেই উপকার না জন্মিলে অথবা স্থায়ীক্ষণ না দশিলে এই ঔষধ উপযোগী।

অনুভূতি।—\* শয্যা শক্ত অনুভূত হয় ( আর্ণ ) ; \* যে সকল অঙ্গে ভরদিয়া শয়ন করা যায় উহা ব্যথিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয় ( ব্যাপ্ট, নয়ন-ন ) ; দ্রুতোৎপন্ন শয্যা-ক্ষত ( কার্ক-এসি )। \* অতিশয় অস্থিরতা ; অঙ্গের স্পর্শ-দ্বেষের উপশমার্থে অবিরত সঞ্চালনের আবশ্যিকতা ( আর্ণ, বেলিস, ইউপ )।

জিহ্বা।—\* বৃহৎ, লোলিত ; \* \* পরিচ্ছন্ন ভার্ণিশকরারমত মসৃণ ; অগ্নির স্থায় রক্তবর্ণ ; গুরু, বিদারিত জিহ্বা ; শব্দোচ্চারণে কষ্ট ( ক্রোট, টের )।

স্বাদ।—\* ঈষৎ মিষ্ট, ভয়ঙ্কর হুর্গন্ধ ; ক্ষত হইতে উৎপন্ন \* \* পুষবৎ ; মুখের স্বাদ।

বমন।—প্রতিনিয়ত ; কফী-চূর্ণের স্থায় ঈষৎ কপিণবর্ণ ; পথ্যাদির বিষ্ঠার গন্ধ বিশিষ্ট ; আবদ্ধ বা প্রতিকূল অস্ত্র সংযুক্ত ( ওপি, প্রম ) ; বমন।

অতিসার।—ভয়ঙ্কর হুর্গন্ধ (সোরি) ; কপিণ বা কৃষ্ণবর্ণ (লেপ্ট) বেদনামূল্য, অনিচ্ছা নির্গত ; অনিশ্চিত, বায়ু-নিঃসরণকালে বহির্গত ( এলো, ছাট, ওলিন ) ; অতিসার।

কোষ্ঠ-রোধ।—সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা সংযুক্ত ( ওপি, স্থানি ) ; \* জরে অস্ত্রাবরোধ বশতঃ হৃদম্য ; \* \* বৃহৎ, কাল, পচা মাংসের গন্ধ ; জলপাইয়ের মত \* ছোট ছোট, কাল গোলায় স্থায় মল বিশিষ্ট ; কোষ্ঠ-রোধ।

শ্বাস।—ভয়ঙ্কর হুর্গন্ধ ; পচা মাংসের গন্ধ ; পচা গন্ধ ; কেবল একদিন স্থায়ী, তৎপরে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর গন্ধ রক্তাক্ত প্রদর বিশিষ্ট ; শ্বাস।

ক্রণ।—ক্রণ ও ফুলাদির অবশেষের জরায়ুতে অবস্থিতি, বিগলিত হওয়া, গর্ভে ক্রণের কতিপয় দিবস মরিয়া থাকা ; কাল, ভয়ানক হুর্গন্ধ শ্রাব নিঃসরণ ; গর্ভদ্রাব বা প্রসবের পর সেপ্টিক জরের পরে দ্ব্যস্ত-শূন্যতা। পাইরোজেন জরায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উত্তেজনা জন্মায়।



প্রসবাস্তিক শ্রাব ।—পাতলা, বিদাহী, কটা, অতি দুর্গন্ধ প্রসবাস্তিক শ্রাব ( লোকিয়া ) ( .নাই-এসি ) ; প্রসবাস্তিক শ্রাবের বিলুপ্তি, তৎপরে শীত, উত্তাপ ও প্রভূত দুর্গন্ধ বর্ষা বিশিষ্ট জর ।

হৃৎপিণ্ড ।—\* হৃৎপিণ্ডের বিद्यমানতার সুস্পষ্ট জ্ঞান, উহা শ্রান্ত অনুভূত হয় ; যেন বড় হইয়াছে এরূপ বোধ হয় ; কানে অবিরত হৃৎপিণ্ডের দপ দপ ও স্পন্দনকর শব্দ শুনা যায়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, রক্তে পচনজনক পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ।

বক্ষঃস্থল ।—প্রশ্বাস পরিত্যাগকালে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে সোঁ সোঁ শব্দ । নড়িলে চড়িলে বা উষ্ণগৃহে কানের যুদ্ধি । গলা-জালা । ক্ষয়-কাস রোগের শেষ অবস্থায় বখন রোগীর বুকে প্রচুর স্লেমা থাকা সত্ত্বেও সে উহা তুলিয়া ফেলিতে পারে না, তাহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে এরূপ বোধ হয়, তখন রোগীর কিঞ্চিৎ শাস্তি বিধানার্থে এন্ট-টার্টাই সাধারণতঃ প্রয়োজিত হইয়া থাকে । কিন্তু যদি পূর্বোক্ত অবস্থায় রোগীর অস্থিরতা, অস্থি-বেদনা, ও সর্ব্বশরীরের পেশীর বেদনা বিद्यমান থাকে তবে এন্ট-টার্ট ও আর্কিকা অপেক্ষা পাইরোজেন দ্বারাই অধিকতর উপকার দর্শে ।

নাড়ী ।—\* নাড়ীর অস্বাভাবিক দ্রুততা, গাত্রতাপের সহিত উহার অনুপাতের সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ ( লিলা ) । অর্থাৎ জরের আতিশয্যে নাড়ীর ধীরতা ও জরের অন্ততায় নাড়ীর অপেক্ষাকৃত দ্রুততা ।

হৃদ ।—হৃকের পাণ্ডুরতা, শীতলতা, ও ভয়ের স্থায় বর্ণ (সিকেলি) ; বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদময় শিরা-স্কীতি সংযুক্ত, দুর্গন্ধ ক্ষত ।

নিদ্রা ।—নানাবিধরূপ স্বপ্ন । স্বীয় কার্য্য-কর্ম্ম বিষয়ক স্বপ্নের আধিক্য । প্রায় সমস্ত রাত্রিই স্বপ্নদর্শন । যেন অর্দ্ধ নিদ্রিত অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় স্বপ্ন-রাজ্যে নিচরণ ।

জ্বর ।—স্ফাতিব্রয়ের মধ্যভাগে, \* পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ ; \* \* \* তীব্র শীত ; \* সর্ব্বাঙ্গের অস্থির ও হস্ত পদের শীত ; সেপ্টিক জ্বরের আক্রমণের লক্ষণ, ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রী গাত্র-তাপ, আকস্মিক উত্তাপ, হৃকের শুষ্কতা ও জালা ; দ্রুত, ক্ষুদ্র, তারবৎ নাড়ী, ১৪০ হইতে ১৭০ বার স্পন্দন ; অনন্তর শীতল আঠা আঠা বর্ষা ।

সেপ্টিক জ্বরে, বিশেষতঃ প্রসবাস্তিক সেপ্টিক জ্বরে পাইরোজেন অতিশয় উপকারী পচন-নিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ।

সম্বন্ধ ।—( ১ ) আর্গ, আদ, ব্যাপ্ট, কার্কো-ভেজি, ওপি, হুঃস, সিকে, ভিরের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; ( ২ ) প্রচ্ছন্ন পৃথ জনন-প্রক্রিয়া বশতঃ দৃশ্যমান সদৃশ ঔষধ ব্যবহারেও রোগের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃ্ত্তি ।

# পারিস কোয়াণ্ড্রিফোলিয়া—ফল প্রাপ্তি। টুলস।

লিলিয়েসী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপে জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অসিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া স্নায়ু-শূল ও স্নায়ু উপদাহের অত্যন্ত লক্ষণ উৎপন্ন হয়। শ্বাস-পথে ইহার প্রধান স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরোবেদনা।—স্নায়বীয় শিরোবেদনায় চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতেছে, এবং একগাছি স্বত্র যেন চক্ষুর অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদিকে মস্তিষ্কের মধ্যস্থান পর্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে, এই প্রকার অনুভবে এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নায়ু-শূল।—বাম-হস্তর অস্থিতে উত্তপ্ত সূচী-বেধন যাতনা ও অতিশয় স্পর্শ দ্বেন লক্ষণাপন্ন মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে; যেন অতিশয় ভারী কিছু স্থাপিত রহিয়াছে ঘাড়ে একপ শ্রান্তি, ও বাহ্যর স্তম্ভতা লক্ষণ সংযুক্ত, বাহ্যপর্যন্ত প্রসারিত বাম বক্ষের স্নায়ু শূলে; পৃষ্ঠবংশের স্নায়ু-শূলে; এবং কোকিল-চক্ষু-অস্থির স্নায়ু শূলে পারিস কোয়াণ্ড্রিফোলিয়া ফলপ্রদ। স্বর-যন্ত্রের রোগ।—প্রতিশ্রুতজনিত স্বরযন্ত্র-প্রদাহে, সবুজ রঙ্গের আঠা আঠা স্লেজমা, ও বেদনাশ্রুত স্বরভঙ্গ লক্ষণে; এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রদাহে অতিশয় দুঃস্থেত স্লেজমায় অবিশ্রান্ত থক্ থক্ কাস ও গলরোধ জন্মাইলে, ইহার ব্যবহার হয়। খল্লি।—হানিমান বলেন যে অতিমাত্রায় পারিস কোয়াণ্ড্রিফোলিয়া আমাশয়ে খল্লী জন্মায়; সুতরাং এতদ্বারা আমাশয়ের খল্লী আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। উন্মাদ।—পারিস কোয়াণ্ড্রিফোলিয়া অনেকটা চা জনিত বহুভাবিতার হ্রায় বহুভাবিতা জন্মায় অর্থাৎ রোগী উল্লসিত চিত্তে অধিক কথা বলিতে ভালবাসে। এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কেবল কথা বলিবার নিমিত্তই কথা বলে; কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে তাহার প্রবৃত্তি থাকেনা। শিরোগূর্ণন।—উচ্চ স্বরে পড়িবার বা বসিবার সময় শিরোগূর্ণন এবং তৎসহ আয়াসিত কথা ও অপরিষ্কৃত দৃষ্টি।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বাচালতাপূর্ণ উন্মাদ (\* ল্যাক ); বুদ্ধিশ্রুত আলাপ ও নির্বোধের হ্রায় অন্তর্ভুক্ত। মস্তক।—মস্তকে জড়তা ও ঘূর্ণন। মস্তকে; ও শঙ্কুদ্বয়ে ভেদন ও সূচী-বেধন; অনন্তর কপালে গুরুত্ব, মাথা হেট করিলে উহার আদিক্য। কপালে ও শঙ্কুদ্বয়ে আকৃষ্ট প্রচাপন; মস্তিষ্ক, চক্ষু ও চর্মে অশিথিলতা অনুভব, এবং অস্থিতে চাঁচিয়া যাওয়ার হ্রায় বেদনা; নড়িলে চড়িলে, উত্তেজনায়া অথবা চক্ষুর ব্যবহারে; এবং সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। দক্ষিণ শঙ্কুদেশে প্রচাপনী বেদনা, হাতের চাপে উহার উপশম। স্পর্শে করোটির স্বল্প প্রাচীরের অস্থিতে ঘর্ষণ বেদনা। চক্ষু।—চক্ষু অতিরিক্ত বৃহৎ বা ক্ষীণ

এবং চক্ষুর কোটর অত্যন্ত বড় বোধ হয় ( কারল , ফস-এসি; প্লম ) । ০ \* চক্ষু যেন ছুটিয়া পড়িতেছে এবং অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিয়া একগাছি স্বত্র যেন পশ্চাৎদিকে মস্তিষ্কের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতেছে, এরূপ অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ অহুভূতি; দৃষ্টির দৌর্বল্য; চক্ষুর মধ্যস্থল দিয়া স্থচী-বেধ । দক্ষিণ চক্ষুর উপরের পাতার স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ ( এগে ) । কর্ণ ।—কর্ণদ্বয়ে আকস্মিক বেদনা, বোধ হয় যেন গোঁজ দ্বারা সবলে নির্ভিন্ন হইতেছে । বাম কর্ণে টুন টুন শব্দ । নাসিকা ।—ফুৎকারে ( ফোৎ করিলে ) নাসিকা হইতে লোহিত ও হরিতাত শ্লেষ্মা নিঃসরণ । পর্য্যায়ক্রমে তরল ও আবদ্ধ প্রতিষ্ঠায় (এম-কার্ক, ষাট-আস', \* নম্ব-ভম ) । মুখমণ্ডল ।—মুখের চারিদিকে দড় । অধরের উপর ফোঁকা । মুখ-মধ্য ।—শুষ্ক, ককর্শ, ও শ্বেত লেপাবৃত জিহ্বা; জিহ্বা অতিরিক্ত বৃহৎ বোধ হয় । প্রাতে মুখের শুষ্কতা । অম্ল, অধিক লালা । গল-মধ্য ।—গলা-বেদনা বোধ হয় . যেন গলার মধ্যে একটা গোলা অবস্থাপিত রহিয়াছে । গল-গহ্বরে অধিক শ্লেষ্মা, তজ্জন্তু থক্ থক্ করিতে হয় । আমাশয় ।—আহারান্তে হিকা ( ব্রাই, ইয়ে, হাইও ); উদগার । আমাশয়ে প্রস্রবের চাপের হ্রাস গুরুত্ব ( \* আস', \* ব্রাই, \* নম্ব-ভম, \* পলস ); উদগারে উহার উপশম । ক্ষীণ, ও ধীর পরিপাক । উদর ।—উদরে কুঞ্জন ও আবর্তন ( এলো, \* কার্বোঁ, সিক, \* লাই ); কর্তনবৎ পেট-কামড়ানি । মল ।—অতিসার; মলে পচা মাংসের গন্ধ । মূত্র-যন্ত্র ।—উপবিষ্ট অবস্থায় মূত্র-মার্গে জ্বালা ও ছল-বেদন । মূত্রমার্গের সম্মুখভাগে ভেদনবৎ বাতনা । পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ জ্বালা । মলিন-লোহিত মূত্র, আরক্ত অধঃপতিত পদার্থ, উপরে বসাবৎ দৃষ্ট সর; বিদাহী, অবদরনকর মূত্র । শ্বাস-যন্ত্র ।—পর্য্যায়শীল, বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গ । স্বরভঙ্গ, ক্ষীণস্বর, কাসিয়া কাসিয়া অবিশ্রান্ত শ্লেষ্মা উত্তোলন, স্বরযন্ত্রে জ্বালা । জীবৎ হৃদিদ্বর্ণ আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । দীর্ঘ নিঃশ্বাস আকর্ষণের প্রবৃত্তি সহকারে গৌরব । স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে দুঃশ্ছেত শ্লেষ্মার অবস্থিতি বশতঃ অবিরত থক্ থক্ কাস ও গল-রোধ । বক্ষঃস্থলে স্থচী-বেধ ( \* ব্রাই \* কালী-বাই ) । হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—বিশ্রামকালে ও সঞ্চলনে; এবং সন্ধ্যাকালে জ্বংকম্প । নাড়ী পূর্ণ কিন্তু মন্দ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠ । —\* ঘাড়ের পিঠে শ্রান্তি, বোধ হয় যেন কোন গুরুভার স্থাপিত রহিয়াছে । ঘাড় ফিরাইলে উহা স্তব্ধ ও ক্ষীত বোধ হয় । স্বক্কাহ্মদ্বয়ে মধ্যবর্তী স্থানে স্থচী-বেধ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—অঙ্গে ছল-বেধবৎ বাতনা । সঞ্চলনে সমস্ত সন্ধিতে বেদনা । রাত্রিতে শয্যার পদদ্বয়ের বরফের হ্রাস শীতলতা ( সিলি, ভিবে ) । অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ বেদনা । অঙ্গুলীতে ঝিঁঝিঁ লাগে । সকল অঙ্গে স্থচী-বেধ । সকল অঙ্গের গুরুত্ব । সন্ধিতে আকুঞ্চক প্রচাপন । ত্বক ।—চর্মে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও ওষ্ঠে অপচ্যমান উত্তেদ । চর্মে স্পর্শ-দ্রোণ; কীট-চারণা অহুভব । নিদ্রা ।—অস্থির, ভগ্ন নিদ্রা, ও অনেক স্বপ্ন । জুস্তগ ও নিদ্রালুতা । জ্বর ।—অধিকাংশ সন্ধ্যাকালে শীত । দক্ষিণ পার্শ্বের শীতলতা; বামপার্শ্ব

স্বাভাবিক। শীত ও রোমাঞ্চ, জ্বন্তু ও শীতল পদ। ঘাড় হইতে পিঠে শীতের অবতরণ (এতদ্বিপরীত, ফস)। শরীরের উর্দ্ধভাগের উত্তাপ ও ঘর্ম। প্রাতে জাগরণান্তে ঘর্ম, তৎসহকারে বারংবার দংশনকর কণ্ডুয়ন। বিশেষ লক্ষণ। দুর্গন্ধে অতিশয় অস্থুভূতি; ক্লান্তি দুর্গন্ধ; প্রাতে তরল ও সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাস; আপনার আয়তন বিবর্দ্ধিত অস্থুভব; মুখে জল-সঞ্চয়; মুত্রে তৈলাক্ত সর। (গরেন্সি)।

সমগুণ :—লিড, লাই, রসটক্স। বিষমগুণ।—কফি।

## পিওনিয়া অফিসিনেলিস।

বসন্তকালে সংগৃহীত সরস মূল হইতে পিওনিয়ার অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। পিওনিয়ার ক্রিয়ায় মলদ্বারে দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবী, যাতনা সংযুক্ত ক্ষত জন্মে। ডাঃ ওজেনাম বলেন\* যে আপনার হইতে এই প্রকার ক্ষত জন্মিলে এই ঔষধে তাহা আরোগ্য হয়। লেহবৎ অতিসার, তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা ও অন্তরে শীতাত্ত্বভব ইহার লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে মলদ্বারের বিদারণে (ফিসার অবদি এনস্) যদি রস ক্ষরিত হইয়া সর্বদাই মলদ্বার আর্দ্র থাকে, এবং বিদীর্ণস্থানে স্পর্শ-দ্বেষ ও টাটানি থাকে, মল-ত্যাগের পরে জ্বালা ও কামড়ানি জন্মে তবে পিওনিয়া ব্যবহৃত হয়। মল-দ্বার-বিদারণ সংযুক্ত অর্শে, মলদ্বার ও তাহার চতুর্দিকবর্তী স্থানের বেঙনি বর্ণ, এবং মলত্যাগকালে ও তৎপরে অসহ্য যাতনা লক্ষণে এই ঔষধের ব্যবহার আছে। অত্যাশ্র ক্ষতেও, বিশেষতঃ নাতীর নিম্নাঙ্গের ক্ষতে ডাঃ ওজেনাম এতদ্বারা বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন কোকিল-চক্ষু-অস্থির নিম্নস্থ ক্ষতেও ইহা ফলপ্রদ। মুখ চাপা (নাইট-মেয়ার) রোগেও কোন কোন চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। কারণ ইহাতে মুখ চাপা জন্মে। শিরোগূর্ণনেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই ঔষধের প্রথম তিন ক্রম কেবল বাহ্য অথবা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয়। বিশেষ লক্ষণ।—মলদ্বারে কামড়ানি ও চুলকানি, \* দ্বার ক্ষীত বোধ হয়। আকস্মিক লেহবৎ অতিসার, তৎসহ মল-ত্যাগের পর উদরের ক্লান্তি ও মলদ্বারের জ্বালা, অনন্তর আভ্যন্তরিক শীত। \* মলদ্বারের নিকটে মূলাধারের উপর দুর্গন্ধ রসস্রাবী বেদনাসংযুক্ত ক্ষত।

## পিক্স লিকুইড।

পিক্স লিকুইডকে বাঙ্গালায় আলকাতরা বলে। আলকাতরা পাইন বৃক্ষের নির্ঘাস। আবৃত স্থানে পাইন কাঠ দগ্ধ করিলে ইহা পাওয়া যায়। রুসিয়া ও উত্তর আমেরিকায় এই সকল পাইন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ফুসফুসে ও চর্ম্মে প্রধানতঃ আলকাতরার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, বাম ফুসফুসের পুষ্ণোৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বামদিকের তৃতীয় পশ্চকীয় উপাধ্বিতে বেদনা লক্ষণে

পিক্র লিকুইডা প্রয়োগে নিশ্চিত ফল দর্শে। দক্ষিণদিকের তৃতীয় পশু'কার উপাধিতে বেদনা লক্ষণে এনিসম ট্রেলটম ফলপ্রদ। পিক্র ও এনিসমের এই লক্ষণ চিকিৎসাকালে পুনঃ পুনঃ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পিক্র লিকুইডা উত্তেদ ও উৎপন্ন করে। কর-পৃষ্ঠেই এই উত্তেদ বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। চর্মে বিদারণ, ও রাত্রিতে অসহ্য কণ্ডুয়ন জন্মে, এবং নখ-ঘর্ষণে রক্তপাত হয়। হাতের একজিমা রোগে ইহার ব্যবহার হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন পিক্র লিকুইডা বক্ষঃস্থলের প্রতিষ্ঠায়ের ও যক্ষারোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুর্গন্ধ ও বিষ্বাহ পুথাক্ত নিগ্গিবন, ও তৎসহকারে বামদিগের তৃতীয় পশু'কার উপাধিতে (বাস্তবিক বাম বায়ুনলীতে) বেদনা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। এই বেদনা পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া যাতায়াত করুক বা না করুক এরূপ অবস্থায় পিক্র লিকুইডাই স্প্রায়োজ্য ঔষধ। যক্ষ্মার তৃতীয় অবস্থায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী।

## পিক্রিকম এসিডম পিক্রিক এসিড।

পিক্রিক এসিডের নামান্তর কার্বোজোটিক এসিড। একভাগ বিশুদ্ধ পিক্রিক এসিড নিরনব্বই ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত করিলে ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। তৃতীয় দশমিক ক্রম জল মিশ্রিত এলকোহলে, ও পরবর্তী ক্রম এলকোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—বিষমাত্রায় রক্তের উপর পিক্রিক এসিডের প্রগাঢ় ক্রিয়া দর্শে, রক্তের অণুকোষগুলি নির্ভিন্ন হইয়া পড়ে, বৃহৎ মস্তিষ্কের বাহ্যাবরণ, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, মেডলা-অবলঙ্কেটা, এবং পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার কোমলতা ও অপকৃষ্টতা জন্মে, স্নতরাং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। পিক্রিক এসিড বৃক্কের প্রদাহ জন্মায়; মূত্রে ফসফেটস, ইউরেটস ও ইউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। এম্বুস্মেন ও চিনিও পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মাত্রায় ঈষৎ রক্ত-সঞ্চয়, তৎপরে শ্রান্তি জন্মে, এই শ্রান্তি অল্প অল্প ক্রান্তি অহুভব হইতে প্রকৃত পক্ষাঘাতে পর্য্যন্ত পরিণত হয়। এই প্রকার অবস্থার সহিত এক প্রকার মানসিক নিশ্চেষ্টতা, ইচ্ছা-শক্তির অভাব, সকল বিষয়েই উদাসীনতা, এবং শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবার অভিলাষ বিদ্যমান থাকে। মস্তিষ্কের দোর্দল্য (ব্রেণ-ফ্যাগ) ও হায়র দোর্দল্যের সহিত পূর্বোক্ত লক্ষণগুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অতএব ঈদৃশ অবস্থায়ই এই ঔষধের প্রধান অধিকার দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

মস্তিষ্কের দোর্দল্যে (ব্রেণ-ফ্যাগ) (ফস) ও হায়বীয় দোর্দল্যে (নিউরাইনিয়া) (ফস-এসি) পিক্রিক এসিড পরমোপকারী ঔষধ। মানসিক পরিশ্রমের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদন ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। মস্তকের পশ্চাত্তাগের শিরঃপীড়ায়ও,

মানসিক প্রযত্নে উপচয় লক্ষণে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। বাম ডিম্বাশয়-প্রদেশে অবিরাম বেদনা; ঋতুর পরিবর্তে শ্বেত প্রদর; ও ঋতুকালে অতিশয় অবসন্নতা (ককু) লক্ষণে হিষ্টিরিয়া রোগেও পিক্রিক এসিডের ফলবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দন্ত-বেদনার জন্য স্বামীকে পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দেওয়াতে একজন জীর হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধ উপশমিত হইয়াছিল, এরূপ একটা প্রকৃত বিবরণের উল্লেখ আছে। এটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। শুক্রস্রাব ও সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা, এমন কি পক্ষাঘাতের আশঙ্কা সংযুক্ত ইন্ড্রিয়-দৌর্বল্যে ও ইহা ফলপ্রদ ঔষধ। পৃষ্ঠবংশের রোগসহকারে কাম-প্রবৃত্তি-পরিশুদ্ধ লিপ্তোথান; অনেকক্ষণ স্থায়ী প্রবল উদগম; প্রভূত শুক্রপাত; পুরুষের কামোন্মাদ (ক্যাস্, ফস)। স্নায়ু-দৌর্বল্য, বিশেষতঃ জননেন্দ্রিয়ের স্নায়ু-দৌর্বল্য বশতঃ বাপসা দৃষ্টি। শীতল জলে ও শীতল বায়ুতে উপশমিত চকু-প্রদাহ। দীর্ঘকালস্থায়ী স্নায়রীয় শিরঃপীড়া ও অবসন্নতার পরবর্তী পুরাতন . বধিরতা। মেলিন, স্বল্প মূত্র; বৃক্ক প্রদেশে আকর্ষণবৎ বেদনা; ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন পুরাতন বা অনতিতরুণ বৃক্ক-প্রদাহ।—এই সকল রোগেও পিক্রিক এসিড ব্যবহার্য। সম্ভবতঃ পিক্রিক এসিড সোরা-দোষয় ঔষধ। মুখমণ্ডলের ব্রণ ও ফোটকেও ইহা প্রযোজ্য। ঘাড়ের পিঠে অথবা কানের মধ্যে ফোড়া হইতে থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

### প্রধান প্রধান লক্ষা।

মন —০ অতিশয় ঔদাস্য; কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা-শক্তির অভাব (ফস)।

\* মানসিক বা শারীরিক কার্যে অপ্রবৃত্তি। \* শিরঃপীড়া সহকারে আলাপে বা সঞ্চালনে বিরক্তি। \* অল্পমাত্র পড়িলে; ও অল্পমাত্র লিখিলে মানসিক অবসাদ। \* চিন্তা সংগ্রহে অথবা অধ্যয়নে অসার্থ্য।

মস্তক।—শিরোগূর্ন ও বিবসিয়া। মাথা নোওয়াইলে (এক, বেল, পল. সল); মস্তক বক্র করিলে; শয়ন করিলে; ও আসন হইতে উঠিলে, শিরোগূর্ন। মস্তকে; ও কপালে উত্তাপ। মস্তকের সেবনি-সন্ধির লম্বালম্বি আলা। উখানে বিবদ্ধিত, বিযুক্ত বায়ুতে উপশমিত, এবং সঞ্চালনে বা মস্তক অবনত করিলে বিবদ্ধিত; মস্তকে চাপ দিলে বা পটা বাঁধিলে উপশমিত (আর্জ-নাই, সিলি), শিরঃপীড়া। গোরব, দৃষ্টিহীনতা ও শিরোগূর্ন জনক মস্তক শিথরে. অবিরাম বেদনা, মস্তক অবনত করিলে উহার আধিক্য। বহির্দিকে প্রচাপন, বোধ হয় যেন মাথা নির্ভিন্ন হইয়া ছুটিয়া পড়িবে. সঞ্চালনে ও অধ্যয়নে উহার আতিশয্য। মস্তকের বাম পার্শ্বে দপদপকর শিরঃপীড়া, অক্ষি-গোলকে ও কপালে উহার আধিক্য, এবং পশ্চাদিকে মস্তকের পৃষ্ঠভাগ পর্যন্ত প্রসারণ, শান্তভাবে থাকিলে উপশম প্রাপ্তি। চক্ষুর উপরে অবিরাম বেদনা, অধ্যয়নে ও সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি এবং স্থিতির হইয়া বসিয়া থাকিলে শান্তি। অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধদেশে ভারী বেদনা, মূর্চ্ছাদেশ পর্যন্ত উহার প্রসারণ,

নড়িলে চড়িলে অথবা চক্ষু ঘুরাইলে আধিক্য। শঙ্খরয়ে স্তম্ভীত্র, সঞ্চরমান, কর্তনবৎ বেদনা।  
মূর্ছাদেশে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ববৎ বেদনা, অবশীর্ষ হইলে ও চক্ষু সঞ্চালন করিলে উহার বৃদ্ধি।  
\* মাথার পিঠে ও ঘাড়ের পিঠে বেদনা। \* মস্তকের পশ্চাভাগে, গ্রীবার পশ্চাভাগে ও মেরুদণ্ড  
পর্যন্ত সম্প্রসারিত গুরুত্ববৎ বেদনা। \* মস্তকের ভূমিদেবে বিশৃঙ্খলতা।

**চক্ষু।**—চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লীর পীতবর্ণ। \* গুরুমণ্ডলের প্রদাহ; দক্ষিণ চক্ষুতে  
আধিক্য; শীতলজলে প্রক্ষালন করিলে ও শীতল বায়ু লাগাইলে উপশম; উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি,  
চক্ষু মেলিয়া রাখিতে কষ্ট, এবং পড়িলে চক্ষে আঠা আঠা অনুভব। চক্ষুতে শুষ্কতা ও  
বালুকা অনুভব (আর্স, \* কষ্ট, হিপ, ইগ্নে, মার্ক, পল, রস, সিপি, সিলি, সল)। চক্ষে  
কাষ্ঠ-খণ্ড অনুভব। প্রাতে জাগরণান্তে চক্ষুর সংযোজনা। অধ্যয়নে অক্ষিপুটের গুরুত্ব,  
উহা নিমীলিত রাখিতে পারা যায় না (জেল)। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা ও বিশৃঙ্খলতা; বোধ  
হয় যেন অবগুষ্ঠনের অভ্যন্তর দিয়া দৃষ্টি করা যাইতেছে (কষ্ট, ক্রোক, গ্রাট-মিউ, পল,  
সিপি, সল)। বায়ু ধুম্বত দেখায়। দৃষ্টবস্তু বিবর্ণিত দেখায়; চক্ষুর সম্মুখে ফুলিঙ্গ  
দৃষ্ট হয়।

**কর্ণ।**—কর্ণ জ্বালা করে ও ফুলাফুলা দেখায়, এবং বোধ হয় যেন কানের ভিতরে  
পোকা হাঁটিতেছে। কর্ণে গুণ্ গুণ্ ও হিস্‌হিস্‌ শব্দ।

**নাসিকা।**—নাসিকার সেতুতে কোন ভারী বস্তুর ন্যায় অনুভব (কালী-বাই)।  
নাসিকার শ্লেষ্মা-পূর্ণতা; কেবল মুখ দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়, অনাবৃত  
বায়ুতে উহার উপশম জন্মে।

**মুখ-মধ্য।**—শুভ্র, ফেগিল লাল; রঞ্জুর ছায় বুলিয়া মাটিতে পতিত হয়। অন্ন;  
তিক্ত; মন্দ; আশ্বাদ।

**গল-মধ্য।**—গল-মধ্যের আবদ্ধতা, অবদরণ অনুভব (এম-কা, কষ্ট, কার্কো, নক্স,  
ফস, পল, সল,); দৃঢ়বৎ আড়ষ্টতা ও উত্তপ্ততা; তালুম্বে গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা; গিলিতে  
অতিশয় কষ্ট, বোধ হয় যেন গলা বিদীর্ণ হইয়া বিয়ুক্ত হইবে; স্পর্শ-দ্বেষ, বাম পার্শ্বে উহার  
আধিক্য; নিত্রান্তে বৃদ্ধি (এপিস, ল্যাক, সল); আহারান্তে উপশম।

**আমাশয়।**—ক্ষুধার বৃদ্ধি, তৎপরে বিলোপ। শীতল জলের হৃদ্য পিপাসা। শূন্ত  
বা অন্ন উদগার। মুখ-প্রসেক। উদরোর্ধ্বে বিবমিষা ও ক্লান্তি অনুভব, উঠিলে ও ইতস্ততঃ  
নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উহার আধিক্য। আমাশয়-গহ্বরে ভার অনুভব, তৎসহ উদগারের  
বিফল চেষ্টা।

**উদর।**—অন্ন-কূজন। বায়ু-নিঃসরণ। যকৃদ্দেশে ও নাভীপ্রদেশে, প্রধানতঃ বাম  
পার্শ্বে তীব্র সূচী-বেধবৎ বেদনা। উদরোর্ধ্বে হ্রস্বতা অনুভব।

**মল ও মলদ্বার।**—মলতাগকালে ও তৎপরে হ্রস্ব-বেধন ও কণ্ডুয়ন। পীতবর্ণ,

প্রচুর, তৈলাক্ত, ঘন ঘন বিনির্গত; কুহন সহকারে নিঃসারিত, অপ্রগাঢ় বর্ণ; নরম থণ্ড থণ্ড, সহজে নিঃসৃত, তৎপরে অধিক বায়ু নিঃসরণ সংযুক্ত বসাক্তবৎ দ্রুত বহির্গত; সাবান-সিকের গন্ধের স্থায়ী স্ববৎ মিষ্ট গন্ধ বিশিষ্ট; মল ।

মূত্র-যন্ত্র ।—বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত । পীতবর্ণ; উগ্র-গন্ধ মলিন পীতবর্ণ; \* স্বল্প; বর্ণশূন্য প্রভূত; প্রচুর ইউরেটস সংযুক্ত; মূত্র । মূত্রে \* অধিক পরিমাণে ইণ্ডিকান, গ্রাণুলার, ও ইপিথিলিয়মের অবস্থিতি ।

জননেন্দ্রিয় ।—( পুং ) ।—\* রাত্রিতে উপস্থের ভয়ঙ্কর উদ্বেক, তৎসহকারে অস্থির নিদ্রা । সমস্ত রাত্রি অতিশয় সন্তোগ-লিপ্সা ও প্রচণ্ড লিঙ্গোদগম, তৎসহ গুরুত্বাব । দিব্যরাত্রি প্রায় অবিশ্রান্ত কষ্টকর লিঙ্গোদ্রেক সহকারে সন্তোগ-লিপ্সা । ( স্ত্রী ) ।—বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে অবিরাম বেদনা; ফিক ব্যথা । ঋতুর অনুকুলে পীতভ কপিশ প্রদর-স্রাব, বিলম্বে ঋতুর উপস্থিতি । ঋতুর পূর্বে, শয্যা ভগ-কণ্ডূয়ন ।

শ্বাস-যন্ত্র ।—গলায় ধূলি-প্রবেশের স্থায়ী গুরু কাস । বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা । বোধ হয় যেন একটা বন্ধন দ্বারা বুক আবেষ্টিত রহিয়াছে ( ক্যাষ্ট ) ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—চঞ্চলতা । হৃৎকম্প । মন্দগামী, ক্ষুদ্র ক্ষীণ, ও অনিয়মিত নাড়ী ।

পৃষ্ঠ ।—পৃষ্ঠে বেদনা, বসিয়া থাকিলে উহার আধিক্য । পৃষ্ঠে ও অঙ্গে গুরুত্ব ও দুর্বলতা । বৃদ্ধক-প্রদেশে আকর্ষণের স্থায়ী বেদনা । মেরুদণ্ডের লম্বাংশ জালা, অধ্যয়নের চেষ্টায় উহার আধিক্য, ও সঞ্চালনে উপশম ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—\* অঙ্গের বিশেষতঃ বামভাগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের; এবং পরিশ্রমে বাহ্যর ও জজ্বার, বিশেষতঃ জজ্বার অতিশয় গুরুত্ব; \* জজ্বারয়ের; এবং বজ্জক প্রদেশের দুর্বলতা ও গুরুত্ব; বাম পার্শ্বে উহার আধিক্য । নিম্নাঙ্গের অবশতা । পদদ্বয়, বরফপাতে জড়ীভূতবৎ অনুভব ( এগে ) ।

দেহ ।—\* যৎসামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি অনুভব; তৎসহকারে সমস্ত শরীরে পঙ্গুতা অনুভব । \* কথা বলিতে অথবা কোন কার্য করিতে অপ্রবৃত্তি; সকল বিষয়েই ঔদাস্য । শব্দ লাগার স্থায়ী বেদনা সহকারে \* অবশতা ।

ত্বক ।—ত্বকের পীতবর্ণ । চর্মে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে অপচ্যমান ব্রণ ও স্কেটক; উহাতে যতনা ।

নিদ্রা ।—পুনঃ পুনঃ জন্ম । সায়াহ্নে নিদ্রানুতা, অনাবৃত বায়ুতে হাঁটিলে উহার শান্তি । গাঢ়, কিন্তু অতৃপ্তিকর নিদ্রা । সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা । অস্থির নিদ্রা । অবিরত স্বপ্ন ।

স্বর ।—\* শীতল শাখা; শীতল পদ । শীতের প্রাবল্য । পৃষ্ঠের নিম্নভাগে ও কটিদেশে উত্তাপ । শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম ।

উপচয় ।—অধ্যয়নে; নিদ্রাস্তে ( ল্যাক ) ; সঞ্চালনে ( মেরুদণ্ডের জালা ব্যতীত ) ; বন্ধি ।



**উপশম** ।—বিমুক্ত বায়ুতে ; বিমুক্ত বায়ুতে বিচরণে ; শীতল জলে ; ও বিশ্রামে উপশম ।

**সমগুণ** ।—আর্জ-নাই, কষ্ট, ককিউ, জেল, ল্যাক, পেট্রো, ফস, ফস-এসি, পল, সিপি, সিলি, সল, ।

## পেট্রোসিলিনম—পাসলি ।

অস্বেলিফেরী জাতীয় এই উদ্ভিদ ইউরোপের দক্ষিণভাগে জন্মে । সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া** ।—মূত্র-মার্গের শৈল্পিক বিলীতে পেট্রোসিলিনমের সুনিশ্চিত ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্বারা উহাতে উপদাহ ও প্রদাহ উৎপন্ন হয় । এজন্ত অনতিতরুণ প্রমেহে ও লালামেহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

**আময়িক প্রয়োগ** ।—অনতিতরুণ প্রমেহ ও পুরাতন প্রমেহে অর্থাৎ লালামেহে বিশেষতঃ নেবিকিউলার ফোসা অর্থাৎ মূত্র-মার্গের নাবাকার গহ্বরের লক্ষণের বিদ্যমানতায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । সহসা দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি ; মূত্র-মার্গের গভীর স্থানে \* তীব্র দংশন ও কণ্ডুয়ন, উহার উপশমার্থে কক্কর্শভাবে মূত্রমার্গ মর্দনের আবশ্যকতা ; লিঙ্গ-মূলে বা মূত্রাশয়ের গ্রীবায় বেদনা, ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ । মূত্র-মার্গের পুরাতন প্রদাহ কিম্বা সংবৃতি সংশ্লিষ্ট জ্বরেও এই ঔষধের ব্যবহার হয় । \* সহসা মূত্র-বেগ, এই ঔষধের একটা বিশেষ লক্ষণ । বালকের হঠাৎ মূত্র-প্রবৃত্তি জন্মিলে এবং তৎক্ষণাৎ মূত্র-তাগ্য করিতে না পারিয়া যাতনায় লক্ষ্য বৃদ্ধ করিলে পেট্রোসিলিনম সুব্যবহৃত ।

## পেছোরম সিডয়ডিস ।

পেছোরম এক প্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ । ইহার নামান্তর বার্জিনিয়া ষ্টোণ ক্রপ । পেছোরম ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে । ইহার সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । বৃহৎ মাত্রায় এতদ্বারা মস্তকের পূর্ণতা, নিদ্রায় অতিশয় স্বপ্ন, নাসিকার প্রতিশ্রায়, এবং গল-গহ্বরের অতিশয় উপদাহ জন্মে । এজন্ত নাসিকার প্রতিশ্রায়ের পূর্বরূপ অবস্থায় নাসা-মধ্য ও গল-মধ্যের অবদরণ অল্পভব ; নাসিকার অভ্যন্তরে একপ্রকার বিশেষ আর্দ্রতাহুভব, অথচ শ্রাবনিঃসরণের অভাব লক্ষণে পেছোরম ব্যবহৃত হয় । প্রতিশ্রায়ের সূচনায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহা ব্যবহৃত হয় । প্রতিশ্রায়ের প্রবর্তিত অবস্থায় পলসেটিলার স্থায় গাঢ় পুয়াক্ত শ্রাব নিঃসরণ পেছোরমেরও লক্ষণ । কোষ্ঠবদ্ধের পরবর্তী আর্দ্র তরল মলশ্রাবী অতিসারেও ইহার ব্যবহার আছে ।

## পেরেরা ব্রেবা ।

পেরেরা ব্রেবা মেনিস্পার্মেসি জাতীয় একপ্রকার লতা । ইহা মার্কিন খণ্ডে জন্মে । ইহার শুক মূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । ক্রিয়া।—জনন-যন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্র-পথের স্নায়িক কিল্লিতেই পেরেরা ব্রেবার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্বারা উপদাহ ও প্রাতিশ্রায়িক প্রদাহের উৎপত্তি হয় । আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রাশয়-প্রদাহ অর্থাৎ সিষ্টাইটিস রোগে, অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি, তৎসহ লিঙ্গ-মুণ্ডে প্রবল বেদনা ও কুহন, এবং তজ্জন্ত যাতনায় রোগীর চিংকার ; হামাগুঁড়ি দিয়া মূত্র-ত্যাগ, মধ্যরাত্র হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি ; মূত্রে উগ্র এমোনিয়ার গন্ধ, ও অধিক পরিমাণ গাঢ় ছুশ্ছেন্ত স্লেয়ার বিद्यমানতা লক্ষণে পেরেরা ব্রেবা ব্যবহৃত হয় । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে মূত্র-রেণু ও মূত্রাশয়ের মূত্র-শীলা রোগে পেরেরা ব্রেবা একটা প্রধান ঔষধ । অতিশয় কুহন ; হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া মাটিতে মাথা রাখিয়া বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত ; বৃক্ক হইতে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত, এবং এমন কি পা পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চার ; মূত্রে লিথিক এসিড অধঃক্ষেপ, অপচি রক্ত ; এই ঔষধের লক্ষণ । বৃক্ক-বন্ত, বা মূত্র-প্রণালীতে ( ইউবিকটার ) প্রস্রাব থাকিলে বার্কেরিসও উৎকৃষ্ট ঔষধ । বার্কেরিস ও পেরেরার প্রভেদ এই যে বার্কেরিসের বেদনা কচিং কুচকীর নিম্নে যায় ; পেরেরার বেদনা উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত যায় । প্রধান লক্ষণ ।—\* অবিশ্রান্ত মূত্র বেগ \* লিঙ্গ-মুণ্ডে প্রবল বেদনা ; \* কুহন ; \* যাতনায় চিংকার ; \* হামাগুঁড়ি দিয়া প্রস্রাব ; ত্যাগ ; \* মূত্রে অধিক পরিমাণ আঠা আঠা গাঢ়, ধেতবর্ণ স্লেয়ার বিद्यমানতা, অথবা লোহিতবর্ণ রেণু-পাত । মূত্রে উগ্র এমোনিয়ার গন্ধ । অনেক সময় মূত্র ত্যাগের চেষ্টা-কালে উরুর নিম্ন পর্য্যন্ত বেদনা । এইগুলি পেরেরা ব্রেবার প্রধান লক্ষণ ।

সম্মুখণ ।—এক, বার্ক, ক্যান-স্টাট, চিমা, ক্যাস, ইউভা ।

## পেছোরম সিডয়ডিস ।

পেছোরম একপ্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ । ইহার নামান্তর বার্কিনিয়া ষ্টোণ ক্রপ । পেছোরম ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে । ইহার সমগ্র বৃক্ষের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । বৃহৎ মাত্রায় এতদ্বারা মস্তকের পূর্ণতা, নিদ্রায় অতিশয় স্বপ্ন, নাসিকার প্রতিশ্রাব, এবং গল-গহবরের অতিশয় উপদাহ জন্মে । এজন্ত নাসিকার প্রতিশ্রাবের পূর্বরূপ অবস্থায় নাসা-মধ্য ও গল-মধ্যের অবদারণ, অম্লভব ; নাসিকার অভ্যন্তরে এক প্রকার বিশেষ আর্দ্রতাভব, অণুচ আবনিসঃরণের অভাব লক্ষণে পেছোরম ব্যবহৃত হয় । প্রতিশ্রাবের প্রবদ্ধিত অবস্থায় পলসেটিলার ছায় পুষাক্ত শ্রাব নিঃসরণ পেছোরমেরও লক্ষণ । প্রতিশ্রাবের হুচনায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহার ব্যবহার হয় । কোষ্ঠবদ্ধের পরবর্তী অর্দ্ধ তরল মলশ্রাবী অতিসারেও ইহার ব্যবহার আছে ।

# ফ্রান্স স্পিনোসা ।

ফ্রান্স স্পিনোসার ইংরেজী নাম সোঁ টী ।

## প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং মস্তিষ্কের মধ্যদিয়া সেই বেদনার বিদ্যুতের জ্বালা গতি ও মস্তকের পশ্চাত্তাগে উপস্থিতি ; দক্ষিণ অক্ষি-গোলকে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষুর অভ্যন্তরভাগ উৎপাটিত হইবে, এই গুলিই ফ্রান্সের প্রধান লক্ষণ । চক্ষুর আভ্যন্তরিক বিধানের রোগবশতঃ এইপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়, স্ততরাং চক্ষুর গাঢ়-মূল প্রদাহে এই ঔষধে উপকার দর্শে । এতদ্বারা বেদনা উপশমিত, প্রদাহ স্থগিত, ও দৃষ্টি পরিস্কৃত হয় । মলকোমা রোগে চক্ষু যেন প্রচাপিত-হইয়া বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছে অথবা চক্ষুর অভ্যন্তরদিয়া ও চক্ষুর চারিদিকে, কিম্বা সেই দিকের মস্তকদেশে বিদ্রবৎ সঞ্চরমান বেদনা ; চক্ষুর সজল ও শুষ্ক পটলের ( পরদা ) কুণ্ডলিকাবৎ অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ; ও চক্ষুর গাত্রের রক্তাধিক্য লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অক্ষিপুটের স্নায়ুশুলে চক্ষু যেন প্রচাপিত হইয়া বিভিন্ন হইয়া যাইবে এরূপ বেদনা লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ । স্নায়বীয় মূত্র-কৃচ্ছ্র । শ্বাস-বস্ত্রের ও হৃৎপিণ্ডের রোগ ; শ্বাস-কৃচ্ছ্র, শ্বাস-রোধ-অস্বভাব । হৃৎপিণ্ডমূলক শোথ । কটিবদ্ধবৎ দ্রুত ও হৃৎশূল —এই সকল রোগেও ইহা উপকারী ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

চাপিয়া বিদ্যারণের জ্বালা বেদনা এবং উহাতে চিন্তার প্রায় বিনুপ্তি । কয়েকটীর নীচে বেদনা, বোধ হয় যেন উহা একটি কীলক দ্বারা বাহিরের দিকে প্রচাপিত হইতেছে । \* \* মস্তকের সম্মুখভাগের দক্ষিণাংশের অস্থি হইতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া, মস্তক-পশ্চাৎ পর্য্যন্ত সঞ্চরমান বেদনা । দক্ষিণ শঙ্খাস্থির উর্দ্ধভাগের নীচে বাহিরের দিকে প্রচাপন, চাপদিলে উহার আধিক্য । \* দক্ষিণ চক্ষু-গোলকে বেদনা, বোধ হয় যেন চক্ষুর অভ্যন্তর ভাগ উৎপাটিত হইবে । দস্ত যেন উৎপাটিত হইবে এরূপ ভেদনবৎ বেদনা । মুখে উচ্চ কিছু গ্রহণ করিলে পেয়ন-দস্তে বিদ্যারণবৎ বেদনা । ক্ষুধাহীনতা, স্বপ্নমুত্র, সরলাস্ত্রে যাতনা সংযুক্ত কঠিন বর্তুলাকার মলসহকারে শোথ । খল্লীবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন একটা কোণাকার বস্তু গুল্মদ্বারের এক ইঞ্চি উপরে সরলাস্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে ভিতরের দিকে প্রচাপিত হইতেছে । শেওলা শেওলা অতিসারের পর ক্ষতে লবণ প্রদানের জ্বালা মলদ্বারের জ্বালা । প্রতি পনের মিনিট পর পর \* মুত্রাশয়ের আবেগ । মুত্র-ত্যাগের বিফল চেষ্টাসহকারে জ্বালাকর বেদনা, তজ্জন্তু যোগীর অবনত হইবার আবশ্যকতা । মুত্র-ত্যাগ করিলে উপশম জন্মে বটে, কিন্তু লিঙ্গ-মুণ্ডে একপ্রকার ভেদনবৎ বেদনা অবশিষ্ট থাকে, এবং উহাতে মুত্র-মার্গের আক্ষেপ জন্মে ও সরলাস্ত্রের আবেগ উৎপন্ন হয় । ব্যস্তমস্ত

হইয়া মুত্র-ত্যাগ করিতে বাইতে হয়; \* বোধ হয় যেন মুত্র লিঙ্গ-মুণ্ড পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় অনন্তর তথা হইতে ফিরিয়া আইসে এবং মুত্র-মার্গে বেদনা জন্মায়। ইতিবার সময় হাঁস-ফাঁস শব্দ বিশিষ্ট \* ব্যাকুলিত, হৃষ-খাস। বন্ধ-ধূলে গৌরব, ওজ্জ্বল ব্যাকুলতাসহকারে গভীর খাস-ক্রিয়ার আবশ্যকতা।

## প্লাটেগো মেজর—প্লাটেন ।

এই উদ্ভিদ ইউরোপ ও আমেরিকার জন্মে। ইহার সব (তাজা) মূল ও পত্র হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

**অধিকার।**—দন্ত-বেদনা। সংযুক্ত কর্ণ-বেদনা। বিষুদ্ধ নায়বীয় কর্ণ-বেদনা। মুখমণ্ডলের পার্শ্বদিয়া সঞ্চরণশীল, নায়বীয়, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে প্রবল, দন্ত-বেদনা। প্রাতঃকালে বিবর্তিত প্রভূত মুত্র; আহারে উপশমিত উদর-বেদনা, ও কপিশ জলবৎ মল বিশিষ্ট অতিসার। রাত্রিতে শয্যায় প্রচুর মুত্র-ত্যাগ। স্তন-বৃন্তের নায়বীয় বেদনা। গাত্র-কণ্ড, শীতপিত্ত, অপচ্যমান উত্তেদ। তামাকে-বিশ্বাদ। পোড়া ঘা, শীতে ফাটা, জন্তুর দংশন, যুষ্টিত্রণ, বিসর্প ও রসটক্সের বিষাক্ততা (বাহু প্রয়োগ)।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**চর্ম-রোগ।**—আভ্যন্তরিক সেবনে ইহার অতিক্রিয়ায় চর্মে একপ্রকার বিশেষ উপদাহ জন্মে। সেই উপদাহ বশতঃ তীর কণ্ডুয়ন, কণ্টক-বেদ, ও জালাহুভব সংযুক্ত গাত্র-কণ্ড, শীতপিত্ত, ও অপচ্যমান পীড়কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু এতদ্বারা চর্মের প্রকৃত বিকৃতি জন্মে বলিয়া বোধ হয় না। গৃহ-চিকিৎসায় উপদাহ, বেদনা, ও উত্তাপ বিশিষ্ট সকল প্রকার চর্ম-রোগেই প্লাটেগোর পত্র অল্প শুষ্ক করিয়া ও ছেঁচিয়া স্থানিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে। বিসর্প, রসটক্সজনিত বিষাক্ততা, এরিথিমা, অগ্নিদাহ, গ্রন্থির প্রদাহ, যুষ্টিত্রণ, ছিন্ন-ত্রণ, জন্তুর দংশন, নিহার-ত্রণ প্রভৃতিতে এই ঔষধের অরিষ্টের জলমিশ্রিত দ্রব, ফাণ্ট, বা পত্রের বাহু প্রয়োগে অতিশয় উপকার দর্শে।

**চিকিৎসিত রোগী।**—( ১ ) একজন যুবতীর হস্ত ও বদনের কিয়দংশ আরক্ত ও ক্ষীত হইয়াছিল, উহাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন ছিল এবং স্থানে স্থানে ফোঁকা জন্মিয়াছিল। প্লাটেগো প্রথম ক্রমের বটিকা সেবন এবং এক ড্রাম অরিষ্ট এক বাটি জলে মিশ্রিত করিয়া বাহুপ্রয়োগ করিতে তিনি সত্ত্বর শান্তি ও তিন দিবসে আরোগ্য লাভ করেন। ( ২ ) রস-ভেন দ্বারা বিষাক্ত হইয়া এক ব্যক্তির মুখমণ্ডল ভয়ানক ক্ষীত ও বিসর্পের ভায়ে আরক্ত হইয়াছিল, প্লাটেগোর পত্র প্রয়োগে তিনি উপশমিত ও রোগ-মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ( ৩ ) ছিন্ন-ত্রণাদি উপঘাতে, বিশেষতঃ বেদনাপূর্ণ ক্ষীততা ও বিসর্পের সম্ভাবনা থাকিলে ইহার বাহুপ্রয়োগে উপকার দর্শে। ( ৪ ) একজন যুবকের

হস্তান্তরের নথমূলের অভ্যন্তর দিয়া কাটিয়া গিয়াছিল; একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক দুই তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। অঙ্গুলী প্রদাহিত অতিশয় ক্ষীত ও ব্যথিত ছিল। প্লাটেগোর অরিষ্টের বাহুপ্রয়োগ দুইবার ব্যবস্থা করাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। (খ) আর একজন যুবকের হাতের আঙ্গুল প্রথম সন্ধিস্থানে একপভাবে দংশিত হইয়াছিল যে আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উপহত স্থান কুক্কটীর অণ্ডের দ্বারা ক্ষীত ও অতিশয় প্রদাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুই তিন বার প্লাটেগোর বাহুপ্রয়োগেই সেই অঙ্গুলীর আরোগ্য জন্মিয়াছিল। (গ) ডাঃ ফ্রেন্সন বলেন যে একজন খ্রী-লোক বডমৎস কুটিতে উহার একটা পাখনা তাহার মধ্যমাঙ্গুলীর তলের দিকে দ্বিতীয় পর্বের ঠিক উপরে বঁধিয়া যায়, অতিশয় রক্ত পড়ে ও গভীর ক্ষত হয়। কিন্তু তখন অত্র কোন ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া কেবল একখানি নেকড়া দিয়া বঁধিয়া রাখা হয়। রাত্রিতে তথায় অত্যন্ত বেদনা জন্মে, সেই বেদনা অঙ্গুলী চইতে স্বল্প পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয় ও অতিশয় যাতনা দেয়, পরদিন প্রাতে সমুদয় হাত, বিশেষতঃ উপহত অঙ্গুলী, সমুখ ও পশ্চাৎ দিকে ফুলিয়া উঠে; বাহুও স্বল্প পর্য্যন্ত ক্ষীত হয় এবং হাত হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত দুইটি দ্বিষং লোহিত রেখা প্রকাশ পায়। কতকগুলি নিষ্ফল ঔষধ প্রয়োগের পর যাতনায় অধীর হইয়া তিনি আহত স্থানে প্লাটেগোর পাতা ছেঁচিয়া লাগান এবং প্রয়োজিত পাতা ক্ষুদ্র হইবামাত্র তাহা তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহার বেদনার এতই শাস্তি জন্মে যে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। দুই তিন দিনেই এই ঔষধে তাহার আঙ্গুল ভাল হয়। (৪) একজন যুবকের পায়ের উপর নীহার-ব্রণ উৎপন্ন হইয়া এত ফুলিয়া পড়িয়াছিল যে তিনি হাঁটিতে পারিতেন না। দুই আউন্স প্লাটেগো-দ্যোত (ওয়াশ) ব্যবহার করাতে তাহার আরোগ্য জন্মে। (৫) ডাঃ ওয়াশবার্গ বলেন যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন রমণীর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মিস্ক-লেগ অর্থাৎ প্রসবাস্তিক জন্মবার ক্ষীততা রোগ ছিল। কখন কখন উহা অতিশয় ফুলিয়া উঠিত ও বেদনা করিত। প্লাটেগোর দ্রব বাহুপ্রয়োগে এবং সিপিয়া ও রসট্রাক্স আভ্যন্তরিক সেবনে তিনি স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন। (৬) ডাঃ হেল বলেন যে স্তনের বিসর্পণ প্রদাহে তিনি প্লাটেগো স্থানিক প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আর্দিকা বা হেমিমেলিস অপেক্ষাও ইহার প্রাদাহিক প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ ও প্রশান্তির শক্তি শ্রেষ্ঠ মনে করেন। প্লাটেগোর পত্র উষ্ণ করিয়া স্তনে লাগাইয়া তদুপরি একখানি তৈলাক্ত কাগজ দিয়া রাখিলে বেদনা, উত্তাপ, ও ক্ষীততার শাস্তি জন্মে।

**দস্ত-শূল।**—প্লাটেগো মারকিউরিয়সের লক্ষণের দ্বারা সূত্র ও ক্রম (ক্ষয়প্রাপ্ত) দস্তে বেদনা; শীতল বায়ু ও স্পর্শে অল্পত্বাধিক্য; এবং দস্তের অতিশয় দীর্ঘতালভব জন্মায়। সূত্রের লাগে বহুকালাধি এই পত্রের তন্ত (জাঁশ) দস্ত-বেদনায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

তথায় ইহার তাজা পাতা ছিঁড়িয়া স্থতার শ্রায় সবুজ আঁশ গুলি যে দিকের দাঁতে বেদনা সেই দিকের কানে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্বারা উপকার দর্শিলে তন্তু গুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, অনন্তর পুনরায় নূতন তন্তু প্রবিষ্ট করা যায়, কিন্তু উপকার না জন্মিলে প্রয়োজিত তন্তু হরিৎবর্ণই থাকে । ডাঃ রিউটলিংগার বলেন যে তিনি প্লাটেগোর দ্বিতীয় দশমিক ক্রম সেবন করাইয়া প্রায় পনের মিনিটে দশভাগের সাতভাগ দস্ত-শুলের রোগী আরোগ্য করিয়া থাকেন । ডাঃ হম্ফ্রি বলেন যে দস্ত-শুলের অত্যাশ্রিত ঔষধ অপেক্ষা প্লাটেগো শ্রেষ্ঠ । তিনি ইহার “ক্রম” সেবন করান এবং তুলায় করিয়া ক্ষয়গ্রাস্ত দস্তে লাগান । কিন্তু কখনও তন্তু কর্ণে প্রবেশ করান নাই । ডাঃ লিলিয়েহাল বলেন যে রক্ত করন ও খনন করনবৎ অত্যন্ত বেদনা, অধিক লাল-নিঃসরণ, শীতল বায়ুতে হাঁটিলে, ও স্পর্শে বৃদ্ধি ; দস্ত দীর্ঘাভূত অল্পভব ; আহারকালে ভাল দস্তেও স্পর্শ-দেহ ; অতি শীঘ্র শীঘ্র দস্তক্ষয় ; এবং দস্ত মূল হইতে রক্তপাত প্লাটেগোর লক্ষণ ।

কর্ণ-বেদনা ।—ইহার পত্রের উষ্ণ রস কর্ণ-বেদনায় উপকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে দস্ত-বেদনার সহিত কর্ণ-বেদনা সংস্পৃষ্ট থাকিলে প্লাটেগো ব্যবহার করিয়া দেখা বাইতে পারে । ডাঃ লিলিয়েহাল লিখিয়াছেন যে দস্ত-বেদনার সহিত সংস্পৃষ্ট স্নায়ুশূল-প্রকৃতির কর্ণ-বেদনায় পঞ্চম স্নায়ু-ঘূর্ণের নিম্নস্থ শাখায় বেদনার সঞ্চার লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । মুখমণ্ডলের বায়ুপার্শ্বের স্নায়ু-শূলেও বেদনা হইলে কর্ণে সঞ্চার করিলে তিনি ইহা ব্যবহারের বিধি দেন ।

উদরাময় ।—উদর-বেদনা, অতিসার, আমরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা ফলপ্রদ । কোন কোন চিকিৎসক শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ও শিশু-বিসৃচী রোগেও এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন । ডাঃ মার্সী শিশু-বিসৃচী রোগে প্রত্যেকবার তরল মলস্রাবের পর ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন ।

কৃমি ।—প্লাটেগোর পরীক্ষা লক্ষণে “নিদ্রিতাবস্থায় দাঁতকড়মড় করা” লক্ষণ আছে এবং ইহার মানসিক লক্ষণের সহিত কৃমি-পীড়িত বালকদিগের মানসিক লক্ষণের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । অতএব কৃমিরোগে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে ।

মূত্র-রোগ ।—বালকদিগের রাত্রিকালীন শয্যা-মূত্র রোগে, বিশেষতঃ মূত্রাশয়ের দ্বারাবরক পেশীর শিথিলতা রোগের কারণ হইলে এবং মূত্র প্রভূত জলবৎ থাকিলে এই ঔষধ ফলপ্রদ । মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ রোগ জন্মিলে ও মূত্রের পরিমাণ অল্প থাকিলে ইহাতে তত উপকার দর্শে না । যুবক অপেক্ষা বালকদিগের রোগেই প্লাটেগো ভাল কাজ করে । কৃমি-জনিত শয্যা মূত্রেও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা বাইতে পারে । রাত্রিকালীন শয্যা-মূত্রে প্লাটেগোর তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহৃত হয় । বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, রাত্রিতে অবিরত মূত্র ; অপ্রগাঢ় ঘ্রণ, অতি প্রভূত, শুভ্র অধঃক্ষেপ স্রাবী মূত্র ; নিয়মিত, ধূসরবর্ণ, বা ধূসরবর্ণ বিমিশ্রিত মল ; চক্ষের নিম্নের ক্ষীততা, অতিশয়

কোপনতা, ও স্বাভাবিক ক্ষুধা ও নিদ্রা লক্ষণে অস্ত্রান্ত মূত্র-রোগেও প্লাণ্টেগোর ব্যবহার আছে ।

**সবিরামজ্বর ।**—ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে কুইনাইন বা অস্ত্রান্ত জ্বর ঔষধের প্রয়োগ সবেও যে সবিরামজ্বর দূরীভূত না হইয়া পুরাতন আকারে অনেক দিন থাকে এবং প্রত্যাহা অথবা ছই, তিন, চারি, সাত, বা চৌদ্দদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দিবাভাগে উপস্থিত হয় তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কেবল দিবসে জ্বরের প্রকাশ ও জ্বর-কালে মূত্রাশয়ের মুখাধরক-পেশীর শিথিলতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ । ডাঃ ওয়াশবার্ণ বলেন যে তিনি প্লাণ্টেগোর মাদারটিংচার বা প্রথম ক্রম ব্যবহারে কয়েকজন বিষমজ্বরের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন ।

**তাম্রকূটের কুফল ।**—অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে যে অসুখ জন্মে প্লাণ্টেগোর মাদার টিংচার বা প্রথম দার্শমিক শক্তির অরিষ্ট বিন্দু মাত্ৰায় সেবন করিলে সেই অসুখ নিবারিত হয় । অত্যন্ত তাম্রকূট সেবন পরিত্যাগ করিলে প্রথম প্রথম যে ভয়ানক অস্থিরতা উপস্থিত হয় তাহা এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে । এই অস্থিরতা প্লাণ্টেগোর একটি বিশেষ মানসিক লক্ষণ । তাম্রকূটজনিত বিবর্ভাব, অবসাদ ও ভয়ঙ্কর স্বপ্নদর্শনাদিও এতদ্বারা দূরীকৃত হয় । ডাঃ মার্গী বলেন যে নক্সভমিকা দ্বারা যেমন সুরাপানজনিত শিরঃপীড়ার শান্তি জন্মে, প্লাণ্টেগো দ্বারাও সেইরূপ তাম্রকূটজনিত দস্ত-বেদনার নিশ্চিতেই আরোগ্য হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ

**মন ।**—সুদিনেও মনের অবসাদ ও অপ্রফুল্লতা । মস্তিষ্কে জড়তানুভব সহ অধীরতা ও অস্থিরতা অতিশয় কোপনতা ও বিমর্ষতা, সায়াহ্নে উহার অতিশয় । অতিশয় অবসন্নতানুভব, তৎসহ ভাবনার ভাব এবং বাহ্যবিষয়ে মনঃসংযোগে অশক্তি । মানসিক বৃত্তির পরিচালন-চেষ্টায় অবসাদেদের আধিক্য ও দ্রুত স্বপ্নের উৎপত্তি, এবং তৎসহ অতিশয় উৎকর্ষা অনুভব । অতিশয় মানসিক উৎকর্ষা, গৃহে চক্রমণ ; অনন্তর শযায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করা ; অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সংযুক্ত নিদ্রা, স্বপ্নবশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ । মস্তকে জড়তা ও অপরিচ্ছন্নতা অনুভব সহকারে মনের নিষ্ক্রিয়তা ।

**মস্তক ।**—মস্তকের স্থানে স্থানে, কখনও দক্ষিণ শাখাস্থানের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদ্ধিক্বে প্রসারিত, কখনও বা মস্তকের পশ্চাভাগে এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অনন্তর মস্তকের অস্ত্রান্ত ভাগে, অল্পবিস্তর তীব্র বেদনার আবেশ । মস্তকের অভ্যন্তরের গভীরাংশে গৌরব, এবং এক কর্ণ হইতে কর্ণান্তর পর্য্যন্ত মাথায় কিছু যেন স্থাপিত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব । কপালের অভ্যন্তরে অনতিতীব্র গৌরব অনুভব ও কখন কখন শাখাস্থি হইতে সমুৎপন্ন, অল্পপ্রস্থ সম্প্রসারিত, দৃষ্টঃ মস্তিষ্কের ভূমিদেগে অবস্থিত গভীর বেদনা । মস্তকে, কখনও দক্ষিণ, কখনও বা বাম করোটি-প্রাচীর-প্রদেশে ; অপচ

স্তনবৃন্তবৎ প্রবর্তনে সঞ্চরমান বেদনা। মস্তকের বামপার্শ্বে, কপাল হইতে মস্তকের গভীরাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত, থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত অনধিক তীব্র বেদনা। মস্তকের বামদিকে, বাম চক্ষুর উপর হইতে মস্তকের পশ্চাত্তাগের অভিমুখে, কিঞ্চিৎ তীব্র বেদনা, কিন্তু শীঘ্রই উহার বিরতি। মস্তক-শিখরে, করোটির নিম্নে কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে সবিরাম স্পন্দনশীল বেদনা। কপালে সামান্য উদ্বেদের আবির্ভাব ও সম্বর উহার তিরোভাব সহকারে করোটির কণ্ডূয়ন।

চক্ষু।—অক্ষি-গহবরের গভীরাংশে সময়ে সময়ে অতীব বেদনা, ও প্রচাপনে উহার আধিক্য। দক্ষিণ অক্ষি-গহবরের গভীরস্থানে অল্পক্ষণ স্থায়ী অবিরাম মৃদু বেদনা। দক্ষিণ চক্ষুর বহির্দিকে উর্দ্ধাংশে তীব্র (চিড়িকমায়া) বেদনা। নিদ্রা হইতে উথানান্তে অক্ষি-পুটের ক্ষীণতা ও আরক্ততা। অক্ষিপুটে কতিপয় ঘটিকাস্থায়ী অস্বাভাবিক পরিণততা অল্পভব। একঘণ্টা পর্যন্ত প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ অক্ষি-গোলকে, অধিকাংশ চক্ষুর অভ্যন্তরীণ কোণের নিকট তীব্র, কষ্টপ্রদ স্ফীতি-বেদ।

কর্ণ।—মস্তকের বেদনা, বোধহয় যেন এক কানের অভ্যন্তর দিয়া অল্প কান পর্যন্ত প্রধাবিত হইতেছে। কর্ণ-কেন্দ্র, অধিকাংশ বামকর্ণে সচরাচর বেদনা, এই বেদনার মস্তকে আরম্ভ।

নাসিকা।—নাসিকার অস্থিগুলি যেন একত্র বা অভ্যন্তর দিকে প্রচাপিত হইতেছে নাসা-সেতুর অল্পপ্রস্থে এপ্রকার অল্পভব। বয়ংবার হাঁচি, এবং তৎসহকারে বাম নাসারন্ধ্র হইতে পাতলা দূষিত স্লেয়া নিঃসরণ। বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে সমস্ত দিন প্রভূত, দূষিত পাতলা স্লেয়া নিঃসরণ, অনন্তর ক্রমে ক্রমে উহার হ্রাস ও দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্র আক্রমণ।

মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ।—উথানান্তে মুখমণ্ডলের চর্মে, বিশেষতঃ কপালে বাম চক্ষুর উপরে ও চারিদিকে, কিয়ৎকাল স্থায়ী অপ্রীতিকর ঘৃষ্ট ও আকৃষ্টবৎ অল্পভব, চাপিলে ও ঘষিলে উহাতে কতকটা অল্পভবাধিক্য। মুখমণ্ডলে, বদনের বাম পার্শ্বে, অধিকাংশ স্ফঙ্গীর নিকটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঈষৎলোহিত, বন্ধুর, সশঙ্ক, মটর-প্রমাণ, স্তূপে স্তূপে উৎপন্ন উদ্বেদ; এবং উহাতে একপ্রকার আকৃষ্টতা অল্পভব; কিন্তু বেদনা বা কণ্ডূয়নের অবিজ্ঞানতা; নাসিকার চারিদিকে কতিপয় অপচ্যমান রক্তবর্ণ পীড়কা ও স্পর্শে উহাতে ব্যতনা। ওষ্ঠে, প্রধানতঃ নিম্ন ওষ্ঠে শুষ্ক, সশঙ্ক, প্রবল জ্বালা ও আততি বিশিষ্ট উদ্বেদ। অনেকদিন পর্যন্ত ওষ্ঠদ্বয়ের নীল, মলিন, রুগ্ন, ও বন্ধুর আকৃতি।

হনু ও দন্ত।—আহারান্তে বামদিকের নিম্ন-হনুর ক্ষয়প্রাপ্ত কোন কোন দন্তে অবিরাম বেদনা। প্রাতে আহারান্তে বামদিকের দন্তে বেদনা; পূর্বাহ্নে উহার বিরতি, মধ্যাহ্নের আহারের পরে পুনরায় উপস্থিতি ও হুই এক ঘণ্টা অবস্থিতি। নিদ্রা হইতে উঠিবার পর বৎসামান্য দন্ত-বেদনা, অনন্তর হুই প্রহর বেলা পর্যন্ত সেই বেদনার বৃদ্ধি; মধ্যাহ্ন সময়ে উহার অতিশয় তীব্রতা, গালের অতিশয় ক্ষীণতা, ১২টার পর হইতে মুখ



হইতে অবিরত লাল নিঃসরণ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে বেদনা, কিন্তু উভয় পার্শ্বের দন্তের অক্ষমতা; অথচ পার্শ্বদ্বয়ের দন্তে এত স্পর্শ-দেহ ও দীর্ঘতা-অনুভব যে তজ্জন্তু আহাৰ করিতে কষ্ট। দন্তে অত্যন্ত রক্তকর্মন ও খননবৎ বেদনা, প্রভূত লাল নিঃসরণ, শীতল বায়ুতে বিচরণ, ও সংস্পর্শে উহার আধিক্য, কেবল শীতল গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলে আংশিক শান্তি লাভ। ( বেদনা অসহ্য হতয়াতে মারকিউরি ৩০ ক্রম সেবনে উপশম প্রাপ্তি )। বামদিকের দন্তের দীর্ঘাভূততা ও স্পর্শ-দেহ; বাম দিকের উপরের পাঁটির ( স্তম্ভ ) পেষণ-দন্তে প্রবল বেদনা। দন্তে, যেন উপরের পাঁটির সম্মুখের দন্তের স্নায়ুতে একপ্রকার শিহরণ অনুভব; নিজা বাইবার পূর্বে এই সকল লক্ষণের উপস্থিতি ও অল্পক্ষণ অগ্রবলভাবে অবস্থিতি। সম্মুখের কর্তন দন্তে শীতল বায়ু আকর্ষণ জনিত শীতলতার ত্রায় শীতলতা ও স্পর্শ-দেহ অনুভব। প্রত্যহ প্রাতে দন্ত দীর্ঘাভূত অনুভব, অনন্তর অপরাহ্ন ২৥০ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অবিরাম তীব্র বেদনা; পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের উর্দ্ধ শাখা-পথে সেই বেদনার প্রধাবন, বেদনার সহজে উদ্বেক এবং রোগীর রাত্রিতে বদনের সেই পার্শ্বে ভয় দিয়া শয়নে অশক্তি। প্রাতে দন্ত-বেদনা ও অগ্রবল বদন-বেদনা, অপরাহ্ন দুইটার পর তাহার শান্তি। দন্ত-বেদনার বিরতি, কিন্তু গালের ক্ষীণতার বিद्यমানতা। অতি শীঘ্র শীঘ্র দাঁতের ক্ষয় প্রাপ্তি।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের শুষ্কতা। মুখ-গহ্বর ও গল-গহ্বরে পরিশুদ্ধতা অনুভব। জিহ্বায় দ্রব্য ও ত্র অল্প অল্প লেপ। প্রাতে জাগরণান্তে গল-কোষে অস্বাভাবিক আকৃষ্টন অনুভব, এবং শীঘ্র উহার বিরতি। দন্ত-মূল হইতে রক্ত-স্রাব। রাত্রিতে গল-কোষে অবদরণ ও স্পর্শ-দেহ অনুভব; পরদিন সারাদিন পরিবর্তিতভাবে এই লক্ষণের বিद्यমানতা এবং তৎসহকারে গলার অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও কণ্ডুয়ন অনুভব, ও তজ্জন্তু শুষ্ক থক্ থক্ কাস। প্রাতে উত্তিবার পর স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা জনিত স্বরভঙ্গের ত্রায় স্বরভঙ্গ।

আমাশয়।—প্রাতে অবিরত উল্কার, উল্কারে উগ্র গন্ধকের গন্ধ; সারাদিন সেই গন্ধের বর্তমানতা, অপরাহ্নে গন্ধকের স্বাদের সর্বদা বিद्यমানতা; অপরাহ্নে সোড়া-ওয়াটার পানের ত্রায় কার্বনিক এসিডের তীব্রস্বাদ; এবং পাচ হইতে পনের মিনিট পরপর উল্কারে সেই বাষ্পের উত্থান; রাত্রিতে আহাৰের পর বাষ্পের উদরে গতি ও অতিশয় আটোপের উৎপত্তি সাধন ও তীব্রগন্ধ অপানরূপে নিঃসরণ। অপরাহ্নে অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে হৃদগ্রস্থানে উত্তাপ, ও উদরে পূর্ণতা অনুভব, এবং বসিলে উহার বিরতি। হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী আমাশয়ের দক্ষিণ-মুখ-প্রদেশে একপ্রকার অবস্কর্য বিশেষ অবস্থার অনুভব; বিশেষতঃ পূর্ণাঙ্গারের পরে তথায় একপ্রকার কষ্টপ্রদ দ্রব্য শীতলতা অনুভব, বোধ হয় যেন সেই স্থান প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই লক্ষণের অবস্থিতি। বিবমিষা সহ শ্রান্তি ও কপ্পন অনুভব।

কুক্ষি ও উদর।—উদরোদ্ধে অল্প অল্প অস্বচ্ছন্দতা; বারংবার শূঁতোদগার, ও

উদরে অল্প অল্প কুঞ্জন, এবং সময়ে সময়ে আপান নিঃসরণ। সায়াছে অর্দ্ধঘণ্টাহারী, বমন-প্রায় বিবমিষা সংযুক্ত উদর-বেদনা ( পেটকামড়ানি )। উদরের বাম-পার্শ্বে কৃত্রিম পণ্ডকার উপস্থিতি গভীর নিম্নে তীব্র উদর-বেদনা, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে সেই বেদনার বৃদ্ধি। সময়ে সময়ে উল্কার, কিন্তু উল্কারে বেদনার শান্তি জন্মে না। দিবাভাগে দক্ষিণ শ্রোণীদেশে বেদনা, বোধ হয় যেন দক্ষিণ বক্ষঃপ্রাণালীতে একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। অপরাহ্নে ও সায়াছে দক্ষিণ কুক্ষিতে ও উদরের পেশীতে তীব্র বেদনা।

মূত্র।—সাধারণতঃ বিমুক্ত ও প্রভূত মূত্র। গাঢ় কমলারঙ্গের মূত্র; বিবর্জিত মূত্র-স্রাব। বারংবার বর্ণশূন্য মূত্রত্যাগ। রাত্রিতে অব্যবহৃত মূত্র; রাত্রিতে দুইবার উঠিয়া এক একবার প্রায় ১০।১২ ছটাক মূত্রত্যাগ। প্রাতে উঠিয়া মলিন-লোহিত, অতিশয় উগ্র-গন্ধ, অধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ। প্রভূত, অপ্রগাঢ় বর্ণ, ও শুভ্র অধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র। প্রাতে উঠিবারাত্র প্রবল মূত্র-বেগ ও মূত্রাশয়ে অল্প অল্প অশিথিলতা অনুভব, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ মূত্রস্রাব। সহসা মূত্র-মার্গের মুখে স্ফুটনভি, ও অপ্রীতিকর কণ্ডুয়নের উপস্থিতি, এবং প্রাতে ও সায়াছে কয়েক মিনিট পর্যন্ত উহার অবস্থিতি। উপবিষ্ট অবস্থায় মূত্র-মার্গে নিম্ন হইতে উপরের দিকে আকস্মিক ছল-বেধবৎ বেদনা। প্রচাপনে মূত্রাশয় প্রদেশের উপরে স্পর্শ-দেহ

মল ও মলদ্বার।—অস্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব অথচ মলের অনিঃসরণ। আহার করিবার পূর্বে অস্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা, যেন মলত্যাগ করিতে বাইতে হইবে। দুর্বলতানুভব সহ পাতলা মলস্রাব। সরলাস্ত্রে কিঞ্চিৎ বেদনা ও মলত্যাগের পূর্বে যৎসামান্য উদর-বেদনা সহকারে প্রতিদিন একবার, কখনও বা দুইবার পাতলা মলস্রাব। রাত্রি প্রায় দশটার সময় অত্যন্ত বেদনা বা মল-প্রবৃত্তি সহকারে অতিশয় জলবৎ মলত্যাগ। তখনও উল্কারের অবস্থিতি। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ আপান নিঃসরণ, ও অস্ত্রে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, তৎপরে তরল মলস্রাব। রাত্রি একটার সময় ও সূর্যোদয়ে মলত্যাগ, জলবৎ মল, প্রথমে পাতলা, পরে গাঢ় ও লেহবৎ; অনন্তর আবার পাতলা, পরে লেহবৎ ক্রমান্বয়ে এইরূপ মল; অপিচ অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ। একবার সহজ মলত্যাগে কিঞ্চিৎ রক্তপাত। মলত্যাগকালে সরলাস্ত্রের আংশিক বহির্গমন। সরলাস্ত্রে ও কটদেশে বেদনা, স্বাভাবিক মল।

পুংজননেদ্রিয়।—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার লাঘব। রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতসারে শুক্রস্রাব।

বক্ষঃস্থল।—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রের আবেগ, ও উত্তাপানুভব। শ্বাস-হ্রস্বতা সহ বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্বলতা ও গৌরব, তৎপরে বমনবৎ বিবমিষা। কথা বলিবার বা উচ্চস্বরে পড়িবার সময় শ্বাসগ্রহণের জন্ত বারংবার থামন; সমগ্র সায়ংকাল পর্যন্ত উহার অবস্থিতি। শ্বাস-কষ্ট, বোধ হয় যেন গৃহে বায়ুর অসুন্দার। বারংবার, অর্টনজিক,

জুস্তা-প্রায় গভীর খাস। সামান্য পরিশ্রমে, বিশেষতঃ সিঁড়িতে উঠিবার সময়, প্রবল হৃদস্পন্দ, ক্ষতনাড়ী সহকারে ঘনখাস (হাঁপানি)। আহাৰান্তে হৃৎপিণ্ডে সূচী-বেধ। সিঁড়িতে উঠিতে প্রবল হৃৎকম্প, ও প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। বৃদ্ধাতির বাম পার্শ্বের নিকটে, স্বকের নিম্নে, কেন্দ্র-স্থলের একটু নীচে যুহু যুহু অবিরাম বেদনা; প্রচাপনে ও উপবেশনে উহার আধিক্য, কিন্তু নড়িলে চড়িলে বিরতি। বাম পার্শ্ব দিবীভাগে কয়েকবার তীব্র চিড়িকমার বেদনা; অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ প্রকার বেদনা, একদা দক্ষিণ পার্শ্বে অতিশয় সূতীর একপ্রকার বেদনার আবির্ভাব। রাত্রিতে শবায় একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণে বাম ফুফুসের নিম্নতর খণ্ডে তীব্র সূচী-বেধ বা ধূতবৎ বেদনা।

গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটি।—মাথা নাড়িলে বা ফিরাইলে ঘাড়ের স্পর্শ-দেহ ও শুষ্কতা, কিয়ৎকাল পরে উহার বিরতি। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক-ঘূর্ণায়ক-পেশীর স্পর্শ-দেহ ও শুষ্কতা; 'আক্রান্ত' দিকে মস্তক নাড়িলে উহার বৃদ্ধি ও অনাক্রান্তদিকে নাড়িলে উপশম; দশদিন পর্য্যন্ত উহার বিত্তমানতা। কটির অল্পপ্রস্থে অতিশয় দুর্বলতা, শরীরের চারিদিকে উহার প্রসারণ ও শরীর ভয়ংকর অল্পভব। বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা, কখনও বা দক্ষিণ স্বল্প পর্য্যন্ত, অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বে, তৎপরে পৃষ্ঠের উর্দ্ধাংশে উহার সম্প্রসারণ। স্বক্কাস্থিঘষের মধ্যে দপদপকর বেদনা, এক স্বক্কাস্থি হইতে অপর স্বক্কাস্থিতে এবং তথা হইতে দক্ষিণ বাহুর পৃষ্ঠে, প্রসারণী পেশীতে, উর্দ্ধ হইতে কণ্ঠের দিকে সেই বেদনার গতি। ত্রিকোণস্থিতে, কটির কশেৰুকার সহিত উহার সংযোগ স্থলে একটু নীচে যুহু যুহু, অবিরাম বেদনা; দঁড়াইলে বা নড়িলে চড়িলে উহার আধিক্য। প্রচাপনে পৃষ্ঠবংশে স্পর্শ-দেহ।

উর্দ্ধাঙ্গ।—শরীর-শাখা, বাহু ও জঙ্ঘার সীসের ত্রায় গুরুত্ব। অতিশয় শ্রান্তি ও শয়নের প্রবৃত্তি। বামস্বন্ধে আমবাতিক অবিরাম বেদনা, ও কয়েক মিনিটে তাহার বিরতি। উপবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণ স্বন্ধে আমবাতিক বেদনার উপস্থিতি ও একঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি। দক্ষিণ বাহুর পেশীতে প্রধানতঃ কণ্ঠের নীচে বেদনা। হস্তাঙ্গুলীর সন্ধিতে আমবাতিক আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাম হস্তের তঙ্গুলীর মধ্যবর্তী স্থানে কণ্ঠন, রাত্রিতে উহার আতিশয্য।

নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বে ও অধঃশাখায় বেদনা ও অস্বচ্ছন্দতা। দক্ষিণ স্বন্ধে ও দক্ষিণ বক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে অতীব অবিরাম বেদনা এবং উহার নিম্নাঙ্গে গতি। দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ জাঁহু-সন্ধিতে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা। প্রচাপনে স্পর্শ-দেহ সহ দক্ষিণ উরুর পশ্চাত্তের পেশীতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। দক্ষিণ উরুর উপরের প্রান্তস্থিত প্রবদ্ধিত অংশ হইতে বক্ষণ-সন্ধি পর্য্যন্ত প্রসারিত সূতীর সঞ্চারমান বেদনা। বাম জঙ্ঘায় জাঁহুর নীচে মচকানবৎ বেদনা।

স্বক।—সমস্ত শরীরের স্বকে অল্পভবাধিক্য, নখঘর্ষণে উহাতে জ্বালাবশেষ। নিম্নাঙ্গে ও শরীরের অন্তঃস্থানে কণ্ঠন, ঘর্ষণে ভাল বোধ হয় বুটে, কিন্তু শ্রান্তি জন্মে না, ঘর্ষণের

বিরতির পর একপ্রকার জ্বালা অনুভূত হয় । দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে কণ্টক-বেধ ও ছল-বেধবৎ বেদনা ; কখনও বা এই বেদনা সূক্ষ্ম সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূত হয়, কখনও বা বিছটীর তায় জ্বালা জন্মায়, কিন্তু একই সময়ে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয় না, সর্বদা একই স্থানে নিবদ্ধ থাকে ; অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে উপবেশনেই উহা প্রধানতঃ প্রকাশিত হয়, অনাবৃত বায়ুতে পরিশ্রমকালে প্রায়ই অনুভূত হয় না । বজ্রকণ ও উরুতে, বিশেষতঃ উরুর অভ্যন্তরভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কঠিন, শুভ্র, চোপ্টা, অপচ্যমান পীড়কা ; এই সকল পীড়কার কোন কোনটার কেন্দ্র-স্থলে আরক্ত ক্ষুদ্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় ; প্রথম যখন পীড়কা প্রকাশ পায় তখন অল্পই চুলকায়, কিন্তু নখ ঘর্ষণে কণ্ডুয়ন অধিক প্রবল হইয়া উঠে, একপ্রকার জ্বালা, ও প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী গভীর আরক্ততা উৎপন্ন হয় ; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পীড়কাগুলি উন্নতও হয় এবং অবশেষে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না পাকিয়া বিলীন হইয়া যায়, ও আবার নূতন উদ্ভেদ হয় । • মণিবন্ধে ও অঙ্গুলীর মধ্যভাগেও কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল । অপচ্যমান পীড়কা হইতে পীড়াভ রস ক্ষরণ, ও তন্তুরা শীঘ্র চিপিটিকার উৎপত্তি । উভয় দিগের হস্ত-নিম্নগহ্বির স্পর্শ-দ্বেষ্ট ও জ্বং ক্ষীততা ।

নিদ্রা ।—রাত্রিতে অস্থিরতা, ও নিদ্রা যাইতে অপারগতা, অপ্রকল্পতাজনক স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ ; দুই প্রহর রাত্রির সময় উহার আধিক্য । রাত্রিতে ধমনীতে কতকটা দপদপ, রাত্রি বারটা বা একটা পর্য্যন্ত অস্থিরতা । অস্থির, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, ও নিদ্রায় দাঁত কড়মড়ি । রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং স্পষ্ট, সংলগ্ন ও সঙ্গত, অপিচ অসঙ্গত, অসংলগ্ন ও বিরক্তিকর স্বপ্ন ।

জ্বর ।—কিঞ্চিৎ শীত ও অল্প শিরঃপীড়া ; হাত পা শীতল, কিয়ৎকাল কানে টুন টুন শব্দ । শরীরোপরি শীতের প্রধাবন, রোমাঞ্চ ; হস্তাঙ্গুলীর শীতলতা । অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবেশনে এবং তথা হইতে বাহিরে গেলে বাম শঙ্খস্থলে তীব্র ক্ষণস্থায়ী বেদনা । নিদ্রা হইতে উঠিবার পর শীতানুভব, তিনঘণ্টা উপবেশনের পর বক্ষঃস্থলে উত্তাপ এবং অঙ্গে, বক্ষে, ও মস্তকে চঞ্চল বেদনা অনুভব ; একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত এই সকল লক্ষণের অবস্থিতি ও-তৎসহকারে অঙ্গ প্রসারণের প্রযুক্তি । অঙ্গ-মর্দ ও জুস্তগ-প্রযুক্তি, বক্ষ-গোরব, এবং মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অপ্রযুক্তি সহকারে বিমর্ষ ও হতবুদ্ধিবৎ ভাব । সবল, পূর্ণ ও সবিরাম নাড়ী, শরিতাবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০ হইতে ৮০ বার নাড়ীর স্পন্দন, এবং সায়াহ্নে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৯০ হইতে ১০০ বার নাড়ীর স্পন্দন । সবিরাম ও অনিয়মিত নাড়ী । প্রায় অপ্রাপ্য, ও সহজে প্রচাপ্য নাড়ী ; প্রতি মিনিটে ১০০ বার স্পন্দন । অত্যন্ত উত্তেজনা ; তীব্র জ্বর ; সবল, উল্লক্ষনশীল নাড়ী ; প্রতি মিনিটে ১২০ বার স্পন্দন ; অতিশয় উত্তাপানুভব ও পিপাসা ; বাস-গৃহ অতিশয় উত্তপ্ত অনুভব । সকল সময় মস্তক, হস্ত, ও পৃথক অস্বাভাবিক উত্তাপ, নাড়ীর ৭২ বার স্পন্দন । ০ বিষমজ্বর ।

**বিশেষ লক্ষণ।**—সকল বেদনার বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি। কর্ণের সম্মুখে ও উপরে বেধনবৎ বেদনা, তৎসহ স্তম্ভতা এবং অস্থি যেন ক্ষীত হইয়াছে এপ্রকার অল্পভব অত্যন্ত মাত্র শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। ক্রুতিশক্তির তীক্ষ্ণতা, শব্দে যাতনা, রবের কম্পন। নাসারন্ধ্র হইতে জাকরাণের জলের ঝায়া জঁয়ং পীতবর্ণ অথবা পরিস্কৃত জল \* সহসা নিঃসরণ। প্রত্যহ দন্তে খোঁচা-মারার মত বেদনা, অপচি, আহারাশ্তে নীচের ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে রক্তকরণের ঝায়া বেদনা, তৎসহ গালের ক্ষীততা, লাল্য-স্রাব, দন্তের দীর্ঘতা ও অল্পভূতি, স্পর্শে স্পর্শ-দ্বেষ। শীতল বায়ুতে ও স্পর্শ স্কুরিলে উপচয়। বার বার অধিক পরিমাণে পরিস্কৃত ও বর্ণশূন্য মূত্রনিঃসরণ। স্বকের অতিশয় কণ্ডূরন, কণ্টক-বেধন (প্রিকিং) ও জ্বালা। (এপিসের বিষয়)।

**সমগুণ।**—আর্গিকা, হিপার, মারকিউরিয়স, ফাইটো-লাক্সা।

## ফর্মিকা—ফর্মিক এসিড।

ফর্মিক এসিড ফর্মিকা নামক প্রকপ্রকার পিপীলিকার বিষ। এই বিদাহী বিষাক্ত পদার্থ বিছটার শুঁয়ায়, কোন কোন প্রকার পোকায়, এবং পুরুতন টর্পেন্টাইন তৈলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাঃ হেল বলেন যে হাইড্রেট অব ক্লোরালেও ফর্মিক এসিড আছে এবং সেই কারণেই হাইড্রেট অব ক্লোরাল শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া) জন্মায় ও আরোগ্য করে। তিনি শীতপিত্তে ফর্মিক এসিড ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলেন। ডাঃ ফ্যারিংটন লেখেন যে স্থানিক প্রয়োগে ফর্মিকা স্বকের প্রাদাহিক আরক্ততা, কণ্ডূরন, ও জ্বালা, অল্প অল্প রসক্ষরণ ও উপদ্রব-স্থলন উৎপন্ন করে। ইহার বিষক্রিয়ায় মূত্রের অণ্ডালময়ত্ব, রক্তাক্ততা, এবং অতিশয় মূত্র-বেগও জন্মে। ডাঃ হেরিং এই ঔষধ সদৃশমতে প্রথম প্রচলিত করেন। পৃষ্ঠ-বংশের স্নায়ু-শৃঙ্খের রোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ; সহসা উপদ্রুত, প্রধানতঃ সন্ধিস্থলে বিঘ্নমান, অস্থিরতা লক্ষণাপন্ন বাত সঞ্চরণে বেদনা বদ্ধিত হইলেও রোগীর নড়িতে চড়িতে প্রবৃত্তি; প্রচাপনে উপশম; ঘর্ষে অল্পশম; চক্ষুরোগ, বিশেষতঃ চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহ ও তাহার পরিণাম; বধিরতা ও বিবিধ কর্ণ-রোগ; স্তম্ভদায়িনীদিগের স্তম্ভাভাব; শুক্রস্রাব; পূর্নাঙ্ক দুইটা হইতে চারিটা পর্যন্ত রোগের প্রকোপ; শীতলজলে ধৌত করিলে জ্বালাকর বেদনার শান্তি; শীতলতা; আর্দ্রতা, শীতলজলে স্নান বা আর্দ্র ঋতুভোগ জন্ত অপকার; এই সকল স্থলে তিনি ফর্মিকা ব্যবহারের বিধি দেন। ক্যামোমিলা প্রয়োগে আংশিক উপকার দর্শিলে এবং বেলেডোনা অল্পপযোগী হইলে তিনি এতদ্বারা অধিক সময় ফল লাভ করিয়াছেন।

## প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

**বধিরতা।**—বধিরতা; বামকর্ণে হল-বেধ ও স্থচী-বেধবৎ যাতনা; বাম কর্ণ-দ্বারের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। **চক্ষু-প্রদাহ।**—বাম চক্ষু-গহ্বরদেশে ও বামশল্মপ্রদেশে

বেদনা, বেদনা-স্থানে স্পর্শ-বেধ; বাম চক্ষুর উপরে বেদনা; দৃষ্টবস্ত্র কুছাটিকার অভ্যন্তর দিয়া দর্পনের ত্রায় দেখায়, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণ বর্ণ, তজ্জন্তু খানিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। হেরিং চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহে; লিউকোমা, টিরিজিয়ম, ও কনীনিকার ক্ষতে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। বাত।—সহসা সমাগত সন্ধিবাতে, তৎসহ অতিশয় অস্থিরতা, সঞ্চরণের ইচ্ছা অথচ নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি; প্রচাপনে বেদনার উপশম; ঘর্ম্মভাবে অহুপশম; বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আধিক্য। শিরোঘূর্ণন।—আহারকালে ভ্রমির উপক্রম; প্রাতে উত্থান-চেষ্ঠায় শিরোঘূর্ণন; শয়ন করিবার সময় শিরোঘূর্ণন সহকারে বাম অক্ষি-গহ্বর-প্রদেশে বেদনা; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণতা ও উপবেশনে উহার উপশম। সাণ্ডলাল-মুত্র।—অণ্ডলাল ও রক্তময় মুত্র; ও অতিশয় মুত্র-বেগ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—পানি, বিস্মৃতি, বিমর্ষতা, ভীকতা, ও আতঙ্ক। মূর্খাদেশের বেদনার অবসানে চিন্তের প্রকল্পতা। উত্থান-চেষ্ঠায় শিরোঘূর্ণন। অক্ষি-পুটের গৌরব, ও অধায়নে অসামর্থ্য সহ অপ্রসন্নতা ও নিদ্রাতুরতা অহুভব। মস্তক।—ছুইদিকেই শঙ্খ ও কর্ণের মধ্যস্থলে চাপ ও নিস্তেজতা অহুভব। ধারহীন অস্ত্রের খোঁচার ত্রায় মস্তকের মধ্যস্থলে তীব্রবেদনা। মস্তকের পশ্চাভাগের উর্দ্ধ ও মধ্যাংশে শিরঃপীড়া; কফি পানে উহার বৃদ্ধি, এবং শীতলজলে ধৌত করিলে আধিক্য। প্রাতে জাগরণ সময়ে বমন ও বক্ষঃস্থলে হৃচী-বেধ সহ শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর উপরের পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল ও গালের সমস্ত বামভাগ পক্ষাঘাতগ্রস্তবৎ অহুভব। নাসিকা।—হাঁচি ও তরল প্রতিশ্রায়।

কর্ণ।—বামকর্ণে বারবার হৃচী-বেধ, তৎপরে কর্ণ-দ্বারের বাহ্যংশে একটি ক্ষুদ্র ত্রণের উৎপত্তি। (উত্তাপ সহ) দুই কর্ণেই প্রচাপনী বেদনা। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় চক্ষুর্ধ্বয়ে বেদনা, প্রক্ষালনে উহার শাস্তি। আমাশয়।—আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডাভিমুখ অংশে অবিরত প্রচাপন, এবং সেই স্থানে একপ্রকার জ্বালা। শিরোবেদনা সহ বিবর্ম্মা, এবং পীতাত তিত্ত স্লেষ্মা বমন। আমাশয়ে যাতনা ও গৌরব সংযুক্ত জ্বালাকর বেদনা।

উদর ও মল।—প্রাতে আয়াসে অল্প অল্প বায়ুনিঃসরণ; অনন্তর সরলাস্ত্রে অতিসারের ত্রায় আবেগ। কুহ্নন সংযুক্ত অতিসার; মলত্যাগের পূর্বে অস্ত্রে বেদনা। প্লীহা প্রদেশে মৃদু মৃদু বেদনা। সক্রম্প শীত সহকারে অস্ত্রে তীব্র বেদনা। মলদ্বারে আকুঞ্জন অহুভব। সরলাস্ত্রে চাপ, সন্ধ্যাকালে ও শয্যায় শয়নে উহার আতিশয্য। তরল আতিসারিক মল, মলত্যাগান্তে আর একবার মলত্যাগের ইচ্ছা। মলদ্বারে ও সরলাস্ত্রে বেদনা বিশিষ্ট মল-প্রবৃত্তি, এবং উহার অনিবৃত্তি। ০ মলদ্বারের আবরক-পেশীর আকুঞ্জন অহুভব সহ কোষ্ঠবন্ধ। জননেন্দ্রিয়।—(পুং) মুষ্ণু-কণ্ডুয়ন; সংসর্গ সময়ে উপস্থের অগ্রচূর উদ্রেক; উপস্থের বামার্দ্ধে উৎক্ষেপবৎ বেদনা। প্রাতে প্রস্রাব করিয়া আসিয়া শয্যায় শয়নে অনেকক্ষণস্থায়ী লিঙ্গোদ্রেক।

(স্ত্রী)।—স্বল্প ও পাণ্ডুর ঋতুরক্ত, তৎসহ কটিতে আবেগ। যথা সময়ের আটদিন পূর্বে ঋতুর উপস্থিতি। বক্ষঃস্থল।—বাম স্তন্যগ্রদেশে প্রবল সূচী-বেধ; তৎপরে পৃষ্ঠের বাম ভাগে ত্রুপ, কিন্তু অধিকতর প্রবল যাতনা; অনন্তর শরীরের অগ্রাংশ স্থানে সেই প্রকার সূচী-বেধ অরূভব। দক্ষিণ স্তন্যগ্রাে প্রবল কণ্ডূরন। হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের ফর্ফর্ শব্দ। উল্কাঙ্ক।—দক্ষিণ কণ্ঠের উপর উগ্র বেদনা। প্রাতে বগলে কণ্ডূরন। বাম স্কন্ধ-ফলকের উপর প্রবল কণ্ডূরন। দক্ষিণ কফোণি সন্ধিতে এবং প্রকোষ্ঠাঙ্ঘ্রি পথে আমবাতিক বেদনা। গ্রীবাপৃষ্ঠের বামপার্শ্বে, বামবাহু পর্য্যন্ত সংগ্রসারিত বাতের বেদনা। বেদনার বামবাহু পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে উপস্থিতি। গ্রীবার অতিশয় শুষ্কতা ও ব্যথিততা; নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে জ্বালাকর সূচী-বেধ। নিম্নাঙ্গ।—রাজিতে শয্যায়া কুচকীতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। জাহ্নু-সন্ধিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা। সমস্ত পেশীগুলোর সাধারণ দুর্বলতা। ত্রিকস্থান ও উরু-পৃষ্ঠে তীব্রবেদনা ও সঞ্চরণে উহার আবিদ্য। পেশীগুলি যেন আকৃষ্ট ও বন্ধন ছিন্ন হইতেছে এরূপ অরূভব। উভয় পদে, বিশেষতঃ পদাঙ্গুষ্ঠের সমীপবর্ত্তী পদতলে খল্লী। বিবিধ কর্ণ-রোগ। শুভদায়িনীদিগের শুষ্ঠাভাব। শুক্রশ্রাব পূর্বাঙ্ক দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত রোগের প্রকাশ শীতলজলে ধৌত করিলে জ্বালাকর বেদনার শাস্তি। শীতলতা, আর্দ্রতা, শীতলজলে স্নান, বা আর্দ্রঋতুভোগ জন্ত অপকার। সমগুণ।—এপস, রস, আর্টিকা, ক্রোটন ইত্যাদি।

## ফাইজোজিগমা—ক্যালেরবার বীন।

লিগুমেনোসী জাতীয় এই ওষধি আফরিকায় নাইগার ও ক্যালেরবার নদীর মুখের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মে। ইহার শিম্বির চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার অভ্যন্তর দিয়া ফাইজোজিগমা সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত ও ইজ্রিয় জ্ঞানের বিলুপ্তি জন্মায় এতদ্বারা শ্বাসের শুষ্কতা, অথবা হৃদগৃহের পক্ষাঘাত জনিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার নূনতাবশতঃ মৃত্যু হয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্পর্শ-জ্ঞান ও চৈতন্ত্যের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মে না। ইহার ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহানাড়ী প্রথমে আকৃঙ্কিত, অনন্তর প্রসারিত হয়, এবং কি আভ্যঙ্গরিক কি বাহ্য উভয় প্রকার প্রয়োগেই কনীনিকার প্রবল সঙ্কোচন উৎপন্ন হয়, তারকামণ্ডলের পেশীর পদার্থে আক্ষেপিক ক্রিয়া দর্শিয়াই এই সঙ্কোচন উপস্থিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রান্ত উৎক্ষেপণ বা স্পন্দন দ্বারা তারকামণ্ডলের সঙ্কোচন জন্মে। দূরবর্ত্তী স্থানে দৃষ্টির উপযোগিতা সাধনেও ইহার ঈদৃশী ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্বারা গতিশক্তি-বিধায়িনী-স্নায়ুর প্রান্তদেশের পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া স্নেহ স্থানিক উপদাহ জন্মে তাহা হইতে পেশী-হৃৎকোর দুর্দম্য স্পন্দন উপস্থিত হয়। সেই কারণেই

অনিচ্ছায় ও পেশীর এক প্রকার ধলুষ্ঠকারের জায় অবস্থার উৎপত্তি হইয়া মূত্রাশয়, আমাশয়, ও অন্ত্র হইতে বারংবার শ্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে এবং অন্ত্রগুলি গ্রন্থিল হইয়া উঠে । সকল প্রকার নিঃশ্রবই, বিশেষতঃ অশ্রু ও লাল, কিয়ৎ পরিমাণে বিবদ্ধিত হয় । চক্ষুরূপরি ফাইজোষ্টিগমার ক্রিয়াই ইহার বিশেষ ক্রিয়া । চক্ষুর তারার অতিশয় সঙ্কুচিত ও অচল অবস্থা কেবল ফাইজোষ্টিগমা ও ওপিয়মই জন্মায় ।

**অধিকার ।**—পক্ষাঘাত, আভিযাতিক ধলুষ্ঠকার, কোরিয়া, লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া, উন্নতের সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত ; বেপথু ও পেশীর ক্রমিক শীর্ণতায়, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে ও কতকটা উপকার করিয়াছে । ধলুষ্ঠকার সদৃশ আক্ষেপ সহকারে পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রক্ত-সঞ্চয় ; এবং অশ্বের ধলুষ্ঠকার রোগে ইহা উপযোগী । হোমিওপ্যাথি মতে চক্ষুরোগেই এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় । নিকট-দৃষ্টি ; অন্ধিপুটের আক্ষেপ ; রেটিনার নিশ্চেষ্টতা ; ষ্ট্র্যাকিলোমা ; গ্লকোমা ; তারকা-মণ্ডলের ভ্রংশ ; কনীনিকার অস্বচ্ছন্দতা ; কনীনিকার ক্ষত ; কনীনিকার প্রদাহাদি চক্ষুরোগে ফাইজোষ্টিগমা ফলপ্রদ । ডাঃ এলেন উল্লেখ করিয়াছেন যে কনীনিকার সঙ্কোচন সাধনে ফাইজোষ্টিগমার অসাধারণ শক্তি থাকতে, কনীনিকার প্রান্তদেশের ক্ষত সহকারে সংস্থাপন, আইরিসের সংলগ্নতা এই ঔষধে বিচ্ছিন্ন হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

এই ঔষধের অধিকার সঙ্গীর্ণ হইলেও সুনিশ্চিত । সুব্যবস্থিত হইলে সত্ত্বরই প্রগাঢ়রূপে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় । ক্যালোবার বীনের বিষক্রিয়ায় প্রধানতঃ পৃষ্ঠবংশ আক্রান্ত হয় । ইহার মুখ্যক্রিয়ায় গতিশক্তিবাহিনী-স্নায়ু বা ইচ্ছায়ত্ত পেশীর এবং গৌণক্রিয়ায় ইচ্ছার অনায়ত্ত পেশীর পক্ষাঘাত জন্মে । কচিং গৌণতঃ মস্তিষ্ক ও অচিহ্নিত পেশীও আক্রান্ত হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, বা সাংঘাতিক মুচ্ছাবিশতঃ বিষাক্তব্যক্তির মৃত্যু হয় । 'এজন্ত তাণ্ডব, বেপথু, ধলুষ্ঠকারাদি আক্ষেপ, ও কোন কোন প্রকার চক্ষুরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । ডাঃ হামণ্ড বলেন যে যুবকদিগের বৈধানিকপরিবর্তন পরিশুদ্ধ বেপথুরোগে নিয়ন্ত্রণে ক্যালোবার উপযোগী । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতায় বা তাণ্ডবেও ইহার ওদ ক্রম ফলপ্রদ । ধলুষ্ঠকারের আক্ষেপে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলেও ইহা ব্যবস্থেয় । সেরিব্রোস্পাইনাল মিনিঞ্জাইটিস রোগে পেশীর পক্ষাঘাতে ক্যালোবারের ২৫ হইতে ৩৫ ক্রম ; এবং ধলুষ্ঠকারে পাঁচ হইতে দশবিন্দু মাত্রায় মাদার টিঞ্চর ৩৪ ঘণ্টা অন্তর ও উহার সহিত পর্যায়ক্রমে বা পরে সিকেলি পূর্বোক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ডাঃ হেল কতকগুলি দুরারোগ্য রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । কনীনিকার সঙ্কোচন ক্যালোবার বীনের একটা মুখ্য লক্ষণ ; এবং কনীনিকার প্রসারণ একটা গৌণ লক্ষণ । স্বয়ত্ত্ব বা ট্রিকনিয়া-জনিত ধলুষ্ঠকারের আক্ষেপও এতদ্বারা আরোগ্য হয় । চক্ষে-ক্যালোবারের বিশেষ ক্রিয়া, দর্শে । এই ক্রিয়া বেলেডোনার ঠিক বিপরীত । এতদ্বারা চক্ষু-তারা সঙ্কুচিত হইয়া



আলপিনের মাথার ভায় ক্ষুদ্রায়তন হয়। অস্থ চক্ষে ক্যালবার নিকট-দৃষ্টি জন্মায়; এবং দূর-দৃষ্টরোগে এতদ্বারা অল্পকালস্থায়ী উপকার দর্শে। উপত্যার ( আইরিস ) গোলাকার তন্তুর পক্ষাঘাত এবং অক্ষিপুটের পেশীর পক্ষাঘাত এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপজনিত ক্ষীণ-দৃষ্টরোগে ডাঃ উডিয়েট এই ঔষধ (এদ ক্রমে) অতিশয় উপকারী দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ এলেন বলেন যে অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপসহকারে চক্ষুর পাতার স্পন্দন লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ স্মরণ করা কর্তব্য। ডাঃ হেল দুই মাস কোষ্ঠবদ্ধের অনেক গুলি রোগী; এবং নিবৃত্তজন্মাদিগের আত্মান ক্যালবার ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ রিংগার উন্মাদদিগের সর্বাত্মক পক্ষাঘাতে ও পেশীর প্রবন্ধনশীল শীর্ণতার ক্যালবার বীনের সারের এক গ্রেণের ত্রিশভাগের একভাগ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া উপকার করিয়াছেন।

ডাঃ লিলিয়েস্থাল নিম্নলিখিত রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন।

**অন্ধতা।**—আংশিক অন্ধতা; লিখিতে চেষ্টা করাতে পংক্তি দর্শনে অশক্তি; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; অক্ষিগোলকের পেশীর পরিদোলনবশতঃ অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। **পৃষ্ঠবংশের মজ্জা-ক্ষয়।**—হাঁটিবার সময় জাঁহু হইতে নিম্নদিকে অদৃঢ়তা অল্পভব, তজ্জন্ত বিশেষতঃ চক্ষুবজ্রিয়া সাবধানে পা ফেলিতে হয়; যেখানে যাইতে হইবে সেখানে আগে দেখিয়া লইতে হয়; চলিতে ছড়ি অবলম্বন করিতে হয়; সরলান্ন ও উরুর অস্থির স্তব্ধতা; আলস্য; ও আত্মান থাকে। **হৃদ্রোগ।**—হৃৎপিণ্ডের পেশী-তন্তুর আক্ষেপিক কম্পন ও স্পন্দন; সর্ব শরীরের অভ্যস্তর দিয়া, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে স্পন্দন, বক্ষঃস্থলে ও শঙ্খস্থলে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন স্পষ্ট দৃষ্ট হয়; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার শিথিলতা, ও বেগের নূনতা, শব্দের স্বাভাবিকতা, মণিবন্ধের নাড়ীর বিষমতা ও দুর্বলতা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিষমতা, ক্ষীণতা, বা বিশৃঙ্খলতা। **পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর (স্পাইন্ডাল কর্ড) প্রদাহ।**—পৃষ্ঠবংশীয় রজ্জুর পক্ষাঘাতের রক্ত-সঞ্চয়ের অবস্থা, ও ধাতুজৈবিক আক্ষেপ; আকর্ষণ ও কর্ণগ্ন্যভব সহ গ্রীবার স্তব্ধতা; পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্বলতা, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অসামর্থ্য, স্তব্ধতা ও বেদনার পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে গতি, সোজা হইয়া যেন বসিতে পারা যাইবে না এজন্ত সম্মুখদিকে অবনত হইবার প্রবৃত্তি; অতি শ্রমাস্তিক শ্রান্তির ভায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি অল্পভব। **চক্ষু-প্রদাহ।**—অক্ষিপুটের পেশীর আক্ষেপ সহকারে অক্ষিপুটের স্পন্দন; চক্ষুর ব্যবহারান্তে বেদনা, মক্ষি-দৃষ্টি, ও শিখা-দৃষ্টি সংযুক্ত নিকট-দৃষ্টি রোগে পক্ষাঘাত।—বিধান-বিকার পরিশূন্ত বেপথু; ভাব-বিকার বা শরীর-বিকার বশতঃ যুবকযুবতীদিগের কম্প; মদিরা-মত্তের ভায় আন্দোলিত গত; মস্তক ও কটির চারিদিকে আবৃদ্ধন অল্পভব; পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা অল্পভব, এবং মস্তকের পশ্চাৎগা হইতে নিম্নাভিমুখে পৃষ্ঠের অভ্যস্তর দিয়া নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত উহার গতি, ও নিম্নাঙ্গে বাঁজি লাগার

জায় অল্পভব; যৎসামান্য পরিশ্রমে অতিশয় দুর্বলতার উৎপত্তি। **ধনুস্কান :**— এই ঔষধে দেহ-কাণ্ডের ও দেহ-শাখার পেশীর আক্ষেপ শিথিল করে। **শিরোঘূর্ণন :**— মস্তকের আকৃষ্টন অল্পভব, শরীরের জড়তা, ও বুদ্ধিভংশের আশঙ্কা সহকারে শিরোঘূর্ণন। বেড়াইবার ও পড়িবার সময় উহার আধিক্য; দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—মনের অসাদারণ ক্রিয়ালীলতা (সিদ্ধ, কফি)। চিন্তা করিতে আটাস; মন একাগ্র করিতে পারা যায়না (জেল)। কিছুই ঠিক নহে; গৃহে অনেক দ্রব্য, এরূপ মনে করা; সতত উহা গণনা করা।

**মস্তক।**—বিশৃঙ্খলা ও ঘূর্ণন; গৌরব, জড়তা ও অগ্রসন্নতা অল্পভব। অগ্রথব গৌরববিশিষ্ট শিরোবেদনা। হুই চক্ষুর উপরেই অসহ্য বেদনা (সিদ্ধ, চিন-সুল)। সম্মুখ-ভাগে তীব্র শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ প্রাতে (কালী-বাই, ভাট-মিউ, নক্স-ভগ)। মস্তকের সম্মুখদেশে ও শঙ্খদেশে রক্তের প্রধাবন অল্পভব (বেল, গ্লন)। শঙ্খদ্বয়ে স্থতীর সঞ্চরমান বেদনা। শঙ্খস্থানের ধমনীর ও গ্রীবা-পার্শ্বস্থ বৃহৎ ধমনীর দপ দপ (\* বেল)। মস্তকের শিখরে ও উভয় শঙ্খস্থলে উগ্র, বেদনাবিশিষ্ট প্রচাপন, মস্তক-শিখরের প্রচাপনের মস্তকের পশ্চাত্তাগপর্য্যন্ত প্রসারণ; তজ্জন্ত শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

**চক্ষু।**—প্রথম দক্ষিণ, তৎপরে বাম চক্ষুর প্রদাহ; চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লীর ক্ষয়, আরক্ততা ও ক্ষীণতা; অক্ষি-গোলকে বেদনা ও যাতনা; অক্ষিপুটে ক্ষত অল্পভব। চক্ষুতে তীক্ষ্ণ সঞ্চরমান বেদনা ও আকর্ষণ, পাক দেওয়া অল্পভব। এক পার্শ্ব হইতে অগ্নি পার্শ্ব সঞ্চালিত হইলে চক্ষে বেদনা (ব্রাই, \* স্পিজি)। অক্ষি-গোলকের শিখরের উপর গভীর স্থানে বেদনা, অভ্যন্তরের কোণ হইতে দক্ষিণ দিকের উন্নত স্থান পর্য্যন্ত, অনন্তর নিম্নাভিমুখে তির্য্যগ্ভাবে বহির্দিকে শঙ্খস্থলের মধ্যে, সেই বেদনার প্রধাবন। \* মধ্য-পেশীর কাগি প্রকৃতরূপে হয়না বলিয়া বোধ হয়, চক্ষুর মধ্য-দণ্ড (এক্সিস) হুই চক্ষে একরূপ থাকেনা; চক্ষু দুর্বল বোধ হয়, ও অশ্রুপাত হয়। অপরিচ্ছন্ন, কুজ্জটিকাবৃত দৃষ্টি (\* কষ্ট, ফস, মার্ক), চক্ষুর উপর পাতলা পরদা (ছানি) (\* পলস); দৃষ্টবস্তু মিশ্রিত দর্শন; তৎপরে চক্ষুর উপরে ও উভয় চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অল্পভব বেদনা। কৃষ্ণ ও শুভ্র উভয়প্রকার মক্ষি-দৃষ্টি (এগে)। অক্ষি-কোটরের পশ্চাত্তাগে অবিরাম বেদনা, মস্তকের পশ্চাদেশ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; অধায়েনে অতিশযা, ও বিবমিবার উৎপত্তি। অক্ষিপুটের গুরুত্ব (কোনা, কষ্ট); উত্তোলন সহ করিতে পারা যায়না; অক্ষি-পুটের স্পন্দন (এগে)। \* চক্ষুর তারার সঙ্কোচন (মার্ক-কর, \* ওপি, ফস, ফাইটো)। আলোকে চক্ষুর অল্পভবাধিক্য (\* এক, \* বেল, \* সল.)। নিকট-দৃষ্টি। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; দ্বিতদৃষ্টি; অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট দৃষ্টি; কুজ্জটিকাবৃতবৎ দৃষ্টি।

কর্ণ ।—কর্ণে তীব্র, সঞ্চারমান বেদনা । হিস্ হিস্, ভন্ ভন্ ও ঠন্ ঠন্ শব্দ ।

নাসিকা ।—তরল প্রতিশ্রাব্য, হাঁচি; নাসারসের জ্বালা, টাটানি, চুলকানি, ও বিনবিনি; নাসিকার আবদ্ধতা ও উত্তপ্ততা ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা; মুখ-রাগ ( ফির ) । মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে দায়ু-শুলের বেদনা । মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে সঙ্কোচন অনুভব ।

মুখ-মধ্য ।—জিহ্বার বন্ধুরতা ও অগ্রভাগে ক্ষত । জিহ্বার প্রান্তভাগে টাটানি; জিহ্বা দগ্ধবৎ অনুভব ( \* আইরিস ) । জিহ্বার লেপাচ্ছন্নতা, মূলদেশে উহার অধিকতর গাঢ়তা । জিহ্বার ও গুষ্ঠের অবশতা ও বিনবিনি, এবং সর্বদা উহা আর্দ্র করিবার ইচ্ছা । মুখের বিরসতা । প্রভূত লাল-নিঃসরণ; গাঢ়, চর্মবৎ লাল । অনায়াসে কথা বলা যায়না ( কষ্ট, কোনা, জেল, হাইও ) । গিলিবার শক্তি না থাকার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কথা বলিবার শক্তির বিত্তমানতা ।

গল-মধ্য ।—গলা-বেদনা, গিলিতে বেদনা; তালু-মূল ও কোমল তালুর মলিন আরক্ততা, জ্বালা, চাঁচা, ও অবদরণ অনুভব; দীর্ঘাভূত অলিজিহ্বা; গল-কোষে পীতবর্ণ কেন্দ্র সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত । গলাধঃকরণকালে গলা হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা ( ফাইটো ) । গলায় যেন একটা গোলা আসিয়াছে এরূপ অনুভব ( \* এসা, \* লাই ) । হৃদ-নিঃস্র-গ্রন্থির ক্ষীততা ও কোমলতা ।

আমাশয় ।—ক্ষুধাহীনতা, আহার, তামাক ও কফি, \* বিশেষতঃ শীতল পানীয় দ্রব্যে অরুচি । স্বাদশূন্য উদগার । বিবগিয়া ও বমন । আমাশয়ে কণ্টক-বেধবৎ তীব্র বেদনা; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের জ্বায় গোরব ও ভার; কামড়ানি; শূন্যতা ও দুর্বলতা; এবং স্নায়বীয়তা ও কম্পন অনুভব । আমাশয়-প্রদেশে স্পর্শ-দেহ ।

উদর ।—কুক্ষিদ্বয়ে ছুরিকা দ্বারা কর্তনের জ্বায় যাতনা । প্লীহা-প্রদেশে বেদনা । নাতী-প্রদেশে বেদনা ও স্পর্শ-দেহ । উদরের বামপার্শ্বে হৃদী-বেধ । উদরের অতিশয় ক্ষীততা ও কুঞ্জন, এবং অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ ( এলো, \* লাই ) । উদর-বেদনা, বোধ হয় যেন অতিসার হইবে । ( এলো ) । উদরের নিম্নাংশে তীব্র কর্তনবৎ বেদনা । কুচকীতে অনুগ্রহ বেদনা ।

মল ও মলদ্বার ।—মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর ক্ষীততা ও দৃঢ়তা; মলত্র্যাণে বাতনা; সরলাস্ত্রের নির্গমন; ক্ষীততা ও অতিশয় স্পর্শ-দেহ; অর্শ-বলির শক্ততা, নির্গমন-শীতলতা, ব্যথিততা ও অতিশয় অনুভবাবিক্য । অতিসার সহকারে কুহ্নন ও জ্বালা; অধিকন্তু মূত্রাশয়ের কুহ্নন ( \* মার্ক-কর ) । প্রভূত; নরম, পাতলা; জলবৎ; ক্রৈবৎ পীতবর্ণ; পৈত্তিক; কপিশ, আলকাতরার জ্বায় কাল; দলাদলা; . এবং মলিন ও দুর্গন্ধি; মল । কোষ্ঠীবেধ ।

মৃত্ত-যন্ত্র ।—বৃক্ষক প্রদেশে ষষ্ঠ্যং অনুভব । মৃত্তাশয় প্রসারিত অনুভব । বারবার  
অধিক মৃত্ত্যাগ ( ফস-এসি ) । পীতবর্ণ ; রক্তবর্ণ ; তীব্র-গন্ধ ; পরিষ্কার কর্দমাকার ; মৃত্ত ।

স্ত্রী-জননেদ্রিয় । খেত প্রদর; জরায়ুর রক্তশাব। রজ-নিঃসরণের ত্রায় বেদনা।  
০ অনিয়মিত রজঃ। ঋতুকালে হংকম্প; এবং চক্ষুতে রক্ত-সঞ্চয়, শরীরের দৃঢ়তা, দীর্ঘ  
নিঃখাসের ত্রায় শ্বাস, ও সংজ্ঞা সহকারে সবল আক্ষেপ।

শ্বাস-যন্ত্র।—গলা তুড়তুড় করিয়া কাসের উপস্থিতি। আয়াসিত, দীর্ঘনিঃশ্বাস সংযুক্ত শ্বাস; জন্তণ। বক্ষঃস্থলে হুটী-বেধ।

হুংপিঙ ও নাড়ী :—হুংপিঙের চতুর্দিকে অম্লগ্র বেদনা, অবচ্ছদতা ও যাতনা ( ডিজি )। ০ সর্বশরীরের অভ্যন্তর দিয়া নাড়ীর স্পন্দন অল্পভব সহকারে প্রবল হুংকম্প ( \* এক, ক্যাঙ্ক )। বামপার্শ্বে শয়নে হুংপিঙের ক্রিয়ার অসমতা ও গগুগোল ( \* ডিজি ), চিং হইয়া শয়নে উহার শাস্তি। পরিবর্তনীয়; বিবদ্ধিত বেগ; ক্ষুদ্র, অনতি-দ্রুত, গবিরাম; নাড়ী।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবায স্তব্ধতা। মাথা ঘুরাইলে ঘাড়ে আকর্ষণ। ঘাড়ে বাতের বেদনা। পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্বলতা, সোজা হইয়া দাঁড়ান যায়না। পৃষ্ঠে অনুগ্রহ বেদনা। মস্তকের পশ্চাদ্বেশ হইতে পৃষ্ঠবংশের নিম্ন পর্য্যন্ত অবশতা। পৃষ্ঠবংশের উর্দ্ধে ও নিম্নে খল্লীর ত্রায় স্থচী-বেধ। দক্ষিণ স্বদ্ধাস্থির নীচে বেদনা (\* চেলি)। কটদেশে অনুগ্রহ ভারাক্রান্ত-বৎ বেদনা ; বাম কুচকীর উপরে, পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত, ঐ প্রকার বেদনা। ত্রিকদেশে বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—অঙ্গে, অতিশয় শ্রান্তির পরবর্তী ক্রান্তির ছায় ক্রান্তি (ক্যাং-কা, সিঙ্ক)। সমস্ত অঙ্গে অবশতা ও পক্ষাঘাতবৎ অল্পভব (এক)। অঙ্গে দ্বায়বীর বেদনা। সন্ধিতে স্তব্ধতা বা ঘূর্ণবৎ অল্পভব। আন্দোলিত গতি। হাঁটবির সময়, বিশেষতঃ চক্ষু বুজিয়া হাঁটবির সময়, জান্ন হইতে নিম্নাভিমুখে অস্থিরতা।

দেহ।—অতিশয় শ্রান্তি ও ক্লান্তি অহুভব; হ্রস্বলতা (\* আস', \* সিদ্ধ)। আক্ষেপিক স্পন্দন (\* এগে, সিকু, ষ্ট্রাম)। সর্বশরীরে প্রবল কম্পন (এট-টাট)। পেশীমণ্ডলীর অতিশয় অবসন্নতা। শীতলজলের ভয় বশতঃ স্নান বর্জন। সমস্ত শরীরে শুষ্কতা ও বেদনা। শরীরের নানাস্থানে উগ্র, তীব্র বেদনা।

নিদ্রা।—নিদ্রার দুর্নিবার ইচ্ছা; প্রগাঢ় নিদ্রা ( \* ওপি )। স্বপ্নসংযুক্ত, অস্থির নিদ্রা।

জ্বর।—পৃষ্ঠে শীতাহ্রুব; হাত পা শীতল (সিলি, ভিরে); শীতল, আঠা আঠা চর্ম।  
মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপ; মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা। হাতে শুষ্ক, জ্বালাকর  
উত্তাপ। সহজে ঘর্ম নিঃসরণ। সর্বগায়ের বিন্দু বিন্দু শীতল ঘর্ম। জননেন্দ্রিয়ের চালাকতা, ক  
উগ্র-গন্ধ ঘর্ম।

উপচয় ।—অধিকাংশ প্রাতে ; পরিশ্রমে ; ও মানসিক চেষ্টায় বৃদ্ধি ।

উপশয় ।—বিমুক্ত বায়ুতে ও হাঁটলে ; চক্ষু বজ্রিয়া থাকিলে ; শাস্ত হইয়া থাকিলে ; উষ্ণ গৃহে ; ক্যান্ফর আচ্ছাদে ; ও আদিকা বাবহারে উপশয় ।

সমগুণ ।—এগে, এট্রো, জেল, জাবো, নক্স-ভম, ওপি, ট্রুম, ট্যাবে ।

## ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস ।

ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদ্র-কূলে এই সামুদ্রিক উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। সচরাচর ইহাকে সি-রাক বলে। ঔষধার্থে শুষ্ক উদ্ভিদের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

মেদ রোগ অর্থাৎ অতি স্থূলত্বে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিয়ায় আহার-পরিপাক কালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা, উদরোদ্ধি দেশে পূর্ণতা ও গোরব, এবং মস্তকাভিমুখে বলকে বলকে তাপের গতি জন্মে না। আশাশয়ের ক্রিয়ার অধিকতর ত্রুততা জন্মে ও ক্ষুধা বর্ধিত হয়। আশ্বাস দূরীকৃত হয়। মূত্রের পরিমাণ, গন্ধ ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়। ছই তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবনের পর মূত্রের আরও আধিক্য জন্মে, এবং উহার উপরে এক প্রকার কাল সর দৃষ্ট হয়। মূত্রাতিশয্য ও মূত্রে কাল সর প্রকাশ পাইলেই রোগীর স্থূলত্ব ক্রমে ক্রমে কম পড়িতে থাকে। শরীরের গুরুত্ব ছয় সাত সের হইতে পনের সের পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। যাহার যে স্থানে অধিক মেদ সঞ্চিত থাকে সেই স্থানই শীর্ণ হয়। কাহার বক্ষঃস্থল, কাহার উদর, কাহার গ্রীবা, কাহারও বা হৃৎকের শীর্ণতা জন্মে। এই ঔষধে স্নেহকার্য ব্যক্তিদিগের মেদের লাঘব হয় না, কিন্তু শিথিল মেদময় বলি, অলিঙ্গিত উদর, ও শীতল আঠা আঠা গাত্রত্বকবিশিষ্ট নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিদিগেরই উপকার দর্শে। এই মেদ-ক্ষয়ে স্বাস্থ্যের ব্যাবাত জন্মে না এবং শরীর লঘু ও কন্ম-ক্ষম হয়। এতদ্বারা মেদ-রোগের আত্মযজ্ঞিক অগ্নিমান্দ্য ; কোষ্ঠবদ্ধ ; শ্বাস-ক্লচ্ছ ; হৃৎকম্প ; খাটু-বৈলক্ষণ্য ; মূত্রাণয়ের উপদাহ, প্রভৃতি উপসর্গও দূরীকৃত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই ঔষধ ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগকেও স্থূল করে। সমীকরণ-ক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া এতদ্বারা অধিক মেদের লাঘব ও অল্প মেদের আধিক্য জন্মিয়া শরীর স্বাভাবিক ও স্নেহ হইয়া উঠে, এবং হৃষ্ট-পূর্ণ হয়। মেদ-রোগে ফিউকাস ব্যবহার কালে স্নাত্তি বসাদ্রব্য, চিনি ও মদিরা সেবন নিষিদ্ধ। প্রতিদিন তিনবার একত্রাম মাত্রায়, জলে মিশ্রিত করিয়া সেব্য। ট্রুম বা গণ্ডমালা-দোষেও ইহা উত্তম ঔষধ। প্রত্যহ তিনবার ত্রিশবিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

## ফেলেণ্ড্রিয়ম একোয়াটিকম ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতার্থে ফেলেণ্ড্রিয়মের সুপক্ক ফল ব্যবহৃত হয় । ফেলেণ্ড্রিয়ম ইহার সমজাতীয় উদ্ভিদ সিকিউটা ও ইনাছির স্থায় ক্রিয়া করে ।

### প্রধান প্রধান আয়ুর্গিক প্রয়োগ ।

**শিরোবেদনা ।**—মস্তকের শিখরদেশে প্রস্তুত বা সীসের স্থায় ভারী বস্তুর চাপ সদৃশ বেদনা, চক্ষুর উপরিভাগে ও শঙ্খদেশে ব্যথা ও জ্বালা ; চক্ষুতে বেদনা ও শুষ্কমণ্ডলে রক্তসঞ্চয় ; চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ ; শব্দে ও আলোকে বিদেহ লক্ষণাপন্ন দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র শিরঃপীড়ায় ফেলেণ্ড্রিয়ম উপকার করে । শিরঃপীড়ায় নেত্রগামী-স্নায়ু আক্রান্ত হইলেই এই ঔষধ উপযোগী । **স্তন-বেদনা ।**—ফেলেণ্ড্রিয়ম স্তনের দুগ্ধবাহী নলে তীব্র বেদনা জন্মায় । অতএব স্তন্যদানের অন্তর্বর্তী সময়ে দুগ্ধবাহী নল-পথে বেদনার গতি ও আতিশয্য হইলে ইহা স্তন-বেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । **যক্ষ্মা ।**—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় নিষ্ঠীবনের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধে ফেলেণ্ড্রিয়ম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ডাঃ গিলিয়েস্‌হাল দক্ষিণ ফুসফুসের ক্ষত ; খাসে হিস্‌হিস্‌ শব্দ ; অবিরত কাস, প্রভূত ঘণ, অতিসার, ভুক্তদ্রব্য বমন ; প্রভূত পুষ্ণময় নিষ্ঠীবন, ও শরীরের শীর্ণতা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । **রজ-কৃচ্ছ্র ।**—রজকৃচ্ছ্র রোগে কেবল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে রজস্রাব ফেলেণ্ড্রিয়মের বিশেষ লক্ষণ । **প্রস্রাব-বিকল বেদনা ।**—স্তন্যদানের মধ্যবর্তী সময়ে প্রধানতঃ বেদনার উপস্থিতি এই ঔষধের লক্ষণ । **কাসাদি ।**—কাস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও কখন কখন ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । দ্রুত খাস, কাস বশতঃ দিবারাত্রি উষ্ণিমা বসিমা থাকা লক্ষণে ব্রঙ্কাইটিস ও এম্ফিসিমা রোগে ইহার প্রয়োগ লক্ষণ ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—\* মস্তকের শিখরদেশে যেন একটা কঠিন দ্রব্য বা ভার অবস্থিত রহিয়াছে এরূপ গৌরব ও বেদনা, তৎসহ শঙ্খদ্বয়ে ও চক্ষুদ্বয়ের উর্দ্ধে অবিরাম বেদনা ও জ্বালা, চক্ষুর জ্বালা ও রক্ত সঞ্চয় । অশ্রুপাত । আলোক বা শব্দ সহ্য করিতে পারা যায় না । \* শিরঃপীড়ায় নেত্রগামী-স্নায়ু আক্রান্ত হয় এবং ব্রঙ্করুদ্ধে একপ্রকার পেষণবৎ অনুভব জন্মে । \* কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রভূত রজস্রাব । \* দক্ষিণ স্তনের অভ্যন্তর দিয়া বুকাছির নিকটে ভেদনবৎ বেদনা, স্ফুঙ্কের সন্নীপে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উহার সংপ্রসাৰণ এবং খাস-ক্রিয়ার উপচয় ।

## বিউফোরাণা — বিউফো ।

বিউফো একপ্রকার ভেদক জাতীয় জন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে । ইহার গাত্র হইতে তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয় । এই তৈল বিধাক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । রাণা বিউফোকে উত্তেজিত করিয়া উহার স্বকের গ্রন্থি হইতে এই বিষ সংগ্রহ পূর্বক ঔষধার্থে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় ঝায়ু মণ্ডলে বিউফোর ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্বারা নীতিবৃত্তি ও গতি-শক্তি-বিধায়িনী ঝায়ু আক্রান্ত হয় । ইহার ক্রিয়ায় নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যকে পশু প্রায় করিয়া তোলে । মাদক দ্রব্য সেবনের আকাজ্জক উদ্ভিক্ত করে, এবং কৃত্রিম মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদনার্থে নির্জন স্থান অন্বেষণের প্রবৃত্তি জন্মায় । এতদ্বারা ধ্বজভঙ্গ জন্মে ; এবং অপস্মারের অনুরূপ এক প্রকার অবস্থার উৎপত্তি হয় । ডাঃ জেসেন লিখিয়াছেন যে অত্যন্ত শীতানুভব এই ঔষধের অপরিবর্তনীয় লক্ষণ ।

### প্রধান প্রধান আয়মিক প্রয়োগ ।

অপস্মার ।—আমেরিকার আদিমনিবাসিনী কামিনীরা স্বামীর দুর্দম্য ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি বশতঃ ক্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্ষীণতা জন্মাইবার জন্ত পানীয় দ্রব্যে এই তৈল মিশ্রিত করিয়া দেয় । হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষার রীতি অনুসারে বিউফো পরীক্ষিত হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষায় কতকগুলি কদর্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে । এতদ্বারা এক প্রকার চিত্তদৌর্বল্য ও লজ্জাশূন্যতা, এবং কৃত্রিম মৈথুনের ছনির্বীর প্রবৃত্তি জন্মে । কৃত্রিম মৈথুন বা স্বাভাবিক সংসর্গের পর অপস্মার রোগের ত্রায় আক্ষেপ উপস্থিত হয় । রতি-ক্রিয়ার সময়ও প্রবল টঙ্কার জন্মিতে পারে । অপস্মারের আবেশ উপস্থিত হইবার পূর্বে যে এক প্রকার “সর সর” অনুভূত হয়, বিউফোর লক্ষণে তাহা জননেন্দ্রিয় হইতে উথিত হইয়া থাকে । অতিরিক্ত কামোত্তেজনাঞ্জনিত বা সোলার প্লেগস ( কড়া ) হইতে সমুদ্ভূত অপস্মারেই এই ঔষধে অধিক উপকার দর্শে । এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে রোগীর একপ্রকার মানসিক উপদাহিতা উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় সে অস্বস্তি অর্থশূন্য বাক্য বলে ; ও তাহার এই সকল কথা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া সে বিরক্ত হয় । আক্ষেপের পরে রোগীর প্রগাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে । ডাঃ হেল বলেন যে তিনি অপস্মার রোগে বিউফো ব্যবহার করিয়া কোন ফলপ্রাপ্ত হন নাই । ডাঃ লিলিয়ানহাল হস্ত মৈথুনের পরবর্তী অপস্মারে ; রোগীর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নির্জন স্থানে যাইবার ইচ্ছা ; স্বখানুভব ব্যতীত দ্রুত শুক্রস্রাব, এবং তৎসহকারে আক্ষেপ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কষ্টকর শ্রান্তি ; পূর্বাৎপত্তি সংযুক্ত অপস্মার ; প্রধানতঃ চন্দ্রের পরিবর্তনে, ঋতুকালে, ও নিদ্রাবস্থায় রোগের আবেশ,—এই সকল লক্ষণে বিউফো ব্যবহারের বিধি, দেন । ডাঃ কাউপারগোয়েট লিখিয়াছেন যে এই ঔষধে অপস্মার আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ।

যখন রতি-কালে রোগের আবেশ উপস্থিত, অথবা কৃত্রিম-মৈথুনের কুফল স্বরূপ উহার উৎপত্তি হয় তখন বিউফো বিশেষ উপযোগী। ডাঃ লিল বলেন যে ভয় জনিত অপস্মারে ইহা উপকারী। ঋতু-কালে অপস্মারের আক্রমণেও বিউফো ব্যবস্থ্যেয়।

**পেরিটোনাইটিস।**—কয়েক বৎসর অতীত হইল একজন পেরিটোনাইটিস গ্রস্ত রোগীর পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইত এবং অবশেষে স্তম্ভি, অচৈতন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা, ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইত। ডাঃ পেইন বিউফো ব্যবহার করিয়া এই রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে একজন ক্রীলোকের গাত্র-ত্বকে, গলার অভ্যন্তরে, ও যোনিতে পুষ্পাষী ফোকা সহকারে আক্ষেপ লক্ষণ ছিল, তাহার উদরে এতই অল্পভাবধিক্য ছিল যে, তাহার বোধ হইত উদরেও এই প্রকার ক্ষত জন্মিয়াছে, বিউফো সেবনে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

**অন্যান্য রোগ।**—লসিকা-বাহিনী নাড়ীতে বিউফোর স্থানিচিত ও সত্ত্বর প্রভাব প্রকাশিত হয়, এবং সেই সকল নাড়ীর গতি-পথে এক প্রকার দ্বিঘৎ নীলবর্ণ ক্ষীততা জন্মে। অভিঘাত হইতেও উহা উৎপন্ন হয়। দূষিত পচ্যমান ব্রণে, মুখে বা গালে ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইলে বিউফো ব্যবস্থা করা যায়। স্তনের কল্কট-প্রকৃতির দৃঢ়তায় ইহা প্রয়োজিত হইয়া ফল দর্শাইয়াছে। অন্যান্য চর্ম্ম রোগে; মস্তিষ্কের কোমলতা-প্রাপ্তির প্রারম্ভে বিউফো ব্যবহৃত হইয়াছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**ঘনাদি।**—অবিরত মত্ততার গ্রাঘ অল্পভব; স্নায়বীয়তা; কোপনতা; তন্ম্রা-দোষ (কোমা)। মত্ততাবৎ শিরোঘূর্ণন। তন্ম্রালুতা; মিড্রালুতা; মিড্রাহীনতা; অস্থির নিদ্রা; প্রতি মুহূর্ত্তেই জাগরণ; অধিক স্বপ্ন দর্শন। (সহানুভূতি জনিত রোগে)।

**মস্তকাদি।**—কেশ-পতন; সম্যক ইন্দ্রলুপ্ত (বল্ডেন্স)। গৌরববিশিষ্ট, অচৈতন্যকর; একপার্শ্বিক; কপালাদিতে অবস্থিত শিরঃপীড়া। চক্ষু।—আক্ষেপিক বেদনা; অক্ষিপুটের ক্ষত। কর্ণ।—অতিরিক্ত অনুভূতি; বেদনা; শ্রাব-নিঃসরণ। নাসিকা।—আরক্ততা, ক্ষীততা; পচ্যমান পীড়কায় আচ্ছন্নতা। বদন।—পাণ্ডুর, পীত, ধূসর বদন; বহিরাগত চক্ষু। ওষ্ঠ।—শুল্ক, রক্তস্রাবী; প্রকম্পিত ওষ্ঠ (টাক, মাথাধরা, চক্ষু-উঠা, কানের প্রদাহ প্রভৃতি রোগে)।

**স্নায়ুশুল্ক।**—স্নায়ুর ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি; দুর্বলতা; জ্বালাকর বেদনা। শুষ্ক-বায়ুর লক্ষণ; আক্ষেপাদি; পক্ষাঘাত। (হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, স্নায়বীয় দুর্বলতা; বিশেষতঃ অপস্মার রোগে)।

**রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র।**—প্রবল হৃৎকম্প; রক্তের নিশ্চিত বিঘাততা। ক্রমাগত অত্যন্ত শীতানুভব; কম্পন; মুখমণ্ডলে উত্তাপ; শীতল ঘর্ম্ম; রাত্রিতে ঘর্ম্ম। (শীতের প্রাবল্য বিশিষ্ট সবিরাম জরে)।



শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রে সমধিক শ্লেষ্মা; ক্ষত; শ্বাসে আয়াস ও ঘড় ঘড় শব্দ। গলায় জ্বালা সহকারে শুষ্ক কাস। বক্ষঃস্থলে জ্বালা; তীব্র হৃদী-বেধবৎ যাতনা (প্রাদাহিক রোগে)।

মুখ-মধ্য ।—মুখ-বিবরে বেদনা; দুর্গন্ধ; ফোকা; দন্ত-বেদনা; জিহ্বার উত্তপ্ততা ও ব্যথিততা; গল-মধ্যের শুষ্কতা, উত্তপ্ততা, ও ক্ষত। ক্ষুৎ-পিপাসার অভাব; তিক্ত, মন্দ আশাদ।

আমায় ।—উদগার; বিবমিষা, বমন, অশিথিলতা, ও জ্বালাকর বেদনা।

উদর ।—ক্ষীততা; বাতান্বিত; শীতলতা অস্বভব; উদর-বেদনা; প্লীহা ও যকৃত বেদনা।

মূল ।—বারবার নিফল মল-প্রস্রুতি, কিন্তু স্বল্প মল নিঃসরণ, অনৈচ্ছিক অতিসার। (মূথের উপক্ষত, শীতাদজ্বনিত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, অতিসারাদি রোগে)।

মূত্র-যন্ত্র ।—বৃদ্ধকে ও মূত্রাশয়ে বেদনা; অবিরত মূত্র-বেগ। প্রভূত; স্বল্প; গাঢ়, পীতবর্ণ মূত্র। (মূত্র-যন্ত্রের প্রাদাহিক রোগে)।

জমন-যন্ত্র ।—(পুং) দুর্বলতা; শক্তিশূন্যতা; উপস্থের ক্ষীততা ও প্রদাহিততা। (স্ত্রী) নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত পূর্বে প্রভূত রক্ত-স্রাব; গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে বেদনা, পুষ-ময় প্রদর; ভগ কণ্ডূরন। (অতি-রক্ত, রক্ত-কৃচ্ছ্র, প্রদর, জরায়ু প্রদাহ, ও ডিম্বাশয়-প্রদাহে)।

দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—দুর্বলতা ও অবশতা; জ্বালাকর, কর্তনবৎ বেদনা; আক্ষেপ। গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে স্তম্ভতা ও বেদনা। হৃৎকের ত্রিকোণ-পেশীর কম্পন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা ও দুর্বলতা, নিম্নাঙ্গের ক্ষীততা। (দ্বায়বিক ও আমবাতিক রোগে)।

ত্বক্ ।—প্রবল কণ্ডূরন, উত্তাপ ও জ্বালা। ত্বকের জঁষৎ পীতবর্ণ; অস্বস্থতা; অপচ্যমান ও জলপূর্ণ ফোটবৎ উদ্বেদ; ক্ষীততা; পুৰ্বোৎপত্তি। (চর্মের অস্বস্থতায়; ও দূষিত ক্ষতাদিতে)।

উপচয় ।—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

উপশয় ।—শয়ন-কালে; ও রাত্রিতে উপশম।

সমগুণ ।—এগস, কোনা, ল্যাক, ফস।

## বেঞ্জোয়েট অব এমোনিয়া—এমোনিয়া বেঞ্জোয়াস।

সলিউশন অব এমোনিয়া, বেঞ্জোইক এসিড, ও পরিস্কৃত জল মিশ্রিত করিয়া মুছ উত্তাপে শোষণ পূর্বক এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণ; পরিস্কৃত জলে অরিষ্ট; এবং তৃতীয় দশমিক পর্য্যন্ত জল সহকারে ক্রম প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বেঞ্জোয়েট অব পোটাসাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

ডাঃ টড আরক্ত জরের পরবর্ত্তী শোথ রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন । অতিশয় অল্প, মলিন আরক্ত, রক্তের স্থায় দৃশ্যমান, তীব্র-গন্ধ, এবং আরক্ত, গাঢ় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ । বালকদিগের এষুমিহুরিয়া জনিত শোথে, স্বল্প, মলিন, ধূমের স্থায় দৃশ্যমান মূত্র লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী । এই প্রকার মূত্র-লক্ষণে আমবাত বা গ্রন্থিবাত ( গাউট ) রোগেও এই ঔষধ ফলপ্রসূ । গাউট রোগে ক্ষুদ্র সন্ধির আরক্ততায় ও ক্ষীততায়, অথবা পদের অঙ্গুষ্ঠে রস-সঞ্চয়ে ; এবং হস্তের অঙ্গুলী-সন্ধিতে লিখেট অব সোডা সঞ্চয়ে ডাঃ সিমুর এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন । ডাঃ হেল বলেন যে তিনি বাতে এতদ্বারা সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । কোন কোন রোগীর পক্ষে বেঞ্জোয়েট অব পোটাসা ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা ভাল ফল দর্শিয়াছিল । পিত্তনিঃস্রবের অভাব বশতঃ কিন্তু পিত্তনালীর প্রতিবন্ধকতা বশতঃ নয়, যে পাণ্ডুরোগ জন্মে তাহাতে পূর্বোক্ত মূত্র-লক্ষণ থাকিলে বেঞ্জোয়েট অব এমোনিয়া বা বেঞ্জোইক এসিড বিশেষ উপকারী । ডাঃ ম্যাকএকি বলেন যে যকৃদ্রোগজনিত শোথে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । ডাঃ হেল বয়ঃপ্রাপ্ত দিগের পক্ষে প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ, এবং বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় দশমিক ক্রমেরবিচূর্ণ ব্যবহার করেন ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—মস্তক ও বাড়ে বাতের বেদনা । ০ ( শোথরোগে ) মস্তকের গুরুত্ব ও জড়ত্ব । মুখমণ্ডল ।—ক্ষীত চক্ষুর পাতা সহকারে মুখমণ্ডলের ক্ষীততা । মূত্রযন্ত্র ।—  
\* অতিশয় অল্প, মলিন রক্তবর্ণ, রক্তের স্থায় দৃশ্যমান, এমোনিয়ার উগ্র গন্ধ, এবং আরক্ত গাঢ় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র । অল্প, মলিন, ও ধূমের স্থায় দৃশ্যমান মূত্র । ঘনঘন মূত্রপ্রবৃত্তি, ও অল্প অল্প মূত্রশ্রাব । মূত্রের উগ্রতা ও উপদাহিতা ( মুখ্যফল ) । বার বার প্রভূত মূত্রশ্রাব । পরিষ্কার প্রচুর মূত্র । মূত্রে অধঃপতিত পদার্থের তিরোভাব ( গৌণ-ফল ) । \* রাত্রিতে শয্যায় প্রস্রাব । \* আমবাতিক রোগে স্বল্প ও রক্তের স্থায় লাল মূত্র । ০ শিশুদিগের মূত্রোপজব । ০ আরক্ত জ্বর বা ব্রাইটস ডিজিজের পরবর্ত্তী শোথ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।—০ বাহ, জজ্বা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আমবাতিক পীড়া । ০ জন্মবার শোথ জনিত ক্ষীততা । ০ পিত্ত নিঃস্রবের অভাব জন্ম ( কিন্তু পিত্তপ্রণালীর অবরোধবশতঃ নয় ) পাণ্ডু । গাউট রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির আরক্ততা ও ক্ষীততা, অথবা পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে তরল পদার্থের সঞ্চয় ; হস্তের অঙ্গুলীর সন্ধিতে লিখেট অব সোডা সঞ্চয় । ০ এষুমিহুরিয়া বা সাণ্ডাল-মূত্র ; প্রকৃত শোথে ইহা ব্যবহারে এষুয়েনের ন্যূনতা ।

সমগুণ ।—বেঞ্জোয়িক এসিড, কলচিকম, ফেরি-মিউর, লাইকো ( ? ) ।

## ব্যাডাইএগা—ফেশওয়ার স্পঞ্জ ।

এই স্পঞ্জ কসিয়ার মুহুগামী শ্রোতে পাওয়া যায় । জ্বক স্পঞ্জ হইতে অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ।**—ব্যাডাইএগাতে চুণ, সিলিকা ও এলুমিনা প্রভৃতি উপাদান আছে । এজন্ত হ্যানিম্যান ইহা সোরা-দোষন্ন মনে করিতেন । রক্তে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া গণ্ডমালা-দোষের অনুরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়, এবং অনেক বিষয়েই স্পঞ্জিয়া অফিসিনেলিসের ক্রিয়ার সহিত ব্যাডাইএগার ক্রিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ।

ফ্যারিংটন বলেন যে লসিকাবাহি-গ্রন্থিতে ও হৃৎপিণ্ডেই প্রধানতঃ ব্যাডাইএগার ক্রিয়া-প্রকাশ পায় । এই ক্রিয়ায় লসিকা-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা জন্মে । এজন্ত বাঘী, কুচিকিৎসিত হইয়া শক্ত হইয়া পড়িলে এই ঔষধে আরোগ্য হয় । এস্থলে কার্বে-এনিমিলিসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে । হৃৎপিণ্ডে ব্যাডাইএগার ক্রিয়াবশতঃ ফসফরাস ও কফির স্থায় ইহাও আনন্দোদ্রেক জনিত হৃৎকম্পে উপকার করে । হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না ।

**অধিকার**—গণ্ডমালাজনিত রোগে, বিশেষতঃ গ্রন্থির ক্ষীণতায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে । গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ । অক্ষি-গোলকের জ্বাশু-শূল । হাঁচি, জলবৎস্রাব ও অত্যন্ত লক্ষণাবিত ওষপিগন্ধজ্বর । সবলে নির্গত নিষ্টিবন বিশিষ্ট হৃৎকম্প-কাস । এইসকল রোগেও ইহার প্রয়োগ হয় । রক্তিতে বিবৃদ্ধিত, ও মস্তকের বৃহত্তরতা অন্ততঃ লক্ষণ সংযুক্ত জ্বাশুর রক্তস্রাব এতদ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । উপদংশ জনিত শক্ত বাঘী । শক্ত বজ্রগ-গ্রন্থি । অর্শ । নীহার-স্ফোট ; ঘোড়ার পায়ের ক্ষত ও খুরের উপধাত ।—এই সকল স্থলেও ব্যাডাইএগার ব্যবহার হয় ।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

**বায়ু-নলী-ভুজপ্রদাহ ।**—বায়ুনলীর পুরাতন প্রতিষ্ঠায়ে অধিক শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে, অর্থাৎ বোগী কথা বলিতে বা কাস দিতে তাহার মুখ হইতে শ্লেষ্মা ছুটিয়া পড়িলে, এবং মুখ-রোধ ও বমন জন্মিলে ব্যাডাইএগা ব্যবহৃত হয় । **গ্রন্থি-রোগ ।**—গণ্ডমালাগ্রন্থ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থির ক্ষীণতায় ও রক্তপূর্ণতায় এই ঔষধ উপকারী । **হৃদ্রোগ ।**—স্নায়বীয় হৃৎকম্প, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ; আনন্দোচ্ছ্বাস জনিত হৃৎকম্প ; বৎসামাত্র মনোভাবে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও আন্দোলন ; রক্তিতে বক্ষঃস্থল হইতে গ্রীবা পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শ্রবণ ও অন্ততঃ ; এইগুলি হৃদ্রোগে ব্যাডাইএগার প্রয়োগ লক্ষণ । ডাঃ মার্সী বলেন যে সকল জন্মস্পন্দনে আইওডিন ও স্পঞ্জিয়ার স্থায় ব্যাডাইএগাও উপযোগী । **উপদংশ ।**

—উপদংশজ বাঘী প্রস্তরবৎ কঠিন, অসম, ও অমৃদু হইলে, এবং রক্তিতে উহাতে অভ্যন্তর হইয়া-বেধের স্থায় প্রবল যন্ত্রণা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । ডাঃ হেরিং বলেন যে

সঞ্চরমান বেদনাবিশিষ্ট বাবীতে পুষ্ণোৎপত্তি আরম্ভ না হইয়া থাকিলে; বিশ্রাম, লঘুপথা, নীতল বাহু প্রয়োগ, ও দুইড্রাম জলে ব্যাডাইএগার অরিষ্ট একবিন্দু মাত্রায় তিনচারি ঘণ্টা অন্তর সেবন ব্যবস্থা করিলে তিন দিবসে সম্পূর্ণরূপে বাবী বিলীন হয়। পুষ্টচক ক্রুচুয়েশন অর্থাৎ আন্দোলন আরম্ভ হইলেও প্রতিদিন ছয়বিন্দু অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাবী বসিয়া যায়। ছপশক-কাস।—মধ্যে মধ্যে আক্ষেপিক কাসের স্ত্রীতর আবেশ, কাসিতে কাসিতে বায়ুনলী হইতে আঠা আঠা পীতভ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অনেক সময় সেই শ্লেষ্মার মুখ হইতে সবলে ছুটিয়া যাওয়া, এবং হাঁচি হইয়া ও নাকদিয়া তরল শর্দি নির্গত হইয়া কাসের আবেশের পরিসমাপ্তি; শিরোবেদনা, অক্ষিগোলকের পশ্চাভাগে বেদনা, ও কর্ণে অল্প অল্প আঘাত সহকারে অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে বৃদ্ধি; ভগ্নবৎ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল; বক্ষঃস্থলে, বিশেষতঃ স্কন্ধাঙ্গুর নিম্নাংশে স্ত্রীতর কর্তনবৎ বেদনা; সমস্ত শরীরের মাংসে ও ত্বকে স্পর্শ-দেয়;—এই ঔষধের লক্ষণ। গণ্ডমালা।—মাথায় খুস্কী বা শুষ্ক দ্রুদ, উহাতে অল্প অল্প কণ্ডুয়ন; মাইবোমিয়ানগ্রন্থির কঠিনতা সহ অভিযান্দ, আরম্ভ ও প্রদাহিত তালুমূল; মুখমণ্ডল, গলা, ও ধাড়ের বামপার্শ্বের গ্রন্থির ক্ষীণতা, উহার কতকগুলির পচ্যমানতা; বজ্জণ গ্রন্থির দৃঢ়তা; দীর্ঘাস্থিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত পিণ্ড; শরীরে মাংসে আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দেয়, ও স্পর্শে বা বস্ত্রের ঘর্ষণে অতিশয় অনুভবান্বিত; ব্যাডাইএগার লক্ষণ। ডাঃ হেরিং মনে করেন বাল্যকালে যাহাদের গণ্ডমালা-দোষ ছিল যৌবনে আবার তাহা প্রকাশিত হইলে এই ঔষধে উপকার করে। হানিয়ান ইহাকে ঐকটোরিক বা কচ্ছু-বিষয় ঔষধের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ব্যাডাইএগার কার্বনেট অব লাইম, সিলিশিয়া, ফসফেট অব লাইম, ও এলুমিনার চিহ্ন আছে; সুতরাং ইহা ঐকটোরিক ঔষধ হওয়া অসম্ভব নহে। অর্শ।—ডাঃ হেরিং বলেন যে রুসিয়ান অর্শরোগ আরোগ্যকর বলিয়া ব্যাডাইএগার প্যাতি আছে। ল্যাকেসিসের পরে ইহা ভাল কাজ করে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—উভয় অক্ষি-গোলকের পশ্চাভাগে, এবং শঙ্খদ্বয়ে অল্প অল্প অধিরাম বেদনা সহকারে অপরাহ্ন দুইটা হইতে শিরঃপীড়া। দিবাভাগে অগ্নাধিক শিরঃপীড়া, তৎসহ অক্ষি-গোলকে বেদনা (সিমি, \* স্পিজি); বাম অক্ষি-গোলকে উহার আধিক্য; অপরাহ্ন একটা হইতে সাতটা পর্যন্ত আতিশয়। শঙ্খস্থলে ও অক্ষি-গোলকে বেদনা; অক্ষি-গোলক হইতে শঙ্খস্থলে বেদনার গতি। অতিশয় খুস্কি (ক্যাফ, মেজ), অথবা অল্প অল্প কণ্ডুয়ন সহ মস্তকের কেশাবৃত অংশের শুষ্ক দ্রুদর হ্রাস আকৃতি। কপালে দ্রুদবৎ উদ্ভেদ সহকারে মস্তকের কেশাবৃত অংশে স্পর্শ-দেয়। চক্ষু।—অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের নীলের আভা যুক্ত বেগুণি বর্ণ, এবং চক্ষুর নিম্নে নীলবর্ণ। অক্ষিপুটের প্রান্তস্থিত বসাত্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির দৃঢ়তাসহ চক্ষুর গণ্ডমালাজনিত প্রদাহ (\* গ্রাফ, \* সলফ)। বাম অক্ষি-গোলকে ও শঙ্খস্থলে তীব্র বেদনা। অক্ষিগোলক পর্যন্ত সম্প্রসারিত শিরোবেদনা (সিমি, স্পিজি)। বাম

অক্ষি-গোলকে সম্পূর্ণ স্পর্শ-দেয়, দৃঢ়রূপে বুজিলেও কষ্ট। দক্ষিণ অক্ষি-গোলকের পশ্চাত্তাগে স্তম্ভীয় সবিরাম বেদনা। **কর্ণ**।—অপরাহ্নে সামান্য আঘাতের শব্দও দূরবর্তী কামানের শব্দের ত্রায় শুনায়। **নাসিকা**।—প্রতিশ্রায়, প্রধানতঃ বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্রাব নিঃসরণ; অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে উহার আধিক্য; তৎসহ হাঁচি। **মুখমণ্ডল**।—কপালে দক্ষর ত্রায় উদ্ভেদ। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর, ভয় বা সীসের ত্রায় বর্ণ। হস্তসন্ধির স্তম্ভতা। **মুখ-মধ্য**।—মুখ-বিবর ও নিঃশ্বাস উত্তপ্ত ও সজ্জর, তৎসহ একবারে অধিক জলপানের তৃষ্ণা (\* ব্রাই)। **গল-মধ্য**।—প্রাতে একথণ্ড আঠা আঠা, নিরেট, রক্তাক্ত শ্লেষ্মা কাসিয়া তোলা। গলায়, বিশেষতঃ গিলিতে, প্রদাহিততা ও স্পর্শ-দেয়। **উদর**।—দৃঢ়ীভূত বজ্রকণ-গ্রহি। **শ্বাস-যন্ত্র**।—\* সময়ে সময়ে আক্ষেপিক কাসের উগ্র আবেশ, ও বায়ুনলী হইতে আঠা আঠা শ্লেষ্মা-নিষ্ক্ষেপ, কখন কখন স্বরযন্ত্র কণ্ঠ্যিত হইয়া মুখ হইতে সবলে সেই শ্লেষ্মার নিঃসরণ। দক্ষিণ কণ্ঠ্যস্থির উর্দ্ধদেশে ছুরিকাঘাতা কর্তৃকের ত্রায় স্তম্ভীয় বেদনা। **হৃৎপিণ্ড**।—তীব্র পরিদোলন; উপবিষ্ট বা শয়িত অবস্থায়, বিশেষতঃ আকস্মিক উল্লাসজনক চিন্তায়, অথবা মনোভাবে হৃৎপিণ্ডের সকম্প স্পন্দন। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ**।—অতিশয় আড়ষ্টতা (রস, \* চেলি)। গ্রীবার পশ্চাত্তাগে হৃচ্চী-বেধ সহকারে স্পর্শ-দেয় ও খজ্ঞতা, মস্তক পশ্চাৎ ও সম্মুখ-দিকে অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। ০ মুখমণ্ডলের বাম ভাগ, গলা ও ঘাড়ের গ্রাহির গণ্ডমালাজনিত ক্ষীণতা; উহার প্রায় সকল গুলিরই কুঙ্কটীর অণ্ডের ত্রায় আয়তন; কোন কোনটা শক্ত, কোন কোনটা বা পল্ল। স্বক্কাস্থির নিম্নে, দক্ষিণ দিকের পশ্চাত্তাগে দারুণ কর্তনবৎ বেদনা ও হৃচ্চী-বেধনবৎ যাতনা; স্বক্ক পশ্চাদিকে ও বক্ষঃস্থল সম্মুখদিকে নিষ্ক্ষেপ করিলে, কিম্বা শরীর আকৃষ্টিত করিলে উহার অতিশয় বৃদ্ধি। **দেহ**।—সমগ্র শরীরের পেশীর ও চর্ম্মের সাধারণ স্পর্শ-দেয়; স্পর্শে, এমন কি বস্ত্রের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত মাংসের স্পর্শ-দেয়; আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দেয় (আর্ণ, কটা)।

**সমগুণ**।—বারা, \* আইও, কালী-আইও, মার্ক, ফাইটো, সিলি, স্পিজি, \* স্পঞ্জ, সলফ।

## ব্যারসমা ক্রিনেটস—বকু।

এই গুল্ম দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। ডাইলিউট এলকোহল বা জলমিশ্রিত সুরাবীৰ্য্য সহযোগে ইহার পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। কোপেবা, চিমাফাইলা, ইরিজারণ, টেরেবিছিনা, ও ইউভা আসা বকুর সমগুণ।

**ক্রিয়া**।—বৃক্ক ও মূত্রযন্ত্রের শৈল্পিক িল্লীতে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শে। স্থানিক সংস্পর্শে সমুদয় শৈল্পিক িল্লীতেই বকুর বিশেষ ক্রিয় প্রকাশ পায়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায়, ও তজ্জন্ত পুরাতন অগ্নিমান্দ্য । ০ অস্ত্রের পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । ০ মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের প্লেগ্মা ও পুষ্পাংশলীল পুরাতন রোগ । বস্তি-কোটর, বৃক্ক, এবং মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ ও প্রচুর শ্রাব নিঃসরণ । ০ মূত্রাশয়ের উপদাহিতা । আক্ষেপিক সংবৃতি ০ মূত্রমার্গের উপদাহিত অবস্থা । ০ প্রভূত শ্রাবনিঃসরণসহ লালামেহ । ০ অধিক পরিমাণ লিথিক এসিড নিঃসরণবিশিষ্ট অশ্মরী । ০ অস্বাভাবিক শ্রাবনিঃসরণ সহ মূত্রাশয়ের মুখশায়ি-গ্রন্থির পীড়া । মূত্রাশয়ের গ্রীবার উপদাহিতা বশতঃ অব্যবহৃত মূত্র । ০ স্বয়ম্ভূত শোথ । ০ মূত্রাশয়ের রোগসহবর্তী শ্বেতপ্রদর । ০ মূত্রমার্গ, শুক্রকোষ, অথবা প্রোটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে অতিরিক্ত শ্রাবনিঃসরণ । এই সকল রোগে বকু সেবনে আরোগ্য লাভ হয় বলিয়া উল্লেখিত আছে ।

মূত্র-যন্ত্র ও জনন-যন্ত্রের প্লেগ্মা ও পুষ্পাংশবিশিষ্ট পুরাতন রোগে, মূত্রের অধঃপতিত পদার্থে অধিক পরিমাণ উপত্যক ও পুষ্প-প্লেগ্মা মিশ্রিত লক্ষণে ডাঃ হেল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । অতিশয় প্লেগ্মাশ্রাব লক্ষণাপন্ন বৃক্ক ও বস্তি-কোটরের পুরাতন প্রদাহ ও মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ রোগে কতিপয় চিকিৎসক বকু-প্রয়োগ করিয়া সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । ডাঃ হেল বলেন যে মূত্রমার্গের আক্ষেপিক সংবৃতি সংশ্লিষ্ট ও মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায়, বা শিলা ( লিথিক এসিড প্রস্তুত ) সংযুক্ত মূত্রাশয়ের উপদাহিতা ব্যারোসমা ব্যবহারে সত্ত্বর অন্তহৃত হইয়াছে । মূত্রাশয়ের মুখশায়ি-গ্রন্থির রোগও এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । ডাঃ হেল এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও চারিআউন্স জলে এক ড্রাম অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রয়োগ পূর্বক কয়েকজন রোগিণীর যোনির শ্বেতপ্রদর আরোগ্য করিয়াছেন । ডাঃ ষ্টিলী তাঁহার ভৈষজ্যতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে অতি মৈথুন বা কৃত্রিম মৈথুন জনিত মূত্রমার্গ, শুক্র-কোষ বা মূত্রাশয়ের মুখশায়িগ্রন্থির প্লেগ্মাশ্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে অতিরিক্ত শ্রাব-নিঃসরণে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ । ডাঃ হেল কয়েকবার এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ষ্টিলীর উক্তির সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । নিম্নক্রমেই বকুর উৎকৃষ্ট ক্রিয়াদর্শে । কখন কখন মুহূর্ণাণ্ট অতি সত্ত্বর উপকার করে ।

### ব্যালসেমম পেরুভিয়েনম—ব্যালসাম হস্ত পেরু ।

এই বৃহৎ বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু প্রদেশে জন্মে । তথাকায় অধিবাসীরা ইহাকে কুইং কুইনো কহে । বহুল কর্তন করিয়া বহুখণ্ডে রস সংগ্রহ পূর্বক উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল জ্বালিয়া ব্যালসাম ( তৈলাক্ত ধূনাময় পদার্থ ) প্রস্তুত হয় । নয়গুণ এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া ইহার অরিষ্ট ও স্থূল স্ফাগার অব মিক্‌ সহকারে বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া।—ঐন্দ্রিয়িক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাস-যন্ত্রের ঐন্দ্রিয়িক ঝিল্লীতে এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে। পীত, সবুজ, ছুর্গন্ধময় স্লেম্মা ও পুষ্যময় শ্রাব ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। নিস্তেজ ক্ষত অথবা পুষ্যময় শ্রাববিশিষ্ট প্রতিষ্ঠায়েও ইহা বিশেষ উপযোগী।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

ডাঃ হেল এই ঔষধ নাসিকার পুষ্যময় ছুর্গন্ধ শ্রাববিশিষ্ট পুরাতন প্রতিষ্ঠায়ে; এবং গাঢ়, পীত বা হরিৎ ও ছুর্গন্ধ পুষ্যময় প্রচুর শ্রাববিশিষ্ট কাসে অনেক বৎসর ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ, গণ্ডমালাগ্রস্ত, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ রোগাক্রান্ত, অথবা উপেক্ষিত প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই এইপ্রকার অবস্থা জন্মে। গুটিকা বিশিষ্ট যক্ষ্মা এতদ্বারা আরোগ্য হয় না বটে কিন্তু উপশমিত হইতে পারে। পুষ্য-নিষ্ঠীবন, বিলেপী জ্বর, দুর্বলতা ও বিমন্দ ক্ষীণ রক্ত-সঞ্চলন যক্ষ্মারোগে ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। ডাঃ হেল সাধারণতঃ ইহার প্রথম বা দ্বিতীয় দশমিক দ্রবক্রম বা বিচূর্ণ ব্যবহার করেন। বিচূর্ণকারেই এই ঔষধ উত্তম ক্রিয়া করে। বাষ্পাকারে আত্মাণ করিলেই ইহাতে সর্কারোপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল দর্শে। সম পরিমাণে কার্বোনেট অব ম্যাগ্নিশিয়া ও চিনি সহকারে এই ঔষধের বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া, তাহার প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ হইতে জলসহযোগে দ্বিতীয় দশমিক শক্তির সমতুল্য দ্রব প্রস্তুত করিয়া দিনে তিনবার, এক একবার পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত, স্ত্রে রূপে আত্মাণ করা কর্তব্য। ডাঃ হফম্যান বলেন যে নিউমোনিয়ার পরবর্তী গাঢ়, পীতবর্ণ, ছুর্গন্ধময় কাসে ইহার প্রথম দশমিক ক্রম; ও বায়ুনলীভুজের পীড়ায় শ্রাবনিষ্ঠীবন বিলোপে ষষ্ঠ ক্রম উপযোগী। হেল বলেন যে বায়ুনলীভুজের রোগে নিষ্ঠীবনের স্বল্পতা ও জ্বর লক্ষণে ষষ্ঠক্রম; এবং প্রভূত পুষ্যময় নিষ্ঠীবন ও জ্বরের অভাব থাকিলে প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার্য। ছুর্গন্ধময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুসের ভমিকা অর্থাৎ পুষ্য-সঞ্চয় রোগে এই ব্যালসাম বিগন্ধ ফলপ্রদ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে বায়ুনলীর প্রতিষ্ঠায়ে স্লেম্মা মিশ্রিত পুষ্য নিষ্ঠীবনে ব্যালসাম অব পেরু প্রশংসিত ঔষধ। রোগীর বক্ষঃস্থলে কর্ণ স্থাপন করিলে যখন উচ্চ শব্দ শুনা যায়, এবং গাঢ়, সর স্ফূট, পীতভা শুভ্রবর্ণ নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে তখন এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। নৈশযন্ত্র ও বিলেপী জ্বর প্রকাশ পাইয়া রোগের আতঙ্কজনক অবস্থা জন্মিলেও ইহা উপকারী। ডাঃ ফ্যারিংটন নিম্ন ক্রমেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল এতদ্বারা স্লেম্মা মিশ্রিত ভুক্তদ্রব্য বমন লক্ষণাপন্ন আমাশয়ের প্রতিষ্ঠায়; অস্ত্রের পুরাতন প্রতিষ্ঠায় বা আমশ্রাব; মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠায় এবং জরায়ু ও যোনির দুর্দম্য প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ স্বেতপ্রদরও আরোগ্য করিয়াছেন। ফুসফুসের রোগে আত্মাণের নিমিত্ত যেকোন জলীয় দ্রব প্রস্তুত হইয়া থাকে স্বেতপ্রদরে সেই প্রকার দ্রবের পিচকারী ব্যবস্থেয়। নিস্তেজ ক্ষত, স্তনাগ্রবিদারণ, অঙ্গুলী ও করতল বিদারণ, ওষ্ঠ বিদারণ প্রভৃতি রোগে এলোজের গ্লিসারোলের পরেই এই ব্যালসামের মলম উপকারী।

বাগসাম অব পেক উষ্ণ করিয়া পাঁচড়ার উপর মর্দন করিলে একবার মাত্র প্রয়োগেই ছর্দয়া পাঁচড়া রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক ।—মস্তকে উত্তাপ ও পূর্ণতা । \* নাসিকা ইহাতে প্রভূত গাঢ় আব-নিঃসরণ ।  
 ০ শ্লেষ্মা ও পুষময় আব-বিশিষ্ট নাসিকার পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । ০ ক্ষতসংযুক্ত পুতিন্তরোগ ।  
 আমাশয় ও অন্ত্র ।—ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তির বৃদ্ধি । আমাশয়ের উত্তাপ ও গৌরব । \*  
 ভুক্তদ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমম । উদরবেদনা ও উদরাময় সহ বিবিধা । \* আমাশয়ের প্রতি-  
 ণ্ঠায় । পুরাতন আমাতিসার । ০ রক্তাক্ত আম ও কুহনসহ পুরাতন রক্তাতিসার ।  
 ০ সন্নিপাত জরের পর অন্ত্রের উপদাহিতা । শ্বাস-যন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রে উত্তাপ ও জ্বালা । শুষ্ক ও  
 হ্রস্ব কাস । \* গাঢ়, পীত বা হরিদ্বর্ণ, ও দুর্গন্ধময় পুষ ও শ্লেষ্মা বিশিষ্ট প্রভূত নিষ্ঠীবন-সংযুক্ত  
 কাস । ০ স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ । ০ অণুটিক স্বারযান্ত্রিক যক্ষ্মা । বৃদ্ধদিগের বক্ষঃস্থলের  
 পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । ০ ফুসফুস-প্রদাহের পরবর্তী তরল, ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট, গাঢ়, পীত বা  
 হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ, শ্লেষ্মা ও পুষময় কাস । ০ বায়ুনলীর পীড়ায় অভ্যস্ত আব-নিঃসরণ বিলোপ ।  
 পুষময় নিষ্ঠীবন ও বিলেপী জ্বর সহ পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ । ০ ফুসফুসে  
 পুষসঞ্চয় বশতঃ পুষময় দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন । মূত্রযন্ত্র ।—মূত্রনিঃস্রবের বৃদ্ধি । \* শ্লেষ্মাময়-  
 অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট স্বল্পমূত্র । ০ মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রতিষ্ঠায় । ০ জরায়ু ও যোনির  
 পুরাতন ষ্ঠেতপ্রদর । ( ? ) । জ্বর ।—রক্ত-সঞ্চলনের উত্তেজনা ও নাড়ীর দ্রুততা, কিন্তু  
 গাত্রের ঘর্ষাদ্রিত্য সহ সর্কাস্কীন ঈতাপ । ০ যক্ষ্মা, পুরাতন বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ, ও পুষত্রাবের  
 আত্মযজ্ঞিক বিলেপীজ্বর । দেহ ।—০ মন্দ ও ক্ষীণ রক্ত-সঞ্চলন সহ দুর্বলতা । ০ নিস্তেজ  
 ক্ষত । ০ স্তনবৃন্ত, অঙ্গুলী ও করতলের বিদারণ ।

সমগুণ ।—অর-নিউ, কোপেবা, কিউবেব, চিমাফাইলা, আইওডিন, সলফার, থুজা, ইউভা ।

### ত্রাকিগ্লটিস রিপেন্স ।

এই বৃক্ষ নিউ জিলাঙ, দ্বীপে জন্মে । সেইস্থানের অদিবাগীরা ইহাকে পিউক-পিউক বলে । যে সকল পশু ইহার পত্রভক্ষণ করে তাহাদের নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে ও পশ্চাৎদিকের পা পড়িয়া যায় ; এবং কয়েক দিন পরে মৃত্যু হয় । কখন কখন আরোগ্যও জন্মে বটে কিন্তু অতি ধীরে ধীরে শক্তি-সঞ্চার হয় । নিউজিলাঙের লোকেরা ঘর্ষোৎপাদন জন্ত ইহা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করে । হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার কাঁচা পাতা ও ফুলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

পিউক-পিউক পরীক্ষিত হইয়াছে । বৃক্ষক প্রদেশে স্পর্শ-দেব । মূত্রাশয়ের গ্রীবায়



চাপ ও স্পর্শ-দেষ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মূত্রমার্গে স্পর্শ-দেষ; মূত্র যেন ধারণ করিতে পারা যাইবে না এপ্রকার অনুভব। প্রচুর মূত্র; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব '০৮; আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় মূত্রে গ্লেম্মা-সূত্র, গ্লেম্মা-বিন্দু ও উপস্বক দর্শন। মূত্রাশয়ের গ্রীবায বেদনা। অধিক পরিমাণ পাণ্ডুবর্ণ মূত্রত্যাগ; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব '০৮; জাল দিয়া ও নাইট্রিক এসিড দিয়া পরীক্ষায় উহাতে এম্বুমেনের বিস্তারমানতা। অধিক পরিমাণ মলিনবর্ণ মূত্র-ত্যাগ, উহাতে লম্বা লম্বা সূত্রাকার পদার্থ বলিয়া সপ্রমাণ। মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গের মূত্রস্রাব কষ্টপ্রদ, কিন্তু উপস্থের মূত্রত্যাগ পরিস্কার। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ৫৬ আউন্স মূত্রত্যাগ; মূত্রের আক্ষেপিক গুরুত্ব ২০; এবং উহাতে বৃক্ক হইতে উপস্বক, ফসফেটস, ও গ্লেম্মার ছাঁচ বিশিষ্ট শুভ্র গ্লেম্মাময় অধঃক্ষেপ। এইগুলি পিউক-পিউকের মূত্র-লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে জানা যায় যে এতদ্বারা নিশ্চয়ই আব্রুমিহুরিয়ায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অতএব ব্রাইটিস ডিজিজ নামক বৃক্কের রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে এই রোগে পিউক-পিউকের প্রতি অনেকটা নির্ভর করা যায় এবং ইহা ব্যবহারে প্রায়ই সন্তোষজনক ফল দর্শে। ডাঃ লিলিয়েস্থাল লেখেন যে অতি পরিশ্রমাদিজ্ঞানিত স্নায়বীয় উপদ্রব সম্বৃত আব্রুমিহুরিয়া, ক্রমে ক্রমে বৃক্কের বিধান-বিকার জন্মাইলে ব্রাকিমিটিস ব্যবহৃত হয়। \* উদরে ও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে সঞ্চালন সংযুক্ত, পুরাতন পেরিটোনাইটিস বিশিষ্ট রজ-কৃচ্ছ্র ও ব্রাকিমিটিসের প্রয়োগ হয়। \* উদরে সঞ্চালন অনুভব (ক্রোক)। \* মূত্র-ত্যাগের পর মূত্রাশয়ে বেদনা (ক্যাথ, মার্ক, ), এবং উপস্থে হল-বেদনবৎ যাতনা সহকারে মূত্র-মার্গে বেদনা। \* স্পর্শ-দেষ সহকারে মূত্রাশয়ের গ্রীবায প্রচাপন। মূত্র-বেগ।—এইগুলি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

## ব্রোমাইডস।

ব্রোমাইড গুলির সাধারণ ক্রিয়া এতলে উল্লেখ করা গেল। এই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সন্ধিবেচনা পূর্বক ব্রোমাইড ব্যবহার করিলে এতদ্বারা অনেকগুলি উৎকট ও সঙ্কটাপন্ন রোগ আরোগ্য হইতে পারে। (১) সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ-মাত্রায় যে কোন প্রকার ব্রোমাইডের মুখ্য ক্রিয়ার সমুদায় রক্তবহানাড়ী, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুরঞ্জর রক্তবহানাড়ী আকৃষ্ট হয়। এই মুখ্য ক্রিয়ার প্রভাবে সমস্ত শরীর-যন্ত্র যেন নিদ্রিত হইয়া পড়ে অথবা উহাদের এপ্রকার প্রশান্ততা জন্মে যে তাহাতে রোগীর নিদ্রা উৎপন্ন হয়। এতদ্বারা প্রতিক্রিাপ্রণ ক্রিয়া প্রতিক্রম ও পেশীর উপদাহ প্রশমিত হইয়া থাকে। (২) দীর্ঘকাল ব্রোমাইড সেবনকালে বা উহার ব্যবহার স্থগিত করার পরে যে মুখ্য ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া দর্শে তাত্ক্ষণিকই ব্রোমাইডের গৌণ ক্রিয়া বলে।

গোণ-ক্রিয়ায় আকৃষ্টিত ধমনীগুলি প্রসারিত হয়, শৈরিক বা ধার্মিক রক্তসঞ্চয় জন্মে, এবং অনিদ্রা, স্নায়বীয় উত্তেজনা, প্রতিক্রিষ্ট স্নায়ুসমূহের অতিরিক্ত অনুভবশক্তি, ও পেশীর অস্বাভাবিক উপদাহিতা উৎপন্ন হয়। সুস্থকায় মনুষ্য বা পশুদিকে ব্রোমাইড সেবন করাইলেই এইপ্রকার ক্রিয়া দর্শে। ঔষধের গোণ ও মুখ্য উভয় ক্রিয়ার প্রতিই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সচরাচর ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া উৎপাদনার্থ অধিক মাত্রারই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উহাতে অনেক সময় গোণ লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথেরা একরূপ করেন না। ব্রোমাইডের মুখ্য ক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ মস্তিষ্কে বা পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চলনে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। রক্তসঞ্চয় ও আক্ষেপাদিতে ব্রোমাইডের গোণ লক্ষণাঙ্কসারেই উহা ব্যবহৃত হয় এবং যথোপযোগী হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োজিত হইয়াতে রোগ বিবদ্ধিত হইয়া পড়ে না।

## ব্রোমাইড অব এমোনিয়া ।

এমোনিয়ার জলে ব্রোমিন দ্রবীভূত করিয়া এমোনিয়ম ব্রোমাইডম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার একভাগ নয়ভাগ পরিশ্রুতজলে দ্রবীভূত করিয়া মাদারটিকার প্রস্তুত হয়। তিনদশমিক ক্রম পর্য্যন্ত জলে, অনন্তর এলকোহলে এই ঔষধের ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাঃ কুশিং নিজদেহে এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্কে, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশীয় অংশে, চক্ষু এবং নাসিকায় প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

মস্তিষ্ক-রোগ।—মস্তিষ্কের ভূমিদেশে অথবা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় বা উহার আবরণ-ঝিল্লীতে রক্ত-সঞ্চয়ের বিঘ্নমানতা সন্দেহ হইলে ব্রোমাইড অব এমোনিয়া সুব্যবস্থায়। এজন্য মাস্তিষ্কপৃষ্ঠবংশীয় মাত্রিকা-প্রদাহ, মস্তিষ্কের ভূমিদেশীয় মাত্রিকা-প্রদাহ, ও মস্তক-পশ্চাতের কোন কোন প্রকার উৎকট শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কপৃষ্ঠবংশের কোন কোনপ্রকার রক্ত-সঞ্চয়ে একরূপ বিশেষ আক্ষেপিক কাস থাকে। ঈদৃশ কাস লক্ষণাপন্ন রক্ত-সঞ্চয়ে ডাঃ হেল ব্রোমাইড অব এমোনিয়া বিশেষ উপযোগী মনে করেন। ব্রোমাইড অব পোটাসিয়মের স্থায় অপস্মার রোগে ইহার বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের ভূমিদেশের রক্তসঞ্চয়ই প্রধান লক্ষণ হইলে ইহা পোটাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল রোগে

রোগীর বয়ঃক্রম ও ধাতু-প্রকৃতি অনুসারে ঔষধের মাত্রা নিরূপিত হওয়া আবশ্যিক । ডাঃ হেল বলেন যে রোগীর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর বয়সে এক এক গ্রেণ ইহার বৃহত্তর মাত্রা । যথা, উৎকট রোগে উপকার লক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসরের বালকের পক্ষে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর তিন গ্রেণ ; এবং কুড়ি বা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক সবল ব্যক্তির পক্ষে তিন বা ছয় ঘণ্টা অন্তর কুড়িগ্রেণ মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে । অন্ত্যকট রোগে ইহার অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায়ও রোগীর আরোগ্য লাভ হয় । এই ঔষধের মুখ্য লক্ষণানুসারে মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীর আয়তনের হ্রাসতা বশতঃ মস্তিষ্কের ভূমিদেশের ও পৃষ্ঠবংশীয় রক্তের উদ্ধাংশের রক্ত-স্বল্পতায়ও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, বা রক্তের পরিমাণের অল্পতা বশতঃ মস্তিষ্কের যে রক্ত-স্বল্পতা ( এনিমিয়া ) উৎপন্ন হয় তাহাতে ব্রোমাইড অব এমোনিয়া ব্যবহৃত হয় না । চায়না, ফিরম, ডিজিটেলিস প্রভৃতি ঔষধ ও রক্ত-কর পথ্য প্রয়োজিত হইয়া থাকে । ব্রোমাইডের মানসিক লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপ জনিত মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতায়ই ইহা ব্যবস্থেয় । কিন্তু ক্ষুদ্রমাত্রায় অর্থাৎ ৩দ ও ৬দ ক্রমে ব্যবহার করা বিধেয় ।

**চক্ষু-রোগ ।**—এই ঔষধের চক্ষু-লক্ষণানুসারে ইহা গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, কনীনিকা-প্রদাহ, অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের ক্ষীণতা প্রভৃতি চক্ষুরোগে অতিশয় উপকারী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।

**নাসা-রোগ ।**—ডাঃ হেল বলেন যে নাসিকার পশ্চাৎ রক্তের ও গল গহ্বরের প্রতিষ্ঠায়ে, বিশেষতঃ গাঢ়, রক্তবৎ স্লেমা নিঃসরণ লক্ষণে এই ঔষধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহার প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহারে এই রোগ সম্যকরূপে দূরীকৃত হয় ।

**হৃৎ-শব্দ-কাস ।**—ব্রোমাইড অব এমোনিয়ামের পরীক্ষা-লক্ষণে দেখা যায় যে এতদ্বারা হৃৎশব্দ কাসের হ্রাস আক্ষেপিক কাস জন্মে । অতএব ইহার কাস লক্ষণানুসারে হৃৎপিং কাসে এই ঔষধের ১দ হইতে ৩দ ক্রম ব্যবহারে উক্ত রোগ আরোগ্য হয় ।

**জরায়ু-রোগ ।**—ডাঃ গ্রিফিথস্ বিবেচনা করেন যে আর্গটের হ্রাস ব্রোমাইড অব এমোনিয়া ও জরায়ুর রক্তবহা নাড়ী আকৃষ্ট করে এবং জরায়ুর সকল প্রকার রক্তস্রাবেই এই ঔষধে উপকার দর্শে । ডাঃ হেল বলেন যে তিনি কেবল দুস্ত্রের ও দুর্দম্য রক্ত-রুদ্ধ, রোগের কয়েকটা রোগিণীর যাতনা এতদ্বারা উপশমিত করিয়াছিলেন ।

**আক্ষেপ ।**—অপস্মার, আক্ষেপ, ও অনিদ্রায় ইহা তত ব্যবহৃত হয় না । কিন্তু আবশ্যক হইলে রোগের আক্রমণ প্রতিষেধার্থ প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ২০ গ্রেণ মাত্রায় ; এবং মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মাত্রিকা-প্রদাহের পূর্ববর্তী অনিদ্রায় শয়ন সময়ে ২০ গ্রেণ মাত্রায় অত্যন্ত ব্রোমাইডের পরিবর্তে ব্রোমাইড অব এমোনিয়াম ব্যবহৃত হইতে পারে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মস্তক ।**—\* মাথার চারিদিকে ফিতা বাঁধা থাকার হ্রাস অনুভব, এবং কানের দিক উপরে উহার অতিশয় আধিক্য । \* মাথার ডান দিকে, চক্ষুর নিকটে প্রেক্ষিতবৎ

বেদনা । ০ মস্তকের বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা । \* মস্তিকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরঃপীড়া । ০ মস্তিকে তীব্র রক্তসঞ্চয় লক্ষণাপন্ন অপস্মার । ০ মস্তিক-পৃষ্ঠবংশীয় মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহের রক্ত-সঞ্চয়ের অবস্থা । চক্ষু ।—০ দুই চক্ষের চতুর্দিকে, ও মস্তকের অভ্যন্তরে বেদনা । ০ দক্ষিণ চক্ষুতে শুভ্রবর্ণ হ্রস্ববর্ণ শ্লেষ্মা । চক্ষুর উপরে উপমাংসাকার ঝিল্লীর উৎপত্তিবৎ দৃশ্য । উভয় চক্ষেরই অতিশয় স্পর্শ-দ্রব ও আরক্ততা ; প্রাতে অক্ষিপুটের অবরুদ্ধতা । অক্ষিগোলকের অস্বাভাবিক পূর্ণত্ব ও বৃহত্ব । প্রতিদিন সায়াহ্নে অক্ষিপুটের পতন এবং উহা তুলিতে ক্লেশ ও আয়াস । ০ গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, গুরুমণ্ডলের প্রদাহ, কনীনিকার প্রদাহ ও গুরুবর্ণ অস্বচ্ছন্দতা । নাসিকা ।—নাসিকা হইতে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ । ০ গাঢ়, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাবী নাসিকার প্রতিচ্ছায় । মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—মুখে শাদা, দড়ির ছায়, স্বাদশূন্য শ্লেষ্মা । গলার অভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় । মুখ-গহ্বর ও জিহ্বার উপরিভাগের দীর্ঘাঙ্গ বলসানবৎ অনুভব । মুখ-গহ্বরে হল-বেধ, \*ও কাসিতে প্রবৃত্তি, হাঁচি হইলে উহার শান্তি । জিহ্বার দক্ষবৎ স্পর্শ-দ্রব, বাতনা ব্যতীত কথা বলিতে বা পড়িতে পারা যায় না । গলার অভ্যন্তর ডিপথিরিয়া কৃত্রিম ঝিল্লীর আরম্ভের ছায় বিন্দু-বেষ্টিত দৃষ্ট হয় । স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী ।—গলায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ বশতঃ কাসের উদ্রেক । প্রাতে গল-কণ্ডুয়ন ও কাসের প্রবৃত্তি । কাসের প্রবৃত্তিসহ গলার উপদাহ । আকস্মিক, গভীর, আক্ষেপিক কাস, ও তজ্জন্তু আমাশয়ে বেদনা । \* শ্বাস-যন্ত্রের ও আমাশয়ের উপদাহ, এবং তৎসহকারে হ্রস্ব-শব্দ কাসের ছায় স্পষ্ট হ্রস্ব-শব্দ বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস । ০ হ্রস্ব-শব্দ-কাস । \* গভীর, আক্ষেপিক, অতিতীব্র, প্রায় অবিরাম, ( বিশেষতঃ রাত্রিতে শয়িত অবস্থায় ), গল-কণ্ডুয়ন, উত্তাপ ও জ্বালানুভব সংযুক্ত কাস । কষ্টপ্রদ, স্বরভঙ্গসংযুক্ত, শুষ্ক আক্ষেপিক, শ্বাস-কাসের ছায় ও অবসাদকর, নিঃশব্দপরিশূন্য কাস । বক্ষঃস্থল ।—বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলের অনুপস্থি-  
অশিথিলতা, দীর্ঘ ও গভীরনিঃশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি । শীতল কিছু গিলিলে গল-নলীতে ক্লেশানুভব । দক্ষিণ স্বক্কের শিখর-দেশে গুরুলার সংস্থাপিতবৎ অনুভব । আমাশয় ।—  
আমাশয় হইতে কিছু যেন উঠিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিবে বলিয়া অনুভব, এবং তজ্জন্তু শ্রান্তিও অস্বচ্ছন্দতা বোধ ও বাতোদ্যমের উৎপত্তি, উদগারে শান্তি । আমাশয় শীতল বোধ হইলেও গলার দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া যেন তপ্তবায়ু উদগত হইতেছে এপ্রকার অনুভব । পৃষ্ঠ ।—দক্ষিণ বুকক যেন কোন শক্ত বস্তুরা চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব ; চাপিয়া ধরিলে উহার শান্তি, কিন্তু একপ্রকার আকর্ষণানুভবের অবশেষ । জরায়ু ।—০ জরায়ুর ক্রিয়া বা বিধানের বিকার, ডিম্বাশয়ের উত্তেজনা; উপদাহ, বা প্রদাহ; অথবা ডিম্বাশয় বা তৎসমীপবর্তী অন্যান্য অংশের পীড়া নিবন্ধন জরায়ুর সকলপ্রকার রক্তস্রাব । ০ রক্ত-শূন্যতা বা রক্ত-কৃচ্ছ । ০ প্রভূত অকাল রক্তঃ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—বাম জঙ্ঘার পশ্চাৎগে স্রুতীর বেদনা সহ, বক্ষণ হইতে জাহ্ন পর্যন্ত স্থানের মধ্য-পথে অতিশয় খণ্ডতা । ০ দক্ষিণ

জন্ম পরিত্যাগ করিয়া বামজন্মার ঠিক সেই স্থানে বেদনার উপস্থিতি। জাহ্নব উর্দ্ধভাগের বেদনার জাহ্নব নিম্নে, অনন্তর গুল্ফে, ও তৎপরে পদে গতি।

সমষ্টিগ ।—কালী-ব্রোম, সোডি-ব্রোম, লিথ-ব্রোম ; ( ড্রস, স্পঞ্জ, সিকেল, অষ্টি ) ।

## ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর—মনোব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর ।

একভাগ ক্যাম্ফর ও একভাগ ব্রোমিন সংযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাতাস লাগিলে ১০০ ডিগ্রী উত্তাপে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

মস্তিস্ক-রোগ ।—ডাঃ হেল বলেন যে অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহিতা সংযুক্ত মস্তিস্কের রক্তসঞ্চয়ে, বিশেষতঃ উহা হিষ্টিরিয়ার আকারে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মুখ্যতঃ সমমতানুযায়ী। অতিরিক্ত উত্তেজনার পরবর্তী মস্তিস্কের রক্তস্রবায় নিদ্রাশৃঙ্খতা, হস্তপদের শীতলতা, রক্তসঞ্চলনের ক্ষীণতা, ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়া লক্ষণে ইহা গোণতঃ উপযোগী। বাল্যক্ষেপ ।—ডাঃ হামণ্ড ১৫ মাস ও ১৮ মাস বয়স্ক দুইটা বালকের দাঁত উঠিবার সময় আক্ষেপে একঘণ্টা অন্তর একগ্রেণ মাত্রায় একটু গঁদের মণ্ডসহযোগে মাড়িয়া এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। একজনের তিনমাত্রা, অপরের দুইমাত্রা সেবনেই আক্ষেপ স্থগিত হইয়াছিল। হিষ্টিরিয়া ।—একজন বিবাহিতা যুবতীর পর্যায়ক্রমে হাস্ত ও ক্রন্দন, এবং অপস্মার ও তাণ্ডণ রোগের দ্বারা আক্ষেপ বিশিষ্ট উৎকট হিষ্টিরিয়া রোগ ছিল। চারিগ্রেণ মাত্রায় একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করাতে ; দশমাত্রা ঔষধ সেবনের পর তাহার রোগের আবেশ নিবারিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ববর্তী আক্রমণ পাঁচ হইতে এগারদিন থাকিত। ডাঃ মার্সী বলেন যে ডাঃ হেল এই ঔষধের ১৮ক্রম হিষ্টিরিয়াজনিত শিরঃপীড়া, আক্ষেপ, বমন, ও অনিদ্রায় অতিশয় উপযোগী মর্মে করেন। নারী-দেহের বেদনার ঝড় এতদ্বারা প্রশান্ত হয়। শিরঃপীড়া ।—স্ত্রীলোক ও যুবতী কুমারীদিগের মানসিক উত্তেজনা ও অত্যন্ত অধ্যয়ন জনিত শিরঃপীড়ায় চারিগ্রেণ পরিমাণে একমাত্রা ঔষধ সেবনেই সাধারণতঃ আরোগ্য লাভ হয়। মদাত্যয় ।—একজন বৃহৎকায় রক্ত-প্রধানব্যক্তির মদাত্যয় রোগে মস্তিস্কের অতিশয় রক্তাধিকা, কম্পন, অতিশয় অন্ধোৎক্ষেপ, অসম্বন্ধ মুহুপ্রলাপ, পূর্ণ ও কোমলনাড়ী, কয়েক রাত্রি অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। ১০০ গ্রেণ ব্রোমাইড অব সোডিয়ম ব্যবহারেও নিদ্রা জন্মিয়াছিল না। পাঁচগ্রেণ মনোব্রোমাইড ক্যাম্ফর সেবনে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহার বারঘণ্টাব্যাপী নিদ্রা হইয়াছিল ; পরে রাত্রিতে পুনরায় পাঁচগ্রেণ পরিমাণে আর একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করাতে সুনিদ্রা জন্মিয়াছিল এবং রোগের অন্ত্যস্ত লক্ষণ উপশমিত হইয়াছিল। এই রোগীর প্রথমে মস্তিস্কে রক্তসঞ্চয় ছিল। কিন্তু ১০০গ্রেণ ব্রোমাইড অব সোডা সেবনের পর ইহার বিচ্ছিন্নতা তত

সম্ভবপর নহে । বাস্তবিক ক্যাম্ফর ব্রোমাইড সেবনের সময় তাহার মস্তিষ্কের এনিমিয়ার লক্ষণ ছিল ; এই অবস্থায় পাঁচগ্ৰেণ মাত্রায় ঔষধ উপকারী । টাইফয়েড জরের প্রলাপেও মস্তিষ্কের এই প্রকার এনিমিয়া ও উপদাহিতা লক্ষণে ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর উপযোগী হওয়া সম্ভব । জননেদ্রিয়ের রোগ ।—ধ্বজভঙ্গ, নিশ্চেষ্টতা, ও অপ্রবল শুক্রমেহ রোগে এই ঔষধ মুখ্যতঃ সমমতাহুযায়ী এবং ৩৮ বা ৬৮ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারে আরোগ্যকর । গোণতঃ কামোন্মাদ, লিঙ্গোদ্বেক, এবং স্বপ্নদোষসংযুক্ত প্রবল শুক্রমেহে ইহা উপযোগী । ডাঃ হামিলটন বলেন যে কর্ডি ( প্রমেহের বক্র-লিঙ্গোদ্বেক ) উপসর্গে তিনি এই ঔষধ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন । ডাঃ হেল বলেন যে শয়নকালে দুই তিন গ্ৰেণমাত্রায় এই ঔষধ সেবনে রাজিকালীন লিঙ্গোদ্বেক, ও স্বপ্নদোষ নিবারিত হয় । অণ্ডকোষ ও মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির দুর্দম্য দ্বায়ুশূলগ্রস্ত একজন রোগীর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত নিদ্রা হইত না, এবং মুক ও প্রেষ্টেট-গ্রন্থি কঠিন ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, রাত্রিতে দুইগ্ৰেণ মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে তাহার নিদ্রা হইয়াছিল এবং অস্বাভাবিক লক্ষণ ও অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল । বিস্মৃচিকা ।—কলারা ইনফান্টম বা শিশু-বিস্মৃচিকায় আশঙ্কিত বা প্রকৃত আক্ষেপে ব্রোমাইড অব ক্যাম্ফর ফলপ্রদ । মস্তিষ্ক-লক্ষণসহ পতনাবস্থায় ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক বা দুইগ্ৰেণ মাত্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে উপকার দর্শে । আসিয়িক ওলাইটায়ও ইহা উপযোগী হইতে পারে ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—আরক্ত মুখমণ্ডল ও আক্ষেপের আশঙ্কা সহকারে প্রচণ্ড প্রলাপ । ০ নিদ্রাহীনতা অসম্বন্ধ মূঢ়প্রলাপ । ০ পর্যায়ক্রমে ক্রন্দন ও হাস্য । মস্তক ।—\* অতিশয় স্নায়বীয় উপদাহিতাসহ মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় । \* শীতলতা, দুর্বলতা, ও নিশ্চেষ্টতাসহ মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতা । \* মানসিক উত্তেজনা অথবা অতিশয় অধ্যয়ন জনিত মাথাধরা । \* অনিদ্রাসহ রক্তস্বল্পতা জনিত মাথাধরা । জননেদ্রিয় ।—জননেদ্রিয়ের দুর্বলতা শীতলতা; ও শিথিলতা ( পুরুষের ) । স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সঙ্গম-শক্তির বা প্রবৃত্তির তিরোভাব । \* জননেদ্রিয়ের উপদাহিতা, আক্ষেপিক উদ্বেক, শুক্রশ্রাব ইত্যাদি । \* জননেদ্রিয়ের উপদাহ বশতঃ গুল্মবায়ুর ত্রায় অবস্থা, ও উন্মাদ ইত্যাদি । \* স্তন-দুগ্ধের বিলোপ । দেহ ।—\* অপস্মার, গুল্মবায়ু, ও তাণ্ডবের ত্রায় আক্ষেপ । \* খল্লী ও উৎক্ষেপসহ শরীরের ও হস্তপদের শীতলতা । ( বিড়াল ও শূকরে ) হৃদস্পন্দনের সংখ্যার নূনতা, নিশ্বাসের সংখ্যার নূনতা, শারীরিক উত্তাপের হ্রাসতা ; শরীরের উত্তাপের বৃদ্ধি ( গোণলক্ষণ ) । ০ এতদ্বারা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় দ্বায়ুমণ্ডলের ও রক্তসঞ্চলনের সাস্থনা জন্মে । ০ কম্পন, উত্তেজনশীলতা, অনিদ্রা ও দৃষ্টিবিভ্রম । ০ হৃৎপিণ্ডের রোগ সহকারে অনিদ্রা । ( ৩ গ্ৰেণ ) । ০ লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক পক্ষাঘাত রোগে অনিদ্রা ও তৎসহ স্বপ্নে মুখচাঁপা । ( ১২ গ্ৰেণ ) । ০ তাণ্ডব, বেড়াইতে বা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে অসমর্থতা । ( ১৬

গ্রেণে উপশম)। ০ বেপথু (৪ হইতে ১৫ গ্রেণে উপকার)। ০ বাম বাহুর তাণ্ডব (প্রত্যহ ৯ গ্রেণ মাত্রায়, পাঁচদিনে আরোগ্য)। বমনসহ গুল্মবায়ুজ তাণ্ডব (প্রত্যহ ৯ গ্রেণ মাত্রায় সত্তর আরোগ্য)। ০ হৃদকপাটের অসম্যকতা। (ডিজিটেলিনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম সেবনে হৃৎস্পন্দনের দ্রুততার হ্রাস হইয়া পনের দিবসে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল)। ০ রাত্রিতে শয্যায় মুত্রভ্যাগ (৬ গ্রেণে আরোগ্য হইয়াছিল)।

সম্মুখণ।—এষার, কফি, স্কুটে, থিয়া, ভেলের।

## ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়মের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হামণ্ড বলেন যে ইহার ক্রিয়া ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম ও ক্লোরাল হাইড্রেটের ক্রিয়ার অনুরূপ। প্রলাপ ও নিদ্রাহীনতা সংযুক্ত মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয়ে, অথবা অতিশয় দ্বায়বীয় উপদাহিতা বিশিষ্ট কেবল অনিদ্রায় ইহা উক্ত ঔষধদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডাঃ হেল বলেন যে বালকদিগের রোগে ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম অত্যন্ত ব্রোমাইড অপেক্ষা অধিক উপকারী। ক্যালকেরিয়া ও ক্যালকেরিয়া সংমিশ্রিত ঔষধগুলির বালরোগে বিশেষ ফলবত্তা দৃষ্ট হয়। ক্যালক-কার্ব, ক্যালক-ফস, ক্যালক-আর্স, ক্যালক-আইওড, ও ক্যালক-ব্রোম, এই পাঁচটা ঔষধে জন্ম হইতে যৌবন পর্য্যন্ত অনেকগুলি বাল-রোগই আরোগ্য করা যাইতে পারে। ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়মের নিম্নক্রমের বিচূর্ণ বা মূল ঔষধ এক হইতে দশগ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বালকদিগের মস্তিষ্কের মুখ্য বা গৌণ রক্তসঞ্চয় ও উপদাহ প্রশমিত করিতে পারা যায়। লসিকা-প্রধান, নিখিল, দ্বায়বীয় ও উত্তেজনশীল শিশুদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। যাহাদের শরীর শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় অথচ পেশী স্নদৃঢ় হয় না; শীঘ্র দাঁত উঠে না এবং দাঁত উঠিবার সময় আমাশয়, অম্ল, ও মস্তিষ্কের উপদাহ জন্মে; যাহারা অনায়াসে হাঁটিতে পারেনা তাহাদের পক্ষেই ইহা অতিশয় উপকারী। হৃৎস্পন্দন, কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু, পিত্ত-প্রধান, দ্বায়বীয় শিশুদিগের পক্ষে ব্রোমাইড অব সোডা বা পোটাসা উপযোগী। ডাঃ হেলের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি পূর্ববর্ণিত বালকদিগের মানসিক রোগের পূর্বরূপ বা প্রথমাবস্থায় বেলেডোনা, হাইওসায়েরাস, একোনাইট, ও ট্রাইওনিয়া অপেক্ষা এই ঔষধের অধিক উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ব্রোমাইড অব ক্যালসিয়ম ও পিয়মের জ্ঞায় মাদক নহে। ইহার ব্যবহারে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এতদ্বারা কেবল মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীগুলি আকৃষ্ট হইয়া রক্ত-সঞ্চয় নিবারিত, এবং প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহের আশঙ্কা হ্রাস প্রাপ্ত বা দূরীকৃত হয়। স্মরণ্য চিকিৎসায় কৃতকার্য হইতে হইলে সাহস পূর্বক ইহা একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। ডাঃ হেল মূল, ঔষধ, বালকের বয়সের পরিমাণানুসারে অর্থাৎ এক এক বৎসর বয়সক্রমে এক এক গ্রেণ

মাত্রায় যে পর্য্যন্ত না বিপদসূচক লক্ষণ অন্তঃস্থত হয় সে পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে বিধি দেন । যুদ্ধ রক্তসঞ্চয় বা উপদাহে ১৮ হইতে ৩৮ ক্রমের বিচূর্ণও ব্যবহার করা যাইতে পারে । তিনি দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের সমস্ত দিনের পেষ দুগ্ধে ১—৩ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়াও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন ; তাহাতেও সুন্দর ফল দর্শিয়াছে ।

## ব্রোমাইড অব মারকিউরি ।

ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়, এবং এতদ্বারা বিবর্দ্ধিত লালারূপ, —অতিশয় বিবমিষাজনক আঁসাদ, —বিরক্তিকর ধাতবস্বাদ ; গল-কোষে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, কাসোৎপাদক অবদারণ অনুভব, উদগার, বিবমিষা, অত্যন্ত উদর-বেদনা ও যন্ত্রণাজনক চেষ্টা সহকারে বমন, প্রবল বমন-চেষ্টা এবং আঁঠা আঁঠা স্লেয়া ও তৎপরে রক্তাক্ত স্লেয়াবমন, গল-কোষে ও আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা, আমাশয়ে প্রচাপন ; উদরের পৃষ্ঠবংশের দিকে আকৃষ্টতা ও অতিশয় স্পর্শ-দ্বेष, পেট-কামড়ানি, অস্ত্রে অল্প অল্প বেদনা ও প্রচাপন, উদর-বেদনার স্থায় বেদনা, অতি প্রবল উদর-বেদনা ও যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ ; উদর-বেদনা ও অঙ্গ-কূজন সহকারে বারংবার মলশ্রাব, পুনঃ পুনঃ পাতলা জলবৎ মলশ্রাব, লেহাকার মল, বিবর্দ্ধিত মূত্রশ্রাব ; শ্বাস-কষ্ট, বক্ষঃস্থলে ভার, ক্ষুদ্র ও মন্দ-গতি নাড়ী, অতিশয় দুর্বলতা; শরীরের নানাস্থানে, বিশেষতঃ বাম কক্ষে ও বাম বাহুতে ( যথায় পরীক্ষার্থে ঔষধ মর্দিত হইয়াছিল ) ছুরারোগ্য স্ফোটোকোৎপত্তি ; সর্বশরীরে ঘর্ষ ও প্রবল বেদনার সময় অতিশয় আশঙ্কা-শীলতা ; এই ঔষধের লক্ষণ । ডাঃ হেল বলেন যে তিনি গলাভ্যন্তরের অতিশয় যাতনা, শ্বেতবর্ণ কৃত্রিম সিল্লী, এবং মুখগহ্বর ও তালু মূলের ধূসরাত লোহিতবর্ণ লক্ষণাপন্ন ডিপথিরিয়া রোগে কয়েকজন রোগীকে ইহার ৩৮ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । অক্সি-চিকিৎসক ডাঃ হিলড্রেথ আইরাইটস রোগেও চক্ষুর বিধানতন্ত্রর তীব্র রক্ত-সঞ্চয়ে এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন ।

## ব্রোমাইড অব আয়রণ ।

ব্রোমাইড অব আয়রণ একভাগ, চিনি তিনভাগ, পরিষ্কৃত জল দশভাগ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধের মাদারটিকার প্রস্তুত হয় । ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত জলে, তদুর্দ্ধ ক্রম এককোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে । রক্ত-স্বল্পতা, অতিশয় দুর্বলতা, ও চিন্তের অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন শুক্রমেহ ( স্পার্মটোরিয়া ) রোগে কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন ; ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয় ।



## ব্রোমাইড অব নিকেল।

ব্রোমাইড অব নিকেল নক্স, চায়না, ফিরম, ও আর্সেনিকমের শিরঃপীড়া সদৃশ একপ্রকার বিশেষ শিরঃপীড়া জন্মায়। এই শিরঃপীড়ায় মস্তক বেন আঘাতিত হইয়া ঋণ্ড ঋণ্ড হইতেছে একরূপ ঘৃষ্টবৎ বেদনা, শিরোগৌরব, উত্থানকালে শিরোগূর্ণন, অধিকন্তু মস্তকে ছেদন, বেদন, রক্তকরণ, ও মৃদগারাবাতবৎ বাতনাদি লক্ষণ থাকে। ঈদৃশ শিরঃপীড়ায় ও স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় ইহার ২৫ বা ৩৫ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

## ব্রোমাইড অব লিথিয়ম।

একড্রামে নয়ড্রাম জল মিশ্রিত করিয়া ইহার জলীয় মাদার টিকার প্রস্তুত হয় এবং পরিস্কৃত জল সহকারে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অত্যাশ্র ব্রোমাইড অপেক্ষা ব্রোমাইড অব লিথিয়মের ফ্রিয়া অধিক সত্ত্ব প্রকাশ পায় এবং ইহার অতিক্রিয়ায় চর্মে উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় না। একজন ডক্টরলোকের সংশ্রাস রোগের উপক্রম উপস্থিত হইয়াছিল। একবার আক্রমণ জন্মিয়াই তাহার অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া ছিল; এবং অবশ্যতা, শিরোগূর্ণন, শিরঃপীড়া, ও বাক্যের স্থূলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; ডাঃ মিচেল ৩০ ত্রিশ গ্রেণ পরিমাণ একমাত্রা এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সেই রোগীকে সম্যকরূপে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন। আর একজন রোগীর অপস্মার (মুগী) রোগ ছিল। প্রতি দিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেই তাহার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত দশ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার এই ঔষধ ব্যবহারে সে আরোগ্য লাভ করে। মিচেল বলেন যে ব্রোমাইড অব পোটাসিয়াম দ্বারা অপস্মারে উপকার না দর্শিলেও এতদ্বারা রোগের আক্রমণ নিবারিত হয়। একব্যক্তির দীর্ঘকাল মানসিক পরিশ্রমের পর মুখ-রাগ, অনিদ্রা, ও স্বপ্নবয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্তম্ভীত বেদনা জন্মে। এই ঔষধে সেই সকল লক্ষণের শান্তি লাভ হয়। এতদ্বারা অত্যাশ্র ব্রোমাইড অপেক্ষা শীঘ্র ও নিশ্চিতরূপে অনিদ্রা দূরীকৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে ব্রোমাইড অব লিথিয়মে লিথিয়া আছে বলিয়া বাত ও গাউট রোগে ব্রোমাইড ব্যবস্থা করিতে হইলে তিনি ইহাই শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

## ব্রোমাইড অব জিঙ্ক।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগণ্ডের রোগে জিঙ্কম একটি প্রধান ঔষধ। বারুক্যজনিত মস্তিষ্কের শীর্ণতায়, কোমলতায়, অবসন্নতায়; এবং বালকদিগের মস্তিষ্কের জল সঞ্চয় ও তদনুরূপ অবস্থায় জিঙ্কম অতিশয় ফলপ্রসূ। ডাঃ হেলের মতে এইসকল রোগে জিঙ্ক অপেক্ষা ব্রোমাইড অব জিঙ্ক সত্ত্ব উপকার করে। দন্তোদ্ভেদকালে অনেক সময় শিশুদিগের

মস্তক ও মুখমণ্ডলের দ্বায়ুর তীব্র বেদনা জন্মে। এই বেদনা বশতঃ শিশু অবসন্ন হইয়া পড়ে, পর্যায়ক্রমে স্তম্ভি ও অনিদ্রা উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে হাইড্রোসিফেলস রোগের অসুস্থ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এইপ্রকার অবস্থায় ব্রোমাইড অব জিক্স তৃতীয় বা চতুর্থ ক্রমে শীঘ্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। কার্য্য-পরতন্ত্র লোকদিগের মস্তিষ্কের অবসন্নতায় ফসফাইট অব জিক্সই অধিক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মস্তকে পর্যায়ালীল প্রবল বেদনা থাকিলে ব্রোমাইড অব জিক্সই শ্রেষ্ঠ। মস্তিষ্কের পুরাতন রক্ত-সঞ্চয়ে বুদ্ধি-বৈকল্য বা বিষাদ লক্ষণেও ব্রোমাইড অব জিক্স উপকারী। কোন কোন বিষয়ে ইহা পিক্রিক এসিড বা সিমিসিফুগার সমকক্ষ।

## ব্রোমাইড অব কুইনাইন।

ইংলণ্ডের ডাঃ রিচার্ডসন জরে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা সলফেট অব কুইনাইন অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এতদ্বারা কুইনাইনের জ্বর মস্তকে অসুখকর রক্ত-সঞ্চয় জন্মে।

## ব্রোমাইড অব সোডিয়ম।

ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম ব্যবহারোপযোগী প্রায় সকল রোগেই এই ঔষধ উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার স্বাদ প্রায় সামান্য লবণের সদৃশ। সূত্রাং রোগীর পথ্য ও শিশুর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## ভাইপারা।

ভাইপারা ভাইপার নামক সর্পের বিষ। ডাঃ জোসেট যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে এই ঔষধের প্রশংসা করেন। বিবমিষা, বমন, তৎসহ শিরোঘূর্ণন ও অগ্নিমান্দ্য, মূচ্ছা, পাণ্ডু, ক্ষয়কর অতিসার, হৃৎকম্প, ; সর্কাসীন আলস্ত ও অবশতা; গল-মধ্য ও বক্ষঃস্থলের আক্কেসিক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বা অকাল-বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য; এই সকল লক্ষণে আমাশয়ের দুর্বলতায় ভাইপারার ব্যবহার আছে। হৃদ্রোগেও বক্ষঃস্থলে প্রবল-বেদনা, তৎসহ শীত; শ্বাস-কষ্ট সহ বক্ষঃস্থলের ক্ষীণতা; হৃৎপিণ্ডে প্রবল রক্তসঞ্চয়; পরিহিত বস্ত্র ছিন্নকরণ ও উদরে অত্যন্ত শুল্কায় অসুস্থত্ব; হৃৎপিণ্ডের নিকটে উৎকর্ষা, উর্দ্ধশাখার অবশতা ও খঞ্জতা; এইগুলি ভাইপারার লক্ষণ।

ডাঃ হানসেন লেখেন যে জীষৎ হরিদ্বর্ণ ও রক্তাক্ত অতিসারের পর বিবর্জিত যকৃতে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা, তৎসহ পাণ্ডু ও জ্বর; যকৃত হইতে স্রব ও কুচকীতে বেদনার

সংপ্রসারণ লক্ষণে ভাইপারা ব্যবহারে যত্ন স্বাভাবিক আকারে পরিণত ও বেদনা দূরীকৃত হইয়াছিল। শিরা-ক্ষীতি ও তরুণ শিরা-প্রদাহেও ভাইপারা উত্তম ঔষধ। শিরার ক্ষীভতা, প্রান্তভাগে প্রদাহ, স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি, \* পীড়াক্রান্ত অঙ্গ নীচে ঝুলাইয়া রাখিলে বিদারণবৎ বেদনা ও অনুভব, মেজের উপর বা অল্প কোন উচ্চ স্থানে তুলিয়া রাখিলে উপশম ভাইপারার প্রয়োগ-লক্ষণ।

## ভাইবার্ণম ওপিউলস—ক্রাণবেরিটী ।

ক্যালিফোর্নিয়ানী জাতীয় এই গুল্ম আমেরিকায় জন্মে। ইহার মূলদ সরস বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। ভাইবার্ণম দুই প্রকার। অল্পপ্রকারকে ভাইবার্ণম প্রিন্ফোলিয়াম বলে। সম্ভবতঃ এই দুইপ্রকারের গুণ একরূপ নহে।

ক্রিয়া।—মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুলের অভ্যন্তর দিয়া স্ত্রী-জননেদ্রিয়ে ভাইবার্ণমের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে ভেলিরিয়েনিক এসিড আছে তাহারই প্রভাবে ইহার এইপ্রকার ক্রিয়া জন্মে।

রজ-শূলে অর্থাৎ বাধক-বেদনায়, বিশেষতঃ রক্তসঞ্চয় অথবা স্নায়বীয় প্রকৃতির বাধক-বেদনায় ( ডিসমিনোরিয়া ) এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বিল্লী-বিশিষ্ট ও প্রতিরোধকর বাধকেও ভাইবার্ণম অল্পকালস্থায়ী উপশমপ্রদ। ইহার ক্রিয়া প্রায় তিনমাস থাকে, তৎপরে অপর ঔষধের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কোন কোন রোগিনী এই ঔষধেই একেবারে স্থায়ী আরোগ্য প্রাপ্ত হন। লক্ষণগুলি প্রধান লক্ষণে উল্লেখিত হইল। প্রসবান্তিক বেদনায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। জরায়ুতে তীব্র খল্লী, ও আবেগ; অথবা পৃষ্ঠ হইতে জরায়ুর চারিদিকে বেদনা, এবং নিম্নোদরে সেই বেদনার অতি সুদারুণ বেদনায় পরিসমাপ্তি;—এই সকল লক্ষণে গর্ভপাত-সম্ভাবনায় ভাইবার্ণম ব্যবহৃত হয়। বেদনাপূর্ণ ঋতুবিশিষ্টাদিগের হিষ্টিরিয়া রোগেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শ্বেতপ্রদর। আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্র, —এই দুই রোগেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ডাঃ হেলের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে জরায়ুর উপদাহ জনিত গুল্মবায়ুর আক্ষেপ; স্নায়ুগুলের সাধারণ উপদাহ; গর্ভাবস্থায় হস্তপদের খল্লী ও আকুঞ্চন; আক্ষেপান্তে পক্ষাঘাতের অবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধ ও অবারিত মূত্র-স্রাব সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য; আক্ষেপবৎ শ্বাস-কষ্ট; অনেকক্ষণ বিচরণের পর পদের খল্লী; গুল্মবায়ুগুণ্ডাদিগের আক্ষেপিক মূত্র-কৃচ্ছ্র; আক্ষেপিক রজ-কৃচ্ছ্র; জরায়ুতে খল্লীর স্থায়ী তীব্র বেদনা সংযুক্ত আক্ষেপিক ও স্নায়ু-শূল প্রকৃতির রজ-কৃচ্ছ্র;—কৃত্রিম বিল্লীবিশিষ্ট রজকৃচ্ছ্র; অতিশয় বেদনাসংযুক্ত, ঋণ, কিন্তু নিয়মিত ঋতু; জরায়ুর উপদাহের প্রতিক্রিয়া বশতঃ আমাশয় অল্প, মূত্রাশয়,

বা অত্যাশ্চর্য বস্ত্রের খস্মীল বেদনা ও আক্ষেপ; এবং রক্ত-কৃষ্ণ সহযোগে ডিম্বাশয়ের উপদাহিতা; ভাইবার্নাম সেবনে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। ভাইবার্নাম প্রনিকোলিয়ম মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের উপকৃত; ছুরারোগ্য প্রকৃতির ক্ষত; ককটীয় ক্ষত; গর্ভাবস্থায় অঙ্গের তীব্র খল্লী; ও গর্ভস্রাবের হৃৎকম্প আরোগ্য করে। অভ্যন্ত গর্ভস্রাব, যে কোন কারণ জনিত উগ্র বেদনা বিশিষ্ট গর্ভস্রাব; ভাইবার্নাম প্রনিকোলিয়ম সেবনে প্রতিবন্ধ হয়। গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে গসিপিয়ম খাইলে এতদ্বারা তাহারও ক্রিয়া সম্যকরূপে বিনষ্ট হয়। এবং প্রসব-বেদনার অধিকতর যুত্ব ও সহনীয়ত্ব জন্মে। ডাঃ হেল আশঙ্কিত অকাল প্রসববেদনায় অথবা গর্ভস্রাবে, রক্ত-কৃষ্ণ, এবং জরায়ুর নানাপ্রকার আক্ষেপিক বেদনায় ভাইবার্নাম প্রনিকোলিয়মের মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আলাবামার এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ ফের্গাস আশঙ্কিত গর্ভস্রাবে ভাইবার্নাম প্রনিকোলিয়ম বিস্তারিত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কি অভ্যন্ত, কি আভিষ্মিক, কি ঔষধজনিত, সকল প্রকার গর্ভস্রাব নিবারণেই এই ঔষধ উপকারী। তিনি ইহার অরিষ্ট একড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ভাইবার্নাম ওপিউলসই সমধিক ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং এতৎসম্বন্ধেই ঔঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনায় বেদনা নিম্নোদরের নিম্নভাগে আসিলে ও উরুতে গেলে ভাইবার্নাম ওপিউলস ফলপ্রদ। এতদ্বারা একান্ত গর্ভস্রাব নিবারিত না হইলেও বেদনা স্থগিত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে আক্ষেপিক বেদনাবিশিষ্ট গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় অপত্য-পথের ঝিল্লী উপহৃত হইবার পূর্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়। নিম্নোদরে ও জন্মায় খল্লীবিশিষ্ট কৃত্রিম প্রসব-বেদনায়ও ইহার ব্যবহার আছে। আক্ষেপিক রক্ত-শূলে (ডিসমিনোরিয়া) ডাঃ হেল ভাইবার্নাম ওপিউলসের অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি এই রোগে ইহার মূল অরিষ্ট, বা ১৬ হইতে ৩৬ ক্রম কয়েক বিন্দুমাত্রায় ঋতুর এক সপ্তাহ পূর্বে হইতে প্রতিদিন তিনবার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; ঋতুকালে বেদনা উপস্থিত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ও বেদনার অতিশয় তীব্রতা থাকিলে পনের মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করেন। এই রূপে তিনি বতগুলি রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়াছেন সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ছুরারোগ্য বলিয়া পূর্বে যে সকল রোগিণী পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহারাও এতৎসেবনে রোগ মুক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম প্রসববেদনায় ও প্রসবাত্তিক বেদনায়ও এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্রত্যেকবার বেদনার আবেশের পর এক একবার ঔষধ গ্রহণ্য। ডাঃ রডক বলেন যে তিনি ডিম্বাশয়ের উপদাহে, জরায়ু-গ্রীবার আক্ষেপিক আকুঞ্চে, এবং যন্ত্রণাপ্রদ ঋতুসম্বন্ধীয় অপর কোন কোন উপদ্রবে এই ঔষধের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাঃ হানসেন বলেন যে এই ঔষধে আশঙ্কিত গর্ভস্রাবের পূর্ববর্তী রক্তস্রাব প্রতিবন্ধ হয়।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—বিমগ্নতা ; কোপনতা । মানসিক পরিশ্রমে অপারগতা ।

মস্তক ।—শিরোগর্ঘন । সম্মুখভাগে, অগ্রথর শিরঃপীড়া ; এবং মানসিক শ্রমে বিবন্ধিত, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশমিত, অক্ষি-গোলক পর্য্যন্ত প্রসারিত ; দপদপ । প্রধানতঃ বিলম্বিত ঋতু প্রকাশিত হইবার সময় ( সিমি ), চক্ষুর উপরে গৌরব সংযুক্ত অতীত্র শিরঃপীড়া, বামদিকে উহার আধিক্য, এবং সময়ে সময়ে মস্তকের শিখর ও পশ্চাত্তাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ; আকস্মিক আঘাতে, অবনত হইলে, পদস্থলনে বা সঞ্চালনে ; ও প্রতিক্রিয়া ; উহার বৃদ্ধি ।

চক্ষু ।—চক্ষু ও চক্ষু-গোলকের উপরে গুরুত্ব ; সময়ে সময়ে দৃষ্ট বস্তুর নিশ্চিত জ্ঞান লাভের নিমিত্ত উহা হইবার দেখিতে হয় । অক্ষি-গোলকে স্পর্শ-দেহ ( ব্রাই, ফাইস, স্পিজি ) ।

মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত ও উত্তপ্ত ।

মুখমধ্য ।—শুক, বিস্তৃত, ও শুভ্রজিহবা ; কেন্দ্রস্থান কপিশ ; জিহবায় দন্তের চিহ্ন পড়ে ( \* নার্ক ) । মুখের স্বাদ তাত্রবৎ ( তাঁবাটে ) ; অগ্নীতিকর । ওষ্ঠ ও মুখ বিবর শুক ( \* আর্স, ব্রাই, \* নক্স-ম, \* পল ) ।

আমাশয় ।—অবিরত বিবমিষা ; তৎসহ শ্রান্তি ; আহারে শ্রান্তি ; তৎপরে বমন ; প্রতি রাত্রিতে নিদারুণ বিবমিষা । আমাশয়ে শ্রান্তি ও তৃষ্ণার অল্পভব ; তজ্জন্ত শয়ন করিয়া থাকার আবশ্যকতা ; ঋতুর পরে, শ্রাব বন্ধ হইলে উহার উপস্থিতি । আমাশয়ে শৃণুতা অল্পভব ( সিমি, ইগ্নে, সিপি ) ; তুচ্ছ দ্রব্যের গুরুভাবে অবস্থিতি ।

উদর ।—প্লীহা প্রদেশে গভীর-মূল, বাণাঘাতবৎ বেদনা । প্লীহার রক্তবহা নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়া তপ্ত তরলদ্রব্য প্রবাহিত হওয়ার ছায় অল্পভব । প্লীহা প্রদেশে তীব্র বেদনা, ঘর্ষ নিঃসরণে শ্রান্তির উপশম । বাম কৃত্রিম-পার্শ্বকার নিম্নে তীব্র দপদপকর বেদনা ; শক্ত চাপে ও হাঁটলে উহার উপশম ; বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারা যায় না । উদরের স্পর্শ-দেহ ও অল্পভবাবিক্য, নাড়ীর নিকটে উহার আধিক্য । নিম্নোদরে অসহ্য-প্রায়, সহসা ভয়ানক উগ্রতা সহকারে উপস্থিত, খালধরার ছায়, উদর-বেদনা ।

মল ।—সরলাব্ধের নিষ্ক্রিয়তা ( \* এলম ) ; বৃহৎ, শক্ত, শুক, গোলাকার আকৃতি মল, আয়াসে ও বাহ্যিক উপায়ে উহা নিঃসারিত করিতে হয় ; কুহন । মলত্যাগান্তে মলিন রক্তপাত । প্রভূত, জলবৎ, শীত সংযুক্ত, অথচ সেই সময় কপাল হইতে বিগলিত শীতল ঘর্ষ বিশিষ্ট, অতিসার ।

মূত্র ।—পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার, জলবৎ প্রচুর মুক্তস্রাব ।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—ঋতু পূর্বে জরায়ুতে তীব্র আবেগ, উষ্ণর সম্মুখভাগের পেশীতে আকর্ষণ ; ত্রিকদেশে ও মণিপূরের উপর ভারী অবিবাহিত বেদনা ; ডিম্বাশয়ে কখন কখন

ভীক্ষ, সঞ্চরমান বেদনা ; বেদনায় রোগিণীর এতই ভ্রায়বীয়তা জন্মে যে সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; নিম্নোদরে ও জরায়ুর অভ্যন্তর দিয়া দাক্ষিণ, ধল্লীবৎ, উদর-বেদনা ; বেদনার পৃষ্ঠে আরম্ভ ও চারিদিকে গতি, জরায়ুর ধল্লীতে পরিসমাপ্তি ; সায়াক্ষের প্রথম ভাগে, ও আবদ্ধ গৃহে বেদনার বৃদ্ধি ; বিষুক্ত বায়ুতে ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাস । ঋতুকালে বিবমিষা । খালধরার ভ্রায় বেদনা ও অতিশয় ভ্রায়বীয় অস্থিরতা ; বোধ হয় যেন শ্বাস শরীর ছাড়িয়া যাইবে ও জ্বপিশেখের স্পন্দন রহিত হইবে ; বেদনায় যেন পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে ; ঋতুর প্রবাহ কতিপয় ঘটিকা স্থগিত থাকে, অনন্তর সংঘত রক্ত পতিত হয় । স্বল্প, পাতলা-রক্তের ঋতু রক্ত, তৎসহ মস্তকে লঘুজ্জ অল্পভব ; উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে শ্রান্তি । বস্তি-গহ্বরস্থ যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় অল্পভব, বোধ হয় যেন রক্ত প্রকাশিত হইবে । পাতলা, পীত-শুদ্ধ, অথবা বর্ণশূন্য প্রদর, কিন্তু মলত্যাগকালে গাঢ়, শুভ্র, রক্তের রেখাক্তি প্রাপ্য ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—মস্তকের পশ্চাত্তাগে বেদনা সহকারে গ্রীবার স্তব্ধতা । পৃষ্ঠের পেশীতে শ্রান্তি ও ষষ্টতাব ভ্রায় বেদনা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।—হস্তদ্বয়ে ভ্রনভ্রন শব্দ, বোধ হয় যেন উহা বিদীর্ণ হইবে । হস্তাঙ্গুলীর ক্ষীণতা ও অবশতা, শীতল জলে প্রক্ষালনে উষ্ণতার আধিক্য ।

দেহ ।—রোগাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে অসমর্থতা ।

নিদ্রা ।—অস্থির, অতৃপ্তিকর নিদ্রা ।

উপচয় ।—সায়াক্ষ ও রাত্রিতে ; উষ্ণ গৃহে ; ও বাম পার্শ্বে ; আধিকা ।

উপশয় ।—অনাবৃত বায়ুতে ; নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে ; ও চাপ দিলে ; উপশয় ।

সমগুণ ।—কল, সিংহ, জেল, সিক, সিপি, জ্যাছোক ।

## ভিনকা মাইনর ।

ভিনকা মাইনর বা পেরিউইস্কেল একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ । সমগ্র সরস বৃক্ষ হইতে ইহার অতিষ্ঠ প্রস্তুত হয় । ইহাতে একপ্রকার তিক্ত ও সংকেচক বীৰ্য্য আছে । এলোপ্যাথেরা এজন্ত ইহাকে বলকর ও রক্তরোধক বলিয়া থাকেন । হোমিওপ্যাথিক ক্রমেও ইহার পুরোক্ত গুণ বিद्यমান থাকে । ক্রিয়া ।—স্বাস্থ্যমণ্ডল ও রক্তবহা নীড়ীতে ইহার সাধারণ ক্রিয়া ও স্বকে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় । মস্তকের স্বকেই ভিনকা মাইনরের সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় । অধিকার ।—মস্তক ও মুখমণ্ডলের পান্য । ক্রষ্টা ল্যাটিষ্টিয়া । প্লিকা পলোনিকা । নাসিকা, ফুসফুস, অস্ত্র, ও অপত্য-পথ হইতে রক্তপ্রাব । নিবৃত্তরক্তস্ফাদিগের ও তত্ত্বময় অর্জুদ জন্ত জরায়ু হইতে রক্ত-প্রাব । ডিপুথিরিয়া ।

## প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

ভিনকা মাইনর মস্তকে, মুখমণ্ডলে ও কর্ণের পশ্চাতে একপ্রকার দুর্গন্ধি উদ্ভেদ উৎপন্ন করে । ঐ সকল উদ্ভেদে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কুমি জন্মে । পীড়কার উপরে একপ্রকার চিপটিকার উৎপত্তি হওয়াতে তলের পুষ পচিয়া পোকা জন্মিবার বিশেষ সুবিধা হয় । চুল পড়িয়া যায় ও সেইস্থানে শুভ্র চুল উঠে । অতএব এক এক ক্ষুদ্র স্থান হইতে কেশ-পতন, ও তথায় ক্ষুদ্র কেশের উৎপত্তি ; মস্তকে রসস্রাবী পীড়কা, ও তদ্বারা কেশ একত্র জড়িয়া যাওয়া ; এই সকল লক্ষণে মধুচক্রাকার অরুণিকা ও তজ্জনিত ইক্সলুপ্টে ভিনকা মাইনর ব্যবহৃত হয় । অরুণিকা ( ক্রষ্টা ল্যাটিয়া ), ও গ্লিকা পলোনিকা রোগে তাইওলা ট্রিকলার প্রভৃতি ঔষধেরও ব্যবহার আছে । তীব্র গন্ধ মূত্র তাইওলার, গ্রন্থির ক্ষীণতা আর্কিশিয়ম ল্যাপ্সার ; পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল, বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারে টাক্সিসে-গ্রিয়ার ; এবং মস্তকের আরক্ততা ও প্রবল কণ্ডুয়ন নক্স জগলাসের প্রভেদক লক্ষণ । অপ্রতিহত শ্রোতের ছায় নিপতিত অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব ও তৎসহকারে অতিশয় দুর্বলতা লক্ষণাপন্ন অতিরক্তরোগে ; এবং তদ্ব্যবসায় অর্ধবৃত্ত বশতঃ জন্মায় হইতে অপ্রবল রক্তস্রাবে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । ডাঃ হিউজ নিবৃত্তরক্তা ভিনকন রোগিণীর রক্তস্রাবে ভিনকা ব্যবহার কবিয়াছিলেন । একজন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল । আর একজনের প্রথম সারিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে রোগ প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল । অপর রোগিণীর কোন উপকার দর্শিয়াছিল না, তাহার কক'ট ( ক্যানসার ) রোগ ছিল । ডাঃ হিউজ এই ঔষধের প্রথম ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ও মস্তিষ্কাদি ।—মূত্র-ভয়সংযুক্ত বিমর্ষতা ; ক্ষণরাগিতা ; কলহ-প্রিয়তা । শিরোগ্রন্থি ; আবর্তন ; চক্ষুর সম্মুখে আলোক-শিখা-দর্শন । পুনঃ পুনঃ জ্বন্তণ ; রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা ; কাম-বিষয়ক স্বপ্ন । ত্রুকু ।—জ্বালা ও কণ্ডুয়ন ; অতিশয় অমুভূতি । মস্তক ও নাসিকাদিতে চর্ম্মদলের ( ইম্পিটাইগো ) অমুরূপ আর্দ্র উদ্ভেদ ।

দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—দুর্বলতা ও অবসন্নতা ; সমস্ত রক্তবাহা নাড়ীতে কম্পন অমুভব । বক্ষঃস্থলে বেদনা ; গ্রীবার পেশীর শুষ্কতা । অঙ্গে ছেদনবৎ বেদনা ; অঙ্গ-প্রসারণ করিবার প্রবৃত্তি ; হস্ত-পদের অঙ্গুলীর সবিশেষ আক্রান্ততা । মস্তক ও চক্ষু-কর্ণাদি ।—মস্তকের কণ্ডুয়ন ; আর্দ্র উদ্ভেদ ; উহাতে পোকা । শিরঃপীড়া,—প্রচাপন ছেদনবৎ বেদনা ; মস্তকের পশ্চাভাগে ও শিখরদেশে বেদনা । চক্ষুর অপরিচ্ছন্নতা ; দৃষ্টির আবিলতা ; বেদনা । কর্ণে টুনটুন ও সন্সন্ শব্দ । নাসিকার অগ্রভাগের আরক্ততা ; কণ্ডুয়ন ; রক্তস্রাব । মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা, বেদনা ও পাণ্ডুরতা । ওষ্ঠের শুষ্কতা ও ক্ষীণতা । স্নায়ুমণ্ডল ।—স্নায়বীজ দুর্বলতা । অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা ; কম্পন । রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্র ।

—সহসা কম্পের আবেশ ; পূর্ণ ও দৃঢ় নাড়ী সহকারে উদ্ভাপ । শ্বাস-বন্ত্র ।—কণ্ঠনলীতে হৃৎস্থিত শ্লেষ্মা ; স্বরভঙ্গ ; দ্রুত শ্বাস । গলকণ্ডুয়নকর আক্ষেপিক কাস । শ্বাস-কৃচ্ছ্র সহকারে বৃকে বেদনা । পরিপাক-বন্ত্র ।—মুখ-বিবরে উপক্ষত, লাল ; দন্ত-বেদনা ; গলায় বেদনা, ক্ষত । অতিশয় ক্ষুধা ; ক্ষুধাহীনতা ; স্বাদ-শূন্যতা । উল্লার ; বিবমিষা, বমন ; ও অত্যাশ্র আশায়িক উপদ্রব । উদরের পূর্ণতা, ও অশিথিলতা, কিন্তু বেদনা-বিহীনতা ; অন্ত্র-কুজন ; হর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ; মোচড়ান বেদনা । মল ।—প্রথমে শক্ত, পরে নরম মল ; অধিক, মল-বেগ ; মলদ্বারে জ্বালা । মুত্র-বন্ত্র ।—মূত্রের অনন্নতা ; পাণ্ডুরতা,—পীতবর্ণ । জনন-বন্ত্র ।—(স্ত্রী) অতিশয় হ্রস্বলতাসহ অত্যধিক রক্ত-স্রাব । উপশম ।—সঞ্চালনে ; ও বিমুক্ত বায়ুতে উপশম । সমগুণ —মার্ক, সলফ, হাইড্রো-ক্যান, ভায়োলা-ট্রিক ।

## ভিক্ষম এন্ডম—মিজেলটো ।

ভিক্ষম একপ্রকার পরগাছা । এই গুল্ম ইউরোপে জন্মে । ওক বৃক্ষে যেগুলি জন্মে তাহাই ঔষধার্থে প্রশস্ত । উগ্র এলকোহল সহযোগে কাঁচা গুল্মের অরিষ্ট ; এবং শুষ্ক গুল্মের বিচূর্ণ প্রশস্ত হয় ।

অপস্মার, তাণ্ডব, শিরঃশূল, শিরোধূর্ন, পর্যায়শীল দ্বায়ুশূল, বক্ষ-শোথ, হৃদ্রোগ, অতিরক্ত, জরায়ুর আক্ষেপ, গৃধ্রসী, (সায়োটিকা) ও অত্যাশ্র নায়বীর রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

অপস্মার ।—অবিরত শিরোধূর্ন, শয়িত অবস্থায়ও শিরোধূর্ন ; মস্তকের সমগ্র-খিলান বেন উঠিয়া যাইবে এক্রূপ অনুভব ; ও মুখমণ্ডলের পেশীর নিরন্তর অস্থিরতা লক্ষণে অপস্মার রোগে ভিক্ষম ব্যবহৃত হয় । নাইস নগরের ডাঃ ফ্রান্স এই ঔষধ পরীক্ষাকালে অপস্মারের “সরসর” অনুভব করিয়াছিলেন । ডাঃ মার্সী বলেন যে ইহার বিচূর্ণ কুড়িগুণ মাত্রায় অপস্মারে ব্যবহৃত হইয়াছে । ম্যাটিথিওলস উল্লেখ করেন যে ভিক্ষমের চূর্ণ পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমাগত চল্লিশ দিবস সেবন করিলে নিশ্চিতই মৃগীরোগ আরোগ্য-হয় । কলপেপার লিখিয়াছেন যে একজন যুবতীর অপস্মার রোগ ছিল, তিনি তজ্জন্তু সূত্রাসিক চিকিৎসকদিগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না । তাহার প্রতিদিন আটদশবার রোগের আবেশ উপস্থিত হইত । পূর্ণিমান পূর্বের কয়েকদিন কেবল প্রকৃত মিজেলটোর চূর্ণ, একটী সিকিতে যে পরিমাণ ধরে সেই পরিমাণে প্রত্যুষে সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন । ভিক্ষমের উপকার



ভিসাইন ছইগ্ৰেণ পরিমাণে সেবন করিয়া একটা শশকের অর্দ্ধঘণ্টাহারী অপস্মারের আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র উদ্ভিদভোজী পশুদিগের অপস্মারে ডাঃ লেভিল এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। ডাঃ ওয়াইল্ড বলেন যে অতি-রক্ত সংস্থাপ্ত অপস্মারে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। শিরঃপীড়া।—সমগ্র করোট যেন উঠিয়া যাইবে এপ্রকার অল্পভব; \* অবিরত, শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্নন; শঙ্খদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত, ছেদনকর সঞ্চরমান বেদনা; এবং মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা ভিক্ষমের প্রয়োগ-লক্ষণ। গৃধ্রসী ( সায়োটিকা )।—ঘাড় হইতে নিতম্বে ও উরুর বহির্দিকে বেদনার স্থান-বিকল্প; ত্রিকাহির বামপার্শ্বে ভয়ঙ্কর ছেদনকর, সঞ্চরমান, দপদপকর বেদনা ও উরু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ; উরুর মাংস যেন উত্তপ্ত সোমাদ্বারা ছিন্ন হইতেছে এপ্রকার অল্পভব; উরুর অতিশয় স্পর্শাধিক্য, যৎসামান্য স্পর্শে ক্লেশামুভব; ত্রিকাহির হইতে বস্ত্রি-গহ্বর পর্য্যন্ত পর্য্যায়শীল বেদনা, শয্যায় শয়িত অবস্থায় উহার অতিশয্য, এবং উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে উভয় উরুতে, অপিচ উর্দ্ধ শাখায় ছেদনকর সঞ্চরমান বেদনা, তৎসহ নিদ্রাহীনতা ও সর্কাদীন অবসন্নতা; এই সকল লক্ষণে উৎকট গৃধ্রসী রোগে ভিক্ষম ফলপ্রদ। তাণ্ডব।—ভয়জনিত তাণ্ডব ( কোরিয়া ) রোগেও ভিক্ষম ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ জ্ঞাপক আক্ষেপ নিদ্রাকালেও বিদ্যমান থাকে। ডাঃ মার্সী উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহার অরিষ্ট পাঁচ বিন্দুমাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করিয়া একজন বালকের কোরিয়া রোগ সত্তর আরোগ্য হইয়াছিল। বাত।—ডাঃ মার্সী বলেন যে প্রথম শততমিক শক্তির এই ঔষধ পাঁচবিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার, দশ হইতে কুড়িমাত্রা পর্য্যন্ত সেবনে পুরাতন বাতে উপকার দর্শে। ডাঃ হেল বলেন যে আমবাতিক স্নায়ুশূলে; ও নিম্নাঙ্গের সায়োটিকা সদৃশ প্রবল স্নায়বীয় বেদনায়ই ভিক্ষম বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। জরায়ু-রোগ।—শঙ্খদ্বয়ে সূচী-বেধবৎ বেদনা, হস্তপদের অবশতা, নিম্ন নয়নের চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল সহ জরায়ুর রক্তস্রাব। রক্তের আংশিক উজ্জলতা, আংশিক মলিনতা ও সংযততা। এই ঔষধে জরায়ুর সংকোচন জন্মে স্তবরাং অমরারোধে উপকার দর্শে। ডাঃ হানসেন বলেন যে হৃৎ-শঙ্খ-কাসেও ভিক্ষম ফলপ্রদ। কয়েকবার উক্ত রোগের ব্যাপকতায় তিনি ইহা পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক।—০ অবিরত শিরোঘূর্নন, শয্যায় শয়িত অবস্থায়ও শিরোঘূর্নন। অপস্মার। ০ শঙ্খদ্বয়ে সূচী-বেধ সহকারে অতীব শিরঃপীড়া। ০ মূর্ছাদেশে মস্তকের চর্ম অবশবৎ অল্পভব। ০ মস্তকে পুনঃ পুনঃ রক্তের প্রধাবন এবং তৎসহকারে মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা। ০ অতিশয় শিরোঘূর্নন ও সঞ্চরমান শিরঃপীড়া। শঙ্খদ্বয়ে সঞ্চরমান, ছেদনকর, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত বেদনা। ০ মস্তকের বিশৃঙ্খলা, বাম শঙ্খদেশে ছেদনকর বেদনা, এবং উহার কণাল ও মস্তকের কেশাবৃত্ত স্থল পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ। ০ করোটের

সমগ্র উপরিভাগ যেন উখিত হইবে এরূপ অল্পভব । ০ শঙ্খদ্বয়ে সপর্ধ্যায়ে প্রত্যাবৃত্ত বেদনা, সান্নাঙ্কে ও রাত্রিতে উহার আতিশয়া । চক্ষু ।—চক্ষুর গুরু মণ্ডলের আরক্ততা । ০ গভীর-প্রবিষ্ট চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল । ০ যুগল-দৃষ্টি । কর্ণ ।—০ প্রতিষ্ঠায় জনিত বধিরতা । ০ বামকর্ণে আকর্ষণ বা ছেদনবৎ অল্পভব । ০ কর্ণে উচ্চ গুণ্ণগুণ ও অবরুদ্ধবৎ অল্পভব । মুখ-মধ্য ।—মুখের কোণদ্বয়ের ক্ষত । জিহ্বায় অতিশয় স্পর্শ-দেয়, কিন্তু জিহ্বা পরিষ্কৃত ; স্বাদ স্বাভাবিক । ০ জিহ্বা নিঃসারণে কষ্ট । ০ গলা-বেদনা । মুখমণ্ডল ।—০ মুখমণ্ডলের পেশীর অবিরত সঞ্চলন । ০ ক্লিষ্ট মুখাকৃতি ; জড়প্রায় মুখাকৃতি । ০ বাম নিম্ন হস্তে ও দন্তে ছিন্নবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা । ০ নিম্ন চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল সহকারে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ । জরায়ুর রক্তশ্রাব সহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ততা । ০ লোহিত ও স্ফীত মুখমণ্ডল । আঁমাশয় ।—০ ( অমরারোধসহ ) কোষ্ঠরোধ । ০ নিম্নদ্বয়ে গুরুত্ব, পূর্ণত্ব ও আকৃষ্টক বেদনা । ০ স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা প্লীহার বৃহত্তরত্ব । ০ প্লীহার অভ্যন্তর দিয়া সঞ্চরমান বেদনা, কখন কখন উহার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারণ । বক্ষঃস্থল ।—০ বক্ষঃশোথ । ০ বাম দিকের কৃত্রিম পশুকাঁয় সঞ্চরমান বেদনা, ও গুরু-কাস সহ কম্প । ০ হরিতাভ শ্লেষ্মা নিষ্টিবন । ০ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে শ্বাস-ক্লেশের আধিক্য । ০ কাসিবার সময় শ্বাস-ক্লেশ ও বেদনার বৃদ্ধি । ০ বামপার্শ্বে শয়নে শ্বাস-রোধ অল্পভব । ০ সমগ্র দক্ষিণ বক্ষঃগহবরের অভ্যন্তর দিয়া ভয়ঙ্কর ছুরিকা-ঘাতের স্থায় অল্পভব । জননেন্দ্রিয় ।—০ জরায়ু, হইতে রক্তশ্রাব । ০ বেদনা সহকারে রক্তশ্রাব, রক্তের খানিকটা উজ্জল লোহিত, খানিকটা মলিন সংযত । ০ প্রসব-বেদনার স্থায় প্রবল আকৃষ্টক বেদনা সহ রক্তশ্রাব । ০ কখনও বা ধারাক্রমে, কখনও বা সংযত আকারে, অবিরত কৃষ্ণাভ রক্তশ্রাব । ০ ত্রিকাস্থি হইতে বস্তি-গহবর পর্য্যন্ত পর্য্যায়শীল বেদনা, শয্যায় শয়িত অবস্থায় উহার আতিশয়া, এবং উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে উভয় উরুতে, অপিচ উর্দ্ধ শাখায় ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত সঞ্চরমান বেদনা, তৎসহ নিদ্রাহীনতা ও সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।—০ সায়োটিকা ( গৃধ্রী ) । ০ ষাড় হইতে নিতম্বে ও উরুর বহির্দিকে বেদনার স্থান-বিকল্প । ত্রিকাস্থির বামপার্শ্বে ভয়ঙ্কর ছেদনকর, সঞ্চরমান, দপদপকর বেদনা, ও উরু পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ । ০ বামদিকের ত্রিকাস্থি ও অনামাস্থির সংযোগ প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, অল্পমাত্র উরু নাড়িলে উরুর বাহিরের পার্শ্ব দিয়া প্রায় চারি আঙ্গুল বিস্তৃত রেখাক্রমে সেই বেদনার জাহ্নু পর্য্যন্ত প্রসারণ, এবং পূর্বাৎপত্তি সদৃশ দপদপ । ০ দক্ষিণ উরুতে ছেদনকর জালাকর বেদনা, ও সমগ্র অঙ্গ বাহিয়া গুল্ফসন্ধিতে উহার উপস্থিতি । ০ উত্তপ্ত সোণা দ্বারা যেন উরুর মাংস বারবার ছিঁড়িয়া তোলা হইতেছে এরূপ অল্পভব । ০ উরুতে অতিশয় স্পর্শাধিক্য, যৎসামান্য স্পর্শে উহাতে বেদনার উৎপত্তি । ০ জজ্ঞা-গুঠের পেশীতে ও গুল্ফে ছেদনকর ঘটনা, এবং, তথা হইতে উহার জাহ্নু-সন্ধি ও ফলকাস্থি পর্য্যন্ত গতি । দক্ষিণ জাহ্নু-সন্ধির ফলকাস্থির

চতুর্দিকে ক্ষীততা ও কোমলতা, এবং প্রচাপনে স্পর্শ-দেয়। ০ ফলকাঙ্ক্ষিতে আততি, বোধ হয় যেন উহার চারিদিকের কণ্ডুগুণি আকৃষ্ট হইয়াছে। ০ কি বিশ্রাম কালে, কি নড়িলে চড়িলে পর্যায়শীল বেদনা। ০ একবার স্বপ্ন ও ও কণ্ঠে, একবার জাহ্নু ও গুল্ফে বেদনা। দক্ষিণ জন্মার দীর্ঘাঙ্গির মধ্যভাগে স্বপ্ন স্বকাবৃত স্থলে অতিশয় ক্ষীততা। ০ জন্মার দীর্ঘাঙ্গি ও পদ-পৃষ্ঠের অস্থিতে খনন, ও চর্কণবৎ যাতনাপ্রদ বেদনা, রাত্রিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি। পদ-পৃষ্ঠের অস্থির ক্ষীততা। দেহ।—০ ভয়জনিত তাণ্ডব, তিন মিনিট কালও সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিতে পারা যায় না এবং অপরের সাহায্য ভিন্ন হাঁটিতে পারা যায় না। ০ নিদ্রাবস্থায়ও তাণ্ডব রোগের সঞ্চলনের বিত্তমানতা। ০ সর্বদাক্ষীন দুর্বলতা ও প্রভূত ঘর্ষ বশতঃ অশান্তিপূর্ণ নিদ্রা। জরায়ু হইতে রক্তনিঃসরণ বশতঃ অতিশয় দুর্বলতা। ০ মুচ্ছাকল ঢর্কলতা। সাধারণতঃ অস্ত্র ও মূত্র-যন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা।

সমগ্ৰণ।—এগেরিকস, সিকিউটা, ষ্ট্রাম, ইনাস্থি ইথুসা।

## ভেরিওলাইনঃম।

মহুঘোর বসন্তের পুষ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে। ডিপথিরিয়ায় সহিত এন্টিটক্সিনের যে সম্বন্ধ বসন্তের সহিত ভেরিওলাইনমেরও সেই সম্বন্ধ। সংশ্লিষ্ট, বিস্লিষ্ট ও দূষিত বসন্ত, উপবসন্ত ও জল-বসন্ত, সকল প্রকার বসন্তেই এই ঔষধের আরোগ্যকারিণীশক্তি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠশততম ক্রম হইতে নয়শত ক্রম পর্যন্ত সকল ক্রমেই এই ঔষধে উপকার দর্শে। বসন্তের প্রতিষেধক স্বরূপ ভিরিওলাইনম ভ্যাক্সিনেশন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দূষিত বীজের দোষে টীকার পরে যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয় ইহাতে সে সকল পরিণামফল উৎপন্ন হয় না। গরুর বসন্তের বীজ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে ভ্যাক্সি নিয়ম, এবং অশ্বের বসন্তের বীজ হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে ম্যালোগুণঃম বলে। এতন্মধ্যে ম্যালোগুণঃমই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতে বসন্তের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

## মাইগেল ল্যাসিওডোরা।

মাইগেল কিউবা দ্বীপস্থ একপ্রকার বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সা। আমেরিক চিকিৎসক ডাঃ হাউয়ার্ড প্রথম ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই উর্ণনাভের বিচূর্ণ ও অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়।—মাইগেল পৃষ্ঠবংশীয় ঝায়ু-শুচ্ছের গতি-জননাংশের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিয়া তাণ্ডব রোগ (কোরিয়া) ও তাণ্ডবায় আক্ষেপ জন্মায়।

অধিকার।—তাণ্ডব রোগ ও উপস্থের উচ্ছ্বাসে (কর্ডি) এই ঔষধ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

কোরিয়া ।—উপসর্গশূন্য তাণ্ডব রোগে মাইগেল একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি । রোগিণীর বিষন্নতা ও নিরুৎসাহিতা ; কপালে যুহু যুহু বেদনা ; মুখমণ্ডলের পেশীর অবিরত স্পন্দন ; একপার্শ্বে, সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তকের উৎক্ষেপণ ; একবাহু ও এক জন্তবার, সাধারণতঃ দক্ষিণ বাহু ও জন্তবার পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ ; পেশীর অনায়ত্ততা ; রোগিণী মস্তকে হাত দিতে চেষ্টা করিলে প্রবলবেগে পশ্চাদ্ধিকে হস্তের উৎক্ষেপণ ; কথ্য বলিতে চেষ্টা করিলে শব্দের বিক্ষেপ ;—এই সকল লক্ষণে কোরিয়া রোগে মাইগেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে তাঁহার চিকিৎসায় একজন অল্পবয়স্ক বালিকার কোরিয়া রোগের আক্ষেপিক লক্ষণগুলি মাইগেল প্রয়োগে অতি সত্ত্বর দূরীকৃত হইয়াছিল । ডাঃ ব্রেক বলেন যে তাঁহার একজন রোগীর বাম জন্তবা ও মুখমণ্ডলের পেশী প্রভৃতির উৎক্ষেপে এতদ্বারা অবিলম্বে উপকার দর্শিয়াছিল । তিনি আর একজন রোগীকে সিমিসিফুগা দ্বারা চিকিৎসা করাতে অত্যন্ত লক্ষণ অন্তরিত হইয়া বামবাহুর স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে । অনন্তর মাইগেল প্রথম ক্রম প্রয়োগে সে সম্যক আরোগ্য লাভ করে । ডাঃ হাউয়ার্ড বলেন যে মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন, ক্ষতবেগে মুখ ও চক্ষুর একবার উন্নীলন ও একবার নিম্নীলন, মুখমণ্ডলে হাতদিতে অক্ষমতা, মধ্য-পথে হস্তের গতির অবরোধ ও নিম্নে উৎক্ষেপ ; গতির অদৃঢ়তা, উপবিষ্ট অবস্থায় জন্তবার সঞ্চলন, ও হাঁটিতে চেষ্টা করিলে ছেচড়িয়া যাওয়া, সর্বশরীরের অবিরাম সঞ্চলন ;—এই গুলি কোরিয়া রোগে মাইগেলের প্রয়োগ-লক্ষণ । ডাঃ হেল বলেন যে নিদ্রাবস্থায় রোগের বিরাম ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি কোরিয়া রোগের এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ । কোরিয়া রোগে এগেরিয়স, সিমিসিফুগা, টারেণ্টুলা, ইমেশিয়া, জিজিয়া ও ট্র্যামোনিয়মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অক্ষিপুটে ও শরীরের স্থানে স্থানে কণ্ডুয়ন ; অক্ষিপুটের অনিবার সঞ্চলন ; এবং পৃষ্ঠবংশের স্পর্শ-দ্বেষ এগেরিয়সের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ । প্রধানতঃ বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে এবং পেশিরবেদনা ও আমবাতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে, অথবা জরায়ুর অবস্থান-বিচ্যুতি বশতঃ রোগ উৎপন্ন হইলে কোরিয়ায় সিমিসিফুগা উপযোগী । দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ জন্তবা কোরিয়া রোগাক্রান্ত হইলে এবং রাত্রিতেও সঞ্চলন বিত্তমান থাকিলে টারেণ্টুলা ব্যবহৃত । চিত্ত-বিকার জনিত কোরিয়ায় ইমেশিয়া ফলপ্রদ ; নিদ্রাকালেও কোরিয়াজনিত অঙ্গ-সঞ্চলন বর্তমান থাকিলে জিজিয়া প্রযুক্ত্য । অবিরত মুখাকৃতির পরিবর্তন ; কখন হস্ত, কখন বা বিস্ত্রিত ভাব, ক্ষতবেগে জিহ্বা বহিকরণ, একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে মস্তক নিক্ষেপ ; পৃষ্ঠবংশের ও সর্বশরীরের আক্ষেপিক আকুঞ্চন ; দেহ-শাখার ও দেহের সমস্ত পেশীর অবিরত সঞ্চলন ; গদগদ-ভাষণ এবং মন আক্রান্ত হইলে সহজে ভ্রমোৎপত্তি ; নিদ্রা হইতে ভীতবৎ জাগরণ ; করযোড় পূর্বক প্রার্থনার আকৃতি দারণ ; ও বারংবার উপাদান হইতে মস্তকোত্তোলন ট্র্যামোনিয়মের লক্ষণ ।

লিন্দোদ্রেক ।—ডাঃ উইলিয়মসন একজন বালককে কিছুকাল এই ঔষধ সেবন করাইয়া ছিলেন । সেই বালকের আক্ষেপিক লক্ষণগুলির প্রকাশ সময়ে তাহার উপস্থের প্রবল বক্র উদ্রেক রূপ এক নতুন উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ত রোগীর অতিশয় কষ্ট জন্মে । মাইগেল হইতেই এই উপসর্গ উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রমেহের বক্র লিন্দোদ্রেকে এই ঔষধের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । তৎপরে উচ্চ ক্রমেও একদ্বারা উপকার দর্শিয়াছে ।

মন ।—সমস্তদিন বিমর্ষতা অল্পভব । অতিশয় উৎকর্ষ ও মৃত্যু-ভয় । নিরাশিতা ও মৃত্যু-ভয় । সারারানি প্রলাপ ও অস্থিরতা, স্বীয় কার্য সম্বন্ধীয় কথা । হান্তজনক স্বপ্ন-সহ সমস্তরাত্রি অস্থিরতা । মস্তক ।—কোরিয়া রোগে সম্মুখকপালে শিরঃশীড়া ও শিরোধূর্ন । মস্তকের একপার্শ্বে বিক্ষিপ । মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের আরক্তরাগ ও উত্তপ্ততা । \* মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন । মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—জিহ্বার পরিণুক্ততা ও খরতা অথবা পরিণুক্ততা ও কপিপিত্ত । রাত্রিতে দাঁত কড়মড় । আমাশয় ।—জ্বংকম্প সহকারে \* বিবমিষা । জ্বর সহকারে অতিরিক্ত পিপাসা । মূত্র-যন্ত্র ।—প্রাতে মূত্র-মার্গে হল-বেধবৎ যাতনা সহ অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ । দিবাভাগে জ্বালকর উত্তপ্ত মূত্র, তাগকালে বোধ হয় যেন মূত্রমার্গ দগ্ধ হইল । জনন-যন্ত্র ।—উপস্থের প্রবল উদগম ও বক্রতা, তজ্জন্ত যাতনা । বক্ষঃস্থল ।—উৎকর্ষা সংযুক্ত আয়াসিত শ্বাস । হৃৎপিণ্ড ।—হৃৎপিণ্ডের সৰল স্পন্দন, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বিবমিষা, ও সর্বদাকীন দুর্বলতা । পৃষ্ঠ ।—পৃষ্ঠে বেদনা, ও সম্মুখভাগে সেই বেদনার সংপ্রসারণ । পৃষ্ঠের পেশীর স্পন্দন । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—( দংশন জনিত ) স্থানিক প্রদাহের অতিশয় প্রসারণ । পা হইতে জালু পর্যন্ত বিস্তৃতি ; এবং হৃৎ, বার্তাকুবর্ণ চিহ্নাবশেষ ও পরিশেষে সেই চিহ্নের হরিদ্রণ ধারণ । লসিকাবাহী নাড়ীর গতির অল্পক্ৰমে জজ্বার পশ্চাভাগ হইতে উল্কাশে শরীরে রেখায় রেখায় \* প্রগাঢ় আরক্ততা এবং তৎসহকারে অতিশয় উৎকর্ষা ও অঙ্গস্পন্দন । \* বাহ ও জজ্বার অদম্য আক্ষেপিক সঞ্চলন । পদে দপদপকর, হল-বেধবৎ বেদনা । জ্বর ।—তীব্র শীত, তৎপরে উত্তাপ, সর্বশরীরে কম্প, অতিশয় পিপাসা, মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ, নাড়ীর ১০০ বার স্পন্দন, জিহ্বার পরিণুক্ততা ও কপিপিত্ত, শ্বাস-কষ্ট, নিরাশিতা, মৃত্যু-ভয়, প্রলাপ । দেহ ।—\* পৃষ্ঠ, বাহ ও জজ্বার অদম্য আক্ষেপিক সঞ্চলন । অবিরত বাহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চলন, মুখমণ্ডলের পেশীর বিকৃতি, মুখে হাত তুলিতে অশক্তি ; শিরঃশীড়া, শিরোধূর্ন, রাত্রিতে দন্ত কড়মড় ; নিদ্রাকালে অস্থিরতা ; ও প্রাতে আতিশয্য লক্ষণাপন্ন তাণ্ডব ( কোরিয়া ) । সমগুণ । [ এপিস, এগেরিয়স, বেলেডোনা, মিমিসিফুগা, ভোরিফোরা, হাইওসায়োমাস, টারান্টিউলা, ইত্যাদি ।

## মার্টস কমিউনিস ।

মার্টেল বা বিলাতি মেদি একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ । প্রায়ই সাহেবদিগের বাগানের বেড়ায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায় । মেদির পত্রের ও ফলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । ইহা ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই । না হউক, তথাপি কোন কোন রোগে এই ঔষধ প্রায় অমোঘ । বাম বক্ষে সূচী-বেধবৎ বেদনা ও স্বক্কাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রধাবন ইহার বিশেষ লক্ষণ । এই বিশেষ লক্ষণানুসারে উপেক্ষিত ফুসফুস-প্রদাহ, ও যক্ষ্মাদি রোগে মার্টস ব্যবহৃত হইলে এতদ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে । রোগ দুরারোগ্য হইলেও এই ঔষধে উপশমিত হয় । রোমনগরের ডাঃ ওয়াল বলেন যে বাম ফুসফুসের উর্দ্ধাংশে বেদনা, ও বক্ষ-কণ্ডুয়ন লক্ষণা-পন্ন সন্দেহসূচক কাস রোগের কয়েকজন রোগী এই ঔষধ ব্যবহারে সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ডাঃ পেইন যক্ষ্মার পূর্বরূপ অবস্থায় মার্টস প্রয়োগের পরামর্শ দেন । বাম কণ্ঠাস্থির নিম্নদেশে সূচী-বেধবৎ ও দপদপকর বেদনা, তথা হইতে বামস্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, গভীরনিঃশ্বাস গ্রহণে বেদনার আধিক্য ; বামক্ষে জ্বালা অনুভব, ও সময়ে সময়ে সর্ব্বশরীরে উত্তাপাবেশ, কিন্তু বদন ও মস্তকে উহার তীব্রতা এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে \* বাম বক্ষস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্বক্কাস্থি পর্য্যন্ত সূচী-বেধবৎ বেদনার সম্প্রসারণ লক্ষণ অনেক সময়ই যক্ষ্মারোগেও মার্টস কমিউনিস সেবনে প্রশমিত হয় । নিউমোনিয়া রোগে বাম ফুসফুসের হিপাটিজেশন ; বাম বক্ষে সূচী-বেধবৎ বেদনা ও উহার উর্দ্ধভাগ হইতে অভ্যন্তর দিয়া সোজাসোজি বাম স্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত সেই বেদনার প্রসারণ, এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণ বা কাসিবার সময় বেদনার আধিক্য লক্ষণে এই ঔষধ ফলপ্রদ । এই সকল রোগে সাধারণতঃ ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

০ বক্ষস্থলে বেদনা ; বক্ষস্থলে অশিথিলতা সহ কাস । ০ গলাভ্যন্তরের পরিণুক্ততা ; রক্ত-নিষ্ঠীবন সহ গলায় ও বুকে বেদনা । ০ বক্ষস্থলে তরুণ বেদনা ; বক্ষস্থলে প্রচাপনী বেদনা । \* বাম বক্ষে সূচী-বেধ ও উহার স্বক্কাস্থি পর্য্যন্ত প্রধাবন ; ( যক্ষ্মারোগে এই লক্ষণটি অনেক সময়ই প্রকাশিত হয়, এবং অল্প কোন ঔষধে প্রশমিত না হইলেও এই ঔষধে উপশমিত হইয়া থাকে ) ০ ফুসফুসের বামভাগের হিপাটিজেশন । \* কুণপ ও জাহ্নসন্ধিতে বেদনাসংযুক্ত শক্তি জ্বর । ০ শুষ্ক, ফাঁপা কাস, বামফুসফুসের সম্মুখভাগের উর্দ্ধাংশ কণ্ডুয়িত হইয়া কাসের উদ্বেক ; প্রাতে উপচয় ; সারাহ্নে অল্প কণ্ডুয়ন ; অপরাহ্নে অতিশয় অবসাদ । ০ বক্ষ-কণ্ডুয়ন সংযুক্ত কাস । ০ বাম কণ্ঠাস্থির নিম্নপ্রদেশে দপদপকর বেদনা, ও সূচী-বেধবৎ যাতনা, তথা হইতে বাম স্বক্কাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, গভীর নিঃশ্বাসগ্রহণে বেদনার বৃদ্ধি, বাম চক্ষে জ্বালা অনুভব । বামক্ষে সূচীবেধবৎ যাতনা, উর্দ্ধভাগ হইতে সোজাসোজি অভ্যন্তর দিয়া বামস্কন্ধের ত্রিকোণাস্থি পর্য্যন্ত উহার সম্প্রসারণ, নিঃশ্বাসপ্রস্থাসে, জন্তুগ্ণে, ও কাসিলে বেদনার বৃদ্ধি । এইগুলি মার্টস কমিউনিসের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।

## মিচেলা রিপেন্স ।

মিচেলা একপ্রকার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ । ইহাকে সামান্যতঃ চেকার-বেরি বলে । ইউনাইটেড স্টেটসের অরণ্যে ইহা উৎপন্ন হয় । ইহার পত্র হইতে উগ্র এলকোহল সহযোগে অরিষ্ট এবং ক্ষুটিত জল সহকারে ফাণ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—জরায়ুতে এই ঔষধের ক্রিয়া দর্শে ।

### প্রধান প্রধান আয়ুর্গিক প্রয়োগ ।

রক্তশ্রাব ।—জরায়ু হইতে সমুজ্জল বর্ণের রক্তশ্রাবে জরায়ুতে রক্ত সঞ্চিত ও মূত্র-কৃচ্ছ্র লক্ষণে মিচেলা ব্যবহৃত হয় । মূত্রাশয়ের উপদাহ ।—মিচেলার ক্রিয়ায় জরায়ু র গ্রীবা শোণিত, সঞ্চিত, মলিন আরক্ত, ও ক্ষীত হয় ; এবং তৎসহকারে মূত্রাশয়-গ্রীবার উপদাহ ও মূত্র বেগ লক্ষণ থাকে । সুতরাং এই প্রকার অবস্থায় মিচেলা ব্যবহৃত হয় । অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে এই ঔষধের প্রয়োগ হয় । মূত্র-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত উজ্জল লোহিত রক্তশ্রাবী রক্ত-কৃচ্ছ্র ও ইহার ব্যবহার হয় । জীলোকদিগের মূত্রাশয়ের উপদাহ লক্ষণে ডাঃ হিউজ ইহাকে ইউপেটোরিয়ম পার্পুরিয়মের সমশ্রেণীস্থ মনে করেন । অন্যান্য রোগ ।—ডাঃ হেল কৃত্রিম প্রসব-বেদনা ; জরায়ুর উপদাহ ; স্বল্প ও বিলম্বিত ঋতু ; মূত্র-কৃচ্ছ্র ; প্রভূত অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট স্বল্পমূত্র প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধিদেন । আদিম আমেরিকেরা সুপ্রসবার্থে প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে গর্ভিণীকে মিচেলার কাথ সেবন করান । ডাঃ হেল এই উদ্দেশ্যে প্রসবের পনের দিবস পূর্বে ইহার অরিষ্ট দশকোটা মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করাইতে বলেন । মিচেলার কাথ প্রস্তুত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সম পরিমাণ দুধের সর সংযোগ পূর্বক আন্তে আন্তে জ্বালিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া সন্তান যখন স্তন পান করে না তখন স্তন-বৃন্তে লাগাইলে স্তন-বৃন্তের ক্ষত আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । জন্মের পৌর ব্যথিততায় সঞ্চালনে লাঘব লক্ষণে মিচেলা উপযোগী ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—মানসিক অবসাদ । অতিশয় বিষ্মতি । মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া ভয় । প্রতিবোধ ( পারসেপশন ) সাধিনী প্রবৃত্তি গুলির অপ্রথরতা । মস্তক ও চক্ষু,—মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে দপদপকর বেদনা । জ্বর উপরস্থ উন্নতস্থানের ঠিক পশ্চাতে সম্মুখ কপালে তীব্র শিরোবেদনা । চক্ষুর অপ্রথরতা ও গুরুতা । চক্ষু হ্রস্বল ও সজল অমৃভব । কর্ণ ।—দক্ষিণ কর্ণে মৃদমৃদ অবিরাম বেদনা ; বাম কর্ণে জ্বালা । মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন । মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—জিহ্বায় কণ্টকবেদ ও জ্বালা অমৃভব ।

গল-গহ্বর শুষ্ক ও উপদাহিত অনুভূত হয় । নিগীরণের প্রতিবন্ধকভাজনক আকুঞ্চন ।  
 আমাশয় ।—আমাশয় ও গলনলীতে জ্বালা সহ উদ্গার । উদরোর্ধ্বে অল্প অল্প অবিরাম  
 বেদনা । উদর ।—বাত নিঃসরণ সহ অস্ত্রের ক্ষীততা । স্থূলাস্ত্রে শূলবেদনা ও প্রচাপনে  
 স্পর্শ-দেষ । মল ।—কোষ্ঠ-কাঠি । মল-বেগ ; আতিসারিক মল । আম্রাসে নিঃসারিত,  
 কুছনসংযুক্ত স্বল্প মল । মূত্র ।—\* মূত্র-বেগ ; মূত্রের লোহিত বর্ণ ; ধৌত বর্ণ অধঃক্ষেপ ,  
 \* বৃক্ক প্রদেশের উপর অপ্রথর অবিরাম বেদনা । \* মূত্রমার্গ ও মূত্রাশয়-গ্রীবার ক্ষীত ও  
 উপদাহিত অবস্থা । \* মূত্রাশয়ের প্রতিশ্রায়, বিশেষতঃ জ্বীলোকদিগের । \* জরায়ু-রোগের  
 আনুসঙ্গিক মূত্র-কৃচ্ছ । মূত্রাশয়ের গ্রীবার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব । মূত্র নিঃস্রবের আধিক্য ।  
 স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—জরায়ু-গ্রীবার রক্তাধিক্য, মলিন বর্ণ, আরক্ততা ও ক্ষীততা ।  
 বিলম্বিত রজঃ । জরায়ুর পেশী-প্রাচীরের শক্তিশূন্যতা বশতঃ জরায়ুতে রক্তাধিক্য ।  
 স্বল্পরজঃ, রজ-কৃচ্ছ, অতিরজঃ । গর্ভের শেষভাগে কৃত্রিম প্রসব-বেদনা । ক্ষীণ, ধীর, ও  
 অকর্মণ্য প্রসব-বেদনা । দ্রুত শ্বাস ; বায়ু-নলীতে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ শুষ্ক, খকখক কাস ।  
 বক্ষঃস্থল ।—হৃৎপ্রদেশের উপর (পেশীতে) জ্বালাকর বেদনা । হৃৎপিণ্ডের মন্দ ও  
 বিষম স্পন্দন, তৎপরে দ্রুত স্পন্দন । দ্রুত শ্বাস, শুষ্ক খকখক কাস, বায়ু-নলীতে অতিরিক্ত  
 শ্লেষ্মা-সঞ্চয় । পৃষ্ঠ ।—পৃষ্ঠে অতিশয় দুর্বলতা ও স্পর্শ-দেষ অনুভব । স্বল্পবয়সের পেশীতে  
 অতিশয় স্পর্শ-দেষ । বৃক্ক-প্রদেশে বেদনা । কটিদেশে মুহুমুহু অবিরাম বেদনা । কটিতে  
 জ্বালা । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—নিম্নাঙ্গে অতিশয় বেদনা । জাহ্নসন্ধিতে অতিশয় বেদনা, এবং  
 নড়িলে চড়িলে উহার উপশম । পেশীতে স্পর্শ-দেষ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত পেশীর অল্প অল্প  
 জ্বালা ও স্পর্শ-দেষ ।

সঙ্গুণ ।—এসক্লিপিয়াস, কলোফাইলম, সিমিসিফুগা, চিমাফিলা, ইউপেটোরিয়ম-  
 পাপুরিয়ম, হেলোনিয়াস, পলসেটিলা, সিনিসিও, ইউভা-আসাই ।

## মিনিএন্থিস—বংক বীন ।

জেন্সিয়ানেশী জাতীয় এই ওষধি এশিয়া, ইউরোপ, ও উত্তর আমেরিকায় জন্মে । সরস  
 অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—শৈল্পিক বিজ্ঞীতে 'মিনিএন্থিসের ক্রিয়া দর্শিয়া কিয়ৎ পরিমাণে উপদাহ ও  
 রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয় । মস্তিষ্ক ও দর্শন-স্বায়ুতেও ইহার মুখ্য ক্রিয়া জন্মিয়া শিরঃপীড়া ও  
 দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা উদ্ভূত হয় । গ্রন্থির স্নায়ু-মণ্ডলে ইহার ক্রিয়া বশতঃ কোন কোন প্রকার  
 জ্বর ও কম্পজ্বরের অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । ডাঃ টেট্ট বলেন যে ড্রোসিরার সহিত  
 ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ড্রোসিরার ক্রিয়া মিনিএন্থিস অপেক্ষা তীব্রতর । তিনি  
 ইহাও উল্লেখ করেন যে যে সকল রোগে মিনিএন্থিস ব্যবহৃত হয় প্রায় সে সমস্ত রোগই



ড্রোসিরা ব্যবহারে উহা অপেক্ষা উত্তমরূপে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু টেট্টের এই উক্তি সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয় না।

**আময়িক অধিকার।**—কোন কোন প্রকার শীত-প্রধান কম্প-জরে হানিম্যান মিনিএস্টিস ব্যবহারের বিধি দেন। প্রতিজ্ঞায়জনিত পীড়া। দৃষ্টিহীনতা। নিম্নোক্ত লক্ষণ সংযুক্ত স্নায়বীয় শিরোবেদনা। সায়েটিকা। এই সকল রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**সবিরাম জ্বর।**—ডাঃ ডনহাম বলেন যে অনিয়মিত সবিরাম জরে প্রধানতঃ শীতাবস্থার প্রাবল্য থাকিলে এবং শীত অসম্যকরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ হস্ত বা হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে অথবা পদাঙ্গুলীতে ও পদে শীত জন্মিলে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগ তুষারবৎ শীতল হইলে, অথবা কেবল উদরে শীত ও কম্প জন্মিলে মিনিয়াস্টিস ব্যবস্থা করা যায়। ডাঃ ডাউগ্লাস বলেন যে সবিরাম জরে, উদরে শীত, ছয়ঘণ্টা শীতের অবস্থিতি, অনন্তর একপ্রকার অতৃপ্তিকর উত্তাপের উপস্থিতি, পর্যায়ক্রমে বা বিমিশ্রিত ভাবে শীতোত্তাপ, তৎসহ পদদ্বয় ও জজ্বাহয়ের শীতলতা এবং নাড়ীর ধীরতা, এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। ত্র্যাহিক জরে জাহ্নুর নিম্ন হইতে জজ্বার শীতলতা, এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে নাসাগ্র, কর্ণ-প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগের শীতলতা; জাহ্নুপর্যন্ত পদের শীতলতা; হস্ত-পদের তুষার সদৃশ শীতলতা ও শরীরের অগ্নাত স্থানের উষ্ণতা লক্ষণাপন্ন সবিরাম জরে ল্যাকেসিসও ব্যবস্থ্য হইতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিসের লক্ষণে গাত্রের নীলবর্ণ ও অতিশয় দুর্বলতা এবং তজ্জন্ত নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা থাকে; মিনিয়াস্টিসে থাকে না। **শিরঃপীড়া।**—উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে \* মস্তক-শিখরে প্রচাপন, \* হাত দিয়া শক্ত চাপদিলে উহার লাঘব (ভিরে); প্রতিপদ-বিক্ষেপে যেন মস্তকের উপর \* কোন গুরুভার চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব (ক্যাষ্ট, ঘন ল্যাক), উপরে উঠিবার সময় বুদ্ধি (ক্যাঙ্ক); সচরাচর শিরোবেদনার সহিত হাত-পায়ের বরফবৎ শীতলতা (ক্যাঙ্ক, সিপি)।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মস্তক।**—মস্তকের বিশৃঙ্খলা ও গুরুত্ব। \* উপর হইতে নীচের দিকে মস্তকে চাপ, হাতদিয়া দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে উহার উপশম; সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে প্রত্যেক সিঁড়িতে যেন মস্তকে কোন গুরু বস্তুর চাপ পড়ে এরূপ বোধ হয়। প্রধানতঃ কপালে প্রচাপনবৎ শিরঃপীড়া। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে, শঙ্খদেশের নিকটে স্ফীত-বেধবৎ ছেদনকর বেদনা। মস্তকের বাম পার্শ্বে স্ফীত-বেধ, উহার মস্তক-শিখরের অভিমুখে সম্প্রসারণ। **চক্ষু।**—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা; চক্ষুর সম্মুখে কুস্মটিকা দীপ্তি-শিখার কম্পন দর্শন (এগে,

সাইকে, \* মার্ক, ফস, \* সল)। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পেশীর, বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের পেশীর (\* বেল), দৃশ্যমান, কিন্তু বেদনামূলক স্পন্দন (এগে, ইয়ে, নক্স); বিশ্রামকালে উহার বৃদ্ধি। আমাশয়।—আমাশয়ে চাপপ্রাপ্তির পরে অতিশয় বিবিধা সহকারে, গলনলী পর্যন্ত প্রসারিত আমাশয়ে শীতলতা অনুভব। শূন্যাদার। উদর।—ভুক্ত দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিপূরিতবৎ, উদরের পূর্ণত্ব ও প্রসারণ, তৎসহ ক্ষুধার অনন্ততা, আবদ্ধ আত্মানের ছায় অনুভব, এবং বার বার বায়ু নিঃসারণের বিফল চেষ্টা (\* কার্কো, \* সিঙ্ক, \* লাই); তাত্রকূটের ধূমপানে সেই পূর্ণত্বের অধিক বৃদ্ধি (ইয়ে)। মূল।—কোষ্ঠবদ্ধ। মূত্র-যন্ত্র।—অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরভঙ্গ; শ্বাসকষ্ট। বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বের উপর চাপ, তৎসহ তীব্র স্ফূর্তিবোধবৎ যাতনা, নিঃশ্বাস গ্রহণে উহার অতিশয় বৃদ্ধি। পৃষ্ঠ।—বাম স্কন্ধাঙ্ঘ্রিতে রক্ত করণের ছায়, অতীব বেদনা, মেরুদণ্ডের অনুপ্রস্থে উহার প্রসারণ। ছই স্কন্ধাঙ্ঘ্রির মধ্যবর্তী স্থানে যন্ত্রণাপ্রদ ছেদনবৎ বেদনা, নিম্নদিকে উহার প্রসারণ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠের শ্বাস-ক্রিয়ায়। কটি ও ত্রিকদেশে ঘূর্ণবৎ বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—দক্ষিণ প্রগণ্ডে পেশীর স্পন্দন। বাম প্রকোষ্ঠের পেশীতে খল্লীর ছায় বেদনা, প্রায় পক্ষাঘাতের ছায় করতলে উহার প্রসারণ। দক্ষিণ জঙ্ঘার পেশীতে খল্লীবৎ বেদনা, পক্ষাঘাতের ছায় নিম্ন হইতে উপরের দিকে উহার প্রসারণ। সমস্ত অঙ্গেই খল্লীবৎ বেদনা। নিদ্রা।—স্পষ্ট বিস্থত স্বপ্ন। জ্বর।—শীতানুভব, বিশেষতঃ হাতের আঙ্গুলে। পদদ্বয় জাহ্ন পর্যন্ত শীতল জলে থাকার ছায় শীতল। \* হস্ত পদের তুষ্কারবৎ শীতলতা (টাবে); কিন্তু অবশিষ্ট শরীরের উষ্ণতা। জন্তু সহকারে শরীরের উচ্চভাগের কম্পন।

সমগুণ।—আরেগিয়া, ক্যাক্টস, ড্রোসিরা, থাট-মিউ।

## মিফাইটিস—ক্ষঃক্ষ

মিফাইটিস মার্জার জাতীয় একপ্রকার বন্য পশু। ইহার মলদ্বারের নিকটস্থ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস এলকোহলে দ্রবীভূত করিয়া ঔষধার্থে অরিষ্টে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মাস্তিক-পৃষ্ঠবংশীয় দ্রাব্যবৃত্তে, বিশেষতঃ ফুসফুস-পাকায়নিক দ্রাব্যবৃত্তে, ও শ্বাস-যন্ত্রের আকৃষ্ট অবস্থায় ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এজ্ঞ শ্বাস-কাস ও হৃৎপাক-কাসে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

অধিকার।—নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান লক্ষণানুসারে শ্বাস-কাস, হৃৎপাক-কাস, ও মুখমণ্ডলের দ্রাব্য-শূলে মিফাইটিস ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**স্নায়বীয় রোগ।**—স্নায়ুমণ্ডলে মিফাইটিসের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। অবসন্ন অবস্থায় নিম্নক্রমে ইহা সেবন করিলে স্নায়ুমণ্ডলের বল জন্মিয়া অবসন্নতা প্রশমিত হয়।\* ফ্লোরিক এসিডের ছায় নিম্নক্রমে মিফাইটিস সেবনেও অল্প নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয়। জজ্বা যেন বোধ শূন্য হইয়া পড়িবে উহার এপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা মিফাইটিস প্রয়োগে উপশমিত হয়।

**হৃৎশব্দ-কাস।**—মিফাইটিস স্পষ্ট স্বরবস্ত্রের আক্ষেপ ও পরিষ্কার ‘হৃৎ’ শব্দ বিশিষ্ট একপ্রকার কাস জন্মায়। এজন্ত হৃৎ-শব্দ কাসে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে প্রতিশ্রাবের লক্ষণের স্বল্পতা, ও আক্ষেপিক ‘হৃৎ’ শব্দের স্পষ্টতা থাকিলেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। রাত্রিতে ও শয়নান্তে কাসের বৃদ্ধি; একপ্রকার শ্বাসরোধ অনুভব, ও প্রথাস ত্যাগে অসামর্থ্য; ভুক্তদ্রব্য বমন, কখন কখন আহ্বারের অনেকক্ষণ পরে উহার আধিক্য,—এইগুলি হৃৎশব্দ কাসে মিফাইটিসের লক্ষণ। ডাঃ ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহার কালে দেখিতে পাইয়াছেন যে এতদ্বারা রোগের ভোগকাল বস্তুতঃ যখন হ্রাস পড়িতে থাকে তখন দৃষ্টতঃ রোগীর অবস্থা মন্দ দেখায়। হৃৎশব্দ-কাসে মিফাইটিসের সহিত কোরেলিয়ম ক্রমের তুলনা হয়। কাসের আবেশের পূর্বে শ্বাসরোধ অনুভব, ও তৎপরে অতিশয় অবসন্নতা; হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনঃ পুনঃ ‘কুকু’ শব্দে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও বদনের ক্রমবর্ণ ধারণ; কোরেলিয়মের লক্ষণ। শ্বাস।—স্বরাপায়ীদিগের শ্বাস-রোগেও মিফাইটিস ব্যবহারের বিধি আছে। ক্ষয়ীদিগের শ্বাসেও (ম্যাজমা) ড্রসিরা বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মিফাইটিস রোগীকে অত্যন্ত শীত-সচিবু করে। শীত ঋতুতেও তাহার অল্প শীত অনুভূত হয়। তুষারসদৃশ শীতলজলে গাত্র প্রক্ষালনে তাহার সুখানুভব জন্মে। বিসর্প।—কণ্ডূয়ন, উত্তাপ, আরক্ততা, ও ফোফা; এবং কর্ণ হইতে দুর্গন্ধি শ্রাব নিঃসরণ লক্ষণে কর্ণের বিসর্পে ডাঃ লিলিয়েস্থাল মিফাইটিস ব্যবহারের বিধি দেন। শিরোমূর্খন।—নিম্নোক্ত শিরোলক্ষণে শিরোমূর্খনেও ইহার ব্যবহার আছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**চক্ষু.**—চক্ষে যেন স্থচীবিদ্ধ হইতেছে এরূপ যাতনা। চক্ষুর উর্দ্ধাংশে বেদনা। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের আরক্ততা ও উহার কৈশিক নাড়ীতে রক্ত-সঞ্চয়। অক্ষর বাপসা দেখায়, প্রভেদ করিতে পারা যায়না, একটার গায় অপরটা লাগিয়া যায়; নিকট-দৃষ্টি। মুখ-মুখ্য।—দন্তের মূলে আকস্মিক উৎক্ষেপ। আমাশয়।—প্রাতে ক্ষুধাহীনতা। আমাশয়ে শূন্যতা, এবং মাখা যেন প্রসারিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব সহকারে বিবমিষা। আমাশয়ে চাপ, ও পেট-বেদনা। মল।—বিরল, কিন্তু পাতলা মল। শ্বাস-যন্ত্র।—পান করিবার সময় পেয় দ্রব্যের স্বরবস্ত্রে প্রবেশ। গন্ধকের বাষ্প আত্মজ জনিত শ্বাস-কাসের

ভ্রায় শ্বাস-কাস ; ০ মতপায়ীদিগের শ্বাস-কাস ; নিদ্রাকালে শ্বাস-কাস । নিঃশ্বাস-ক্রিয়া অস্বা-  
সাধ্য ; প্রশ্বাস-ক্রিয়া প্রায় অসাধ্য ; অথবা কুরুক-রববৎ । পানাস্তে, ও কথা বলার বা উচ্চস্বরে  
পড়ার পরে কাস, আক্ষেপিক, ফাঁপা বা গভীর, এবং অবদারণ, স্বরভঙ্গ ও বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর  
দিয়া বেদনা সংযুক্ত কাস, তৎসহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শ্বাস-রোধ অহুভব ; প্রশ্বাস ত্যাগ  
করিতে পারা যায় না ; আহারের কয়েক ঘণ্টা পরে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পড়ে ; রাত্রিতে ও  
শয়নাস্তে কাস বৃদ্ধি পায় ; প্রাতে তরল থাকে ও অল্প অল্প স্লেমা উঠে । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—  
বাহতে ও জন্তব্য অস্বচ্ছন্দতা । অঙ্গে আমবাতের বেদনা । কড়ায় জালা ও বেদনা । দেহ ।  
—টঙ্কার ; অস্থিরতা । অঙ্গ-মর্দের প্রবৃত্তি ; কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি । পক্ষাঘাতিত অহুভব,  
বিশেষতঃ বেদনা সহকারে । অতি সূক্ষ্ম নায়বীয় কম্পন, উহাতে অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা জন্মে,  
বোধ হয় যেন হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে । নিদ্রা ।—নিদ্রাকালে শ্বাস-কাসের আক্রমণ ।  
প্রত্যয়ে জাগরণ, ও বিশ্রান্তি অহুভব । প্রাতে নিদ্রালুতা । সুস্পষ্ট অবিস্মৃত বঁপ্প । জ্বর ।—  
বিবর্জিত উষ্ণতা বিশেষতঃ প্রাতে । শীতল বায়ুতে অল্পতর শীত ; শীতল জল ভাল লাগে ।  
সমগুণ ।—এষা, আস, ককস, কোরাল, ড্রোম ।

## মিরিকা সিরিফিরা —বে-বেরি ।

মিরিকেসী জাতীয় মিরিকা সিরিফিরা নামক উদ্ভিদ আমেরিকায় সমুদ্র উপকূলে জন্মে ।  
ইহার মূলের সরস বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । ইহার বীৰ্য্যকে মিরিসিন বলে ।

ক্রিয়া ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মিরিকাসিরিফিরার  
প্রধান ক্রিয়া দর্শিয়া এই সকল স্থানের প্রতিষ্ঠায় জনিত উপদ্রব উপস্থিত হয় । বহুতেই ইহার  
বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পিত্ত-নিঃসরণ বিলুপ্ত হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মে ও উহার সাধািয়  
লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মুখ-বিবর, গল-কোষ ও পিত্ত-প্রণালী প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠায়িক অবস্থায় ;  
বহুতের উপদ্রব ; এবং পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ । ফ্যারিংটন বলেন যে মিরিকার ক্রিয়ায়  
শরীর-যন্ত্র প্রগাঢ়রূপে আক্রান্ত হয়, এবং পাণ্ডু-বিশিষ্ট বা পাণ্ডু-বর্জিত অবসন্ন অবস্থায়,  
দুর্বলতা সহকারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আঠা আঠা প্রকৃতি, এবং জিহ্বার উপরে, মুখ-বিবরে ও  
গল-কোষে চিপটিটিকাজনক অল্প অল্প দুঃশ্চেষ্টা নিঃস্রব থাকিলে এই ঔষধে আরোগ্য জন্মে ।  
ডাঃ ওয়াকার এই ঔষধ দুইবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন । দুইবারেই তাঁহার সুস্পষ্ট

পাণ্ডু-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমবারের পরীক্ষায় নিদ্রানুতা ও তৎসহ প্রাতঃকালে সমুখ কপালের গৌরব সংযুক্ত শিরঃপীড়া, চক্ষুর পীতবর্ণ, মুত্রের স্বল্পতা, ও মলের অপ্রগাঢ় বর্ণ, অর্থাৎ পাণ্ডুরোগের সমস্ত পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় ঔষধ সেবনে বিরত হওয়াতে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি আপনাপনিই অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায়ও এই সকল লক্ষণ পুনরায় উপস্থিত হয়। কিন্তু এবার যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাণ্ডু অর্থাৎ স্বকের মলিন পীতবর্ণ, ক্ষুধাহীনতা; আমাশয় ও উদরের পূর্ণতা; স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ, ফেগিল মুত্র; কঠম বর্ণ বা পলালবর্ণ পাতলা পিত্তশূন্য মল; অতিশয় দুর্বলতা, এবং প্রায় স্তম্ভি সদৃশ নিদ্রানুতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়াছিল সে পর্যন্ত তিনি ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না। এই ঔষধ কৃত পাণ্ডুরোগ আরোগ্যার্থে ডাঃ ওয়াকার পডোফিলম, লেপ্টাণ্ডা নক্সডমিকা, আসেন্নিকম, মারকিউরিয়স ডলসিস প্রভৃতি ঔষধ খাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই উপকার দর্শিয়াছিল না; অবশেষে প্রথম দশমিক শক্তির ডিজিটেলিস সেবনে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পরীক্ষায় অত্রান্ত লক্ষণও প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার পাণ্ডু-লক্ষণই সমধিক সুনিশ্চিত এবং এই রোগেই মিরিকা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হেল বিশ্বাস করেন যে পিত্ত-প্রাবের বিরতি বশতঃ এতদ্বারা পাণ্ডু জন্মে, প্রতিরোধ বশতঃ নহে। প্রতিরোধ বশতঃ পাণ্ডু জন্মিলে মলের আলকাতরার আকৃতি ও ক্রমবর্ণ জন্মিত এবং ডিজিটেলিসের ক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে মল-মুত্রের স্বাভাবিক বর্ণ উৎপন্ন হইত না। তিনি মনে করেন যে মিরিকার গোপক্রিয়ায়ই পাণ্ডু জন্মে, সুতরাং নিম্নক্রমেই এই ঔষধ পাণ্ডুরোগে উপযোগী। ডাঃ মার্সী দক্ষিণদিকের পঞ্জগাস্থির ঠিক নিম্নে অতীব বেদনা, জিহ্বায় পীতভ শুল্কবর্ণ গাঢ় লেপ, ক্ষুধাহীনতা; অল্পদ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা; এবং অতৃপ্তিকর নিদ্রা লক্ষণে মিরিকার মূল অরিষ্ট এক দুই বিন্দুমাত্রায় ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে পাণ্ডুরোগে ডিজিটেলিসের সহিত মিরিকা সিরিক্সের সুন্দর তুলনা হয়। নিরাশিতা উভয় ঔষধেরই প্রথম লক্ষণ। যকৃতের ক্রিয়া-বিকার হইতে চিত্তের এইরূপ অবস্থা জন্মে। উভয় ঔষধেই যকৃতের অসম্যক পিত্তোৎপত্তি বশতঃ পাণ্ডু জন্মায়, পিত্তপ্রাব-প্রতিরোধ বশতঃ জন্মায় না। ডিজিটেলিসের পাণ্ডু মূলতঃ হৃদ্রোগ হইতে, মিরিকার পাণ্ডু যকৃতের ক্রিয়া-বিকার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয়। মিরিকায় কোন কারণে যথোপযুক্তরূপে পিত্ত প্রস্তুত হয় না, সুতরাং পিত্তের উপাদান গুলি রক্তে থাকিয়া যায়; এবং গৌণতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া নাড়ীর মন্দগতি জন্মে। ডিজিটেলিসের ক্রিয়ায় ত্রায় মিরিকার ক্রিয়া প্রগাঢ় নহে, এজন্য উৎকট পাণ্ডুরোগে ইহা তেমন উপযোগীও নহে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় নিরাশতা; বিমর্ষতা; কোপনতা। কোন বিষয়ে মন-সংযম করিতে পারা যায় না। অপ্রিয় নিন্তেজ অবস্থা। মস্তক।—জড়তা ও তন্দ্রানুতা;

অবশীর্ণ হইলে মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন ; এবং বিবিম্বা সহকারে শিরোধ্বর্জন ।  
কপালে, শঙ্খস্থলে ও কটিতে বেদনা সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ ; বিমুক্ত বায়ুতে উহার  
উপশম । চক্ষুর উপরে ও মধ্যে মৃদু মৃদু গোরব অমুভব । চক্ষু ।—চক্ষুর রক্ত-সঞ্চয় ও  
পীতবর্ণ । নিস্তেজতা ও ভারিহ অমুভব, জাগ্রত হইবার পরেও এইপ্রকার অমুভব ।  
পড়িবার সময় চক্ষু জ্বালাকরে ও সহজে শ্রান্ত হয় ( ফস, রুট, সিপি ) ; অক্ষিপুটের শুক্ক  
( কোনা, জেল ) । মুখমণ্ডল ।—মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ ; পাণ্ডুরোগ ( চেলি, সিক ) ।  
উত্তাপ ও দপদপ সহকারে, বিশেষতঃ বাহিরে খোলা বায়ুতে থাকিতে, মুখমণ্ডলের পূর্ণত্ব ।  
মুখ-মধ্য ।—জিহ্বার উপরে পুরু, পীতভা, মলিন, শুষ্ক ও শক্ত লেপ, তজ্জন্ত জিহ্বার  
প্রায় অচলতা । মুখে দুর্গন্ধ মন্দ আশ্বাদ ; তন্নিমিত্ত আহার করিতে পারা যায় না ;  
তিক্ত, বিবিম্বাজনক স্বাদ । গালের ঝিল্লীর উপরে দৃশ্যে অচ্ছাদন, মুখের তালুতে  
শুক, শব্দ সংযুক্ত চিপটিকা, উহা জলে আর্দ্র বা দ্রবীভূত হয় না । মুখের শুষ্কতা ; পিপাসা ,  
জল পানে কিছুকালের জন্ত কেবল উহার আংশিক শান্তি । গল-মধ্য ।—গলার  
অভ্যন্তরে রক্তবৎ শ্লেষ্মা ; উহা অনায়াসে ছাড়ান যায় না । গল-মধ্য ও নাসা-বস্ত্রে একপ্রকার  
দুর্গন্ধ, দৃশ্যে শ্লেষ্মা ; উহা অনায়াসে স্থলিত হয় না ( এম-কার্ক, নাই-এসি, ফাইটো ) ।  
গল-কোষের শুষ্কতা ; বেদনা, বোধ হয় যেন উহা চিড়িয়া যাইবে, গিলিতে প্রতিবন্ধকতা ও  
অবশেষে প্রতিক্রিয়া জন্মে । গল-কোষে আঠা আঠা, ফেণিল শ্লেষ্মা ; কুলী করিলেও  
উহা বিচ্যুত হয় না ; বিরক্তিকর স্বাদ জন্মায় ; ও আহারের ব্যাঘাত করে । আমাশয় ।—  
ক্ষুধা, অথচ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহীত আহারের স্থায় পূর্ণতা অমুভব ( \* সিক, লাই ) ।  
ক্ষুধাহীনতা ; আহারের অপ্রবৃত্তি । আমাশয়ে পূর্ণতা ও চাপ, অথবা দুর্বলতা ও নিমগ্নতা  
অমুভব । উদর ।—যক্কং-প্রদেশে মৃদু বেদনা ; পূর্ণতা ; তন্দ্রালুতা ; দুর্বলতা ; বর্দম-বর্ণ  
ভোস্কা মল ; \* পাণ্ডু । উদরে মোচড়ান বেদনা ; অস্ত্র-কুজন ; মল-বেগ ; কেবল বায়ু  
নিসরণ । যেন অতিসার হইবে এরূপ দুর্বলতা অমুভব । মল ।—অধিক দুর্গন্ধ অপান  
নিসরণ । নাতীপ্রদেশে ধলীবৎ অমুভব ও কুহন সহকারে পাতলা, ভোস্কা মল  
( কলোস ) । পাতলা পীতবর্ণ, ভোস্কা ভোস্কা বর্দম-বর্ণ মল ( ক্যাক, ডলি, হিপ,  
পড ) ; পাণ্ডুরোগ । মূত্র ।—ঈষৎ পীতবর্ণ ফেণা সংযুক্ত বিয়ার মদিরার বর্ণ মূত্র ; ঈষৎ  
পাটল মিশ্রিত কপিশ, অল্প অধঃপতিত পদার্থ । ফুৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—ফুৎপিণ্ডের  
আবেগ বিবদ্ধিত, নাড়ীর বেগ যাইট ; নাড়ী ক্ষীণ ও অনিয়মিত । গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ।—  
অল্প অবিরাম বেদনা, আকর্ষণ, আলস্ত, শিরঃপীড়া । দেহ । অল্প অল্প স্বায়বীয়  
উত্তেজনা ও অস্থিরতা ; অনন্তর সঙ্কর অস্থিরতা ও দুর্বলতা অমুভব । পেশীর খঞ্জতা ও  
স্পর্শ-দ্রব্য ; আলস্ত ; চিত্তের অবসাদ । নিদ্রা ।—তন্দ্রালুতা ; শিরোধ্বর্জন ; অর্দ্ধ-স্থিতি ।  
অস্থিরতা, অথবা প্রাতঃকালের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত গাঢ় নিদ্রা ; কিন্তু সাধারণতঃ জাগরণের  
পরে মানি অমুভব । জ্বর ।—গৃহের বাহিরে গেলে শীত ; কটিদেশে অল্প অল্প বেদনা । শীত

সহকারে পূর্ণাঙ্গক্রমে উদ্ভেজিত সজ্জতা অনুভব ; পৃষ্ঠবংশে উষ্ণতা অনুভব, অনন্তর শীত ও যুগ্ম ঘর্ষ। মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা। ত্বকু—পাণ্ডুরোগবৎ পীত আকৃতি।  
উঁশের কামড়ের ভ্রায় কণ্ডুয়ন। উপচয়।—রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।—উপশম।  
—প্রাতরাহ্নের পরে ; ও বিমুক্ত বায়ুতে হ্রাস।

সমগুণ।—চেলি, ডিজি, পড।

## মেডোরাইনঃম ।

প্রমেহের বিষ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কুচিকিৎসিত ও বিলুপ্ত প্রমেহের সর্বাঙ্গীন মন্দফলে অতীব সুনির্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান আয়ুর্গিক প্রয়োগ।

সাইকোসিস ( মাষক-দোষ ) হইতে উৎপন্ন গাউট, আমবাত, নায়ু-শূল এবং পৃষ্ঠ-বংশের মজ্জার বা উহার ঝিল্লীর রোগ—এমন কি উহার বিধান-বিকার ও উহা হইতে পক্ষাঘাতে পরিণতিতেও মেডোরাইনঃম উপযোগী।

নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয়-প্রদাহ ( ওভেরাইটিস ), ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, পেলবিক সেলুলাইটিস, তন্তুময় অর্কুদ, কোষময় অর্কুদ, ও জরায়ুতে অন্তর্বিধ অস্বাভাবিক বস্তুর উৎপত্তিতে, বিশেষতঃ সেই সকল বিকৃত পদার্থের উৎকট প্রকৃতি ধারণের সম্ভাবনায়, সাইকোসিস-দোষ মূলক হউক, বা না হউক, এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

স্মিরঃস, কার্শিনোমা অথবা ক্যান্সার রোগের তরুণ বা পুরাতন বিকাশে, লক্ষণের সৌসাদৃশ্য ও সাইকোসিস-দোষের পূর্ববৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী।

ত্বকু ও শৈল্পিক ঝিল্লীর গভীর-মূল রোগে সোরিগমের যে সম্বন্ধ, সাইকোসিস-দোষ জনিত পৃষ্ঠ-বংশীয় ও সহানুভৌতিক নায়ুমণ্ডলের গভীর-মূল পুরাতন রোগে মেডোরাইনঃমের সেই সম্বন্ধ।

পাণ্ডুবর্ণ, রেকাইটিস-গ্রস্ত বালক-বালিকা ; অপরিবদ্ধিত ক্ষুদ্রকায় ( ব্যারা-কা ) ; মানসিক শূলবুদ্ধিতা ও দুর্বলতা।

লসিকা-প্রস্থির বিবর্দ্ধন সহকারে সর্বশরীরের অতিশয় উত্তাপ ও স্পর্শ-দেহ। ক্ষয়রোগ-জনিত অবসাদ ; শ্রান্তি, সর্বাঙ্গীন জীবনী-শক্তির অতিশয় অবসন্নতা।

বেদনা।—বিলুপ্ত প্রমেহের পরিণাম স্বরূপ সন্ধিবাৎ ও আমবাত জনিত বেদনা ( ডাফ, ক্রিম ) ; আকুঞ্চনবৎ বাতনা, বোধ হয় যেন সমগ্র শরীর কষিয়া ধরা হইয়াছে ( ক্যাঙ্কি ) ; সর্বশরীরে ঘৃষ্টবৎ স্পর্শ-দেহ ( আর্গ, ইউপ )।

রোগীর নিকট \* সর্বশরীরের কম্পানুভব, তীব্র নায়বীয়তা ও গভীর অবসন্নতা।

\* হিমালয় অবস্থা, সকল সময়ই বাতাস করিতে বলা ( কার্কো-ভে ); বিমল বায়ু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ; গাত্র শীতল সম্বন্ধে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়া ( ক্যাম্ফ, সিক ); গাত্রের শীতলতা ও শীতল সম্বন্ধে সিক্ততা ( ভিরে ) ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ; নাম, শব্দ বা শব্দের প্রথম অক্ষর স্মরণ রাখিতে পারা যায় না ; অত্যন্ত আত্মীয় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; এমন কি নিজের নাম পর্যন্ত স্মরণ থাকেনা । পরিশুদ্ধরূপে বর্ণ-বিব্রাস করিতে পারা যায় না ; সুপরিচিত নাম কেমন করিয়া বানান করিতে হয় তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে হয় । আলাপ করিতে করিতে কথার সম্বন্ধ হারাইয়া যায় । রোগিণী তাহার লক্ষণ অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারেনা, সে ভেবাচেকা খায়, তখন পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিতে হয় । \* না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারা যায়না । মৃত্যুর কথা পূর্বে বলা ; সর্বদা পূর্ব-দৃষ্টি, ঘটনা ঘটবার পূর্বেই তৎসম্বন্ধে অতিশয় অনুভূতি । সামান্য সামান্য বিষয়ে বিরক্তি ; দিব্যভাগে কোপনতা রাত্রিতে হৃষ্টতা । অতিশয় অসহিষ্ণুতা ; ক্ষণরাগিতা । উৎকণ্ঠা, দ্বায়বীর্যতা, অত্যন্ত অনুভূতি ; অত্যন্ত শব্দে চমকিত হইয়া উঠা । সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে অবসান হয় ( এলম, আর্জ-না, ক্যান-ইণ্ড ) । অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা ; কোন কিছু করিবার সময় রোগিণীর এতই ব্যসমস্ততা যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়ে । অনেকগুলি লক্ষণ, যখন উহাদের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখন বুদ্ধি পায় ( বেদনার বিষয় ভাবিবামাত্র উহার প্রত্যাবৃতি, অক্জ-এসি ) ।

মস্তক ।—মস্তকে দারুণ জ্বালার বেদনা, উপমস্তকে (সেরিবেলঃম) উহার আতিশয্য ; মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্যন্ত প্রসারণ । মস্তক ভারী বোধ হয় এবং পশ্চাদিকে আবৃত্ত হয় । গাড়ীর কক্কশ শব্দে শিরঃপীড়া ও অতিসার । মস্তকে অশিথিলতা ও সঙ্কোচন অনুভব, সমগ্র পৃষ্ঠবংশের লম্বালম্বি উহার প্রসারণ ।

গল-মধ্য ।—যেন তীর শর্দি হইয়াছে রোগিণীর এইরূপ অনুভব, তৎসহ অস্থিতে বাতনাগ্রদ বেদনা, গলার বেদনা ও ক্ষীততা, তরল বা অতরল পদার্থ গিলিতে পারা যায় না (মার্ক) । নাসিকার পশ্চাৎ রক্ত হইতে গাঢ়, ধূসর, বা রক্তাক্ত স্লেয়া নিঃসৃত হইয়া গলার সতত পূর্ণতা ( হাউড্রা ) ।

ক্ষুধা ও পিপাসা ।—আহারান্তে তৎক্ষণাৎ আবার অতিশয় ক্ষুধা ( সিনা, লাইকো, সোরি ) । অবিরত পিপাসা, রোগিণী স্বপ্নেও জলপান করে । মদিরায় ( পূর্বে ঘৃণা সম্বন্ধে ) ( এসার ) ; লবণে ( ক্যাক, জাট ) ; মিষ্ট দ্রব্যে (সলফ) ; বরফ, অন্ন, কমলালেবু ও কাঁচাকলে ; \* অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ।

অঙ্গ ।—হৃৎশক্তি বর্দ্ধমবৎ, ধীরে ধীরে নির্গত মল ; সরলাঙ্গ বাহির হইয়া পড়িবে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কুহন করিতে অসামর্থ্য (এলম) । গুলার ঝায় মল সহকারে



অস্ত্রের আকুঞ্চন ও নিষ্ক্রিয়তা ( ল্যাক )। কেবল অনেকদূর পশ্চাৎদিকে ঝুকিয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায় ; মল-ত্যাগে বড়ই যাতনা হয় ; এত যাতনা হয় যে চক্ষু দিয়া জল পড়ে ; বোধ হয় যেন মলদ্বারের মুখাবরক-পেশীর পশ্চাৎদিকের উপরিভাগে একটা পিণ্ড রহিয়াছে। সরলান্ত্রে তীব্র স্থচী-বেদনের ভ্রায় বেদনা। মলদ্বার হইতে রস-ক্ষরণ, উহার লোণা মৎস্তের জলের ভ্রায় দুর্গন্ধ ( কষ্ট, হিপ )।

মূত্র-যন্ত্র ।—বৃক্ক-প্রদেশে উগ্র বেদনা ( পৃষ্ঠ-বেদনা ), অধিক মূত্রশ্রাবে উহার উপশম ( লাইকো )। বৃক্ক-শূল ; অশ্মরি-নিঃসরণ অল্পভব সহকারে মূত্রবাহী নালীতে দারুণ বেদনা ( বার্ক, লাইকো, ও সিম ) ; বরফ খাইবার স্পৃহা। রাত্রিতে শয্যা-মূত্র ।—প্রতিদিন রাত্রিকালে শয্যাং এমোনিয়ার গন্ধ বিশিষ্ট লোহিতবর্ণ প্রভূত মূত্র-ত্যাগ ; অধিক কার্য্য করিলে বা অধিক খেলা করিলে, ও উত্তাপ বা শীতলতার আতিশয্যে উহার বৃদ্ধি। সর্ক্যাপেক্ষা স্নানিকীর্ণিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে ; এবং সাইকোসিস-দোষের পূর্ব-বৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মূত্রত্যাগ কালে মূত্রাশয় ও অস্ত্রের যন্ত্রণা-পূর্ণ কুহন।

জনন-যন্ত্র ।—ঋতু। অতি মলিন, সংযত, প্রভূত, রজঃ ; রক্তের দাগ সহজে ধুইয়া উঠান যায় না ( ম্যাগ-কা )। জরায়ুর রক্তশ্রাব ।—বিরজঃ কালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত মলিন সংযত দুর্গন্ধ রক্তের প্রবাহ, নড়িলে চড়িলে হড় হড় করিয়া রক্তপাত ; তৎসহ জরায়ুর উৎকট রোগ। দারুণ রজ-শূল, জাহ্নব্ব উপরের দিকে আকর্ষণ এবং প্রসব-বেদনার অন্তরূপ ভয়ঙ্কর কুহন ; প্রসব-বেদনার ভ্রায় পদদ্বয় কোন অবলম্বে চাপ দিতে হয়। ভগের ওষ্ঠের ও যোনির দারুণ কণ্ডুয়ন, চিন্তা করিলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। স্তন ও স্তন বস্ত্রে স্পর্শ-দেব। ( ঋতু-কালে ) স্তন দ্বয়ের বিশেষতঃ স্তন-বস্তুর স্পর্শে তুষার সদৃশ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা।

শ্বাস-যন্ত্র ।—শ্বাস-কাস। এপিগাস্ট্রিসের দুর্বলতা বা আক্ষেপ বশতঃ শ্বাস রোধ ; স্বর-যন্ত্রের এরূপ অবরুদ্ধতা যে উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখের উপর ভর দিয়া শ্বাসন করিলে এবং জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিলে উহার উপশম। স্বর-যন্ত্রে ক্ষতবৎ স্পর্শ-দেব। শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আকুঞ্চন অনুভব ; অনায়াসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়, কিন্তু প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ( শ্রাসু )। কাস ।—শুষ্ক, অবিরত উগ্র কাস ; যাতনা, বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্র হইতে স্নৈয়িক বিল্লী ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; পিপার মধ্যে কাস দেওয়ার ভ্রায় গভীর শূত্র-গর্ভ কাস ; রাত্রিতে, মিষ্টদ্রব্য আহারে, ও শ্বাসন করিলে, উহার বৃদ্ধি ; আমাশয়ের উপর ভর দিয়া শ্বাসন করিলে উপশম। নিদ্রাবন ; আঠা আঠা কফ, অনায়াসে তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না। প্রচ্ছন্ন ক্ষয়-রোগ ; ; ফুসফুসের মধ্যখণ্ডে তীব্র বেদনা।

পৃষ্ঠ ও দেহ-শাখা ।—স্ফাক্সি দ্বয়ের ব্যবধান-স্থলে পৃষ্ঠে বেদনা ; সমগ্র মেরুদণ্ডে লম্বাংশে স্পর্শ-দেব ( চিল্লি-সল )। দারুণ জ্বালকীর উত্তাপ, ঘাড়ের পিঠে উহার আরম্ভ

এবং মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহ আকৃষ্টন বা স্তম্ভতা, অঙ্গ প্রসারণ করিলে উহার বৃদ্ধি। স্বস্ত্রের ও বাহুর শিখর-দেশের আমবাত; হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বেদনার প্রসারণ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি (দক্ষিণ, শ্রাদ্ধ। বাম, ফির)। কটিদেশীয় কশেরুকায় বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ। ত্রিকাস্থি, কোকিল-চকু-অস্থি এবং বজ্রকর্ণ-পৃষ্ঠে বেদনা, চারিদিকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিম্ন পর্য্যন্ত উহার সঞ্চরণ। কুচকী হইতে জাহ্ন পর্য্যন্ত ও জজ্বাধ্বয়ে বেদনা; কেবল হাঁটিবার সময় বেদনা অনুভূত হয়। জজ্বাধ্বয়ের গুরুত্ব, নীসের ছায় ভার বোধ হয়; হাঁটিতে অতিশয় আয়াস বোধ হয়, জজ্বা ভাঙ্গিয়া আইসে। নিম্নাঙ্গ সারারাত্রি বেদনা করে, উহাতে নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা জন্মে। \* জজ্বাধ্বয় ও পদদ্বয়ের অত্যন্ত অস্থিরতা (জিহ্ব)। তড়িৎ সম্বলিত ঝড়কালে জজ্বাধ্বয়ে ও বাহুদ্বয়ে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। জজ্বাধ্বয়ে বেদনা, শয্যায় উহা স্থির রাখিতে পারা যায় না, আত্ম-সংযম পরিত্যাগ করিলে ও নিদ্রা যাইতে শরীর শিথিল করিলে বেদনার বৃদ্ধি। জজ্বা ও পদের এবং হাত ও বাহুর সম্মুখ ভাগের শীতলতা। জজ্বার শিরায় ও পদের গ্রন্থিতে আকর্ষণ ও আকৃষ্টনবৎ অল্পভব; জজ্বা-পৃষ্ঠ ও পদতলে খল্লী (কুপ)। হাঁটিবার সময় গুল্ফ সহজে ঘুরিয়া যায় (কার্কো-এন, লিড)। হাত-পায়ের \* \* জালা, উহা অনাবৃত রাখিতে ও পাখার বাতাস প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা (ল্যাক, সল)। জজ্বায় এবং বাহুতে স্নায়ু-শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ; অত্যন্ত মাত্র প্রয়াসে উহার অবসন্নতা। শরীরের প্রত্যেক সন্ধির বেদনা-পূর্ণ স্তম্ভতা। হাতের আঙ্গুলের সন্ধির বিকৃতি; \* অঙ্গুলীর পর্কের রহস্য ও ক্ষীততা; গুডমুড়ার ক্ষীততা ও বেদনাবিশিষ্ট স্তম্ভতা; পায়ের গোড়ালীর এবং গোলাবৎ স্থানের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; বায়ু-কোষের ছায় সকল সন্ধির ক্ষীততা।

উপচয়।—\* রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলন, অক্স-এসি); উত্তাপে, আবরণে; প্রসারণে; ঝড়-বজ্রকালে; অত্যন্ত মাত্র সঞ্চালনে; মিষ্টদ্রব্য সেবনে; দিবালোক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (সিফির বিপরীত) বৃদ্ধি।

উপশম।—\* সমুদ্রকূলে (ছোটের বিপরীত); আমাশয়ের উপর তরদিয়া শয়নে ও আর্দ্রকালে (কষ্ট, নঙ্গ); হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) শুষ্ক কাসে, ইপির সহিত; হিমাস্কে, সিকে, ক্যান্ফ, ট্যাব, ভিরের সহিত; বিচরণে অসমর্থতায়, পিক-এসি, জেলসের সহিত; এবং প্রাতঃকালীন অতিসারে, এলো ও সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) সলফারের পদদ্বয়ের জালা এবং জিহ্বের পদ ও জজ্বার অস্থিরতা উভয়ই যুগপৎ মেডোরাইনমে পাওয়া যায়।

## মেছা পিপারিটা।

পিপারমিণ্ট একপ্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ। ইহা পৃথিবীর চারিখণ্ডেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে এক প্রকার উদ্বারী তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল এলোপ্যাথেরা সচরাচর ব্যবহার করেন। ডাঃ ডিমোস' বলেন যে পিপারমিণ্ট এক প্রকার ছুনিবার শুষ্ককাস উৎপন্ন করে। এই কাস স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট করাইলে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে, ধূমপান বা ধূম আত্মাণ করিলে উদ্ভিক্ত হয়। স্তূতরাং সমমতে ঈদৃশ শুষ্ককাসে এই ঔষধে উপকার করে। তিনি বলেন যে উপঘাতে আর্গিকা ও প্রাদাহিক রোগে একোনাইট যেরূপ উপযোগী, শুষ্ককাসে মেছা পিপারিটা সেইরূপ উপকারী। ক্ষয়রোগের কাস পর্যন্ত এতদ্বারা উপশমিত হয়। অনেক সময় ত্রিশ শক্তির একটীমাত্র বটিকা সেবনেই শুষ্ক কাস আরোগ্য হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট কাসে রুমেক্স ক্রিসপস অতীব উত্তম ঔষধ। বৃক্কাস্থির উর্দ্ধ গহ্বরে বিরক্তিকর কণ্ডুয়ন বশতঃ কাসের উদ্বেক; ও রোগীর উষ্ণ বায়ু নিঃস্বসনের ইচ্ছা রুমেক্সের প্রয়োগ-লক্ষণ। যে কোন কারণে নিঃস্বসিত বায়ুর তাপের ব্যাঘাত জন্মে তাহাতেই এই কণ্ডুয়ন উৎপন্ন হয় ও কাস জন্মে। এই কণ্ডুয়ন বক্ষঃস্থল পর্যন্ত ও সম্প্রসারিত হইতে পারে। তখনও রুমেক্স উপযোগী। মিছা পিপারিটারও এই প্রকার কাস-লক্ষণ বটে এবং এতদ্বারা ঈদৃশ কাস আরোগ্যও হইয়াছে। কিন্তু তিনি রুমেক্স অপেক্ষা পিপারমিণ্ট নিকৃষ্ট মনে করেন। বাষ্প-সঞ্চয় সংযুক্ত পিত্ত-শূল; এবং হার্পিজ জোষ্ঠারের তীব্র বেদনায়ও ইহা ফলপ্রদ। যোনিকণ্ডুয়নে ইহার বাহ প্রয়োগ হয়।

## মেলিলোটস—ইয়ালো মেলিলোট।

লিগুমিনোসী জাতীয় মেলিলোটস অফিসিনেলিস ইউরোপে জন্মে। ইহার সরস ফুল হইতে স্মৃষ্টি প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—স্নায়ু-মণ্ডলেই মেলিলোটসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, তজ্জন্ত মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, আরক্ত মুখমণ্ডল, এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্ত-পাত লক্ষ্যাপন্ন \* অতি তীব্র শিরঃপীড়ার উৎপত্তি হয়। এতদ্বারা স্নায়বীয় কারণে সমুৎপন্ন, অথবা মস্তিষ্কের গৌরব বশতঃ সমুদ্ভূত শিরোবেদনার সম্বর শান্তি জন্মে, এবং 'সবমন শিরঃপীড়ায়' সম্যক উপকার দর্শে। ইহার প্রধান উপাদান 'কিউমেরিণ' বৃহৎ মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন; বমন এবং নিদ্রাহীনতা, মস্তকে দারুণ বেদনা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসাদন ও শরীর-শাখার শীতলতা সহকারে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়।

অধিকার।—স্নায়ু-শূল ও রক্ত-সঞ্চয় জনিত শিরোবেদনায়ই এই ঔষধ প্রাধান্যতঃ ব্যবহৃত হয়। 'সবমন শিরঃপীড়ায়' ইহা অমোঘ বাঁগিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাসিকা

হইতে রক্তশ্রাব হইয়া শিরোবেদনার শান্তি ইহার একটা লক্ষণ । অতিশয় আরক্ত বদনাদি সংযুক্ত ধর্মসংক্রান্ত বিষাদ-বায়ু এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । অবসাদ-বায়ু । ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ । দস্তোডেদ কালে মস্তকে অতিশয় রক্ত সঞ্চয় সহ, বিশেষতঃ দ্বায়বীয় শিশুদিগের, আক্ষেপ ।—এই সকল রোগেও মেলিলোটস উপযোগী ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**শিরঃপীড়া** ।—মেলিলোটস মস্তিকে এমনই অত্যন্ত প্রচণ্ড রক্তসঞ্চয় ও শিরঃপীড়া জন্মায় যে তাহাতে রোগীকে প্রায় উন্নত করিয়া তোলে । (পরীক্ষাকারীকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল) । তাহার বোধ হয় যে কপাল বিদীর্ণ হইয়া মস্তিক বাহির হইয়া পড়িবে । এই ঔষধ পরীক্ষাকালে একজন স্ত্রীলোকের ঈদৃশ রক্তসঞ্চয় বিশিষ্ট শিরঃপীড়া সহকারে কন্দ ও হৃৎকম্পও উপস্থিত হইয়াছিল । অতএব সবমন ও দ্বায়বীয় শিরোবেদনায় অত্যন্ত দ্বায়বীয়তা; কোপনতা; স্মৃতিশূন্যতা; চিন্তার বিশৃঙ্খলতা; হৃৎকম্প; তরল মলশ্রাব; এবং নাসিকা হইতে রক্তপাতে শান্তি লক্ষণে মেলিলোটস ব্যবস্থেয় । দ্বায়বীয় শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ । ইহার মূল অরিষ্ট পাচমিনিট আত্মাণ করাইলেই শিরোবেদনা উপশমিত হয় । **নাসিকার রক্তশ্রাব** ।—মস্তকের তরুণ রক্ত-সঞ্চয়জনিত নাসিকার প্রবল রক্তপাতেও মেলিলোটস উপকারী । **স্নায়ু-শূল** ।—মস্তকের দ্বায়বীয় বেদনায় মেলিলোটস ষে রূপ উপকারী গ্যাষ্ট্রালজিয়া প্রভৃতি আশ্রয়ের দ্বায়বীয় বেদনায়ও এই ঔষধ প্রায় তদ্রূপ ফলপ্রদ । ইহার এক বিশেষ গুণ এই যে স্নায়ুশূলের আক্রমণের পরবর্তী স্পর্শ-দ্রব ও খঞ্জতা এতদ্বারা দূরীকৃত হয় । **সন্নিপাত জ্বর** ।—বধিরতা ও মুকতা; অজ্ঞাতসারে রক্তমিশ্রিত মল নিঃসরণ; নাসিকা হইতে রক্তপাত, চৈতন্যশূন্যতা, স্মৃতিহীনতা, মনোভাবের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি লক্ষণে দ্বায়বীয় বিকার বিশিষ্ট সন্নিপাত জ্বরে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় । **কাস** ।—আক্ষেপিক ককর্শ কাসে, যেন প্রচুর পরিমাণে বায়ু পাওয়া যায় না এরূপ অসুস্থত্ব, এবং বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্পর্শ-দ্রব অসুস্থত্ব লক্ষণে কাসেও এতদ্বারা উপকার হইতে পারে বলিয়া ডাঃ হেল উল্লেখ করিয়াছেন । **মানসিক রোগ** ।—মানসিক অবাস্তব বস্তু দর্শন; ভূতাবেশ; উদরের ক্ষীণতা ও ক্রমসঞ্চরণ অসুস্থত্ব, ভয়ানক বজ্রপাত শিরোবেদনা; বিবসিমা ও মুচ্ছার ভাব; পেশীর স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণে মানসিক রোগেও ডাঃ লিলিয়েস্থাল এই ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন** ।—কোপনতা, অধীরতা, অসন্তুষ্টি, দোষ-দর্শন । অলসতা, অনাবিষ্টতা, জড়তা, উদাসীনতা । অধ্যয়নে অপারগতা, কিছুই মনে রাখিতে পারা যায় না । লিখিতে

শব্দ ও অক্ষর পড়িয়া যায় (লাই) । মস্তক ।—সঞ্চালনে শিরোবুর্ন । মস্তিকে আন্দোলন অল্পভব ও শান্তিবৎ বেদনা । নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে শিরোপীড়ার শাস্তি । আরক্ত মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ চক্ষু ও পরিশেষে নাসিকা হইতে রক্তপাতে শাস্তি লক্ষণাপন্ন শিরোপীড়া । নাসিকার রক্তপাতে অথবা ঋতু-স্রাবে উপশমিত সবমন শিরোপীড়া । প্রতি সপ্তাহে একবার, কিম্বা চারি সপ্তাহে একবার স্নায়বীয় শিরোপীড়া, শীতকালে উহার আধিক্য । শিরোগৌরব, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণের অভ্যন্তর দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইবে এরূপ \* পূর্ণত্ব ও দপদপ, নড়িলে চড়িলে বিবদ্ধিত বিবিধা ও শিরোবুর্ন সহকারে \* মস্তকের প্রবল রক্ত সঞ্চয় । অতিশয় অবসন্নতা-পূর্ব্ব সমুদ্র ভাগের দপদপকর শিরোপীড়া । সমুদ্র ভাগের তীব্র শিরোপীড়া, তৎপূর্ব্ব উত্তপ্ত ও আরক্ত বদন এবং অল্প অল্প জ্বরানুভব । দক্ষিণ ভাগের সমুদ্রত স্থানে পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দপদপকর শিরোপীড়া । চক্ষু ।—চক্ষুর পাতা অতিশয় ভারী । নাসিকা ।—নাসিকার অত্যন্ত পরিপুষ্কতা । \* নাসিকা হইতে বার বার অধিক রক্তপাত ও উহাতে সর্বাঙ্গীন শাস্তি । মুখমণ্ডল ।—ক্যারটিড ধমনীতে দপদপ সহকারে মুখমণ্ডল ও মস্তকের আরক্ততা ( \* এমিল, \* বেল ) । মুখমণ্ডলের প্রায় নীলবর্ণ । মূত্র-যন্ত্র ।—বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্র-স্রাব । প্রভূত জলবৎ মূত্রপাত এবং উহাতে রক্তসঞ্চয় জনিত মূহ শিরোপীড়ার শাস্তি ( \* জেল ) । স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ।—বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গে বারংবার ক্ষণস্থায়ী স্থচী-বেধ । শ্বাস-যন্ত্র ।—বক্ষঃস্থলে পূর্ণত্ব বশতঃ কাস । উজ্জল লোহিত রক্তস্রাবী রক্ত-কাস । শ্বাস-রোধ অনুভব ; খণ্ডে খণ্ড বায়ু পাইতে পারা যায় না । বক্ষঃস্থলের উপর ভার বশতঃ আয়াসিত শ্বাস ; বক্ষঃস্থল ও মস্তকের পূর্ণত্ব ; ফুসফুসের প্রবল রক্তসঞ্চয় । উপশম ।—বিমুক্ত বায়ুতে এবং বিচরণে ও অবস্থান-পরিবর্তনে উপশম ।

সমগুণ ।—এমিল, বেল, ক্যাক্ট, মন. ফির, শ্রাদ্ধ ।

## ম্যানসিনেলা ।

ইউফরবিয়সী জাতীয় হিপোমেন ম্যানসিনেলা অতিশয় বিদাহী উদ্ভিদ । ইহার পত্র হইতে স্বকৈ জল-বিন্দু পতিত হইলেও ফোঁকা উৎপন্ন হয় ; কিন্তু সেই ক্ষেপে যে আরক্ততা জন্মে তাহা ক্যাছেরিস অপেক্ষা অধিক । এই আরক্ততা স্থালেটিনার আরক্ত রাগের সদৃশ । এজন্ত স্থালেটিনা রোগে ম্যানসিনেলা ব্যবহৃত হয় । ডাঃ মুর প্রথম এই ঔষধ পরীক্ষা করেন । দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এই ঔষধের প্রধান প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয় ।

ক্রিয়া ।—সাধারণতঃ স্নায়ুগুণ্ডে, শ্বাস-বস্ত্রে পরিপাক-বস্ত্রে, ও স্বকৈ ম্যানসিনেলার প্রকৃতি প্রকাশ পায় ।

**অধিকার ।**—যকে উগ্র অরুণিমা সংযুক্ত ফোঁকা । আরক্তজ্বর ও প্রলাপ । গলা-বেদনা । গলায় ও গল-নলীতে আকুঞ্জন জন্ত গিলিতে কষ্ট । চক্ষু-জ্বালা, অক্ষি-পুট রুদ্ধ করিলে উহার আধিক্য । কৃষ্ণবর্ণ বমন সহকারে আমাশয়ে জ্বালাকর বেদনা । গদগদ-ভাষণ । উৎকট ও তরুণ রোগের পর কেশ-পতন ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**কেশ-পতন ।**—উৎকট তরুণ রোগের পর কেশ-পতন । **উদর-বেদনা ।**—মূর্ছা সংযুক্ত অস্ত্র-শূল, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও অতিসার । **উন্মাদ ।**—বিবাদ, স্বর্গহে বা স্বদেশে যাইবার একান্ত ইচ্ছা ; প্রায় দুই প্রহর রাত্রির সময় ভয় ও কম্পের উপস্থিতি ; ভূত-প্রেতের ভয়, ভূতগ্রস্ত, হইবার আশঙ্কা ; নিদ্রা-হীনতা, হৃদপ্রদেশে প্রুচাপন, হৃৎপিণ্ডের কঠিন স্পন্দন, তৎপরে মূর্ছাকল্পতা, ও চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার-দর্শন ; মূছ ও কোমল নাড়ী ; চর্ম-রোগ । **গলা-বেদনা ।**—আরক্তজ্বরের পরবর্তী গলা-বেদনা ; উপজিহ্বার অতিশয় দীর্ঘতা ; তালু-মূলে পীতাত শুভ্র, প্রবল জ্বালাকর বেদনা বিশিষ্ট ক্ষত ; তালু-মূলের অতিশয় ক্ষীততা ও পকতা, এবং শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা, ও হিস্-হিস্ শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস । **অগ্নিমান্দ্য ।**—মুখে অতিশয় তিক্তাস্বাদ, জ্বালা ও কণ্টক-বেধ ; সমগ্র মুখ ও জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা ; শ্বাস-দুর্গন্ধ ; গল-কোষ ও গলনলীতে পিপাসামুখ উত্তাপ ; মুখের ক্ষত জন্ত কেবল তরল খাত্তদ্রব্য আহ্বারের সামর্থ্য ; শীতল জলের পিপাসা, কিন্তু আমাশয় হইতে উথিত এক প্রকার গল-রোধ অনুভবে জলপানে বিরতি ; অত্যন্ত বিবমিষা, \* অল্প, বসাবৎ বমন, তৎসহ জলপানে বিরক্তি ; বাস্ত পদার্থে সংযত বসার ঞায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ বস্তুর অবস্থিতি ; আমাশয় হইতে অগ্নি-মিথ্যা উত্থানের ঞায় অনুভব, অথবা আমাশয় যেন আকৃষ্ট হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ, ও অনন্তর আবার সহসা উহার বিমোচন ; আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব সহ সরলান্নে পূর্ণতা ; পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠ-রোধ । **তালু-মূল-প্রদাহ ।**—তালু-মূলের অতিশয় ক্ষীততা ও পুয়োৎপত্তি, এবং শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা ; হিস্-হিস্ শ্বাস ; তালু-মূলে প্রবল জ্বালাকর বেদনা বিশিষ্ট পীতাত শুভ্র ক্ষত । এই সকল লক্ষণে পূর্বোক্ত রোগে ডাঃ লিলিয়েস্থাল ম্যানসিনেলা ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ও মস্তিষ্ক ।**—প্রফুল্লতা ; নীরবতা ; গভীর অহুকম্পা ; ঔদাস্য ; তন্দ্রাবল্য । শিরোধূর্ন, মস্তকে জড়তা । তন্দ্রালুতা ; নিদ্রালুতা, অহির নিদ্রা ; উৎকণ্ঠিত স্বপ্ন । **ত্বক ।**—সমগ্র চর্ম্মের উপর জ্বালা অনুভব । চর্ম্মের আরক্ততা ; অপচ্যমান, পচ্যমান, ও ফোঁকার ঞায় উদ্বেদ । **দেহ ও অঙ্গ ।**—আক্ষেপ, টঙ্কার, দুর্বলতা ; অবসরতা । ষাড়ের ও কটির বেদনাবিশিষ্ট স্তম্ভতা । সকল অঙ্গের, আলস্ত ; সন্ধিস্থানগুলিতে

অশিথিলতা ; অবর্ণনীয় গ্লানি । মস্তকাদি ।—মস্তকের কেশাবৃত্তভাগের স্বকে কণ্ডুয়ন ও অশিথিলতা । শিরঃপীড়া ; গৌরব, স্থী-বেদন, ও জ্বালাকর বেদনা ; বিবমিষা ও বমন । চক্ষু জ্বালা ; অক্ষি-গোলকে কর্তনবৎ যাতনা । কর্ণে উত্তাপ ও গড়গড় শব্দ । নাসিকার শুষ্কতা ও মন্দ গন্ধ । মুখমণ্ডলের আরক্ততা ; পীতবর্ণ । ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণ ; নিম্নের ওষ্ঠ নীচে ঝুলিয়া পড়া । স্নায়ুমণ্ডল ।—কতকটা উপদাহ ; অতিশয় দুর্বলতা । কম্পন ; টঙ্কার ; অবসন্নতা ; বেদনা । রক্ত-সঞ্চলন-যন্ত্র ।—নাড়ীর দুর্বলতা ; দ্রুততা ; হৃৎপিণ্ডে থল্লী । বরফবৎ শীতল হস্ত-পদ সহকারে শীত ; তাপাবেশ ; পিপাসা সহ জ্বালাকর উত্তাপ ; শীতল ঘর্ম্ম । স্বরযন্ত্রে অশিথিলতা ; অমুনাসিক শব্দ ; শ্বাসের হাঁসফাঁস ও ঘড়ঘড় শব্দ । বেদনাসংযুক্ত প্রবল কাশ ; রাত্রিতে উহার আধিক্য । বক্ষঃস্থলে ভার ও ঘড়ঘড় শব্দ । পরিপাক-যন্ত্র ।—মুখ-মধ্য প্রদাহিত ; অধিক লাল ; জিহ্বার শুষ্কতা ও ক্ষীণতা । গলার অবিরত অতিশয় শুষ্কতা । ক্ষুধার বৃদ্ধি ; বিলোপ ; অতিশয় পিপাসা ; তিক্তস্বাদ । উদগার ; বিবমিষা ; ক্লঞ্চবর্ণ বমন ; আমাশয়ে জ্বালাকর, স্থীবেধবৎ বেদনা । উদরে বেদনা ; অস্ত্রের শূল-বেদনা ; উদরের নানাস্থানে প্রবল কর্তনবৎ যাতনা । উদর-বেদনা ও বমন সহকারে প্রভূত অতিসার । কোষ্ঠ-কাঠিগ্র সহকারে পর্যায়ক্রমে অতিসার । মূত্র-যন্ত্র ।—মূত্রাশয়ে উপদাহ ও কর্তনবৎ বেদনা ; মূত্র-মার্গে জ্বালা । অধিক মূত্র ; স্বল্পমূত্র ; মূত্রের ঈষৎ শুভ্রবর্ণ । জনন-যন্ত্র ।—(পুং) সন্ধম প্রবৃদ্ধি ; অণ্ডকোষ-কণ্ডুয়ন । (স্ত্রী) ঋতু-রক্তের পাণ্ডুবর্ণ । উপচয় ।—রাত্রিতে ; প্রাতে ; ও আহারান্তে বৃদ্ধি । উপশম ।—বিমুক্ত বায়ুতে ; ও শয়নে হ্রাস ।

সমগুণ ।—কোনা, ইথু, ওলি, লরো ।

## ম্যালেরিয়া অফিসিয়ালিস ।

ইণ্ডিয়ানার ডাঃ বাউয়েন এই মূল্যবান ঔষধের আবিষ্কার করেন । ইহা অনুপস্থানের শুষ্ক বিগলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে এইরূপে প্রস্তুত হয় । জলাস্থানের পচা ও শুষ্ক ঘাসের চাপড়ার স্থায় পদার্থ জলপূর্ণ অবরুদ্ধ বোতলে এক হইতে তিন সপ্তাহ ফারেনহাইটের নব্বই ডিগ্রী উত্তাপে ভিজাইয়া রাখিতে হয় । যতই অধিকদিন রাখা যায় ততই অধিক তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে । ১৮৬২ সালে ম্যালেরিয়া প্রথম এই প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছিল । অনন্তর ডাঃ বাউয়েন ইহার আংশিক পরীক্ষা করেন । আমেরিকার পশ্চিমাংশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এক প্রকার জরের প্রাদুর্ভাব হইত । উহার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতনা । একরূপ প্রচ্ছন্ন বা “ঘূষঘূষে জরের” সহিত উহার সাদৃশ্য দেখা যাইত । এই জ্বর সে প্রদেশে বড়ই দুর্দ্দম্য ছিল । ইহার একটা বিশেষ ঔষধ আবিষ্কার করিবার

জন্ম ডাঃ বাউয়েন এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বাষ্প যে প্রক্রিয়ায় শরীরে প্রবিষ্ট হয় সেই প্রণালীতেই তিনিও কতকগুলি বেতনভুক শ্রমজীবী দ্বারা এই পদার্থের পচনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বাষ্প নিঃস্বসন করাইয়া ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রকাশিত পরীক্ষা-লক্ষণগুলি পরীক্ষাকারীদিগের নিজের ভাষায় পরিবাক্ত হয় নাই। ডাঃ ইংলিং ইহার ত্রিংশ শক্তিঘারাও পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

পরীক্ষায় প্রথম সপ্তাহের পরে ;—শিরঃপীড়া, বিবমিষা, শুভ্রলেপাযুক্ত জিহ্বা ; আমাশয়ের যাতনা, এই কয়টা লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং উহা দুই তিন দিন ছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে ;—বিবর্দ্ধিত-শিরঃপীড়া, বিবমিষা, আহারে অপ্রবৃত্তি, আমাশয়ে, যকৃত ও প্লীহায় যাতনা, এবং তৃতীয় দিবসে শীত প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রিয়ায় ঔষধ ব্যবহার দ্বারা প্রতিহার না করিলে উহা অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিত। তৃতীয় সপ্তাহের পরে ;—পূর্বোক্ত লক্ষণের সহিত অত্যন্ত আলস্য, বিবমিষা, ক্ষুধাহীনতা, অসহ-প্রায় বেদনা সংযুক্ত অবিরামজ্বর, এবং সন্নিপাতাবস্থা সংযুক্ত প্রগাঢ় দুর্বলতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডাঃ ইংলিং ১৯০০ সালে কয়েকটা চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণিত পরীক্ষা-লক্ষণের অভাবে এই ঔষধের ক্রিয়া নিরূপণে সেই সকল রোগীর বিবরণে কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা হইতে পারে :—

(১) প্রথম রোগী ২৮ বৎসর বয়স্ক একজন সৈনিক। এক সপ্তাহকাল শীত ও বৃষ্টি-কালে তাঁবুতে থাকিয়া পীড়িত হইয়া ইনি বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন। ইহার শীতের পর জ্বরের উত্তাপ ; সর্বশরীরে বেদনা ; বিবমিষা, বমনোত্তম ও পিত্ত-বমন ; শীতল পানীয় দ্রব্যের আকাজ্জা ; আহারে অসামর্থ্য এবং যাহা আহার করা যায় তাহাতেই বমন ; অন্নদ্রব্যের স্পৃহা ; জিহ্বায় পুরু শুভ্রলেপ ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও ঝলসানবৎ আকৃতি ; উগ্র চার জলের ত্র্যাস আরক্ত মুত্র ; বমনোত্তম, কাসিয়া কাসিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা গল-রোধ ; মুখমণ্ডল, চক্ষু ও ত্বকের বিবর্ণ ; চর্ম্মের অতিশয় পরিশুষ্কতা ; মুখ-বিবরের আর্দ্রতা, অথচ রোগীর নিকট শুষ্কতা অল্পভব ; অতিশয় দুর্বলতা ও কম্পন ; এই সকল লক্ষণ ছিল। (২) দ্বিতীয় রোগিণীর ৬৫ বৎসর বয়স। কয়েকদিন যাবৎ ইনি পীড়িত হইয়াছিলেন। উঠিলেই ইহার মাথা ঘুরিত। মাথা ভাল বোধ হইতনা ; বেদনা করিবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিত। যুথের স্বাদ তিক্ত ; মুখ-মধ্য ঝলসানবৎ ; জিহ্বা শুষ্ক ছিল। লেমনেড পানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জলপানের তত ইচ্ছা ছিলনা। পূর্বে কয়েক দিন পর্য্যন্ত অতিশয় ক্ষুধা ছিল, কিন্তু এক্ষণ ক্ষুধাভাব হইয়াছিল। সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীল বেদনা ; অস্থি-বেদনা। রাত্রিতে উচ্চ ( তীব্র ) জ্বর। অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করা। বাহুদ্বয়েই অস্থিরতার-সমধিক সুস্পষ্টতা। সেই দিন প্রাতঃকালে জন্মণ ও অঙ্গ-মর্দন ; বেদনাশান্তি অতিসার ; প্রাতঃকালে পাঁচ ছয়বার মলশ্রাব ; জলবৎ জীষৎ পীতবর্ণ, কতকটা হৃগ্ন মল ; দক্ষিণ শ্রোণী-দেশে (ইলিয়ায়াক রিজন) স্পর্শ-বেদ ; অস্ত্রে দুর্বলতা। ত্বকের উত্তপ্ততা ও পরিশুষ্কতা।—এই সকল লক্ষণ ছিল। (৩) তৃতীয় রোগীর



বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর । এক বৎসর “অতীত হইল” ইহার সামান্য শীতোত্তাপ ; ও ঘর্ম্মশূন্য “ঘুমঘুমে” জ্বর হইয়াছিল । কপাল ও শঙ্খস্থলের অভ্যন্তর দিয়া বেদনা ছিল । ক্ষুধার অত্যন্ত অল্পতা ; ও সকল সময়েই পিপাসা ছিল । পূর্বদিন তরল মল নিঃসৃত হইয়াছিল, সেদিন মলত্যাগ হয় নাই । প্রাতে উত্তিবার পর ভাল বোধ হয় ; কিন্তু বাহিরে কিছু কাল থাকিলে অসুখ বাড়ি ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপশম পড়ে । কটিদেশে পৃষ্ঠবেদনা, পৃষ্ঠের উপরের দিকে বেদনার সঞ্চরণ ; প্রথম শয়ন সময়ে বেদনার বৃদ্ধি, তৎপরে হ্রাস ; হাঁটিবার পরে ; ও উদরের উপর ভরদিয়া শয়ন করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি । : বিগত চারিদিন রোগীর শ্রান্তি ও ক্লান্তি ; জ্বরণ ; ও “ম্যালেরিয়া দ্বারা বিধাক্রবৎ অসুভব” লক্ষণ ছিল : ( ৪ ) চতুর্থ রোগীর ১৩ বৎসর বয়স । প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গোধূলী সময়ে, প্রত্যহ আশুয়াইয়া আশুয়াইয়া তাপাবেশ সংযুক্ত শীত, বিমল বিমুক্ত বায়ু সেবনের অতিশয় ইচ্ছা, যকৃত্তে বেদনা বশতঃ শ্বাস-ক্রিয়ার অসামর্থ্য, শয়ন করিলে উহার বৃদ্ধি, যকৃত্তপ্রদেশে শত্রু চাপদিলে উপশম ; দিবাভাগে বেদনা বা স্পর্শ-দ্বেষের অবিচ্ছিন্নতা । তখন সম্পূর্ণ স্নেহ বলিয়া বোধ হয়, কেবল ক্রমশঃ অধিকতর দৌর্বল্য অসুভূত হয় । সন্ধ্যাকালে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বরণ ; রোগী প্রলাপ বকে, গান করে, সারসারাত্রি কথা বলে ; স্থিতির নিদ্রা হয়না । জিহ্বা পরিষ্কৃত । ক্ষুধা পরিবর্তনশীল ; গোল-আলু, এপেল ফল, ও গো মাংসের কবাব খাইবার স্পৃহা । ( ৫ ) পঞ্চম রোগীর বয়স ২৮ বৎসর । একদিন পর একদিন জ্বর আইসে , সকল শরীরে শীত ; কুচকী হইতে নিম্নপর্ধ্যন্ত বরফের স্নায় শীতল ; দেহ-কাণ্ডে উত্তাপের আধিক্য ; ঘর্ম্ম সর্বাঙ্গীন, কিন্তু অল্প । প্রায় মধ্যাহ্নের সময় জ্বরের আরম্ভ । বিরাম কালে শ্রান্তি, দুর্বলতা ও নিদ্রালুতা ; উঠিতে অসামর্থ্য । অল্প ক্ষুধা অতিশয় পিপাসা শ্বাসে দুর্গন্ধ । নাড়ী দুর্বল ; সকল সময়েই তাপাবেশ । অধিক কুইনাইন ও কোষ্ঠবদ্ধতার জন্ত সন্টস্ সেবন করা হইয়াছিল । মল কঠিন, এবং সময়ে সময়ে মলত্যাগের পর রক্তপাত । মাথা যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ উগ্র শিরঃপীড়া । এই সকল লক্ষণ ছিল । এই সকল রোগীই ম্যালেরিয়া অফিসিনেলিস ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করিয়াছিল ।

ডাঃ ক্যাসানোবা উল্লেখ করিয়াছেন যে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও স্পেনে কতকগুলি এমন স্থান আছে সেখানে অনুপস্থলের পুতিবাষ্প ( ম্যালেরিয়া ) দ্বারা ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ প্রতীহিত ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । অত্র কোন চিকিৎসা বা পথ্যাদির নিয়ম আবশ্যক হয় না । ক্যাসানোবার উক্তির সমর্থনার্থে লণ্ডন নগরের ডাঃ হেরিং বলেন যে ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর । তিনি একবার ম্যালেরিয়া প্রধান পানামা যোজকে নয়দিন জাহাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পরে জাহাজের অনেকগুলি স্নেহ নাবিক পানামা-জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল । কিন্তু তিনি পূর্বে ফুসফুসের টিউবারিকুলার রোগে ভোগিয়াছিলেন বলিয়া এই জ্বর হইতে সম্যকরূপে নিমুক্ত ছিলেন ।

## জ্বরের লক্ষণ ।

**প্রকার ।**—ঐক্যিক, দ্ব্যিক, ত্রয়-বিরাম, সন্তত, ম্যালেরিয়া জনিত, ও টাইফয়েড, জ্বর । এলোপ্যাথি ঔষধ বা প্যাটেন্ট ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ ; অথবা অন্ত্রবিধ ; সর্বপ্রকার ঘূষঘূষে জ্বর ( ডঃম এগিউ ) । সময় ।—পর্যায়কালের অনিচ্ছিতা । দিবা ও রাত্রির সকল ঘণ্টা । কারণ ।—ম্যালেরিয়া লাগান, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও শরৎকালের অনাবৃষ্টি-সময় ; কুইনাইন ও অগ্নাশ্র “জ্বর ঔষধ” দ্বারা জ্বরের আবেশের অবরুদ্ধতা । আমবাতিক, সোরিক ( কচ্ছু-বিষ-দুষ্টি ) বা টিউবারকিউলার ( গুটিকা-দোষ-দুষ্টি ) দাতু । পূর্বরূপ ।—হস্তে, মণিবন্ধে, কফোণীতে ; পদে, গুল্ফে, ও জামুতে বেদনা । মণিবন্ধে ও উরুদ্বয়ে, উদরে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে শ্রান্তিবৎ বেদনা । সর্বাঙ্গীন শ্রান্তি অনুভব । শীত ।—বাম প্রকোষ্ঠে শীতানুভব, তৎপরে হস্ত ও হস্তাঙ্গুলীতে শীতানুভব ; পদদ্বয়ে শীতলতা ও শীত, যেন জজ্বা বাহিয়া উঠিবে এরূপ অনুভব । কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জামুদ্বয়ে শীতল অনুভব । জজ্বা হইতে শরীরে যেন শীতলতা উঠিতেছে এরূপ অনুভব । পৃষ্ঠ-বেদনা ; কটদেশ শ্রান্ত বোধ হয় । অল্পক্ষণ হাঁটিবার পর সর্বশরীরে, বিশেষতঃ বস্তি-গহ্বর, ত্রিকাস্থি-প্রদেশ ও উরুর উপরিভাগের অভ্যন্তরদিয়া শ্রান্তি অনুভব ; ও শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবার প্রবৃত্তি । যেন শীত জন্মিবে সময়ে সময়ে এপ্রকার অনুভব ; অনন্তর আবার যেন উত্তাপ উপস্থিত হইবে এরূপ অনুভব, কিন্তু শীতোত্তাপ কিছুই স্পষ্ট প্রকাশ নয় । জ্বন্তণ ও অঙ্গ-মর্দনের ইচ্ছা । জজ্বাদ্বয়ের অস্থিরতা ; প্রসারণ ও সঞ্চালন করিবার আবশ্যিকতা । পচিশ বৎসর অতীত হইল রোগীর একবার সবিরাম জ্বর হইয়াছিল, তদনুরূপ অনুভব । মুখমণ্ডল ও মস্তক উষ্ণ অনুভব, অনন্তর সর্বশরীরে ঈষৎ জ্বরের স্রাব উত্তাপ ।

**বিলোষণ ।**—ইপিকাক, স্ট্রাটম, সিকোনা, ও উহার উপকারগুলির ম্যালেরিয়াজনিত তরুণ রোগের সহিত যে সম্বন্ধ, ম্যালেরিয়া অফিসিনেলিসের পুরাতন রোগের সহিত সেই সম্বন্ধ । যে সকল রোগীর জ্বর এলোপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য না হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং জ্বরের প্রকার পরিবর্তিত হইয়া এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে মূলরোগের লক্ষণ ও ঔষধজনিত লক্ষণে প্রভেদ করিতে পারা যায় না সেই সকল স্থলেই এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ।

## রসভেনেনেটা—পয়জন সূমাক

রসভেনেনেটা একপ্রকার ক্ষুদ্র বিষ-বৃক্ষ । ইহা আমেরিকায় জন্মে । রসটজ অপেক্ষা রসভেনেনেটা অধিকতর বিষাক্ত । ইহার স্তম্ভ স্তম্ভ বেগুতে চতুর্দিকস্থ বায়ু কতকদূর পর্য্যন্ত বিষ-দুষ্টি হয় ও সেই বায়ুর সংস্পর্শে অনেকেরই বিসর্প-প্রকৃতির ক্ষীণতা জন্মে ; কখনও বা শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্ত নড়িতে পারা যায় না । আবার

কাঁহার কাঁহার বা স্পর্শ করিলে একেবারেই কোন অপকার জন্মে না। ডাঃ বিজলো বিবেচনা করেন যে ( ১ ) উষ্ণ বা শীতল প্রদেশে ; ( ২ ) গ্রীষ্মকালের অতি উত্তপ্ত দিবসে ; ( ৩ ) বালকদিগের দেহে ; ( ৪ ) আহ্বারের অব্যবহিত পরে ; ( ৫ ) আর্দ্রতা সহযোগে ; এবং ( ৬ ) ঘর্মাক্ত কলেবরে রসভেনেনেটার বিষ-ক্রিয়ার সমধিক প্রাবল্য জন্মে। ডাঃ হয়েট, বার্ট, ও ওয়েম এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা-লক্ষণ “প্রধান প্রধান লক্ষণ” শিরোনামে উল্লেখিত হইল। রসভেনেনেটা দ্বারা বিষাক্ত হইলে রসটক্স জনিত বিষাক্ততার জ্বায় চিকিৎসা করিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে রসভেনেনেটার বকুলের বা পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বিসর্প।**—ডাঃ মার্সী বলেন যে তৃতীয় দশমিক শক্তির রসভেনেনেটা সেবনে স্ফোট-বিশিষ্ট বিসর্পের জ্বালা ও কণ্ডুয়নের শাস্তি জন্মে। **চর্মরোগ।**—ডাঃ ওয়েম লিখিয়াছেন যে বিসর্প, শীতপিত্ত, কণ্ডু, কচ্ছ, পামা, ও স্ফোটকাদি রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ রসভেনেনেটা রসটক্স অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন। সুতরাং ঐষ্টীন পরীক্ষিত রসটক্স পরিভাগ করিয়া এই নূতন ঔষধ ব্যবহার করেন না। ওয়েম বলেন চর্মরোগে রসভেনেনেটা রসটক্স অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং একজিমা সোলেয়ার প্রভৃতি কোন কোন রোগে অধিকতর উপযোগী। রাত্রিকালে কণ্ডুয়ন ও দীর্ঘাহুগুলিতে কণ্ডুয়ন লক্ষণাগর এরিথিমা নভোসঃম রোগে রস-ভেন প্রধান ঔষধ। **উপেক্ষত।**—মুখের উপেক্ষত রোগে জিহ্বা, গাল ও গল-গহ্বরের অভিশয় আরক্ততা, ও সেই সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট, এবং মুখ ও গলা যেন বলসিয়া গিয়াছে এপ্রকার অল্পভব লক্ষণে রস-ভেন ব্যবহৃত হয়। **অন্ত্রান্ত্র রোগ।**—রসভেনেনেটা পরীক্ষাকালে ডাঃ হয়েটের অগ্নিমান্দ্য ও পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ রোগের উপকার দর্শিয়াছিল, তিনি বলেন যে বাহ্যদের শরীরে রসটক্সের প্রভাব দর্শনা, তাহাদের দেহে রসভেনেনেটার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার নিজের শরীরে রসটক্স স্পর্শে কোন অসুখ জন্মেনা, কিন্তু বিশেষ সতর্ক হইয়াও রসভেনেনেটা স্পর্শ করিলে ইহার প্রবল বিষ-লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। অপর একজন বোগীর এঞ্জাইনা রোগে রসটক্স বিশেষ উপযোগী ঔষধ সত্ত্বেও তদ্বারা কোন উপকার না হওয়াতে রসভেনেনেটা ব্যবহারে সেই রোগ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল।

**মন।**—অতিশয় বিমর্ষতা, জীবনধারণে অনিচ্ছা ; সকল বিষয়ই বিষাদপূর্ণ বোধ হয়। বিমনস্বতা ; কোন বিষয়েই চিন্তাসংঘম করিতে পারা যায় না। মানসিক পরিশ্রমে যাতনা বৃদ্ধি পায়। **মস্তক।**—\* মস্তকের সম্মুখভাগে শিরোগৌরব বিশিষ্ট ঘৃহ শিরঃপীড়া,

হাটিলে ও মাথা নোয়াইলে উহার বুদ্ধি । \* শিরোঘূর্ণন অল্পভব, সারাক্ষে উহার আতিশয্য ; মস্তকের অসহ্য গুরুত্ব । \* তীব্র, উপদাহকর জ্বর সহকারে মস্তক, মুখমণ্ডল, ও হস্তের অতিশয় স্ফীততা । \* মস্তক ও মুখমণ্ডলের বিসর্প । ০ বদন ও কেরোটীর স্ফোটবিশিষ্ট বিসর্প । চক্ষু ।—\* চক্ষুর চারিদিকস্থ কোষময় বিধানতন্ত্রের অতিশয় স্ফীততা বশতঃ চক্ষুর অবরুদ্ধতা । \* প্রভূত অশ্রুক্ষরণ ; অক্ষিগোলকে অবিরত মুছ বেদনা । চক্ষে জ্বালা ও যন্ত্রণা । অক্ষিপুটের স্ফীততা । চক্ষের অবিরত উপদাহ । ০ চক্ষুর পুরাতন প্রদাহ । কর্ণ ।—বিরক্তিকর বধিরতা । \* কর্ণের স্ফোটবিশিষ্টপ্রদাহ, এবং উহা হইতে পীতবর্ণ, জলবৎ মস্ত ক্ষরণ । নাসিকা ।—নাসারঞ্জের অতিশয় পরিশেষ, নাসারন্ধ্রের অবরোধ । ০ নাসার বিসর্পজনিত আরক্ততা । মুখমণ্ডল ।—\* মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা, স্ফীততা, ও স্ফোটচ্ছন্নতা এবং কণ্ঠ্যন ও জ্বালা । \* নাসিকা ও মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর নিম্নভাগের অতিশয় স্ফীততা । উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বাম গণ্ডে কণ্ঠ্যন ও জ্বালা । মুখ-মধ্য ।—\* জিহ্বা বলসানবৎ অল্পভব, লবণাক্ত, নীরস, বা কৰ্কশ আবাদ । \* জিহ্বার কেন্দ্র ও ভূমিদেশ শুভ্র লেপাচ্ছন্ন, পার্শ্বদ্বয় অতিশয় আরক্ত । \* জিহ্বার নিম্নভাগে ফোফা ও উহাতে বলসানবৎ অল্পভব । \* মুখের রৈখিক বিল্লীর অতিশয় আরক্ততা । ০ উপরের কর্জন-দন্তের মূলে আরক্ত ফোফার স্থায় উদ্বেদ । গল-মধ্য ।—অবিরত গল-শোষ অল্পভব । তালুমূলের আরক্ততা ও রক্তসঞ্চয়, এবং অল্প অল্প বেদনা । গল-মধ্যের স্পর্শ-দেব, আরক্ততা, ও স্ফীততা । আমাশয় ।—আমাশয়ে ও নাভীতে বেদনা ও যাতনা । ক্ষুধাহীনতা, কিন্তু অতিশয় পানোচ্ছা । ০ আরক্ত জিহ্বা সহকারে অগ্নিমান্দ্য, এবং বিসর্পের অভিযুগতা । উদর ও মল ।—উদরের অতিশয় স্ফীততা ও প্রচাপনে অভ্যস্ত বেদনা । অস্ত্রে অবিরত কুজন ও পেটকামড়ানি । নাভীতে প্রতিনিয়ত মুছবেদনা, ও অস্ত্র-কুজন, তৎপরে আতিসারিক নরম মল নিঃসরণ । মলত্যাগের পূর্বে সর্বদাই বেদনার আধিক্য, কিন্তু মলনিঃসরণে বেদনার অবিরতি । প্রায় শাদা, পাতলা, লেহবৎ মল । শুষ্ক, দলাদলা, মলিনবর্ণ মল সহকারে নাভীস্থানে বেদনা । আতিসারিক মল ( টিংচার জুনিপারস সেবনে উহার অবরোধ ) মলদ্বারে অসহ্য কণ্ঠ্যন ও জ্বালা ; মলদ্বারে দ্বায়বীর বেদনা । অস্ত্রে বেদনা, প্রাতে উহার বুদ্ধি । জননেন্দ্রিয় ।—অণ্ডকোষে ও উপস্থে তীব্র কণ্ঠ্যন ও জ্বালা । লিঙ্গ-মুণ্ডের স্ফীততা ও অতিশয় স্পর্শ-দেব । উপস্থ ও অণ্ডকোষের ত্বক-জ্বলন । \* অণ্ডকোষের অতিশয় স্ফীততা, প্রগাঢ় লোহিতবর্ণ ও ফোফা দ্বারা আচ্ছন্নতা । পৃষ্ঠ ।—\* গ্রীবা-স্তম্ভ, স্বকৃৎসরের মধ্যবর্তী স্থানে বাতের বেদনা । গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অবিরাম অতীব বেদনা । পৃষ্ঠের অতিশয় শুষ্কতা । রাত্রিতে পৃষ্ঠে, কিন্তু দিবসে মুখমণ্ডলে, ঘাড়ে ও হাতে কণ্ঠ্যন । ০ মচকিয়া গিয়া বা সর্দি লাগিয়া কটিবেদন । উরুজিহ্বা ।—বাস্য কফোণি সন্ধিতে তীব্রবেদনা । হৃই প্রকোষ্ঠেই আকৃষ্টবৎ বেদনা । \* স্বক্কে ও কফোণিতে

বাতের বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি। মণিবন্ধ ও অঙ্গুলীর অতিশয় স্তম্ভতা, ও অবিরাম যাতনা। করতলের ও অঙ্গুলীর উপস্থক পরিপূটন। করতলে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুকুরি ও উহাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন হস্তের অঙ্গুলীতে স্তবকে স্তবকে জলপূর্ণ ফোটা। কর-পৃষ্ঠের শোথ। নিম্নাঙ্গ।—জাহ্ন ও গুল্ফের সর্বদা বেদনা, তৎসহকারে অতিশয় দুর্বলতা। জাহ্নতে অতীব্র, আকৃষ্টবৎ বেদনা ও যাতনা। গুল্ফের অতিশয় আরক্ততা ও ক্ষীততা, তৎসহকারে গুল্ফে, পদে ও পদাঙ্গুলীতে জলপূর্ণ ফোকা, এবং উহা হইতে অধিক পরিমাণে জলনিঃসরণ। পদের পাশ্বে বড় বড় ফোকা। গুল্ফ, পদদ্বয় ও পদাঙ্গুলীর অসহ কণ্ডুয়ন, উষ্ণতায় উহার আধিক্য। প্রাতে সন্ধি সকলের অতিশয় স্তম্ভতা, ব্যায়ামে উহার শান্তি। অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাহ্নে গুল্ফের বেদনার বৃদ্ধি। শীতল জলে স্নান করিলে কণ্ডুয়ন ও জ্বালায় শান্তি। জ্বর।—উষ্ণ হইলে, উষ্ণগৃহে, ও শয্যা শয়ন করিলে পৃষ্ঠের উপরে ও নিম্নে শীত। রাত্রিতে উত্তপ্ত স্বক ও দাহ সহকারে অতিশয় অস্থিরতা। স্বক উত্তপ্ত ক্ষীত, চিকণ, অশিথিল, ও অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে। প্রদাহিত স্থানের বিবর্তিত তাপ। ০ বিসর্পজনিত প্রদাহ। ( রসটক্সের ত্রায় লক্ষণাপন্ন ) ০ টাইফয়েড জ্বর। ত্বক।—হস্তাঙ্গুলীর প্রান্তে বৃহৎ বিদারণ, উহা হইতে সহজে রক্তপাত। প্রকোষ্ঠে, মণিবন্ধে, কর-পৃষ্ঠে, হস্তাঙ্গুলীতে ও অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে, অণ্ডকোষে এবং গুল্ফদেশে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ। ( পামা )। \* তপ্তজলে কণ্ডুয়নের শান্তি। গুল্ফে বড় বড় ফোকা। উপরের ওষ্ঠ ও কর্ণের অতিশয় ক্ষীততা, ও ফোকা। কপালে, ঘাড় ও বাহুতে, এবং দক্ষিণ উরুতে ফোটক। ০ ফোটাকার ও বিসর্পজনিত সর্বপ্রকার উদ্বেদ। ০ ফ্রেগমোনস এরিসিপেলাস। দেহ।—বৃষ্টির পূর্বে সমস্ত লক্ষণের উপচয়। প্রাতে সকল সন্ধির স্তম্ভতা। ব্যায়ামান্তে স্তম্ভতার বিরতি। উষ্ণতায় স্বকের কণ্ডুয়ন ও জ্বালায় বৃদ্ধি। নিদ্রা।—শুষ্ক, উত্তপ্ত গাত্র সহকারে রাত্রিতে অতিশয় অস্থিরতা। চিকিৎসা-সিদ্ধ লক্ষণ।—অতিশয় বিমর্ষতা, জীবন ধারণে অনিচ্ছা; সকল বিষয়েই বিষাদপূর্ণ বোধ হয়। মস্তকের সমুখভাগে শিরোগোরব বিশিষ্ট মুছ শিরঃপীড়া, হাঁটলে ও মাথা নোয়াইলে উহার বৃদ্ধিশ্রান্তি। জিহ্বার অগ্রভাগ আরক্ত, মধ্যভাগ বিদারিত, ও অপর পৃষ্ঠ ফোকা যুক্ত। পূর্বাঙ্ক চারিটার সময় প্রবল উদর-বেদনা সহকারে ও অতিশয় বলে বিনির্গত জলবৎ প্রভূত মল (সচরাচর শুভ্র)। দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতবৎ আকর্ষণ, বিশেষতঃ মণিবন্ধে ও তথা হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে উহার গতি।

সমগুণ।—এনাক, ক্রিম, কনোফ্রেডিয়া, কোটন-টিগ, রাগনকিউলস, রসটক্স।

## রস গ্লাবরম—কমন স্মাক ।

রস গ্লাবরম ছয় হইতে পনের ফীট উচ্চ এক প্রকার গুল্ম । হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার বকুল বা পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ কিং উল্লেখ করিয়াছেন যে রস গ্লাবরমের বকুল বলকর, সঙ্কোচক ও পচননিবারক । ইহার ফল শৈত্যকর ও মূত্রকর । ইহার মূলের বকুল প্রমেহ, প্রদর, অতিসার, রক্তাতিসার, বিলেপীজ্বর ও গণ্ডমালা রোগে উপকারী । ডাঃ পেইন বলেন যে শোণিতে ও পরিপাক-বস্ত্রেই রস গ্লাবরমের আরোগ্য-কারিণী শক্তির বিশেষ প্রভাব দর্শে । তিনি শীতাদ লক্ষণ সংযুক্ত অতিসারে ; জাইমোটিক বিষ জাত রক্তাতিসারে ; এবং টাইফয়েড ও টাইফস জ্বর জনিত অস্ত্রের ক্ষতে এই ঔষধের সমধিক উপকারিতা স্বীকার করেন । ডাঃ পেইন প্রবল ক্ষতে ও অর্শ-বলিতে ইহার বাহ্য-প্রয়োগের অতিশয় প্রশংসা করেন । এই ঔষধের দশ গ্রেণ এক আউন্স গ্লিসিরিণের সহিত মাড়িয়া মলম প্রস্তুত করিয়া মুখের উপক্ষতে, স্কালে'টিনা ও ডিপথিরিয়ায় পরবর্তী গল-ক্ষতে, এবং উপদংশ-ক্ষতে লাগাইলে সুন্দর উপকার দর্শে । ডাঃ স্কডার বলেন যে ইহার কাথ সেবনে দুর্বলতাজনিত অতিঘর্ষ নিবারিত হয় ; এবং অধিক মাত্রায় ইহার বকুল সেবনে বিরচন জন্মে । ডাঃ কো বলে যে সঙ্কোচক বলকর ঔষধ শ্রেণীর মধ্যে রস গ্লাবরম অতিশয় শ্রেষ্ঠ । প্লেইস্ট্রিক বিল্লীর অনেক গুলি রোগে এতদ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে । পচন-নিবারক বলিয়া পচন প্রবণতা বিশিষ্ট রোগে ইহা অতিশয় ফলপ্ৰসূত । অতিসার, রক্তাতিসার, মুখের উপক্ষত ও পায়দজনিত মুখ-ক্ষত, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ, বিলেপীজ্বর, এবং গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগে তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন । অস্থির খাস-রোগে ইহার ফল ব্যবহৃত হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

ডাঃ মার্শাল এই ঔষধ কিয়ৎ পরিমাণে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তাঁহার “নৈশ্বাস্য,” “মুখ-ক্ষত,” “অতিসার,” ও “রক্তশ্রাব” ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল । নির্দীচন-মতাবলম্বী (এক্লেস্টিস) চিকিৎসকেরা ও এই ঔষধে এই সকল রোগের শাস্তি হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ডাঃ হেলের মত এই যে একমাত্র হোমিওপ্যাথি মতেই কেবল ঔষধে রোগারোগ্য হয় । এলোপ্যাথি বা অল্প কোন মতে যে সকল ঔষধে আরোগ্য জন্মে সেই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রানুসারেই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে । ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথি মতে পরীক্ষিত হইলেই তাঁহার কথার যথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় । ডাঃ লিলিয়েস্থাল মস্তকের পশ্চাভাগের শিরোবেদনায় বারংবার এই ঔষধের ফলবদ্ধা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । তিনি ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, ও সহস্রক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন । বামদিকের নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত পাত্তেও ইহা ব্যবহৃত হয় ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—স্বতিশক্তির দুর্বলতা, ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী বস্তুর প্রতি অতিশয় ঔদাসীন্য় ।  
 মস্তক ।—মস্তকের সম্মুখ ভাগে ও উপরের ভাগে মৃদুমৃদু অবিরাম বেদনা । মস্তকের  
 শিখরদেশে পূর্ণতা ও বেদনা । ০ মস্তকের পশ্চাৎভাগের আমবাতিক প্রকৃতির বেদনা ।  
 নাসিকা ।—বাম নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব । বাম নাসা-রন্ধ্রে রক্তাক্ত চিপটিকা । ০  
 নাসিকা হইতে রক্তস্রাব । মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য ।—\* মুখ হইতে রক্তস্রাব । \* নিদ্রা  
 হইতে জাগরণান্তে গলা হইতে খণ্ড খণ্ড রক্ত নিঃসরণ । মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত । ০ স্তন্য-  
 পায়ী শিশুদিগের মুখে ক্ষত ; মুখের উপক্ষত । ০ সামুদ্রিক শীতাদ ( স্কার্ভ ), ও সাধারণতঃ  
 শীতাদ রোগ । আমাশয় ও উদর ।—আমাশয়ে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, আহার বা পানান্তে  
 উহার অতিশয্য । নাভীপ্রদেশে প্রচাপনে স্পর্শ-দেয় । উদরে তীব্র, কঠনবৎ বেদনা ।  
 ০ অতিসার । ০ রক্তাতিসার । ০ রক্তস্রাবী অর্শ । ০ সাপ্তর দস্ত-মূল, বিকৃত ক্ষুধা ও  
 ক্ষীত উদর সংযুক্ত অতিসার । শ্বাস-যন্ত্র ।—০ শ্বাস-রোগের উপসর্প সহকারে পুরাতন  
 স্বরভঙ্গ । ০ অশ্বের শ্বাস-কষ্ট রোগ । মূত্র-যন্ত্র ।—০ শুল্ক, আরক্ত মূত্র । জ্বর ।—উত্তপ্ত  
 ও আর্দ্র গাত্র, তৎসহকারে পিপাসা । \* প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম । গাত্র-তাপের প্রকৃত বিবর্দ্ধিত  
 অবস্থা, অথচ শীতলতা অল্পভব । ০ টাইফয়েড জ্বরের অতিসার, শীতাদ প্রভৃতি কোন কোন  
 অবস্থা । নৈশ ঘর্ম্ম সংযুক্ত বিলেপী জ্বর ।

সমগুণ ।—গ্যালিক এসিড, ট্যানিক এসিড, এলনস, ব্যাপ্টিসিয়া, বোরাক্স, চায়না,  
 ক্লিরেনিয়ম, গ্যালিয়ম, হেমিমেলিস, হাইড্রাষ্টিস, মাইরিকা ।

## রস এরোমেটিকা ।

এই গুণ্য উচ্চ, পার্শ্বতা ভূমিতে উৎপন্ন হয় । ভগ্ন করিলে ইহা হইতে এক প্রকার উগ্র  
 গন্ধ নির্গত হয় । একত্র ইহাকে রস এরোমেটিকা বা সুরভী রস কহে । ইহার মূল্যের বহুল  
 হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয় । এই ঔষধ পরীক্ষিত হয় নাই । কিন্তু এতদ্বারা (১) নিম্ন আপেক্ষিক  
 গুরুত্ব বিশিষ্ট অধিক মূত্রস্রাব, ও রোগীর শীর্ণতা লক্ষণাপন্ন মূত্র-মেহে ( ডায়েবিটিস  
 ইম্পিডিস ), এবং অতিশয় অবসাদ ও আলস্ত, পৃষ্ঠে বেদনা, অধিক পিপাসা, কখনও অধিক  
 কখনও অল্প ক্ষুধা, গাত্র-স্বকের মলিনতা ও কোমলতা, ১০১২ ডিগ্রী গাত্র তাপ, অল্প অল্প  
 কাসি ও কখন কখন নৈশ ঘর্ম্ম, শরীরের শীর্ণতা, মূত্রে শর্করার বিद्यমানতা, এই সকল  
 লক্ষণাপন্ন মধুমেহে ( ডায়েবিটিস মিলিটস ) ১০ বিন্দু হইতে ৬০ বিন্দু মাত্রায় উপকার  
 দর্শে । মূত্রাশয়ের পেশীতন্ত্রের শিথিলতা অথবা স্নায়ু-তন্ত্রের উপদাহ বশতঃ মূত্রধারণায়  
 অশক্তি ; অবিরত বিন্দু বিন্দু মূত্র-পাত ; রাত্রিতে শয্যা মূত্র-তাগ প্রভৃতি মূত্ররোগ ও

এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত আছে। ( ডাঃ হানসেন বলেন যে ১০ বিন্দু মাত্রায়, শয্যা-মুত্রে ইহা একটা প্রধান ঔষধ )। ( ২ ) সর্ব্বাঙ্গীন রুগ্নতা জনিত, অথবা ব্রাইটাখ্য রোগের পূর্ববর্তী বৃক্কের রক্তশ্রাব; মূত্রাশয় হইতে রক্তশ্রাব; জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব; এবং ( ৩ ) বালকদিগের গ্রীষ্মকালীয় অতিসার; কখনও অধিক কখনও অল্প মল ও বেদনা বিশিষ্ট পুরাতন অতিসার; আমরক্ত, কিম্বা পরিষ্কার রক্তশ্রাবী পুরাতন রক্তাতিসার রোগেও রস এরোমেটিকা উপকারী।

ডাঃ ম্যাকক্লানাহান লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ, পিতা, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহার উগ্র অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাদার টিঙ্কার ১০ ফোঁটা মাত্রায় এক একবার ব্যবহার হয়।

## রাটানহিয়া ।

রাটানহিয়ার গুণমূলের অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। চক্ষুর সম্মুখে চর্ম্মের শ্রায় অল্প হইব রাটানহিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ। স্তত্রাং অর্থ রোগে ( টেরিজিয়ম ) এংদ্রারা উপকার দর্শে। কোষ্ঠরোধ। \* অতিশয় কুশ্ন সংযুক্ত কঠিন মল; অর্শবলি নিঃসরণ, তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিরাম বেদনা ও \* মলদ্বার-জ্বালা ( সলফ ); মলদ্বারের নিষ্ক্রিয়তা; মলত্যাগের পর মলদ্বারে ও সরলাজে যেন কাচের টোচ ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ বেদনা ( থুজা )। মলদ্বারের রুক্ষ উত্তাপ ও ছুরিকাঘাতের শ্রায় সূচী-বেদনবৎ যাতনা এই ঔষধের অপার একটা বিশেষ লক্ষণ। এজ্জা গুদদারি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফ্যারিংটন বলেন যে মলদ্বার-বিদারণে রাটানহিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলদ্বারের অতিশয় আকুঞ্জন লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। অধিক চেষ্টা করিয়া সবলে মল নিঃসরণ, এবং মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারের বেদনা ও জ্বালা রাটানহিয়ার লক্ষণ। ডাঃ এলেন বলেন যে এই রোগে কর্তন বা ভল্লাঘাতের শ্রায় বেদনায় রাটানহিয়া; ক্ষতবৎ যাতনায় গ্রাফাইটিস; এবং এইরূপ বেদনা মলত্যাগের পরে না হইয়া মলত্যাগ কালে হইলে নাইট্রিক এসিড উপযোগী। কটদেশের ত্রণ বসিয়া ঘাইয়া জরায়ুতে বেদনা জন্মিলে ডাঃ টেট এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে ভয়ঙ্কর দস্ত-বেদনা; দস্ত দীর্ঘীভূত বোধ হয়; \* শয়ন করিলে বেদনা বাড়ি তখন উঠিয়া হাঁটিতে হয়। গর্ভিণীদিগের দস্ত-বেদনায় বেদনা রাত্রিতে বাড়িলে ও ভজ্জন্ত রোগিণীকে শয্যা হইতে উঠিয়া হাঁটিতে হইলে কার্বনেট অব ম্যাগ্নিশিয়া ও রাটানহিয়া ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্নেশিয়ায় উপকার না দর্শিতে ডাঃ লিপি রাটানহিয়া ব্যবস্থা করিয়া একজন রোগিণীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। অগ্নির শ্রায় জ্বালা বিশিষ্ট অর্শ। পাতলা, দুর্ব্বল অতিসার, রক্তাক্ত বিরেচন ও মলদ্বারে অগ্নির শ্রায়



জালা। শুষ্কদায়িনীদিগের স্তন বৃন্তের বিদারণ। এই সকল রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ইহার ২৫ ও ১৫ ক্রম ব্যবহৃত হয়।

**বিশেষ লক্ষণ।**—চক্ষুর সম্মুখে চর্মের ত্রায় অনুভব। \* প্রবল হিকা, \* তজ্জন্ত আমাশয়ে যাতনা। মলদ্বার হইতে রস-ক্ষরণ। আতিসারিক মল-নিঃসরণের পূর্বে ও পরে জ্বালাকর বেদনা। \* মল-দ্বারে শুষ্ক উত্তাপ ও ছুরিকাঘাতের ত্রায় আকস্মিক সূচী-বেদবৎ যাতনা। অতিশয় প্রয়াসে মল-নিঃসরণ, অর্ণের বলি বহির্গমন। \* মল-ত্যাগের পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মলদ্বারের বেদনা ও জ্বালা। সরলান্ন কাচ-চূর্ণ দ্বারা যেন প্রপূরিত এরূপ অনুভব। \* মলদ্বারের আকুঞ্চন।

## রিসিনস কমিউনিস।

রিসিনসের অপর নাম পাগা ক্রিষ্টাই। সংস্কৃতে ইহাকে এরণ্ড এবং বাঙ্গলায় ভেরাণ্ডা বলে। এরণ্ড বৃক্ষ ভারতবর্ষে জন্মে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ পক হয়। পরিপক বীজ হইতে একপ্রকার স্থায়ী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহাই ক্যাপ্টার অয়েল বা রেডির তৈল নামে বাজারে বিক্রীত হয়। আসামদেশে এরণ্ড পত্র হইতে একপ্রকার রেশম উৎপন্ন হয়। উহাকে এরি কহে। বোধ হয় রেডি এই এরিরই অপভ্রংশ। এরণ্ডবীজ বিষাক্ত। এই বীজের শাঁস হইতে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই সচরাচর “রিসিনস” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তৈলজ অরিষ্টকে “ওলিয়ম রিসিনি” বলে। উভয়ের আরোগ্যাধিকার ঠিক এক নহে। এরণ্ডবীজ বিশ্লেষণ করিলে উহা হইতে রিসিনি নামক উপক্ষার; রিসিনিক এসিড, ইলাইওডিক এসিড ও মারগারাষ্টিক এসিড নামক ত্রিবিধ অতি তীব্র অম্ল; এবং একপ্রকার উদ্বায়ী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেবোক্ত উপাদান বীজ ছেঁচিবার ও মাড়িবার সময় উড়িয়া যায়। রিসিনি জলে ও এলকোহলে, এবং এসিডতরয় এলকোহলে দ্রবীভূত হয়।

**বিষ লক্ষণ।**—ডাঃ হেলের গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে দেড়শত গ্রেণ পরিমাণে এরণ্ডবীজের শস্ত খাইলে প্রবল বমন ও বিরেচন জন্মে। ইহার দশমাংশ সেবনেও বমন-বিরেচন উৎপন্ন হয়। গিয়াকোমিনাই বাল্যকালে নয় দশটা এরণ্ডবীজ খাওয়াতে তাঁহার প্রচণ্ড বমন ও দীর্ঘকালস্থায়ী অবসন্নতা জন্মিয়াছিল। বার্জিস লিখিয়াছেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন লোক একটীমাত্র এরণ্ডবীজ সেবন করাতে প্রথমদিন মুখে কেবল একপ্রকার কটু আশ্বাদ বর্তমান থাকে, পরদিন প্রত্যাষে প্রথমে প্রবল বমন হয়, অনন্তর সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বমন ও বিরেচন হয়। আর একটা লোকের একটীমাত্র বীজ খাইয়া বিবমিষা, বমন, ও অতিসার জন্মে। একজন যুবতী তিনটা তাজা বীজ ভক্ষণ করিয়া ওলাউঠার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং তাহার অস্ত্রে তীব্র বেদনা জন্মিয়াছিল। ডাঃ টেলার

উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনজন যুবতীর প্রথম জন প্রায় কুড়িটা, দ্বিতীয়জন চারি পাঁচটা, তৃতীয় জন দুইটা এরওবীজ খাইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের কেবল প্রবল বিরচন হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম যুবতীর বমন ও বিরচন উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তাহার আকৃতি সাংঘাতিক ওলাউঠার রোগীর স্তায় হইয়া পড়িয়াছিল; স্বক্ শীতল, পাণ্ডুর, ও কুঞ্চিত; উদর ব্যথিত, মন একপ্রকার নিদ্রাবল্য ও অর্ধচৈতন্য বিশিষ্ট হইয়াছিল। রক্তাশু বিরচিত হইতেছিল। প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন না হওয়াতে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতদেহ পরীক্ষায় আমাশয়ান্ত্রের শৈথিল্যিক বিল্লীর অবদারণ ও প্রদাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আলজিরিয়ার একজন সৈন্য তিনটা এরওবীজ খাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরে তাহার অন্ত্রের সমগ্র শৈথিল্যিক বিল্লী ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রক্তে আবৃত, এবং আমাশয়ের আন্তরগবিল্লী কিয়ৎপরিমাণে আরক্ত ও কোমল দেখা যায়। কুড়িটা বীজ খাইয়া অপর এক ব্যক্তির আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ জন্মিয়া আক্ষেপ ও সর্বাঙ্গীন পতনাবস্থা উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু হয়। একজন বলবান যুবক তৈল-নিষ্পেষিত বীজের দুই গ্রেণ সেবন করিতে তাহার এমনই ভয়ঙ্কর বমন উপস্থিত হয় যে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। এরওবীজের বিষ-ক্রিয়ায় যে কেবল অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে এমন নহে, অণ্ডালালময় মূত্র ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। বীন নামক কোন সৈনিক পুরুষ ১৮৭১ সালের ১০ই জুলাই প্রাতে বিরচনার্থ সতরটা এরওবীজ সেবন করে। তিন চারি ঘণ্টা পরে তাহার কয়েকবার ভেদ হয়, তৎপরে মুখপ্রসেক, আমাশয়ে খল্লী, বিবমিষা ও বমন জন্মে এবং সেই সময় সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিক বিরচন হইতে থাকে। কুহন বা উদর বেদনা পরিশূন্য আমনিশ্রিত মস্তময় তরল মল নিঃসৃত হয়। অপরাহ্ন চারিটার সময় অতিশয় প্রায় অবিরাম হইয়া উঠে, এবং খল্লী ও শীত জন্মে। অপরাহ্ন পাঁচটার সময় রোগী চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হয়। তখন তাহার বদন পাণ্ডুর, কপাল শীতল ঘর্ম্মাল, মুখাকৃতি আকুঞ্চিত; চক্ষু আক্লিষ্ট ও উর্দ্ধমুখে অক্ষিগহ্বরে আকৃষ্ট, এবং চক্ষুর শুভ্রাংশ আরক্ত ছিল; অধিক অশ্রুপ্রাব হইতেছিল; নাড়ীর বেগ স্বাভাবিক ছিল বটে কিন্তু উহা এতই সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন কখন মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যাইতেছিল না। রোগীর জ্ঞান পরিস্কার ছিল; শিরোবেদনা, শিরোগুর্জন, কর্ণ-নাদ, ও আমাশয়ের উপর অতিশয় অস্বচ্ছন্দতাজনক অর্গল স্থাপিতবৎ অম্লভবের কথা বলিতেছিল; তাহার জ্বালাকর পিপাসা; মুখ-প্রসেক, বিবমিষা, ও বমনও ছিল; বাস্তবদার্থ তরল, ও অগ্রগাঢ়-পিত্ত-রঞ্জিত ছিল ও উহাতে কতকগুলি চিকণ তন্তুবৎ বস্তু ঝুলিতে ছিল। উদরোরুদ্ধদেশে স্পর্শ-ষেব ছিল, এবং বেদনা নাড়ী ও কুক্ষির দিকে বিকীর্ণ হইত; গুরু বা লঘু প্রচাপনে বৃদ্ধি পাইত না, সে সময় অন্ত্রে এক প্রকার প্রবল আকুঞ্চন অনুভব হইত। এক্ষণ অতিসারে শরীর ক্ষয় পাইতেছিল এবং মল ওলাউঠার মলের স্তায় দেখাইতেছিল। পূর্বাহ্ন দশটা হইতে সম্পূর্ণ মূত্রশূন্যতা জন্মিয়াছিল, স্বরভঙ্গ; ও অতীব দুর্বলতা ছিল, দুইজন লোক রোগীকে ধরিয়া না তুলিলে

সে উঠিতে পারিত না। প্রতিবেদক ঔষধ প্রয়োগের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। স্মরণ্য যে কৃত্রিম ওলাউঠার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল তাহারই শাস্তির নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা হয়। শরীরে কর্পূর মর্দন, উরুদেশে সর্ষপের পটী প্রয়োগ এবং অধিক পরিমাণে মসিনার জল পানের বিধি দেওয়া হয়। এই চিকিৎসায় শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু বমনের বিরতি জন্মে না, তন্নিমিত্ত বমন নিবারণার্থ সেই চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসক বরফমিশ্রিত পানীয়, এক প্রকার আক্ষেপ নিবারক ঔষধ, বিবের অবশেষাংশ দূরীকরণার্থ মলদ্বারে স্নেহ-বস্তি, উদরোপরি পোল্টিশ, ও ক্রমাগত গাত্র-ঘর্ষণ ব্যবস্থা করেন। রাত্রি তিন ঘণ্টা পর বমনের বিরতি জন্মে। ১১ই জুলাই রোগীর কক্ষিৎ জ্বর, উত্তপ্ত ও পরিণুক্ত জিহ্বা, ক্ষুধা-হীনতা ও মুখ-প্রসেক; পুনরায় বমন; উদরোর্দ্ধ ও উদরের বেদনা, ও অতিসার; থল্লীর আধিক্য; অত্যন্ত দুর্বলতা; ও সম্যক মূত্রহীনতা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। পূর্বাঙ্ক দশটার সময় সে অল্প একটু মলিনবর্ণ, গাঢ়, অতিশয় অণ্ডলালময় মূত্র পরিত্যাগ করে। ১২ই তারিখেও জ্বর ও অতিসার; অনেকক্ষণ পরে পরে থল্লী; তীব্র শিরোবেদনা; মূত্রের স্বল্পতা, ও উদ্ভাপ বা নাইট্রিক এসিড সংযোগে উহাতে অধিক পরিমাণে অধঃক্ষেপ সঞ্চার লক্ষণ থাকে। পূর্ববৎ চিকিৎসাই চলিতে থাকে। ১৩ই তারিখে নাড়ী স্বাভাবিক; মূখমণ্ডল অল্প অল্প রক্তসঞ্চিত; জিহ্বা শুভ্র; দৃষ্ট হয়। ক্ষুধাহীনতা, মুখ-প্রসেক; বমন ও উদরের বেদনা; কুহন বা উদর বেদনা পরিশুদ্ধ মধ্যম রকম অতিসার; অতিশয় অণ্ডলালময় মূত্র, ও স্ফুপষ্ট পাণ্ডু;—এই সকল লক্ষণ বর্তমান থাকে। ১৪ই জুলাই অল্প অতিসার ও অতিশয় অবসন্নতামাত্র অবশিষ্ট রহে। ১৫ই জুলাই রোগী কেবল দুইবার মাত্র মলত্যাগ করে; তাহার ক্ষুধা প্রত্যাবৃত্ত ও মূত্রের অণ্ডলালময়ত্ব দূরীকৃত হয়; এবং সে চিকিৎসালয় হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। ডাঃ এলেনও তাঁহার স্মপ্রসিদ্ধ ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থে এই প্রকার কতকগুলি রোগীর বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল রোগীর একজনের অতিসারে কোন প্রকার বেদনা লক্ষণ ছিল না। এলেন বেদনার অভাব রিসিনসের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং চিকিৎসায়ও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ওলাউঠা।—ডাঃ সালজার তাঁহার ওলাউঠার চিকিৎসা পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, রিসিনসের বিষ-লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহাতে বিষ-ক্রিয়া বশতঃ প্রথমে অল্প অল্প ভেদ হইয়া ক্রমে ক্রমে জলবৎ বমন ও বিরচন, মূত্র-নাশ, পতনাবস্থা প্রভৃতি আতিসারিক বিসৃচিকার (ডায়েরিক কলেরা) ভায় লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অল্পদিন হইল এই ঔষধ ওলাউঠার ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার বিলক্ষণ উপকারিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আক্ষেপিক বিসৃচিকার (স্পাজমোডিক কলেরা) কান্সর যে প্রকার উপযোগী, আতিসারিক বিসৃচিকার রিসিনস সেই প্রকার ফল প্রদ।

আতিসারিক ওলাউঠার ভেদ-বমন উদর-বেদনা সহকারে আরম্ভ হয় না, ভেদ-বমনের প্রাচুর্য অনুসারে ক্রমে ক্রমে উদর-বেদনা প্রকাশ পায়। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় \* উদর বেদনা-বিহীন বিরচন রিসিনস প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। উদর-বেদনা সংযুক্ত বিরচনে ভিরেট্রম বা কুশ্রম উপযোগী। বিহুচিকার উপক্রমে বেদনার অভাব দ্বারা ইহাই জানা যায় যে কোন বিধান-তন্ত্রের উপদাহ বা আক্ষেপ বশতঃ রোগ উৎপন্ন হয় নাই। উহা সম্যক অনাক্ষেপিক ওলাউঠা। আক্ষেপিক বিহুচিকায় যেমন প্রথম হইতে পতনাবস্থার পূর্ব পর্যন্ত ক্যান্ডর বা ক্যান্ডরের সমকক্ষ অথ কোন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আতিসারিক বিহুচিকায়ও রিসিনস সেইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। পতনাবস্থার যদি বমন বা বিরচন, অথবা বমন বিরচন উভয়ই বিত্তমান থাকে তবে অত্যাশ্রয় অবস্থায় যথেষ্টরূপে রিসিনস ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে পতনাবস্থায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আতিসারিক বিহুচিকায় বিরচন-লক্ষণেই ইহার প্রধান উপকারিতা দৃষ্ট হয়, স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সহকারী স্বরূপ অত্যাশ্রয় উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য হইয়া উঠে। রিসিনসের বিষ-ক্রিয়া সমধিক স্নাতী হইলে আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মে, কিন্তু অল্প পরিমাণে এরণ্ডবীজ সেবন করিলে বিষ-ক্রিয়ার তত তীব্রতা না জন্মিয়া অগ্নাশ্ববৎ বিরচন হইতে থাকে। বাস্তবিক রিসিনস ও জ্যাট্রোফার বিষ-ক্রিয়া ভিন্ন অথ কোন পদার্থে ওলাউঠার স্থায় অগ্নাশ্ববৎ বিরচন উৎপন্ন হয় না। এই নিমিত্ত অত্যাশ্রয় প্রকার বিহুচিকারও অগ্নাশ্ববৎ বমন-বিরচন প্রশমনার্থ সহকারী ঔষধ স্বরূপ রিসিনস ব্যবহার করা যায়। অপর, ওলাউঠা সহকারে জ্বর হইয়া পাণ্ডুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও রিসিনস উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠার রক্ত-ভেদ হইতে থাকিলেও রিসিনস দ্বারা উপকার দর্শে, কিন্তু তৎসহ কুহন থাকিলে মার্ক-করো উপযোগী।

**ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রিসিনসের ব্যবহার।**

(১) পূর্বরূপাবস্থা।—আতিসারিক ওলাউঠার পূর্বরূপ অবস্থার উদরাম্নে অথ কোন বিশেষ ঔষধ জাপক লক্ষণ না থাকিলে রিসিনস ব্যবহৃত হয়।

(২) বিকাশাবস্থা।—আতিসারিক বিহুচিকার বিকাশাবস্থায় জলবৎ বা অগ্নাশ্ববৎ বিরচন, তাহাতে কুমড়া-পচার স্থায় ছিবড়া ছিবড়া পদার্থের বিত্তমানতা; বিরচন সহকারে কুহন বা পেট-বেদনার অবর্তমানতা; ঘন ঘন বমন; উপর পেটে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা, এবং সেই বেদনার নাভী ও কুঁকি পর্যন্ত সম্প্রসারণ রিসিনসের লক্ষণ। উদর-বেদনাসংযুক্ত ওলাউঠায় ভিরেট্রম যেরূপ উপযোগী, উদর-বেদনা পরিশূন্য ওলাউঠায় রিসিনস তদ্রূপ উপকারী। বেদনাশূন্য বিরচন রিসিনসের বিশেষ লক্ষণ। বিরচন-কালে উদর-বেদনা ভিরেট্রমের বিশেষ লক্ষণ। অপর, ভিরেট্রমের বিরচন হরিতাভ জলবৎ; রিসিনসের মল বর্ণহীন পরিষ্কার জলবৎ বা অগ্নাশ্ববৎ। ছিবড়া-ছিবড়া পদার্থ উভয় ঔষধ

জাপক বিরচনেই ভাসিতে দেখা যায়।\* অন্নাসুৰং বমন-বিরচনের প্রাবল্যের উপরই রিসিনসের বিশেষ অধিকার। পতনাবস্থা।—যদি পতনাবস্থায়ও অর্থাৎ রোগীর হিমাজ ও নাড়ী বিলোপ হইলেও বমন বা বিরচন, কিম্বা বমন ও বিরচন চলিতে থাকে এবং পূর্বে পূর্বে অবস্থায় যথোপযুক্ত পরিমাণে রিসিনস প্রয়োজিত না হইয়া থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্বে ব্যবহার করিয়া কোন ফল না দর্শিয়া থাকিলে পতনাবস্থায় আর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। ওলাউঠায় সচরাচর রিসিনসের তৃতীয় বা মষ্টক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্নাসুৰং বিরচন; প্রস্রাব-পরিশুদ্ধতা; স্বরভঙ্গ; নাড়ীর স্তব্ধতা; ক্ষুদ্রতা; কপালে শীতল ঘর্ষ, শরীর শাখার শীতলতা ও আর্দ্রতা; অতিশয় অবসন্নতা; অত্যন্ত বমন-বিরচন ও তৎসহ পতনাবস্থা; প্রস্রাব বন্ধের পর প্রস্রাব হইলে তাহাতে এধুমনে অর্থাৎ অণ্ডুলালের বিচ্ছিন্নতা; কখন কখন অবিরত মুখদিয়া জলউঠা; মনের অবসন্নতা; অর্দ্ধচেতন্ত; উর্দ্ধ-নেত্রতা; চক্ষের শুক্রমণ্ডলের রক্তবর্ণ; অশ্রুপ্রাব; কর্ণনাদ; শিরোধূর্ণন; শিরোবেদনা; উদরোপরি চাপাহুভব; ব্যাকুলতা; অতি পিপাসা; অনন্তর জরবোধ;—এই গুলি রিসিনসের প্রধান লক্ষণ।

স্তম্ভ্যভাব।—স্তম্ভ-জনন বলিয়া এরণ্ড-পত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি। ডাঃ টেইলার স্মিথ, রথ, গিলফিলান, উডবেরি প্রভৃতি চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া ইহার এই গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্তন-দুগ্ধ নিঃসারণার্থে এরণ্ড-পত্রের বাহু-প্রয়োগ হইয়া থাকে। একমুষ্টি পত্র চারি পাঁচ সের জলে জালদিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে পনের কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত স্তম্ভদায়িনীর স্তনদ্বয় প্রক্ষালন করিতে হয়, এবং সিদ্ধপত্রগুলি ছিঁড়িয়া শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত স্তনের উপর পাতলা করিয়া পাতিয়া রাখিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না স্তনান চুষিলে দুধ বাহির হয় সে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎকাল পরে পরে এইপ্রকারে কাথ ও পত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক করে। ইহাতে সাধারণতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যাহাদের একেবারেই স্তনান হয় নাই অথবা বাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্তনানকে স্তম্ভ দান করে নাই তাহাদের স্তম্ভ উৎপাদনার্থ একটু স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া করিতে হয়। যথা,— দুই তিন মুষ্টি এরণ্ড-পত্রের পূর্বোক্ত প্রকার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষুটিত কাথ অল্প উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া বজ্রাবৃত হইয়া জননেত্রিয়ে ও উরুতে ভাপরা লুইতে হয়। অনন্তর কাথ একটু শীতল হইলে তদ্বারা ঐ সকল স্থান ধৌত করিতে হয়, তৎপরে কাথদ্বারা পূর্ববৎ স্তনদ্বয় প্রক্ষালন ও হস্তদ্বারা অল্প অল্প মর্দন, এবং পরিশেষে উপরোক্ত প্রকারে সিদ্ধপত্র প্রয়োগ করিতে হয়। দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন চারি বার এই প্রক্রিয়া করিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে ও স্তনান প্রচুর দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। যেসকল স্ত্রীলোকের স্তন সুবিকসিত ও প্লীনোমত তাহাদেরই এতদ্বারা সহজে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্তন ক্ষুদ্র ও কুঞ্চিত থাকিলে জবায়ুতে ক্রিয়া দর্শে ও ঋতুপ্রাব হয়। ঋতু-কাল দূরবর্তী থাকিলে স্বাভাবিক

পরিমাণে, সন্নিহিত থাকিলে অধিক পরিমাণে রক্তঃ ক্ষরিত হইয়া থাকে । এরণ্ড-পত্রের তরল সার (ফ্লুইড একট্রাক্ট) বা অরিষ্ট (টিংচার) সেবন করিলেও স্তন্য-হ্রাসে বা স্তন্য-নাশে উপকার জন্মে । এসাফিটিডা সেবনেও অনেক সময় ঈদৃশ ফল দর্শে । ক্যাষ্টর অয়েল উষ্ণ করিয়া স্তনে মর্দন বা নিম্নক্রমে সেবন করিলেও স্তন্য শ্রাব বিবর্জিত হয় । ডাঃ টেইলার স্মিথ্‌ যে সকল ত্রীলোককে এরণ্ডপত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই স্তনের ক্ষীণতা, দর্পদপ, বেদনা, কক্ষগ্রস্থির ক্ষীণতা, ও তথা হইতে বাহ্য পর্গাস্ত বেদনার বিস্তৃতি ; প্রসবাস্তিক বেদনার ত্রায় কটি-বেদনা ; ও প্রদর-শ্রাবের আধিক্য জন্মিয়াছিল ; এবং স্তনের মস্তশ্রাব দুগ্ধাকারে পরিণত ও ঋতু শীত প্রকাশিত হইয়াছিল ।

**রক্তোবিলোপ** ।—রক্ত-নাশ বা রক্ত-হ্রাস রোগেও এরণ্ডপত্রের পূর্ববৎ বাহ্যপ্রয়োগে উপকার দর্শে ।

এরণ্ডপত্রের তরল সার দুই বা চারি ঘণ্টা অন্তর দশ বা কুড়িবিন্দু মাত্রায়, অরিষ্ট তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়, এবং কাথ দুই আউন্স মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয় ।

ডাঃ হেল বলেন যে ডাঃ হেরিং তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকেরা উল্লেখ করেন যে এরণ্ডপত্র মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের ক্ষত, চর্মে বেদনাবিশিষ্ট পচ্যমান পীড়কা ও ত্রণ জন্মায় এবং অণ্ডকোষ ও গুল্ফের ক্ষীণতায়, অপিচ স্তন্যতা সংযুক্ত বজ্জণ-সন্ধির বেদনায় ব্যবহৃত হয় । আয়ুর্বেদে এরণ্ডপত্র বাতন্ত্র, কফ-নাশক, রক্ত-পিত্তের প্রকোপজনক এবং কৃমি, মূত্রকৃচ্ছ, গুল্ম, বস্তি-শূল প্রভৃতির বৃদ্ধিবিনাশক বলিয়া উল্লেখিত আছে । এরণ্ডের নামান্তর বাতরি । ইহার মূল স্থানিকভাবে এদেশীয় কবিবাজেরা সিস্তর ব্যবহার করিয়া থাকেন । হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে এরণ্ডমূল ও পত্র ভালরূপে পরীক্ষিত হইলে এই সকল গুণ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে । ডাঃ হানসেন বেদনাশুভ্র প্রায় অবিরত অতিসারে রিসিনসের উপকারিতা প্রমাণিত বলিয়া লিখিয়াছেন ।

**সমগুণ** ।—জ্যাট্রফা, ক্রোটন-টিগ, আইরিস, ভিরাট, আর্স, ইউফরবিয়া ।

**বিষমগুণ** ।—ব্রাইওনিয়া ও নক্সভমিকা ।

## • রোবিনা—ইয়্যালো লোকফট ।

লিগুমিনোসী জাতীয় রোবিনা একেশিয়া বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মে । ইহার তরুণ পল্লবের সরস বহুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া** ।—নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া আমাশয়ে রোবিনার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এবং তন্মূলা পরিপাক-প্রক্রিয়া সংরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত অল্প জন্মে, তাহাতে অতিশয় অল্প বমন উৎপন্ন হয়, বাস্তব পদার্থ দ্বায়ে লাগিয়া দাঁত টক হয় ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

রোবিনিয়া আমাশয়ের অল্পত্ব জন্মায় ও আরোগ্য করে । আমাশয়ের অল্পত্বসংযুক্ত সবমন শিরঃপীড়া, অল্পপিত্তসহকারে অগ্নিমান্দ্য, ( বিশেষতঃ যখন উহা রাত্রিকালে প্রকাশিত হয় ) ; দন্তহর্বজনক, অত্যন্ত অল্প, জলবৎ বমন ; আত্মান, উদর-বেদনা, ও মল-প্রবৃত্তি সহকারে আমাশয় ও উদরের ক্ষীণতা ; কিন্তু মল-তাগকালে প্রথমে কেবল বায়ু নিঃসরণ, তৎপরে কঠিন মল বহির্গমন ; শিশুদিগের অল্প মল ও অল্প বমন ;—এই সকল প্রয়োগে রোবিনিয়া ব্যবহৃত হয় । ডাঃ মার্সী বলেন যে অল্পত্ব, বৃকজালা, চিত্তের অপ্রফুল্লতা, ও বাস্পোদ্ধার ( ধূমা : টেকুর ) লক্ষণাপন্ন অগ্নিমান্দ্যে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ফলপ্রদ । রাত্রিতে উপস্থিত ও নিদ্রার ব্যাঘাতজনক অগ্নিমান্দ্যেও ইহা উপকারী ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—অতিশয় অপ্রফুল্লতা ; কোপনতা । মস্তক ।—অবিশ্রান্ত অল্পত্ব, গৌরব সংযুক্ত, অথবা দগদগকর, সমুখ ভাগের শিরঃপীড়া, সঞ্চালনে, ও অধ্যয়নে উহার বৃদ্ধি । আমাশয় ।—অবিরত অত্যন্ত তরল পদার্থ উৎসারণ । বিবমিষা, তৎপরে অধিক পরিমাণে \* তীব্র অল্প তরল পদার্থ বমন, উহার সংস্পর্শে দন্তের অল্পত্ব । আমাশয়ের অল্পত্ব । আমাশয় ও উদরোদ্ধে তীক্ষ্ণ বেদনা । আমাশয়ে ও পিত্তাশয়-প্রদেশে জ্বালা । আমাশয়ে অল্পত্ব, গৌরববৎ, অবিরাম বেদনাজনক যাতনা । বাতায়ান বশতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের অতিশয় প্রসারণ ; উগ্র উদর-বেদনা, ও অল্প অতিসার । মল ।—মল-প্রবৃত্তি, কিন্তু কেবল বায়ু নির্গত হয় । পরিশেষে কঠিন মল পরিত্যক্ত হয় । পীতবর্ণ, হরিষ্বর্ণ, জ্বালাকর মল বিশিষ্ট অতিসার । ০ শিশুদিগের অল্প মল ( ক্যাঙ্ক, পড, \* রিউম ) । দেহ ।—০ শিশুর সমস্ত শরীরে অল্প গন্ধ ( \* রিউম ) ।

সমত্ত্ব ।—ক্যাঙ্ক-কা, আইরিস, ম্যাগ-কা, পলস, \* রিউম ।

## লাইকোপস ভার্জিনিকস—বিউগল উইড ।

লেবিএটা জাতীয় লাইকোপস ভার্জিনিকস নামক ওষধি মার্কিণথণ্ডে অনুপস্থানে উৎপন্ন হয় । সরস অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া ।—হৃৎপিণ্ডেই লাইকোপসের প্রধান ক্রিয়া দর্শে । ডিজিটেলিসের সহিত এই ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ডিজিটেলিসের সংগ্রাহক গুণ, অর্থাৎ অল্প মাত্রায় সেবন করিতে করিতে সংগৃহীত হইয়া হঠাৎ অধিকমাত্রায় ফলোৎপাদন লাইকোপসে নাই । লাইকোপসের মুখ্য ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা ও জীবনীশক্তির দুর্বলতা জন্মে, ধমনীতে রক্তের প্রচাপন হ্রাস হয়, হৃৎপ্রাণ সর্বত্রই অশিথিলতার লাবণ্য হয়,

এবং এই প্রকারে, হৃৎপিণ্ডের অবসন্ন বল সংযুক্ত, উপদাহিতার অবস্থা উৎপাদিত হয়। গৌণতঃ এতদ্বারা হৃৎপিণ্ডের বিকৃত উত্তেজনা জন্মে এবং আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়া বিবর্জিত হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও বিবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডে মুখ্য ক্রিয়ার ফলে সাধারণতঃ শরীরের সকল বস্তু, বিশেষতঃ যক্ষ্ম, ফুসফুস, ও বৃককে, শৈথিল্য রক্তের গতি স্থগিত হইয়া রক্ত সংযত হয়।

**অধিকার।**—হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা ও দুর্বলতায়ই লাইকোপস বিশেষ ব্যবহার্য্য। কি হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া, কি আমবাতিক রোগ, কি শারীরিক দৌর্বল্য, কি ভাস্কুটাদি উত্তেজক দ্রব্য সেবন, যে কারণেই এই উপদাহিতা ও দুর্বলতার উৎপত্তি হউক, তাহাতেই এই ঔষধ উপযোগী। এতদ্বারা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অধিকতর ধীর, পূর্ণ ও নিয়মিত হয়। দ্বায়বীয় উপদাহ অথবা হৃদ্রোগ জনিত হৃৎকম্পও ইহা ফলপ্রসূ। এই সকল রোগে লাইকোপস ডিজিটেলিসের সুল্লর অম্লকল্প, এতদ্বারা কাস ও ফুসফুসের উপদাহের মুষ্ণুনা জন্মে এবং জ্বর ও অস্বাস্থ্যকর রক্তাধিক্য, ধমনীর ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। হৃৎকম্প, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা সহকারে যক্ষ্মার রক্ত-কাসেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হৃদ্রোগ জনিত বহিরাগত-অক্ষিগোলক রোগের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ, এতদ্বারা বহিরাগত চক্ষু ও হৃৎক্রিয়ার গোলযোগ উপশমিত হয়। রক্তাতিসার ও অতিসার; পার্শ্ব-বেদনা; আমবাতি, দ্বায়-শূল বা দ্বায়-শূলসদৃশ বেদনা; প্রভৃতিতেও লাইকোপসের ব্যবহার হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

**বহুমূত্রে।**—দ্বায়মূত্ৰের ক্রিয়া-বিকারজনিত বহুমূত্রে চিনি সংযুক্ত প্রচুর, পরিষ্কার মূত্রস্রাব; অতিশয় পিপাসা; অধিক শীর্ণতা; বায়ু-নলীর বিবর্জিত উপদাহ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশিষ্ট শ্বাস; হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা; লাইকোপসের লক্ষণ। ডাঃ হেল এক পাইন্ট জলে এক আউন্স লাইকোপস ভিজাইয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া উহার দুই ড্রাম মাত্রায় প্রতিদিন পাঁচবার সেবন করাইয়া কয়েক সপ্তাহে একজন রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

**হৃদ্রোগ।**—হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে আবৃক্ষনী বেদনা ও স্পর্শ-দেহ; শশক ও সবল হৃৎক্রিয়া; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; রক্তনিষ্টিবনবিশিষ্ট কাস; হৃদস্পন্দনের সবিবর্তমতা; বৃক্কাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অধিকতর স্পষ্টতা; আমাশয়ের মুখে হৃচ্চী-বেদন বা দগদগকর বেদনা; আমাশয়-মুখে বহির্দিকে বেদনাশূন্য প্রচাপন অনুভব; দ্বায়বীয় উপদাহ জনিত হৃৎকম্প, তৎসহ সর্বাঙ্গীন রক্তাধিক্য (প্লেথোর); নিদ্রা হইতে জাগিয়া একটু শ্রম করিবারাত্র হৃৎপিণ্ডে বাতনা ও উহার শিথরদেশে সেই বাতনার অত্যন্ত স্পষ্টতা; ক্ষীণ, প্রচাপ্য নাড়ী; মুচ্ছাপ্রবণতা; হৃদ্রোগে এইগুলি লাইকোপসের লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া; ধাতুগত দুর্বলতা সহকারে আমবাতিক পীড়া; হৃৎপিণ্ডের অবসাদক বা উত্তেজক দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি শারীরিক কারণে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা



ও উপদাহিতা জন্মিলে উচ্চক্রেমে লাইকোপস ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার কারণে জায়গুণ্ডে বিভ্রমণ থাকিলে ইহা তত উপযোগী নহে। আবার, পেশীর দুর্বলতা বশতঃ কিবা বক্রং, ফুসফুস, বৃক্কাদি যন্ত্রের রোগজনিত সহায়ভূতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া, অতিরিক্ত অল্পভাবাদিকা, ও বিরুদ্ধিত্তেও গৌণতঃ লাইকোপস ব্যবহৃত। এই সকল হ্রদোগে এই ঔষধের নিয়ন্ত্রণ বা মাতৃকারিষ্ট উপযোগী। ডাঃ মার্সী লিখিয়াছেন যে হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকারজনিত রোগে আকুঞ্চনী ও দপদপকারিণী বেদনা, ও বহিরাগত চক্ষুসহ কাস লক্ষণে লাইকোপস উপকারী। ডাঃ ব্রাউন এই ঔষধের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ শততম ক্রম ব্যবহার করিয়া হৃৎপিণ্ডের আমবাতবৎ 'বেদনায়' সুন্দর ফল দেখিতে পাইয়াছেন। এক এক মাত্রায় জল সহযোগে ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির তিন চারি বিন্দু ডিজিটেলিস বা রক্তমোক্ষণের উৎকৃষ্ট অলুকা। গ্রেন্ডেস ডিজিজ বা এক্সঅপথালমিক গায়টার।—চক্ষুতারা বাহির হইয়া পড়া, হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ও স্পন্দন, উচ্চে উত্থানে, উত্তেজনা, গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণে, ও হৃৎস্পন্দনের বিষয় মনে করিলে সেই স্পন্দনের বৃদ্ধি; বিষম ও সবিরাম নাড়ী, হৃৎস্পন্দনের সহিত নাড়ীর অসাদৃশ্য; সম্মুখ কপাল এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ কপালে শিরঃপীড়া, সবলে চাপ প্রদানে উহার উপশম; স্বরবস্ত্রে আকুঞ্চন অল্পভব; অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ নিগ্ধবন বিশিষ্ট কাস, দক্ষিণ স্বক্কাস্থির নীচে উদ্ভূত বেদনা ও হাঁসফাঁস শব্দ; দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ সহকারে শ্বাসে আয়াস; হাতে কম্পাহুভব; অবস্থান পরিবর্তনশীল বাতবৎ বেদনা, সূর্যাস্তকালে ও সায়াহ্নে উহার বৃদ্ধি, এই সকল লক্ষণে লাইকোপস ব্যবহার্য। যক্ষ্মা।—হৃৎপিণ্ডের অতিশয় উপদাহিতা, ও বংশামাত্র নড়িলে হৃৎকম্প; দ্রুত, দুর্বল নাড়ী,—রক্তনিগ্ধবন, অতিশয় দুর্বলতা, ক্ষুধাহীনতা ও অতিসার; এই ঔষধের লক্ষণ। বাত।—পেশীর বাতবৎ বেদনা, সেই বেদনার সন্ধি ও কণ্ডুরা আক্রমণ; নড়িলে চড়িলে ও নীতল বাতাস লাগিলে বৃদ্ধি, ঘর্ষণে বা নীতল জল প্রয়োগে, অথবা অব্যবহিত উষ্ণতা প্রয়োগে অল্পপণম, কিন্তু উষ্ণগৃহে বা উষ্ণ শয্যায় উপশম; হাঁচি; শ্বাস-কৃচ্ছ; কাস ও নিগ্ধবন; বক্ষঃস্থলের প্রতিষ্ঠায়ের জায় হাঁসফাঁস শব্দ ও গল-কোষের উপদাহ; হৃৎপিণ্ডের বাতনা ও হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে বাতের বেদনা; বিষম ও সবিরাম নাড়ী; সূর্যাস্তকালে বৃদ্ধি; এইগুলি লাইকোপসের লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধ।—ডাঃ মার্সী বলেন যে এই ঔষধে বৃক্কদিগের বক্রতের ক্রিয়ার সহায়তা করে ও কোষ্ঠবন্ধের উপশম জন্মায়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চক্ষু।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার গোলযোগ সহকারে ০ চক্ষুর বহিরাগতি; হ্রদোগজনিত বহিরাগত অক্ষি-গোলক। বাম অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধদেশে অল্পগ্র বেদনা। অক্ষি-গোলকে বেদনা সংযুক্ত চাপ (এলো, ব্যাপ্ট, সিমি)। আমাশয়।—আমাশয়-প্রদেশে নীরাবদ্ধ বেদনা ও সঙ্কোচন। উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা ও বাতনা সহকারে অজীর্ণতা। মল।—

পেটকামড়ানি ও পেট-ডাকুনিসহ অতিসার । ০ দুর্বলীভূত হৃৎপিণ্ড বশতঃ পাণ্ডুরোগে অতিসার । কোষ্ঠবদ্ধ । মূত্রে-যন্ত্র ।—পায়ের শোধ সহকারে স্বল্প, গাঢ়, ও কর্দমবৎ মূত্র । মূত্রে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা, এপিথিলিয়াম সেল ও অকজেলেট অব লাইমের বিচ্যুতমানতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১২—১০২০ । ০ মধুমেহ অর্থাৎ শর্কর বহুমূত্র । শ্বাস-যন্ত্র ।—শ্বাস-ক্লান্ত ; শ্বস্বজ্ঞে আকুঞ্চন অল্পভব । জীবৎ পাণ্ডুর নিম্নীবন বিশিষ্ট কাস । পশু-কা-মধা-পেশীর বেদনা ( সিমি, রাগন, রোড, রস ) । শ্বাস-ক্রিয়ায় কষ্ট সহকারে বক্ষঃস্থলে বেদনা । হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ।—হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে আকুঞ্চনকর বেদনা ও স্পর্শ-দ্বৈষ । হৃৎপ্রদেশের আমবাত সদৃশ বেদনা ও চিড়িকমার বেদনা ( এক, ক্যালমিয়া, রস, স্পিজ ) । বুকাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে হৃৎস্পন্দনের স্পষ্টতরতা । হৃৎপিণ্ডের গৌরব ও বাতনা । স্পর্শে হৃৎপিণ্ডের নাড়ীর স্পন্দন প্রায় অনুভূত হয়না ( ডিজি ) । সপর্ধ্যায় নাড়ী ও মূচ্ছুরীকরণ শ্রান্তি সহকারে ( ডিজি ) ; এবং দ্রুত বেগে উপরে উঠিতে ( আস' ) ; হৃৎপিণ্ডের অবসাদন । হৃৎপিণ্ডের শব্দের অস্পষ্টতা, সঙ্কোচন ও প্রসারণ । শব্দের সংমিশ্রতা । জাগরণান্তে, বারংবার বিরাম সহ আয়াসিত হৃদক্রিয়া । হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ, দুর্বল ও দ্রুত ক্রিয়া ( ডিজি ) । ০ গোলযোগ ও সবলতা সংযুক্ত ক্রিয়া ( স্পিজ, ভিরে-ভিরি ) ; শয্যা হইতে কতিপয় পদ দূরে উঠা শ্রুত হয় ; চক্ষুর বহিরাগতি । দ্রুত, সবিরাম ; ক্ষীণ, অসম সবিরাম ; প্রতি নিঃশ্বাসে দ্রুততাপ্রাপ্ত ; প্রায় অপ্রাপ্য ; অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ; সঞ্চলন-কালে অসম, ও অতিশয় চাপ্য ; নাড়ী । পৃষ্ঠ ।—ঘাড়, পৃষ্ঠ, ও কটিতে তরুণ আমবাতের ঠায় বেদনা ( রস ) । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।—সমস্ত অঙ্গে তরুণ আমবাত সদৃশ বেদনা ( রস ) । দেহ ।—০ আমবাতবৎ বেদনা, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে উহার গতি ; বাম দিকে আবার প্রত্যাবৃতি ; প্রধানতঃ পেশী ও সন্ধিস্থল আক্রমণ ; এবং সঞ্চালনে, শীতল বায়ুতে, ও বেদনায়চিত্ত-সংঘমে বিবর্দ্ধন । উপচয় ।—একদিন পর একদিন বৃদ্ধি । সমগুণ ।—একন, ক্যান্ট, \* ডিজি, ক্যালমিয়া, স্পিজ, ভিরে-এস ।

## লাইনৈরিয়াভলগারিস ।

লাইনৈরিয়া মূচ্ছুরীকরণ । এজন্ত হৃৎপিণ্ডমূলক মূচ্ছুরি এই ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে । “কোন পরিদৃশ্যমান কারণ ব্যতীত মৃত্যুবৎ মূচ্ছুরি” ইহার একটা প্রধান লক্ষণ । মূচ্ছুরোগের চিকিৎসায় কোন ঔষধের উপকারিতা স্থানিচিত করা একটু কঠিন ব্যাপার । কারণ, এই রোগে সচরাচর রোগী ঔষধের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ংই সত্তর চৈতন্ত লাভ করে । সুতরাং ঔষধে কোন ফল-দর্শিল কি না তাহা বুঝা যায় না । তবে বাহ্যদের মধ্যে মধ্যে মূচ্ছুরি আক্রমণ উপস্থিত হয় তাহাদের রোগ আবেশকালে উপশমিত ও একেবারে নিমুর্ক্ত

হইলে ঔষধের কলবস্থা উপলব্ধি করা বাইতে পারে। অপর, লাইনেয়িয়া অবিরত মূত্র-স্রাব জন্মায় ও আরোগ্য করে। পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগ ও তজ্জন্ম রাত্রিতে উঠবার প্রয়োজনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

## লাইসিন-হাইড্রোফোবিন

কিন্তু ককুরের লীলা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্ত বিষাক্ত করিয়া দ্রাব্যমণ্ডলেই লাইসিনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গলার দ্রাব্যগুলিই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত ও আকৃষ্ট হয়।

অধিকার।—অস্থিরতা। প্রলাপ। রোষ। \* পুরাতন শিরঃপীড়া; কপালে প্রচাপন ও রক্ত-করণবৎ বেদনা, রোগীর জলের শ্রোত দর্শন সহ হয় না। বদনের পেশীর আক্ষেপিক আকৃষ্টন। হ্রস্বস্তম্ভ। গলার জ্বালাকর বেদনা। তরল পদার্থ পানে গলার আক্ষেপ। তরল পদার্থে, বিশেষতঃ জলে অক্ৰচি। পিপাসা কিন্তু জলপান করিতে পারা যায় না। \* গর্ভা-বস্থায় জল-চালার শব্দে টঙ্কারের উৎপত্তি।

প্রধান: প্রধান লক্ষণ।—মন ও মস্তিষ্কাদি।—স্থিতি প্রকৃতি; বিবমিষা; অস্থিরতা, প্রলাপ; রোষ, স্রুতি। ভ্রমি; জড়তা; মস্তক-ঘূর্ণন। উত্তেজিত অবস্থা; নিদ্রা বাইতে পারা যায় না, স্পষ্ট স্বপ্ন। স্বক্।—চর্মে তুড়তুড়ি ও কণ্ডুয়ন। কপালে ও মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচ্যমান বর্ণ। দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখা।—দুর্বলতা; অবসন্নতা; গাজে, বিশেষতঃ সন্ধি-স্থানে যুহু যুহু অবিরাম বেদনা। বামপার্শ্বে বেদনা; বক্ষঃস্থলে, নিতম্বে, ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা। নিতম্ব হইতে পদদ্বয় পর্যন্ত বেদনা; বাহুদ্বয়ে অবশতা; সন্ধিতে বেদনা। মস্তক।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়; কেশের অতিশয় শুষ্কতা; কেশাবৃত শিরোভাগের সমধিক অল্পভূতি। শিরঃপীড়া,—কপালে ও শঙ্কদ্বয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত প্রচাপন ও রক্তকরণবৎ বেদনা। চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ; ব্যথিততা; দুর্বলতা। কর্ণ।—কর্ণে রক্তের প্রধাবন। মড়মড় শব্দ। নাসিকা।—বেদনা; হাঁচি; রক্ত-পাত। বদন।—পাণ্ডুরতা, পীতবর্ণ; পেশীর আক্ষেপিক আকৃষ্টন। হ্রস্বস্তম্ভ। দ্রাব্যমণ্ডল।—অতিশয় বিকৃত উত্তেজনা, তৎপরে অবসন্নতা। আক্ষেপ; টঙ্কার; ধ্বস্তুস্তম্ভ; পক্ষাঘাত। রক্ত-সঞ্চালন-বহ্ন।—জ্বপিণ্ডে বেদনা; রক্তের বিষহুঁতা। শ্বাস-যন্ত্র।—স্বরবজ্রের বেদনা ও আক্ষেপ শ্বাস-ক্রিয়ায় আয়াস, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-ত্যাগ। বক্ষঃস্থলের বেদনা ও ভার। পরিপাক-যন্ত্র।—মুখমধ্য।—অধিক থুথু-ফেলা; দাঁত-বেদনা; মাড়ীতে ও জিহ্বায় বেদনা; গল-মধোর প্রদাহ, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে আক্ষেপ। ক্ষুধায় পরিবর্তনশীলতা; পিপাসা, কিন্তু জল গিলিতে পারা যায় না। আমাশয়।—বিবমিষা, বমন; পেট-ডাকা; প্রচাপনবৎ বেদনা। উদর।—স্পর্শ-দেব; জ্বালা; প্রচণ্ড বেদনা, যকৃদ্দেশে স্পর্শ-দেব।

মল ।—স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর নরম মল ; প্রাতে কালে অতিসার । মূত্র-যন্ত্র ।—মূত্রাশয়ের দ্বারা বরক-পেশীতে বেদনা ; মূত্র-তাগাস্তে জ্বালা । প্রচুর, অপ্রগাঢ় বর্ণ ; কপিশ, আবিল ; মূত্র ।—জনন-যন্ত্র ।—( পুং ) অবসাদ ; ধ্বজভঙ্গ ; অণ্ডকোষে বেদনা । ( স্ত্রী ) নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে ধাতু ; জরায়ুতে বেদনা ; কুহনবৎ যাতনা ; আঠা আঠা প্রদর । উপচয় ।—প্রাতে বৃদ্ধি । উপশম ।—শীতল বায়ুতে উপশম ।

বিশেষ লক্ষণ ।—\* \* জল-ঢালা বা প্রবাহিত জল দেখিলে অথবা উহার শব্দ শুনিলে সমুদয় পীড়ার উপচয় । জলাতঙ্ক রোগ বা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের আতঙ্ক ; উন্মাদ জন্মিবার আশঙ্কা । সত্ত্বরণের (উণ্ডের) ঈষৎনীল বিবর্ণ ( ল্যাক ) । স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি জনিত পীড়া । মনোভাব বা বিরক্তিজনক অশ্রিয় সংবাদে সর্বদা রোগীর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি । \* \* সূর্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায় না ( জেল, ঘন, ল্যাক, ছাট ) । অতৃষ্ণ জল বা প্রতিফলিত আলোক ও জল বা দর্পণ দর্শনে ; কোন প্রকার তরল পদার্থের বিষয় চিন্তা করিলে ; এবং অত্যন্ত সংস্পর্শ বা বায়ু-প্রবাহে ; আক্ষেপের উৎপত্তি । উন্মত্ত ও অহুন্মত্ত কুকুরের দংশন বশতঃ শিরঃপীড়া ; মনোবিকার বা মানসিক পরিশ্রমজনিত পুরাতন শিরঃপীড়া ; \* প্রবাহিত জলের শব্দে অথবা উজ্জল আলোকে উহার বৃদ্ধি । মুখে ও গলায় হ্রস্বেচ্ছ, রজ্জুবৎ, আঠা আঠা, ফেণিল লালা ; অবিরত থুথু-ফেলা ( হাইড্রা ) । গলা-বেদনা, সতত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি ( ল্যাক-ক্যান, মার্ক ) । গিলিতে কষ্ট ; এমন কি তরল পদার্থ গিলিতে গল-নলীর আক্ষেপ ; জলগিলিতে মুখ-রোধ । \* প্রবাহিত জল দর্শনে অনবরত মূত্র-প্রবৃত্তি ( ক্যাছ, সলফ ) ; চিনিসংযুক্ত, স্বন্ন, আবিল মূত্র । কন্দ ; বহুবৎসরের রোগ-গ্রস্তা অনেক রোগিণীর আরোগ্য লাভ । অপত্য-পথের অতিশয় অনুভূতি, তজ্জন্ত রমণ-ক্রিয়ায় যাতনা । \* জলের দর্শনে বা শব্দে ; উজ্জল প্রথর আলোকে ( ষ্ট্রাম ) ; ও শকটারোহণে ( কক ) বৃদ্ধি ।

সমগুণ ।—হাইড্রোফোবিয়া রোগে, বেল, ক্যাছ, হাইও, ও ষ্ট্রামোর সহিত হাইড্রো-ফোবিনের তুলনা হয় ।

## লেপিস এন্ডস ।

লেপিস এন্ডস ঈষৎ উজ্জল, শুভ্রবর্ণ একপ্রকার শৈল । জর্জর দেশের গ্যাটিন নগরের খনিজ পদার্থ মিশ্রিত উৎসের জলে ডাঃ গ্রাবোল প্রথমে এই শৈল দেখিতে পাইয়াছিলেন । এই নির্ঝর জলপানে বস্মা, গণ্ডমালা, ও ককট রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত ছিল । ভন গ্রাবোল এই শৈলই সেই নির্ঝরের জলের ভৈষজ্য গুণের কারণ মনে করিয়া উহার খানিকটা বিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন । তিনি পরীক্ষায় ষষ্ঠশক্তির বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাঁহার পরীক্ষায় আমাশয়ের উর্দ্ধ ও নিম্ন মুখে, এবং স্তনে ও জরায়ুতে

জ্বালা ও হলবেধবৎ যাতনা ; কক্কট ও অগ্নাত্ত ক্ষতের বৃদ্ধি ; ফলক-গ্রন্থির ক্ষীততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল । গ্রবোলের আবিষ্কারের পূর্বে বোষ্টন নগরের ডাঃ বেলোস ইংলণ্ডের ডার্বিসায়ারের জলেও ফ্লোরিণ, লাইম ও সাইলেক্স সমবেত এই শৈল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং এই শৈল রেণু মিশ্রিত জল পানই তথাকার গলগণ্ড ও গণ্ডমালার প্রাবল্যের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । ডাঃ হেল বলেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার কোন কোন নির্ঝরেও এই শৈলের রেণু ভাসমান আছে । কক্কট ও অগ্নাত্ত দুর্দ্দম্য ক্ষত আরোগ্য হয় বলিয়া এই সকল নির্ঝরের জলেরও বিলক্ষণ খ্যাতি আছে । গ্রবোল বলেন যে এই ঔষধে বিমুক্ত কক্কট আরোগ্য হয় না ; কিন্তু গণ্ডমালা ধাতু দোষ জনিত অমুক্ত কক্কটে উপকার দর্শে । অনেকগুলি জরায়ুর কক্কট রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । যাহাদের পূর্বে সবিরাম জ্বর, বা ম্যালেরিয়া জনিত অগ্ন কোন রোগ ছিল তাহাদিগকে এই ঔষধ দিতে নিষেধ করেন । কারণ এতৎসেবনে পুনরায় সেই সকল রোগ উপস্থিত হয় । বসাময় অর্কুদ, মাংসল অর্কুদ, গ্রন্থিল ও সৌত্রিক অর্কুদ ; অবিমুক্ত অর্থাৎ ক্ষতপরিণত কক্কট অর্কুদ প্রভৃতি অর্কুদ রোগেও লেপিস এবস ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে । ডাঃ হানসেন লিখিয়াছেন যে আমাশয়ের উর্দ্ধ ও নিম্ন মুখের, এবং জরায়ু ও স্তনের জ্বালাকর ও সঞ্চরমান বেদনা ; গল-গ্রন্থির ক্ষীততা ; গলগণ্ড ; স্তনের অর্কুদ ; চক্ষুর প্রচ্ছন্ন ছানি প্রভৃতিতেও এই ঔষধ প্রয়োজিত হয় । এই ঔষধের বিচূর্ণই প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তন গ্রবোল ইহার বর্ষ দশমিক জলীয় দ্রব-ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন । ডাঃ মার্সী এই ঔষধের তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা ভাল মনে করেন ।

## ল্যাক ডিস্কোরেটম ।

ল্যাক ডিস্কোরেটম মণিত গোহৃদ্ধ । ইংরেজীতে ইহাকে স্কিম্‌ড মিল্ক বলে । বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় এই দুগ্ধ ঔষধ ও আহার স্বরূপ বিস্তর ব্যবহৃত হয় । সাধারণতঃ প্রথমে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ও রাত্রিতে আধসের পরিমাণে স্কিম-মিল্ক পান করিতে হয় এবং খেতসারবিশিষ্ট খাত্তদ্রব্য ও চিনি সেবন পরিত্যাগ করিতে হয় । অনন্তর মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ চারি পাঁচ সের পর্যন্ত পান করা আবশ্যক করে । ডাঃ ডনকিন বলেন যে বহুমূত্র রোগে মণিত দুগ্ধ পান করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে উপযোগী মাত্রায়, নির্দিষ্ট পরিমাণে, নিয়মিত সময় অন্তর সেবন করিতে হয় এবং অল্প বা অধিককাল পর্যন্ত অগ্ন কোন প্রকার আহার গ্রহণ করিতে হয় না । ইহা সেবন কালে মাংস বা অন্ত্রবিধ স্ববন্ধারজান বিশিষ্ট ( নাইট্রোজিনস ) খাত্তদ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ । থাইলে ইহার ঠৈমজ্যপুণ্ড বিনিষ্ট হয় । যথানিয়মে ও যথারীতিতে এই ঔষধ সেবন না করিলে

এতদ্বারা রোগারোগে সফলতা লাভ করা যায় না । এতদেশে কবিরাজেরা কেবল চুখ পথ্য দিয়া শোথ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন । সম্ভবতঃ বৃক্ষ ও উহার নিঃস্রবে ক্ষিম মিক্সের কতকটা ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় । বহুমুত্রে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেবল ক্ষিম-মিক্স পান করা হইলে পর রোগী ক্রমে ক্রমে মাংস ও ভূসির রুচী প্রভৃতি আহার গ্রহণ করিতে পারে । বহুমুত্রে মথিত চুখ সেবনে মুত্রের পরিমাণ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হয় । ল্যাক ডিক্লোরেটম হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিতও হইয়াছে । এতদ্বারা মস্তকের সম্মুখভাগে অবস্থিত তীব্র শিরঃপীড়া আরোগ্য হয় । দপদপকর বেদনা, এবং তৎসহকারে বিবমিষা, বমন, ও অত্যন্ত দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ । কটিদেশে বেদনা ; হস্তাঙ্গুলীর শীতলতা ; অগ্নির নিকটেও সর্বশরীরের তুষারবৎ শীতলতা ; কম্পপরিশৃঙ্খতা ; অতিশয় পিপাসা, এক একবার অধিক পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা ; জলবৎ প্রভূত মুত্র অথবা স্বল্প, প্রগাঢ় বর্ণের মুত্র ; উত্তানাবস্থা হইতে উত্থানকালে ঘূর্ণিতবৎ শিরোগূর্ণন ; উদরের ক্ষীণতা ; ল্যাক ডিক্লোরেটমের অতিরিক্ত লক্ষণ । রক্তহীনা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । ডাঃ লিলিয়েস্থাল লেখেন যে অগ্নির নিকটেও শরীরের তুষারবৎ শীতলতা সবমন শিরঃপীড়ার এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

নৈরাশ্র ; বাঁচিয়া থাকিতে যন্ত্রশৃঙ্খতা মৃত্যুর ভয় নাই কিন্তু মরিতে যাইতেছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা । \* আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া ।—গ্রাতে উঠিবার পর কপালে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকের পশ্চাভাগ পর্য্যন্ত প্রসারণ (ব্রাই) ; \* দারুণ দপদপ, বিবমিষা, বমন, \* দৃষ্টিহীনতা ও দুর্দম্য কোষ্ঠ-রোধ (ইপিজি, আইরিস, স্রাজ) ; গোলমাল, আলোক ও সঞ্চালনে (ম্যাগ-মি. সিলি) ; এবং ঋতুকালে (ক্রিমো, সিপি) বৃদ্ধি ; অতিশয় অবসন্নতা ; প্রচাপনে, ও কষিয়া মাথা বাঁধিলে (অর্জ-না, পলস) হ্রাস ; বর্ণশৃঙ্খ প্রভূত মুত্র । শুষ্ক-বায়ু-গোলক (প্রোবঃস হিষ্টরিকঃস) ।—আমাশয় হইতে গলায় ঘেন একটা বড় গোলা উঠিতেছে এরূপ অনুভব, এবং উহাতে শ্বাস-রোধের উৎপত্তি (এসাক, কালমিয়া) । বমন ।—নিরন্তর বমন, আহারের সহিত উহার সম্বন্ধশৃঙ্খতা ; প্রথমে অপরিপাচিত, অত্যন্ত ভুক্তদ্রব্য, অনন্তর তিক্ত জল বমন ; গর্ভাবস্থার বমন (ল্যাক্ট-এসি, সোরি) । কোষ্ঠবদ্ধতা ।—নিষ্ফল মল-বেগ (এনাক, নক্স) ; শুষ্ক ও শক্ত বিষ্ঠা (ব্রাই, সল) ; \* বৃহৎ শক্ত মল, অতিশয় কুন্তন, উহাতে গুহদ্বারের বিদারণ ; \* \* ক্রন্দনজনক যাতনা । ঋতু ।—বিলম্বিত ঋতু ; \* শীতল জলে হাত রাখাতে ঋতু-বিলোপ (কোনা) ; \* ঋতুকালে এক গ্রাস চুখ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরবর্তী ঋতু-কাল পর্য্যন্ত রজ-স্রাবের বিলুপ্তি । অতিশয় অস্থিরতা, \* নিদ্রাহীনতা বশতঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যন্ত যাতনা (কক, নাই-এসি) । কিছু করা হউক বা না হউক সম্পূর্ণ অবসন্নতা অনুভব ; ইটিবার সময়

অতিশয় ক্লান্তি । অল্পভূতি ।—আবৃত থাকিলেও যেন শীতল বায়ু গায় লাগিতেছে ; চাদর যেন আর্দ্র রোগিণীর এপ্রকার অল্পভব । শোথ ।—বাস্তবিক হৃদ্রোগ ; পুরাতন যক্ষ্মা ; এবং অনেক দূর বিবর্তিত এলবুমিনিয়াম হইতে উৎপন্ন ; ও সবিরাম জ্বরের পরবর্তী ; শোথ । স্ফোলা বা মেদ-রোগ , মেদের অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি ।

## ল্যাক ক্যানাইনম ।

ল্যাক ক্যানাইনম কুকুরের দুগ্ধ । স্নায়বীয়, অস্থির, ও অত্যন্ত অল্পভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । সাধারণতঃ এক মাত্রারই এই ঔষধের সর্বোৎকৃষ্ট ফিলা দর্শে । ইহার গল-লক্ষণগুলির সদৃশ ঔষধ সম্ভবতঃ ভৈবজ্য-তন্ম আৰ নাই ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

ডিপথিরিয়া ।—গণমালা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ডিপথিরিয়া ; তালু-মূলে শুভ্রবর্ণ ক্ষত, তালু-মূল ও গল-গহবরে পীতভাষ ধূসরবর্ণ দধির ছায় অথবা \* শুক্লির ছায় কৃত্রিম বিল্লী ; পৃষ্ঠে, মস্তকে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা ; লেপাবৃত জিহ্বা ; শীত, তৎপরে উত্তাপ, অধিক লালা নিঃসরণ, তদ্বারা বালিসের সিক্ততা ; অবিরত নিগীরণ-প্রবৃত্তি ; অধিক মূত্রস্রাব ; গভীর বা স্বল্প অবসাদ, আহারগ্রহণের সামর্থ্য ; বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে রোগের আরম্ভ ; অথবা একবার দক্ষিণ একবার বামপার্শ্বে উপস্থিত, বড়বৃষ্টির সময় উপচয় ; শ্বাসের ভগ্ন ক্রুরোগবৎ, অনেক সময় অমুনাসিক শব্দ, কেবল মুখদিয়া শ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি ; নাসিকার একপার্শ্বের অবরুদ্ধতা, অপর দিক দিয়া পাতলা শ্লেষ্মা বা পাতলা রক্ত নিঃসরণ ; গল-কোষের প্রদাহ ও সেই স্থানের সমগ্র উপত্যকের বিনাশ ; আঠা আঠা লালা ; \* ক্ষতের রূপার ছায় উজ্জলতা ; গিলিবার সময় কণ্টক-বেধ ও কণ্টকবৎ যাতনা, উহার কর্ণ পর্য্যন্ত গতি ; শ্বাসের দুর্গন্ধ ; হস্তের তালুকার উত্তপ্ততা ; সর্বদা অবস্থান-পরিবর্তনের আবশ্যতা । এই সকল লক্ষণে নিউইয়র্ক নগরের একজন চিকিৎসক এই ঔষধ বিস্তার ব্যবহার করিয়াছেন । ফ্যারিংটন বলেন যে ডিপথিরিয়া রোগে ল্যাকক্যানাইনমের ল্যাকেসিসের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে । রেইসিগ, বেরার্ড, সোয়ান প্রভৃতি আমেরিক চিকিৎসকগণও ডিপথিরিয়ায় ইহার উপকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন । জরাম্মুর রক্তস্রাব ।—উজ্জল লোহিত, রক্তবৎ, \* অগ্নির ছায় উত্তপ্ত, সবেগে নির্গত ও সহজে সংযত রক্ত ; ভগ্ন হইতে যেন সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অবিরত আবেগজনক বেদনা । প্রসবাস্তিক বেদনা ।—উরুদ্বয় পর্য্যন্ত সঞ্চারমান প্রসবাস্তিক বেদনা । প্রসবের পরবর্তী স্তন-প্রদাহেরও ইহা প্রতিষেধক । সন্ধ্যাকালে ও যৎসামান্য সংঘর্ষে বৃদ্ধি ও অনধিক প্রদাহ ইহার লক্ষণ । রজোরোগ ।—অতিরিক্ত

ঘনঘন অধিক রক্তশ্রাব, উজ্জল লোহিত, দড়িদড়ি রক্ত; রক্ত-ক্লচ্ছ, উদরে বস্ত্রের ভায়ে পর্যন্ত অম্লভাবধিক্য; যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণ। ডিম্বাশয়ের রোগ।—( ঋতুকালে ) ডিম্বাশয় ও জরায়ু-প্রদেশে উত্তাপ। ঋতুর পূর্বে ডিম্বাশয়ের, বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহিত ও রক্তসঞ্চিত অবস্থা এবং ডিম্বাশয়ের অতিশয় স্পর্শ-দেহ ও অম্লভাবধিক্য, তজ্জন্ত সকল প্রকার সঞ্চলনে ও অবস্থানে, এমন কি শ্বাস ছাড়িতে পর্যন্ত যাতনা। স্কার্লেটিনা।—স্কার্লেটিনার পর গ্রহির বিবর্দ্ধন; গণ্ড-মালাগ্রস্ত বালকদিকের অপচ্যমান স্ফীততা। তালুমুল-প্রদাহ।—গল-মধ্যের প্রায় নিকটে তালুমুলের প্রদাহ ও অতিশয় স্পর্শ-দেহ, আরক্ততা ও উজ্জলতা, গল-মধ্য ও গল-গহ্বরের পরিশুদ্ধতা; হ্রু-নিম্নগ্রস্থির স্ফীততা। এই সকল রোগে ডাঃ লিলিয়েস্থাল ল্যাক-ক্যান ব্যবহারের বিধি দেন। ওজিনা।—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে উপদংশ জনিত ওজিনা ও এঞ্জাইনা রোগে মুখের কোণ ও নাসিকার পার্শ্ব বিদারিত হইলে এই ঔষধে উক্ত রোগদ্বয় আরোগ্য হয়। স্তন-দুগ্ধ।—স্তন দুগ্ধ শুকাইয়া ফেলিবার জন্ত প্রায় সকল রোগিণীর পক্ষেই এই ঔষধ উপকারী ( এসফ।—স্তন-দুগ্ধের পুনরুৎপত্তি বা বিবর্দ্ধনার্থে, ল্যাক-ডি )।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—\* \* অতিশয় বিস্মৃতি, \* অশ্রমনস্কতা, দ্রবাদি কিনিয়া তাহা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া ( এগস, এনাকা, কষ্ট, ছাট )। লিখিতে অতিরিক্ত অধিক কথা ব্যবহার করা অথবা প্রকৃত কথাগুলি ব্যবহার না করা; শব্দের শেষ অক্ষর বা অক্ষরগুলি ফেলিয়া যাওয়া, পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করিতে না পারা; অতিশয় স্নায়বীয়তা ( বোভ, গ্রাফ, ল্যাক, ছাট-কা, সিপি )। নৈরাশ্র; রোগিণী মনে করে যে তাহার রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবেনা; তাহার কোন আত্মীয় স্বজন জীবিত নাই; তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই; যে কোন মুহূর্ত্তে সে অশ্রুপাত করিতে পারে ( এক্ট, অর, কাক, ল্যাক )। কোপনতা, খিটখিটে স্বভাব; শিশু সকল সময়েই, বিশেষতঃ রাত্রিতে ক্রন্দন ও চিৎকার করে ( জ্যালা, নক্স, সোরি )। একাকী থাকিতে ভয় ( কালী-কা ) ; মৃত্যু-ভয় ( আস ) ; উন্মাদ হইবার আশঙ্কা ( বোরা )। সংসামান্ন উত্তেজনায় ক্রোধের, অভিশাপের ও শপথের আবেশ ( লিলি, নাই-এসি ) ; দারুণ কুৎসিততা ; ঘৃণাপূর্ণতা। মস্তকাদি।—প্রত্যেক বস্তু এত কৃষ্ণবর্ণ দেখায় যে উহা হইতে আর অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারেনা ( লাই, পলস )। গাঢ়, গুল্ল শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে মস্তকের প্রতিষ্ঠায়। এক নাসা-রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, অল্প নাসা-রন্ধ্রের বিযুক্ততা ও শ্রাব নিঃসরণ; এই অবস্থার পর্যায়শীলতা; শ্রাবের বিদাহিতা; নাসিকা ও ওষ্ঠের অবদরণ ( এরম, সেপা )। ডিপথিরিয়া ও টন্সিলাইটিস; \* এক পার্শ্ব হইতে অল্প পার্শ্বে লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন। ঋতু সহকারে গলা-ব্যথা ও কাসের আরম্ভ ও শেষ; ও কাসের আরম্ভ ও শেষ; গলার খেত বা পীতবর্ণ তালীর মত স্থান; বেদনার কর্ণ পর্যন্ত



সঞ্চরণ। গল-মধ্যের বহির্দিকে স্পর্শ-দ্বেশ ( ল্যাক ) ; খালি ঢোক গিলিলে উহার বৃদ্ধি ( ইগে ) ; অবিরত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি, উহাতে \* ব্যথিততা, প্রায় অসাধ্যতা ( মার্ক ) ; \* বেদনার কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারণ ( হিপ, কালী-বাই ) ; বামপার্শ্বে আরম্ভ ( ল্যাক ) । ডিপথিরিয়ার কৃত্রিমঝিল্লীর, উপদংশের ও ক্ষতের \* \* উজ্জল, চিকুণ আকৃতি। পরিপাক-যন্ত্র।—অতিক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধার পরিভৃষ্টি জন্মেনা ; আহারের পূর্বেও যেমন ক্ষুধা পরেও তদ্রূপ ক্ষুধা ( ক্যাক, ক্যাক, সিনা, লাই, ট্রিন ) । উদরোচ্চি দেশে নিমগ্নতা ; \* আশাশয়ে দুর্বলতা। জন্ম-যন্ত্র।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে ; অতি প্রভূত পরিমাণে ; প্রবল-প্রবাহে, উজ্জল লোহিত, আঠা আঠা, রজ্জুবৎ রজ-নিঃসরণ ( মলিন কাল, রজ্জুবৎ রজঃ, ক্রোক ) ; স্তনদ্বয়ের ক্ষীততা, ব্যথিততা, এবং ঋতুর পূর্বে ও তৎকালে অতিশয় অল্পভূতি ( কোনা ) । অপত্য-পথ হইতে বায়ু-নিঃসরণ ( ব্রোম, লাই, নক্স-ম স্ত্রাক ) । স্তনের প্রদাহ ও বেদনা ; অত্যন্ত সংঘর্ষে ও সক্ষার প্রেক্ষালে উহার বৃদ্ধি ; \* সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে স্তনদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হয় ( ব্রাই ) । কোন অপরিজ্ঞাত কারণে স্তন্য-দান কালে দুগ্ধের বিলোপ ( এসাক ) । স্পর্শে, উপবেশন-কালে প্রচাপনে, অথবা হাঁটিবার সময় ঘর্ষণ লাগিয়া সহজে জননেত্রিয়ার উত্তেজনা ( সিনে, কফ, মিউর, প্লাট ) । দেহ ও অঙ্গ।—বাম পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্পের প্রাবল্য, দক্ষিণ পার্শ্বে কিরিলে লাঘব ( ট্যাব ) । হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন শুল্বে হাঁটা যাইতেছে ; শয়ন-সময় বোধহয় যেন শয্যা স্পর্শ করা যাইতেছেন ( এসার ) । নিদারুণ, অসহ্য, ত্রিকাস্তি-প্রদেয়ের উর্দ্ধভাগে-অবস্থিত, দক্ষিণ নিত্য হইতে দক্ষিণ বজ্রকণ-নায়ু ( সায়েটিক নার্ভ ) পর্য্যন্ত প্রসারিত ; বিশ্রামে ও বিশ্রামান্তে প্রথম সঞ্চালনে বিবক্ষিত ; পৃষ্ঠ-বেদনা ( হ্রুঃ ) মস্তিষ্কের ভূমিদেহ হইতে কোকিল-চক্ৰ-অস্থি পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশের অবিরাম বেদনা, \* স্পর্শে বা প্রচাপনে উহাতে অতিশয় অল্পভূতি ( চিনি-সল, ফস, জিঙ্ক ) । লক্ষণের স্থান-পরিবর্তন-শীলতা, বেদনার একস্থান হইতে অল্প স্থানে সতত সঞ্চরণ ( কালী-বা, পলস ) ; \* কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিবস পরে পরে এক পার্শ্ব হইতে অল্প পার্শ্বে গতি।

সমগুণ।—এপিস, কোনা, মিউরেক্স, ল্যাক, কালী-বাই, পলস, সিপি, সলক।

## ল্যাক্টোকা ভিরোসা—লেটিউস ওপিয়াম।

কম্পোজিটি জাতীয় এই ওষধি ইউরোপে জন্মে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে অগ্নিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া নাড়ীর বল ও দ্রুততায় লাঘব জন্মে, এবং নিদ্রা উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ওপিয়ামের স্থায় এতদ্বারা মস্তিষ্ক কিম্বা স্নায়ু-

লক্ষণের উত্তেজনা জন্মে না। গোণতঃ ল্যাক্টিকার ক্রিয়ায় পরিপোষণ-বস্তু-মণ্ডল ও শ্বাস-যন্ত্রের মৈত্রিক বিলী আক্রান্ত হয় এবং ভদ্ররূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, কিন্তু চিকিৎসা-কার্য্যে এই সকল লক্ষণের অল্প কয়েকটির মাত্র সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

**আময়িক প্রয়োগ।**—প্রেক-বিদ্ধবৎ তীব্র কপাল বেদনা ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার আময়িক নিদ্রানুতা সংযুক্ত, কোন প্রকার বরুতের রক্তসঞ্চয়ে ও ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয়ে ডাঃ হিউজের মতে এই ঔষধ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। প্রতিশ্রাব্য জনিত স্নায়ু-প্রদাহ ও বায়ু-নলী-ভুক্ত-প্রদাহে নিম্নোক্ত লক্ষণে ল্যাক্টিকার উপকারিতা লক্ষিত হইয়াছে। ছপশক কাস ; বক্ষঃস্থলের শোথ ; ও হৃৎশূলেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ ফারিংটন বলেন যে হৃৎপিণ্ডের নিকটে ভয়ঙ্কর শ্বাস-রোধ অনুভব এবং তজ্জন্ম নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করা ল্যাক্টিকাসিদি ঔষধের দ্বারা ল্যাক্টিকারও হ্রাসক্ষণ।

**মন।**—বদ্ মেজাজ ; বিরক্ত-চিত্ততা, ক্ষণরাগিতা। মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ; মনের বিশৃঙ্খলা ; চিন্তা শক্তির লাঘব ( জেল, \* নক্স, \* ফস-এসি )। **মস্তক।**—মস্তকে বিশৃঙ্খলা ; শিরোবুর্ন। অমুগ্র শিরোপীড়া। **চক্ষু।**—\* চক্ষুর তারা অতিশয় প্রসারিত ( \* বেল, \* ট্রায় )। **আমাশয়।**—আমাশয়ে দীর্ঘ বেদনা সহ পশ্চাদিকে আমাশয় গহবরের আকৃষ্টন ; প্রচাপনে উহার উপচয়। আমাশয়ে উষ্ণতা অনুভব, তৎসহকারে গলা পর্য্যন্ত উখিত বিবমিষা ; ও জিহ্বা-মূলে বিরস আবাদ, অনন্তর শীঘ্রই উহার আমাশয় ও গলার তুয়ার সদৃশ শীতলতায় পরিণত। আমাশয়-গহবরে অশিথিলতা, তৎপরে হৃদয়ের প্রকৃত উৎকর্ষ। **উদর।**—উদরে, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণদিকে পূর্ণতা অনুভব, তজ্জন্ম শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা ; উর্দ্ধ বা অধোদিকে বায়ু নিঃসরণে উহার উপশম। **মূত্র যন্ত্র।**—মূত্রের বিবন্ধিত নিঃসরণ ( এম্ব্রা, ফস-এসি ) শ্বাস-যন্ত্র।—\* অবিরত আক্ষেপিক কাস, বুক যেন ফাটিয়া বাইবে এরূপ আশঙ্কা ; সর্ব্বদা গল-গহবরে একপ্রকার বিশেষ তুড়তুড়ি বশতঃ কাসের উদ্বেক, গলার অভ্যন্তরে একপ্রকার শ্বাস-রোধ জন্মিয়া যেন সেই তুড়তুড়ির উৎপত্তি ; ও তৎপরে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্কাশন। অল্পক্ষণ পরে পরে শুষ্ক কাসের আবেশ, উহাতে বক্ষঃস্থলে ও মস্তকের পশ্চাভাগে ঝাঁকি লাগে। বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা বশতঃ উৎকর্ষ সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ ( \* একন )। বক্ষঃস্থলের নানাস্থানে খালধরার দ্বারা প্রচাপনী বেদনা। বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগের বামদিকে নখাঘাত ও শস্তাঘাতবৎ অমুগ্র বেদনা। বক্ষঃস্থলের বামদিকে হ্রস্ব পঞ্জরাস্থির নিয়ে সূত্রীত হুচী-বেধবৎ যাতনা। **দেহ।**—অতিশয় শ্রান্তি ও অবসন্নতা। শরীরের অস্বাভাবিক অশিথিলতা অনুভব। দীর্ঘ কম্পন। **নিদ্রা।**—নিদ্রাশূন্যতা ; বিশ্রান্তিজনক গাঢ় নিদ্রা। রাজিতে জড়বৎ নিদ্রা। রাজিতে অস্থির নিদ্রা।

**সমগুণ।**—কফি, ড্রোস, ওপি।

## সিলিজিয়া সিলভেটিকা—কুইন্স ক্লট ।

ইউকরাইনবাসী জাতীয় এই ওষধি আমেরিকায় জন্মে । ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

**ক্রিয়া ।**—অস্থি-বেষ্টে ও তান্তব বিধান-তন্তুতে সিলিজিয়ার স্পষ্ট ক্রিয়া দর্শিয়া পুরাতন আমবাত ও গোণ উপদংশের লক্ষণের অনুরূপ অস্থি-বেদনা, অস্থির অর্কুদ ও আমবাতেব লক্ষণ উৎপন্ন হয় । স্বর-বস্ত্রের উপস্থিতিতে এক খাঁস-পথের শৈল্পিক বিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া জন্মে তদ্বারা স্বরবস্ত্র ও বায়ুনলীর উপদাহ ও প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হয় । ইহার ক্রিয়ায় লসিকা-গ্রন্থিগুলি বৃহত্তর হয় এবং উহাদের নিঃস্রব পরিমাণে বিবদ্ধিত ও গুণে বিকৃত হয় । চর্মে পামা জন্মে এবং ক্ষত-স্থান হইতে অত্যধিক শ্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

**অধিকার ।**—গোণ উপদংশ ; উপদংশজনিত অস্থি-বেষ্টের বাত ; অস্থির অর্কুদ ; পুরাতন আমবাত ; উপদংশগ্রস্ত রোগীদিগের গৃধ্রসী ; উপদংশজ স্বরবস্ত্র-প্রদাহ ; পারদজনিত অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ ; মূত্র-মার্গ-প্রদাহ ; প্রমেহ ; লাল-মেহ ; শ্বেতপ্রদর ; এবং উপদংশজনিত বা গণ্ডমালা জনিত ক্ষত ও উদ্বেদ ;—এই সকল রোগে লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে সিলিজিয়ার সফল প্রয়োগ হয় ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**অস্থি-রোগ ।**—উপদংশ বা গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগে সিলিজিয়া ব্যবহৃত হয় । উপদংশমূলক দীর্ঘস্থির পীড়ার অর্থাৎ ফিমর, টিবিয়া, হিউমারস প্রভৃতি অস্থির বা অস্থি-বেষ্টের প্রদাহে, রাত্রি বা অর্ধকালে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে সিলিজিয়া অতিশয় উপকারী । অবদরগণকর নাসিকার প্রতিচ্ছায়ের (ওজিনা) বিদ্যমানতা সিলিজিয়ার অতিরিক্ত লক্ষণ ।

**বজ্জ্ব-রোগ ।**—গোণ বা কোলিক উপদংশমূলক হিপ-ডিজিজ বা বজ্জ্ব-রোগে বজ্জ্বণের অভ্যস্তর দিয়া বেদনা থাকিলে এবং সেই বেদনা রাত্রিতে ও বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধি পাইলে সিলিজিয়া ফলপ্রদ ।

**গৃধ্রসী ।**—উপদংশজ বামপার্শ্বিক সায়েটিকা ; পদ, বজ্জ্ব, জজ্বা, ও বাম নিতম্বদেশে অবিরাম বেদনা ; পদাঙ্গুষ্ঠ ও বহির্দিকের গুল্ফে বেদনা ; পৃষ্ঠে অবিরাম বেদনা এবং উহার উরু ও জজ্বা পর্য্যন্ত সঞ্চরণ ; টিবিয়ার অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ ও অর্কুদ ; এই ঔষধের লক্ষণ । **প্রমেহ ।**—ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে বাতনাশূর্ণ লিঙ্গেথান, মূত্র-কালে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন ; মূত্রাশয়-প্রদাহের আশঙ্কা ; এই সকল লক্ষণে প্রমেহ রোগে সিলিজিয়া ব্যবহৃত হয় । ডাঃ হেল বলেন যে সিলিজিয়ার মুখ্য ক্রিয়ায় মূত্রমার্গ-প্রদাহের লক্ষণ উৎপন্ন হয় অতএব কোন কোন প্রকার প্রমেহে হৃদাশ বা জিংগক্রেমে ইহা ক্যাছেরিস বা গুজার ভ্রায় উপকার করিতে পারে । উপদংশ বা প্রমেহমূলক শ্বেত-প্রদরেও এতদ্বারা উপকার দর্শে । **উপদংশ ।**—উপদংশজ প্রাচীন চর্ম রোগে নিভেজ, সশঙ্ক, দুর্দম্য

উদ্ভেদ লক্ষণে ষ্টিলিজিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ । কৌলিক উপদংশে ইহা আইওডাইড অব পোটাস, বা মারকিউরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অরম সহকারে ইহা স্নন্দন প্লাটে । অরম নাসাহির রোগ, এবং ষ্টিলিজিয়া চর্ম্মের রোগ দূর করে । বাত ।—উপদংশ জনিত অস্থি-বেষ্টের বাতে ষ্টিলিজিয়া আশ্চর্য্য ফলপ্রদ । ডাঃ হেল পুরাতন বাতেও এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন । ফাইটো ল্যাক্সা ও আইওডাইড অব পোটাসার ক্রিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় । পুরাতন রোগে রসটক্স জাপক লক্ষণে রসটক্স ব্যবহারে যখন কোন উপকার লক্ষিত হয় না তখন তিনি উচ্চক্রমে ষ্টিলিজিয়া ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন । উচ্চক্রমে এক সপ্তাহে কোন ফল না দর্শিলে নিম্ন ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন । স্বর যন্ত্র-প্রদাহ ।—স্বরযন্ত্রের বিধান-তত্ত্ব, বিশেষতঃ উপাস্থিময় বিধান-তত্ত্ব সহিত ষ্টিলিজিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে । এজন্ত উপদংশজনিত স্বরযন্ত্র প্রদাহে এতদ্বারা অতিশয় উপকার দর্শে । বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ ও কাস ও এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—চিত্তের অবসাদ, \* ও বিষাদজনক ভবিষ্যদ্বাণী । মস্তক ।—মস্তকের দপদপ ও ঘূর্ণন । ০ মস্তক ও কপালের উপর অস্থিময় ক্ষীততা । ০ পারদজনিত কেরোটিক অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ । মস্তকোপরি আর্দ্র, কপিশ, অবদগকর উদ্ভেদ । চক্ষু ।—চক্ষুর প্রদাহ ও সজলতা, তৎসহ উগ্র শিরঃপীড়া ও সর্বাঙ্গের পেশীর স্পর্শ-দেয়, যেন রোগীর শর্দি লাগিয়াছে । নাসিকা ।—নাসিকা হইতে প্রথমে জলবৎ তৎপরে শ্লেষ্মা ও পুয়াক্ত প্রতিক্রিয়িক স্রাব ; নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে ক্ষত । ০ নাসিকার অস্থির প্রদাহ ও নাশ ( নিক্রোসিস ) ( \* অর ) । গল-মধ্য ।—গল-গহ্বরে শুষ্কতা, অবদগণ, হল-বেধন, ও যাতনা । আমাশয় ।—প্রত্যহ অপরাহ্নে মুখ-প্রসেক, শয়ন-সময় পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি । আমাশয় ও অস্ত্রে জালা ( \* আস, \* আইরিস, ক্যান্স ) । উদরোর্দ্ধে যাতনা ও মোচড়ান বেদনা, অস্ত্রে কূজন, তৎপরে আতিসারিক মল নিঃসরণ ( \* এলো ) । মল ।—অতিসার ; অনিয়মিত, ফেণিল, বিদাহী, পৈত্তিক ; শুভ্র, দধিবৎ ; মল কোষ্ঠ-কাটিত । মূত্র-যন্ত্র ।—বৃক্ক প্রদেশে অপ্রথর দারুণ বেদনা । আরক্ত, ফেণিল, গাঢ় ও হৃৎবৎ (ফস-এসি ) মূত্র । সমগ্র সঞ্চয়িত প্রচুর শুভ্র অধঃপতিত পদার্থ ; শুভ্র, পশমের থোপার আকার ; অথবা ইষ্টকচূর্ণের ত্রায় অধঃপতিত পদার্থ (লাই ) ; প্রস্তুতীকৃত মাংসের ত্রায় জীবৎ কপিশমিশ্রিত লোহিত বর্ণ অধঃপতিত পদার্থ । সমগ্র মূত্র-মার্গের অভ্যন্তর দিয়া প্রবল তীব্র জালা ও যাতনা ; মূত্রতাগ করিলে উহার বৃদ্ধি, প্রস্রাব করিতে কষ্ট, ও বৃক্ক প্রদেশে অল্পপ্র বেদনা, মূত্রমার্গের বেদনা এতই সূতীর যে উন্মোচনে ঘর্ম্মোদ্বেক জন্মায় । স্ত্রী-জন্মনেন্দ্রীয় ।—আমবাতের বেদনা সহকারে, ০ প্রভূত, পুষ-শ্লেষ্মাক্ত প্রদর-স্রাব । শ্বাস-যন্ত্র ।—সন্ধার প্রাকালে, কণ্ঠনালী, কণ্ঠয়িত হইয়া উদ্ভিক্ত অত্যন্ত শুষ্ক কাস ।

দৃষ্টতঃ কণ্ঠনালীর উপস্থিতিতে খঞ্জতা অনুভব। গল-গহ্বরে হল-বেধন ও জালা সহকারে স্বরযন্ত্র-প্রদেশে আকৃষ্টন। হৃৎ, গভীর, সরল আক্ষেপিক কাস। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী। —হৃৎপিণ্ড প্রদেশে রক্ত করণের হ্রাস বেদনা ( সেনেগা )। অতি বিষম নাড়ী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ।—সায়াহ্লে দক্ষিণ জজ্বায় এক প্রকার অবিরাম ও দপদপকর বেদনা, তৎসহ স্পর্শ ঘেব। বাহ্যতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রসারিত সঞ্চরমান তীব্র বেদনা। প্রাকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগের তৃতীয়াংশে ও উপরে পার্শ্বে চিড়িক-মারা বেদনা। কুচকি, জজ্বা ও পায়ের অবিরাম বেদনা ; দক্ষিণভাগে উহার আতিশয্য। জাহুর নিম্নে জজ্বায় জালা ও কণ্ডুয়ন। অঙ্গে উদ্বেদ, ক্ষত ও অস্থি বেতের বিবর্দ্ধন। দেহ ।—গ্রানি ; তন্দ্রালুতা ; সর্বাদীনি যাতনামুভব। ০ গুটিকাকার উদ্বেদ, উহাতে ক্ষত জন্মে। ০ গ্রীবার গ্রহির, বিবর্দ্ধন। জ্বর ।—প্রতিষ্ঠায়জনিত জ্বরের হ্রাস, বিশিষ্টরূপে মুখমণ্ডলে উত্তাপ। উপচয় ।—অপরাহ্লে ; আর্দ্র বায়ুতে ; ও সঞ্চালনে ; বৃদ্ধি। বিশেষ লক্ষণ ।—ষ্টিলিজিয়ার হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ প্রাতে ও সায়াহ্লে বিবর্দ্ধিত, মধ্যাহ্নে উপশমিত ; এবং চন্দ্র-লক্ষণ বাতাসে বিবর্দ্ধিত, উষ্ণতায় ও আবরণে উপশমিত হয়। ইহার মন্তক, বক্ষ, ও উপস্থের বেদনা সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে যায়।

সমগুণ ।—আর্জ, অর, হিপ, কালী-আইও, মার্ক, মেজ, ফাইটো, রিসটক, সলফ, ।

## সম্বল ।

মধ্য এসিয়ায় একপ্রকার মূল পাওয়া যায়, মৃগনাভীর গন্ধের তায় উহার গন্ধ, এজন্ত প্রভারণাপূর্বক মৃগনাভীর সহিত উহা মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই মূলকেই সম্বল বা কন্তুরী মূল বলে। প্রাচীন অধ্যাপক টলি বলেন যে গন্ধ ও স্বাদের সাদৃশ্বে ঔষধ দ্রব্যের গুণেরও কতকটা সাদৃশ্য থাকে। যথা, আরেলিয়া ও ইরিঞ্জয়মের গন্ধ অনেকটা একরূপ, এবং উহার উভয়েই শ্বাস-রোগে ফলপ্রদ। আবার, মম্বস ( মৃগনাভী ) প্রায়োগোপযোগী অনেকগুলি রোগেই সম্বল ফলপ্রদ। উভয়ের লক্ষণেও বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে এবং সায়ামণ্ডলে এই দুই ঔষধের প্রায় একরূপ ক্রিয়াই দর্শে। কাষ্টরিয়ন, নক্সমস্কা, এস্বারগ্রিস, ও এসাকিটিভা পোভতি গন্ধ-দ্রব্যের গুণের সহিতও সম্বলের গুণের ঐক্য আছে। প্রাতে বৃদ্ধি-বৃদ্ধির জড়তা ও সন্ধ্যাকালে পরিক্রতি। লিথিতে ও অক্ষ কসিতে ভুল-পড়া। গল-নালীর শিথর-দেশে গল-রোধজনক আকৃষ্টন, ও অবিরত গলাধঃকরণ সম্বলের বিশেষ লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার মূলের বন্ধনের অরিষ্ট ও বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

প্রধান প্রধান. আময়িক প্রয়োগ ।

হিস্টিরিয়া ।—এই রোগে শিরোঘূর্ননই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। মাথা নোয়াইলে, উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে, নড়িলে চড়িলে ; অথবা আসন হইতে উঠিলে শিরো-

ঘূর্ণন জন্মিলে ; এবং বৎসামাত্র কারণে মুচ্ছার উপক্রম উপস্থিত হইলে ; ও রোগের আবেশে রোগিণী সমুখদিকে পতিত হইলে সঞ্চল ব্যবহৃত হয় । প্রতিশ্রুতায় ।—সঞ্চল শ্রাস্থকস-  
স্থচক প্রতিশ্রুতায়ের ত্রায় নাসিকার ও গলকোষের একপ্রকার প্রতিশ্রুতায় জন্মায় এবং উহাতে হাইড্রাটস ও কিউবেবের লক্ষণের ত্রায় আঠা আঠা হরিদ্রা বর্ণ স্লেমা নিঃসৃত হয় ।  
অতএব ডাঃ হেল বিশ্বাস করেন যে বালকদিগের অতিশয় স্নায়বীয়তা, নিদ্রাশূন্যতা, ও  
আক্ষেপ-প্রবণতা সংযুক্ত প্রতিশ্রুতায়ে সঞ্চল একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইবে ।  
কুমি ।—টাকের ত্রায় ক্ষীত উদর, কোষ্ঠবদ্ধ, নাসা-কণ্ডুয়ন প্রভৃতি লক্ষণে কুমিরোগে এই  
ঔষধের পঞ্চদশ ক্রম ফলপ্রদ । কুমির উপদাহজনিত প্রতিক্রিষ্ট স্নায়বীয় লক্ষণেই ডাঃ হেল  
ইহা উপকারী মনে করেন । কোরিয়া ।—অধিরত মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপণ,  
এবং জিহ্বা বাহির করণ ; অতিশয় ক্ষুধা ; উৎফুল্লাভা, ও সর্বদা জ্বং হান্ত ; জড়বৎ  
মুখাকৃতি ; উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কা ; ভুক্তদ্রব্য বমন ও কোষ্ঠবদ্ধ ; সঞ্চলের লক্ষণ ।  
হুদ্রোগ ।—ডাঃ হেল বলেন যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার জনিত অনেকগুলি রোগে সচরাচর  
ব্যবহার্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে এই ঔষধে উপকার হওয়া সম্ভব । গুল্মবায়ু-গ্রস্তা, বা  
নিবৃত্তরজ্জাদিগের স্নায়বীয় হৃৎকম্পে ইহা উপযোগী । রজ-নিবৃত্তিকালের উত্তাপাবেশেও  
সঞ্চল সদৃশ-মত সম্ভব । বায়দিকেই ইহার অধিক প্রভাব দর্শে । ধমনী অপেক্ষা শিরামণ্ডলীই  
ইহার অধিক ক্রিয়ায়ত্ত । হৃৎপিণ্ডের শৈরিক পার্শ্বেই প্রধানতঃ সঞ্চলের ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া  
বোধ হয় । হৃৎপিণ্ডের স্নায়বীয় পীড়া ; আগমাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ ; হৃৎপিণ্ডের বেগের  
সবলতা ও উৎক্ষেপ, পরিশ্রমাস্তে বা পরিপাক-সময়ে উহার বিশেষ প্রাবল্য ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার  
পূর্ণতা ও তীব্রতা, সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের বিষমতা, আট দশবার শীঘ্র শীঘ্র, অনন্তর  
দীর্ঘে দীর্ঘে স্পন্দন ; ভক্তার ত্রায় হৃৎপিণ্ডের শব্দ, তৎসহ প্রবল ও বিষম হৃৎস্পন্দন এবং পৃষ্ঠ  
হইতে প্রবাহবৎ তাপের আবেশ ; বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত সদৃশ বেদনা ; বায় বক্ষে যাতনা ;  
অবরুদ্ধবৎ অসুভব, মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি ; বায় বাহ্য অবশতা, গোরল, ও শ্রান্তি, এবং  
হস্তাঙ্গুলীতে তারের ত্রায় চিড়িক ; গুল্মবায়ুর ত্রায় ভাব ; এইগুলি সঞ্চলের স্বদলক্ষণ । স্নায়ু-শূল ।  
কোন কোন প্রকার স্নায়বীয় বেদনায় পরিজ্ঞাত অস্ত্রাণ্ড ঔষধ অপেক্ষা সম্ভবতঃ সঞ্চল অধিক  
ফলপ্রদ । কখন কখন মুখমণ্ডল, বজ্জংস্থল, বা ডিম্বাশয়ের স্ত্রীত স্নায়ুশূলে প্রবল-প্রভাবশালী  
ঔষধগুলি বিফল হইলে পর কয়েক মাত্রা সঞ্চল প্রয়োগে এত শীঘ্র বেদনার বিরতি জন্মে যে  
দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় । ঠিক কোন কোন প্রকার স্নায়ুশূলে যে এই ঔষধ উপকারী  
তাঃ বলা সুকঠিন । কিন্তু স্নায়বীয় ধাতুর সজীব প্রকৃতির জ্বীলোকদিগের মধ্যেই এই প্রকার  
স্নায়ু-শূল দেখা যায় । পক্ষান্তরে স্লেমা-প্রধান-ধাতু ও হৃদ্য কোষ্ঠবদ্ধ বিশিষ্টা, গুল্মবায়ু-গ্রস্তা-  
দিগের মূত্র শিরোবেদনায় সঞ্চল উপযোগী নহে । একজন প্রসিদ্ধ রুস চিকিৎসক বলেন যে  
বায়ু ও রস প্রধানা, জন্মায়ুর রোগগ্রস্তা জ্বীলোকদিগের মধ্যে এক প্রকার বিশেষ স্নায়ু-শূল  
হয়, উহাতে বাসকুক্ষিদেহ বা বায়স্তনের নিম্নস্থ প্রদেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই বেদনা

এত উগ্র যে হৃৎ-শূলের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার সহিত সচরাচর হৃৎকম্পও বিद्यমান থাকে। জৈদ্র শ্বাসশূলে অনেক সময় শ্বসলের কয়েকবিন্দু অরিষ্ট মস্ত্রের তায় ক্রিয়া করে। এসম্বন্ধে সম্বল সিমিসিফুগা, পলসেটোলা, ও লিলিয়মের অনুরূপ। অত্যাশ্রয় রোগ।—গর্ভাবস্থার অস্থিরতায়; দীর্ঘকাল মদিরাপান জনিত অনিদ্রায়; ও পুরাতন বায়ু-নলী-ভুক্ত প্রদাহেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

## সাইপ্রিপিডিয়ম ।

মার্কিন্থে অটিপ্রকার সাইপ্রিপিডিয়ম জন্মে। ইহার ফুলগুলি দেখিতে চীনদেশীয় চটিকুতার তায় দেখায় একত্র ইংরেজীতে ইহাকে লেডিস স্লিপার কহে। সাইপ্রিপিডিয়ম পিউনিসেসসই হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট, এবং বীৰ্য সাইপ্রিপিডিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

স্বস্থশরীরে অধিক পরিমাণে ইহার ফাণ্ট বা উগ্র সার সেবন করিলে প্রথমতঃ মনের ও শ্বাসশূলের হৃষ্টতা জন্মে। অনন্তর একপ্রকার শান্তি ও অস্থিরতা উৎপন্ন হয়; তৎপরে মনের শান্তি ও গৌরব, এবং নিদ্রা-প্রবৃত্তি জন্মে। বহুকাল রোগভোগ ও অতিরিক্ত সবুজ চা বা কাফি পান করিয়া যেসকল স্ত্রীলোকের শ্বাসশূল ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহারা সাইপ্রিপিডিয়মের ফাণ্ট সেবন করিয়া থাকেন। এতদ্বারা অস্বাভাবিক উপদাহিতা দূরীকৃত হয় কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে পান করিলে ইহার মুখ্য ক্রিয়ায় যে উপদাহিতা ও হ্রাসিতা উপশমিত হয়, গৌণক্রিয়ায় তাহাই বিবর্জিত হইয়া থাকে। চা, কাফী, কোকা, প্রভৃতি সাইপ্রিপিডিয়মের সমস্ত সমগুণ ঔষধেরই এই ধর্ম দৃষ্ট হয়। এই সকল ঔষধের গৌণফলে যেসকল অবস্থা জন্মে সাধারণতঃ সেইসকল অবস্থায়ই ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—মাস্তিক-পৃষ্ঠবংশীয় শ্বাসশূলে, শ্বাসরূর বিধান-তন্তুর ধূসরাংশে সাইপ্রিপিডিয়মের ক্রিয়া দর্শে, এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বা প্রতিক্ষিপ্ত শ্বাসবীয় উত্তেজনায় ইহার ব্যবহার হয়।

অধিকার।—হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, শ্বাসবীয় শিরঃপীড়া, মদাত্যয়, অবসাদ-বায়ু, শ্বাসশূল, ও অস্থিরতা প্রভৃতিতে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই সকল রোগ অত্যন্ত তরুণ না হইলে এতদ্বারা উপশম ভিন্ন সম্যক আরোগ্য জন্মে না। গুরুতর অবস্থায় যে সকল ঔষধের ক্রিয়া প্রগাঢ় তাহাই প্রদোষ করা আবশ্যক করে। কিন্তু কোন কোন রোগে এই ঔষধে স্থায়ী উপকারও

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ ।

**অনিদ্রা ।**—ডাঃ লিলিয়েস্থাল বলেন যে অধিক রাত্রিতেও নিদ্রা না যাইয়া জাগ্রত থাকিয়া হাস্ত ও খেলা করা এবং নিদ্রাবস্থারও হাস্তকরা লক্ষণে বালকদিগের অনিদ্রায় সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয় । ডাঃ ফেরিংটন বলেন .যে নিদ্রা হইতে জাগিয়া অতিশয় প্রফুল্লভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খেলা করা ও পুনরায় নিদ্রা যাইতে অপ্রবৃত্তি দর্শান মস্তিষ্ক-রোগের পূর্ব লক্ষণ । এই প্রকার অনিদ্রায় যথা সময়ে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ভাবী মস্তিষ্ক-রোগ প্রতিবন্ধ হইতে পারে । ডাঃ হেল বলেন যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুলের ক্রিয়া-বিকার, অথবা মানসিক উত্তেজনা জনিত অনিদ্রা কয়েক বিন্দুমাত্রায় সাইপ্রিপিডিয়মের মাতৃকারিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম বারবার সেবনে স্বল্প দূরীকৃত হয় । পূর্বাপেক্ষা বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের অনিদ্রায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী । স্নায়বীয় অবসন্নতাজনিত, বিশেষতঃ জরায়ু-রোগ, অথবা দীর্ঘকাল রোগ-ভোগ বশতঃ দুর্বলীভূত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রায়ও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

**জননেন্দ্রিয়ের রোগ ।**—**শুক্র-মেহ ।**—অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদন ও চিন্তের অপ্রসন্নতা বিশিষ্ট শুক্রমেহে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয় । অতিরিক্ত ইঞ্জির-সেবা অথবা শুক্রমেহ জনিত মানসিক অবসাদ ও উপদাহিতায় ; এবং ক্লান্ত শুক্রমেহ, বা স্বপ্ন-দোষের কুফলচিন্তা জনিত মানসিক নিরাশিতায়ও এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

**রজোলোপ ।**—শুক্রবায়ু সহকারে রজোলোপে অতিশয় স্নায়বীয় দুর্বলতা ও নিরাশিতা লক্ষণে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবহৃত হয় । যোনির স্নায়ুশূল ।—কোপনতা ও চঞ্চল-চিত্ততা ; শুক্র-বায়ু ; নিদ্রাশূন্যতা, অস্থিরতা, এবং যোনির উপদাহিতা এই ঔষধের লক্ষণ ।

**শিরোবেদনা ।**—স্বথকর বিষয়েও অতিরিক্ত মনোনিবেশ বা উত্তেজনা বশতঃ অবসন্নতা, শিরোবেদনা বা অত্রবিধ বিশুদ্ধ স্নায়বীয় লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাইপ্রিপিডিয়ম ব্যবস্থা করা যায় ।

**অপস্মার ।**—প্রতিক্রিপ্ত স্নায়বীয় উপদাহ জনিত, স্নায়ু-শক্তির অবসাদন সম্ভূত ; এবং বালকদিগের মস্তিষ্কের উপদাহিতা হইতে উৎপন্ন অপস্মারে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

**মস্তিষ্কের উপদাহ ।**—আমাশয়ের বা অন্ত্রের উপদাহের প্রতি-ক্ষিপ্ততা বশতঃ মস্তিষ্ক উপদাহিত হইলে ও আক্ষেপ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা জন্মিলে সাইপ্রিপিডিয়ম অতিশয় ফলপ্রদ । এই রোগে ইহা প্রচলিত বেলেডোনা, হাইওসায়েরাস, ও ক্যামোমিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ব্রোমাইডস, ক্লোরাল, স্কটেলেরিয়া, ও কুপ্রম এসিটিকমের সমকক্ষ । ইহার মাতৃকারিষ্ট বা প্রথম দশমিক ক্রম কয়েক বিন্দুমাত্রায় বার বার প্রয়োগ করিতে হয় ।

দস্তোভেদ বা মানসিক উত্তেজনা বশতঃ সাংঘাতিক মস্তিষ্ক-বিপ্লী প্রদাহের পূর্বরূপ স্বরূপ শিশুদিগের যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার সংক্রান্ত উপদাহিতা উৎপন্ন হয় এবং যে উপদাহ পরিশেষে রক্ত-সঞ্চয় বা আক্ষেপাদিতে পরিণত হইয়া রোগীর ঔণ বিনষ্ট করে ও যাহার পূর্বলক্ষণরূপে শিশুর অন্ন নিদ্রা, রাত্রিতে জাগিয়া থাকিয়া হাস্ত ও ক্রীড়া আলোক ও গোলমালের আকাজ্জা প্রভৃতি প্রকাশ পায় সেই উপদাহ দূরীকরণে



সাইপ্রিডিয়ম উপযোগী । কিন্তু উপদাহ স্থায়ী হইয়া মস্তিষ্কের বা পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছের রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মিলে এতদ্বারা কোন উপকার দর্শে না । অপর, এই ঔষধে সন্নিপাত জ্বরের স্পন্দন, কম্পন, অস্থিরতাাদি উপসর্গে শাস্তি জন্মে ।

মাত্রা ।—শিশুদিগের পক্ষে ইহার প্রথম দশমিক বা দ্বিতীয় দশমিক শক্তির শুদ্ধ বটিকা অথবা চারী আউন্স তপ্তজলে দশগ্ৰেন মূলের ফাট ; এবং বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে মাতৃ-কারিষ্টের দশবিন্দু সাইপ্রিডিয়মের মাত্রা ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন ।—মনের ও স্নায়ুগুচ্ছের উৎফুল্লতা স্থিরতা বা মানসিক অবসাদ অনুভব । অধিক কথা বলা, এবং অধিক কাজ করিতে প্রবৃত্তি । মনের গৌরব অনুভব । সকল বিষয়ে, 'এমন কি অধ্যয়নে, কর্তব্য কর্মে, ও সামান্য শিষ্টাচারদিতে পর্যাপ্ত গভীর ওদাস্ত । অধ্যয়ন, চিন্তা, ও বস্তু-তাদি শ্রবন করিতে অশক্তি । অল্প অল্প নিদ্রা-প্রবৃত্তি । নিদ্রা-হীনতা সহ মস্তিষ্কের অল্প অল্প গৌরব ও পূর্ণতা । কোপনতা ; বিরক্ত-চিন্ততা ; সামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্বেক ; গুল্মবায়ুর ভাব । ০ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অথবা প্রতি-ক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ স্নায়ুর ধূসর পদার্থের রুগ্নতা । ০ মদাত্যয়ের মূছ আক্রমণ । ০ শুক্রমেহরোগে মানসিক বিষন্নতা । নিদ্রা ।—\*আলাপ-প্রবৃত্তি অথবা মনে নানা প্রকার আনন্দজনক ভাবোদয় সহকারে অনিদ্রা । \* শরীরের অস্থিরতা ; অঙ্গের স্পন্দন সম্বলিত নিদ্রাশূন্যতা । দেহ ।—গুল্মবায়ুজনিত উপসর্গ । ০ তাণ্ডব, ও প্রতিক্ৰিপ্ত অপস্মার । ০ শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ, বা অঙ্গের উপদাহ জনিত মস্তিষ্কের উপদাহ । ০ মস্তিষ্ক রোগের পূর্বরূপ, এবং তজ্জন্ম বাগকের নিদ্রা হীনতা, এবং রাত্রিতে হাস্য ও খেলা করা । ০ টাইফয়েড জ্বরে অঙ্গ-স্পন্দন ও কম্পন । চর্ম্ম ।—রসটল্লের বিষ-লক্ষণের স্থায় চর্ম্ম লক্ষণ । প্রত্যহ অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটার সময় চক্ষুতে কণ্ডুয়ন, জ্বালা, ও স্পর্শ-দেব, কিন্তু ক্ষীততা বা আরক্ততা নহে ।

সমগুণ ।—এষার, কোকা, স্কটেলেরিয়া, জিক্স, ভেলেরিয়ান, ব্রোমাইডস ।

### সায়েনাইড অব পটাসিয়ম

ফেরোসায়েনাইড অব পটাসিয়ম ও কার্বনেট অব পটাসিয়ম একত্র উত্তপ্ত করিয়া সায়েনাইড অব পটাসিয়ম প্রাপ্ত হয় । ইহার স্বাদ ও গন্ধ প্রসিক এসিডের স্থায়, কিন্তু একটু ক্ষারাক্ত । সায়েনাইড অব পটাসিয়ম অত্যন্ত তীব্র বিষাক্ত পদার্থ । ইহার বিষ ক্রিয়া অনেকটা হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সদৃশ । তিন গ্রেণেই এতদ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয় ।

একজন স্ট্রীলোক ১২ গ্রেণ সায়েনাইড অব পটাসিয়ম খাইয়া বজ্রাহতের ভ্রায় পতিত হয় এবং ৪০ মিনিটে তাহার মৃত্যু হয়। হাইড্রোসায়েনিক এসিডে এক মিনিটের ন্যূন সময়েও মৃত্যু ঘটে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে দশগ্রেণ পরিষ্কৃত জলে একগ্রেণ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ইহার মাদার টিঞ্চার প্রস্তুত হয়; তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত জলে, এবং তদুর্দ্ধে উগ্র এলকোহলে ইহার ক্রম ( ডাইলিউশন ) প্রস্তুত হইয়া থাকে। সায়েনাইড অব পটাসিয়মকে কখন কখন সায়েনিউরেট অব পটাসিয়মও বলে।

রক্তের অভ্যন্তর দিয়া মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের স্নায়ু-কেন্দ্রে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের অপরোক্ষ ক্রিয়া এবং ফুসফুসে ও হৃৎপিণ্ডে পরোক্ষ ক্রিয়া দর্শে। সম্ভবতঃ ফুসফুসের ক্রিয়ায় যথোপযুক্ত স্নায়বীয় প্রভাবের অভাব বশতঃ প্রথমে শ্বাসক্রিয়া স্থগিত হয়; অনন্তর, ফুসফুস হইতে রক্তের চলাচল রহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়। স্নতরাঃ শ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। এজন্ত মৃত্যুর পরে মস্তিষ্ক, ও ফুসফুসাদিতে শৈরিক রক্তসঞ্চয় দেখা যায়। শ্বাস-রোধের পূর্বে অচৈতন্ত জন্মে। মস্তিষ্কে রক্তের অভাব বশতঃ এই অচৈতন্ত উৎপন্ন হয় না, বিধেয় অব্যবহিত পক্ষাঘাতজনক প্রভাবই উহা জন্মিয়া থাকে। সদৃশমতে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের পরীক্ষা-লক্ষণে সায়েনাইড অব পটাসিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। পটাসিয়ম মিশ্রিত থাকাতে কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না, বরং ক্রারের অতিরিক্ত লক্ষণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতা সায়েনাইডের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান আয়মিক প্রয়োগ।

রক্তসঞ্চয় ।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় রক্তসঞ্চয়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর সাংঘাতিক বা সঙ্কটস্থচক অচৈতন্ত ( কোমা ) জন্মিলে; অথবা শৈরিক রক্তসঞ্চয় জনিত সংশ্রাস রোগের আক্রমণে রোগীর সহসা পতন হইলে সায়েনাইড অব পটাসিয়মে উপকার দর্শিতে পারে। স্নায়ু-শূল ।—( ১ ) অক্ষি-গহ্বর ও হনুর্দ্ধদেশে যন্ত্রণাপ্রদ স্নায়বীয় শিরোবেদনা; প্রতিদিন একই ঘণ্টায় বেদনার উপস্থিতি, ও বদনের সেইদিকের অভিশয় আরক্তরাগ। ( ২ ) শঙ্খদেশ, ক্র-তোরণ ও হনুর্দ্ধদেশে স্নতীত্র স্নায়বীয় বেদনার আক্রমণ তৎসহ সংশ্রাস রোগাক্রান্তের ভ্রায় চিৎকার ও দৃষ্টতঃ চৈতন্তের বিলোপ; নাড়ীর ৮০ বার স্পন্দন, মুখ-মণ্ডলের আরক্তরাগ। ( ৩ ) শঙ্খদেশে ও বাহু হস্তর উদ্ধাংশে তীত্র স্নায়বীয় বেদনা, প্রত্যহ পূর্বাঙ্ক চারিটার সময় বেদনার উপস্থিতি, পরদিন পূর্বাঙ্ক দশটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ন চারিটার সময় বিরতি; মধ্যাহ্নী সময়ে ক্ষুধাহীনতা, জ্বর, শিরঃপীড়াদি। ( এই প্রকার বেদনা আর্সেনিক, কুইনাইন, এট্রোপিয়া, চেলিডোনিয়ম, ও নব্র-ভমিকা ব্যবহারেও আরোগ্য হইয়াছে কিন্তু বেদনার আবেশের আকস্মিকতা ও উগ্রতা থাকিলে সায়েনাইড সুব্যবহেয় )। এই তিন প্রকার স্নতীত্র ও সবিরাম স্নায়ু-শূল এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। এই সকল বেদনার, ও অন্ত্যাক্ত রোগে

সায়েনাইডের প্রথম শততম ক্রমের বিচূর্ণের এক গ্রেণের অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে; বিরামকালে এক ছই ঘণ্টা, ও রোগের আবশ্যকালে পনের মিনিট অন্তর এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বালকদিগের পক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শততম ক্রম ব্যবহৃত হয়। গলনলীর-রোগ।—এই ঔষধের লক্ষণে “বিবমিষা, তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গল-রোধ অনুভব, তৎপরে অধিক পরিমাণ বমন” আছে। অতএব গলনলীর আক্ষেপিক রোগে উহার পক্ষাঘাত বশতঃ আক্ষেপান্তে বমন হইলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাঃ হেল বিবেচনা করেন আকস্মিক স্ত্রীতর আনাশয়-প্রদাহেও সায়েনাইডে উপকার দর্শিতে পারে। শ্বাস-রোধ।—ফুসফুসে শৈরিক রক্তসঞ্চয় বশতঃ শ্বাস-রোধের আশঙ্কায়; কাসের তীব্র আবশ্য সময়ে শ্বাস রোধ লক্ষণাপন্ন হৃৎপিণ্ড কাশে; অপর হৃদ্রোগজনিত, ও কোন কোন প্রকার রাসিকালীয় আবেশিক কাসে এই ঔষধে উপকার করে। হৃদ্রোগ।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকারে, পর্যায়ক্রমে ধীর, ও বিষম নাড়ী এবং হৃৎকম্প লক্ষণে ডাঃ হেল কয়েকবার সায়েনাইড ব্যবহারে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বিধান-বিকার বিশিষ্ট হৃদ্রোগে ও শ্বাসবীয় লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে এই ঔষধ উপকারী। শৈরিক রক্তসঞ্চয়ের প্রবণতা এবং ওষ্ঠ ও ত্বকের ঈষৎ নীলবর্ণ ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—আকস্মিক অচেতনতা। মস্তক।—মস্তকে অকস্মাৎ তীব্র বেদনা। শিরোগুর্ণন ও মস্তকে ভারবোধ। মস্তকের পশ্চাৎভাগে অতিশয় বেদনা। মস্তকের শ্বাসশূল। বদন, চক্ষু, ও কর্ণ।—শ্বাসবীয় শিরোবেদনাসহ মুখমণ্ডলের আরতরাগ। স্থির চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা; অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। কর্ণে শব্দ। আমাশয়।—গলার আকুঞ্চন। আমাশয়ে তীব্র জ্বালা। বিবমিষা, তৎসহ তরল দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলে গল-রোধ অনুভব, তৎপরে প্রতৃত বমন। বক্ষঃস্থল।—দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণে অশক্তি, অথচ কোন প্রকার নির্দিষ্ট বেদনার অভাব। প্রশ্বাস ধীর ও আয়াসিত। ০ বিরক্তিকর কাস, তজ্জন্তু নিদ্রার ব্যাঘাত, ক্ষুধার আঘাতে বক্ষঃস্থলে ঘনগর্ভ শব্দ। প্রশ্বাসের ক্ষীণতা, কেশ ঘর্ষণ-ধ্বনি ও বায়ুনলী-ভুজের ধ্বনি। হৃৎপিণ্ড।—ধনুষ্ঠকারের আক্ষেপে হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবার দশ মিনিট পরে সমস্ত শরীরের সর্বাস্থান আক্ষেপ। দেহ-কাণ্ড ও দেহ-শাখা।—দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক, ধাতুষ্কারিক শুষ্কতা, তৎসহ অঙ্গ-কম্প। সন্ধিস্থলের ত্বক বিদারণ ও রক্তক্ষরণ; নখ ও নখ-মূল পর্য্যন্ত সেই প্রদাহের প্রসারণ। হস্তের কোমলাংশের অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষত ও উহাতে অতিশয় বেদনা। সর্বাস্থান আক্ষেপ; চক্ষের স্থিরতা ও আকুঞ্চন। ০ তরুণ সন্ধিবাত।

সমগুণ—এসি-হাইড্রোসা, এমিগ, প্রুস, লরোস, ডিল্লি।

## সায়েনিউরেট অব মারকিউরি।

ষোলভাগ জলে দুইভাগ ফেরো-সায়েনিউরেট অব পটাসিয়ম দ্রবীভূত করিয়া এবং তাহাতে তিনভাগ শুষ্ক পারসলফেট অব মারকিউরি সংযোগ করিয়া সায়েনিউরেট অব মারকিউরি প্রস্তুত হয়। পরিমাণ করিয়া একভাগে কুড়িভাগ ৮০ ডিগ্রীর এলকোহল সহযোগে ইহার মাদারটিকার ও সাধারণ নিয়মানুসারে বিচূর্ণ প্রস্তুত করা যায়।

সায়েনিউরেট অব মারকিউরি প্রায় সায়েনাইড অব পটাসিয়মের স্থায় বিযাক্ত। যদিও এতদ্বারা পটাসিয়মের স্থায় তত সহসা মৃত্যু হয় না, কিন্তু রোগীর তদপেক্ষা শতগুণ তীব্র বর্ণণা জন্মে। সায়েনিউরেট অব মারকিউরি দ্বারা বিযাক্ত হইলে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সমস্ত বিষ লক্ষণ, অধিকন্তু কেরোসিন মারকিউরির ভয়ঙ্কর ফল প্রকাশ পায়। উপর এতদ্বারা অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারের ডিপথিরিয়া রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

ডিপথিরিয়া।—ডাঃ হেল বলেন যে সায়েনিউরেট অব মারকিউরির মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের বিষ-লক্ষণে ক্ষতসংযুক্ত সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া রোগের প্রতিকরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব ডিপথিরিয়া রোগে রোগের আক্রমণের আকস্মিকতা ও উৎকটতা থাকিলে সর্বোপরি এই ঔষধ নির্বাচিত হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, আকুঞ্চিত কণী-নিকা, মুচ্ছা, অচেতনতা, বমন, অতিসার, ও অশ্রুস্থানের শৈথিল্যকর ঝিল্লীতেও ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি; এই সকল আনুবাদিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সিকাগো নগরের ডাঃ বার্ট লিখিয়াছেন যে, কি মুহূর্ত কি উৎকট সকল প্রকার ডিপথিরিয়া রোগেই পূর্বরূপ হইতে পরিণাম পর্যন্ত সায়েনাইড অব মারকিউরি উপযোগী। সেণ্ট-পিটার্সবার্গ নগরের ডাঃ ভিলার্স এই ঔষধ দ্বারা প্রায় একশত ডিপথিরিয়ার রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন; ইহাদের একজনেরও মৃত্যু হয় নাই। তিনি বলেন যে সায়েনাইড অব মারকিউরি প্রয়োগে ডিপথিরিয়ার সকল রোগীই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। বার্লিন নগরের ডাঃ ট্রাঙ্কার এতদ্বারা অনেকগুলি ডিপথিরিয়ার রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ মার্সী লেখেন যে পনিরের স্থায়, বা মধুচক্রাকার ছিদ্রাঙ্কিত কৃত্রিম ঝিল্লী দ্বারা গল-গহ্বর (ফসিস) পূর্ণ; ও অতিশয় অবসন্নতা দি থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে সায়েনাইড অব মারকিউরি ডিপথিরিয়া রোগের একটা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় দুর্বলতা বা সাংঘাতিকতা বিশিষ্ট রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সায়েনাইড অব মারকিউরি হাইড্রোসায়েনিক এসিড ও মারকিউরির সংযোগে প্রস্তুত। সুতরাং ইহাতে হাইড্রোসায়েনিক এসিড থাকাতে যে সকল রোগীর প্রথম হইতেই অতিশয় অবসন্নতা থাকে তাহাদের রোগে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী হয়। নাড়ীর দ্রুততা; এমন কি ১৩০ বা ১৪০ বার স্পন্দন; কিন্তু উহার আয়তনের অভাব; কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রথমে তালু ও তালু-

মূল আবৃত করিয়া অবস্থিতি ও শুভ্রবর্ণ; অনন্তর সমস্ত গ্রন্থি সকলের ক্ষীণতা ও তখন কৃত্রিম ঝিল্লীর মলিনবর্ণ, এবং পচিবীর আশঙ্কা; অত্যন্ত দুর্বলতা; শ্বাসে দুর্গন্ধ; জিহ্বার কপিশবর্ণ, বা ( উৎকট রোগে ) কৃষ্ণবর্ণ; ক্ষুধাশূন্যতা; ও সঙ্কটস্থচক নাসিকার রক্তস্রাব প্রভৃতি এই ঔষধের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণে সায়েনাইড অব মারকিউরি বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল উল্লেখ করেন যে ক্রিয়ার তীব্রতায় ডিপথিরিয়ার অল্প কোন ঔষধই ইহার সমতুল্য নহে। তবে কালী-কষ্টিকম, কালী-বাইক্রমিকম, ও ল্যাকেসিস ইহার অনেকটা সদৃশ বটে। বালকদিগের পক্ষে ইহার বর্ষ ও বয়সদিগের পক্ষে তৃতীয় শততম ক্রমের নিম্নে এই ঔষধ ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। কেবল এই ঔষধ বা এতৎ সহকারে ক্লোরাইড অব লাইমের কুলি ( চারি আউন্স জলে এক ড্রাম লাইকার ক্যালসিস ) এক্ষণ ভয়ঙ্কর ডিপথিরিয়া রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ডাঃ এলেন বলেন যে \* গল-গহ্বরের উগ্র আরক্ততা, ও গলাধঃকরণে অতিশয় আয়াস; সমগ্র গল-গহ্বরের উপর এবং গল-মধ্যের নিম্ন পর্য্যন্ত কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রসারণ; পচা গ্যাংগ্রীণবিশিষ্ট ডিপথিরিয়া, তৎসহ বিগলিত ক্ষত; এবং \* অতিশয় দুর্বলতা; মারকিউরিয়স সায়েনাইডের লক্ষণ। তিনি ইহাও বলেন যে যখন এই ঔষধ ব্যাপক আকারে প্রকাশিত ডিপথিরিয়ার লক্ষণের সাদৃশ্যে অমোঘ ঔষধরূপে স্থিরীকৃত হয় তখন অত্যন্ত অমোঘ ঔষধের হ্রাস প্রতিষেধক স্বরূপও ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ক্রুপ। —ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় অর্থাৎ কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট সাংঘাতিক ক্রুপ রোগে গাঢ়, রজ্জ্ববৎ নিষ্ঠীবন; শ্বাসকূচ্ছ, সংযুক্ত কর্কশ, কুসুরববৎ, ক্রুপ রোগের কাস লক্ষণে সায়েনাইড অব মারকিউরি প্রয়োগে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় কিন্তু সর্বদা হয় না। ডাঃ হেল বলেন যে ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি বায়ু-পথে সম্প্রসারিত হইয়াই ক্রুপের এই সকল লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। বৃক্কক রোগ।—ক্যালো টিনা ও ডিপথিরিয়ার পরবর্তী কৃত্রিম ঝিল্লিবিশিষ্ট বৃক্কক-প্রদাহে, ও এম্‌মিউরিয়ায়ও এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারে। রক্তাতিসার।—অতিশয় অবসাদ, পচা রক্তাক্ত বিরেচন, মলদ্বারে কৃত্রিম ঝিল্লির উৎপত্তি, ক্ষত, কোথ এবং পরিশেষে হিমাক্ত ও মৃত্যু লক্ষণাপন্ন সাংঘাতিক রক্তাতিসারেও সায়েনাইড অব মারকিউরির অল্পরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা। চৈতন্য-বিলোপ; মুছাঁ। সর্কাস্ট্রীন দুর্বলতা। মস্তক।—শিরোগূর্ণন ও কর্ণে জ্বালা সহকারে শিরঃপীড়া। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও শীর্ণতা; নীলাভা। নাসিকা হইতে অধিক রক্ত স্রাব। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের নীলবর্ণ। চক্ষু।—নিমগ্ন চক্ষু। আকৃষ্ণিত কনীনিকা। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—জিহ্বার পাণ্ডুবর্ণ ও উহার মূলে পীতভ রেখা; ক্ষীণতা প্রান্তর্যাগের আরক্ততা। \* গল-মধ্যের বন্ধুর দৃশ্য; গল-কোষের আরক্ততা ও কৈশিকা

নাড়ীতে রক্ত-সঞ্চয়; দস্ত-মূলের ক্ষীণতা, ও একপ্রকার শুভ্রবর্ণ সংলগ্ন স্তরে আচ্ছন্নতা, উহার নিম্নে বেণুগি রঙ্গের প্রান্তভাগ । \* তালু ও তালু-মূলে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ স্তর; দক্ষিণ গালের অভ্যন্তর ভাগে একটা গোলাকার ক্ষত, সেই ক্ষতের নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ; প্রান্তভাগ কণ্ঠিতবৎ ও অতিশয় লোহিত বর্ণে পরিবেষ্টিত । \* গল-মধ্যের কৃত্রিম বিল্লী বিশিষ্ট প্রদাহ । \* ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গালের অভ্যন্তরভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, এবং উহার উপরে ধূসরাভ শুভ্র আচ্ছাদন । গল-মধ্যের শৈল্পিক বিল্লীর অতিশয় আরক্ততা । সমগ্র গণ্ড-গহবরের প্রদাহ । লালানিঃসরণ, এক প্রকার পাতলা, দুর্গন্ধি, অবদরণকর শ্রাব । গিলিতে অতিশয় আয়াস । ০ কৃত্রিম বিল্লীবিশিষ্ট স্বরস্র ( ক্রুপ ) । ০ পচা ক্ষত সংযুক্ত সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া । আমাশয় ।—বিবমিষা, বমন, ও বারবার আতিসারিক মল-নিঃসরণ তৎসহ শরীরের তুষারবৎ শীতলতা । পেয় দ্রব্য তখনই উল্লীর্ণ । আমাশয়ে জালা অল্প ভব । গলার প্রবল উপদাহ সহ বিবর্জিত পিপাসা । সবুজবর্ণ স্লেয়া বমন । প্রবল উদগার । চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত অবিরত হিষ্কা । উদর ।—উদরে অল্প অল্প বাতনা । উদরের প্রচণ্ড বেদনা, প্রতিবার মলত্যাগে উহার বৃদ্ধি । উদর-বেদনা, তৎপরে কঠিন মল, অনন্তর কোমল মল নিঃসরণ । মল ও মলদ্বার ।—রক্তাক্ত তরল মল । দুর্গন্ধময়, সবুজ ও চকচকে আতিসারিক মল । আর্দ্র ও তুষার-শীতল গাত্র সহকায়ে দুর্দম্য প্রভূত অতিসার । বারবার মল-প্রবৃত্তি, মলত্যাগের পূর্বে ও মলত্যাগ কালে কুহন; স্বপ্ন ও রক্তমিশ্রিত মল । ( অবি-রক্ত বমন সহকারে ) অতিশয় মল-প্রবৃত্তি, তৎপরে তরল মল নিঃসরণ । মলিন বর্ণ মল । মল-ত্যাগের চেষ্টায় বিস্তৃত কাল রক্তশ্রাব । সরলান্ত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ নিঃসরণ, উহার গ্যাংগ্রিণের স্রাব গন্ধ, ও উহা লাগিয়া কাপড়ে বড় বড় কাল দাগ । বসিবার সময় সরলান্ত্রে বেদনা, মলদ্বারের চারিদিকেও বেদনা, মলদ্বারের ক্ষীণতা । মলদ্বারের চতুর্দিকে অর্শবলী, ও উহার শৈল্পিক বিল্লীর গ্রন্থিবৎ ক্ষীণতা । গালের স্রাব মল-দ্বারের চারিদিকেও ডিপথিরিয়া জনিত ধূসরাভ স্তর । ০ সাংঘাতিক বা গলিত রক্তাতিসার । মুত্র-যন্ত্র ।—পাঁচদিন পর্যন্ত মুত্রস্তম্ভ । মুত্রনাশ । পীতবর্ণ মুত্র; মুত্রত্যাগে কষ্ট । পল্লি-দ্বার, কিন্তু স্বল্প মুত্র । স্বল্প ও মলিন মুত্র । মুত্রাশয়স্থ মুত্রের অতিশয় অণুলালময়ত্ব । ০ ব্রাইটস ডিজিজ । জনন-যন্ত্র ।—উপস্থের মলিন বর্ণ, ও অর্দ্ধোখিত অবস্থা । অণুকেথের মলিন বর্ণ । হৃৎপিণ্ড ।—নাড়ী ক্ষুদ্র ও অবসন্ন, স্পন্দন ৭৬ । নাড়ী সবলতর ও ক্ষততর, স্পন্দন ৯০ । নাড়ী দুর্বল, স্পন্দন ১৩০, তৎসহ শরীর-শাখার শীতলতা ও মুখমণ্ডলের নীলবর্ণ । নাড়ীর স্পন্দন ( কেবল একবার ) ১০২, প্রাতে বিষমগতি । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের প্রচণ্ডতা ও কক্ষিততা । হৃৎপিণ্ডের তীব্র আকুঞ্চন, উপরে হাত রাখিলে হাত প্রতিক্ষেপণ । নিম্নান্ত্র ।—বাম জজ্বা-পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা, শিরার রজ্জুদ্বয়ের স্রাব আকুতি ও উহার গুল্কের সমীপে সংমিলন; অত্যন্ত স্পর্শে উহাতে অত্যন্ত বেদনা; জজ্বার অতিশয় ক্ষীণতা । দেহ ।—সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা, মুচ্ছা, শরীরের তুষারবৎ শীতলতা । অত্যন্ত

অবসন্নতা, বাববার বমন, হিকা। অতিশয় শীত শীত অনুভব। লঘু আক্ষিপিক সঞ্চালন বশতঃ শরীর শাখার চঞ্চলতা।

সম্মুখণ।—এরম ট্রিফ, কষ্ট, হিপার, কালী-বাইক্রম, কালী-কষ্ট, মার্ক-আইওড, ফাইটো, মিউর-এসি, ল্যাকেসিস।

## সারাসিনিয়া পারপুরিয়া।

সারাসিনিয়া বা পিচার প্লাণ্ট একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ। ইহা আমেরিকায় জন্মে। সারাসিনিয়ার মূলের অরিষ্ট; এবং সমগ্র বৃক্ষের ফাঁট প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা বসন্তের প্রারম্ভের স্থায় জ্বর, অস্থি-বেদনা ও অঙ্গ-গ্রহ জন্মে; সুতরাং বসন্ত রোগের পীড়কা উদ্ভব কালীন ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এই ঔষধ বসন্তরোগে আরোগ্যকর ও প্রতিষেধক; আবার কেহ কেহ একেবারেই ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না। বাস্তবিক অস্ত্রাপিও বসন্তে সারাসিনিয়ার আরোগ্যকারিতা অবিসম্বাদিত ও সুনিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। ডাঃ হেল বলেন যে বসন্তরোগে সারাসিনিয়ার উপকারিতার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণগুলি সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া তিনি বিশ্বাস করেন যে বসন্তে এই ঔষধের বিশেষ আরোগ্য-শক্তি আছে। এতদ্বারা পীড়কার ভোগ-কালের অল্পতা ও তীব্রতার হ্রাসতা জন্মে, এবং কোন উৎকট উপসর্গ উপস্থিত হয় না বলিয়া বোধ হয়। অর্দ্ধ আউন্স মূল ও পত্র আট আউন্স তপ্ত জলে ভিজাইয়া ফাঁট প্রস্তুত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক চামচ; অথবা দুই ঘণ্টা অন্তর নিম্ন শক্তির কয়েক বিন্দু অরিষ্ট সেবনে এই ঔষধ দ্বারা বসন্তের চিকিৎসায় কৃতকার্যতা লাভ হয়। ডাঃ মার্সী বলেন যে বসন্তের যুহু আক্রমণে, জ্বরের অল্পতার বিঘ্নমানে সারাসিনিয়া প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। পীড়কাগুলি শুষ্ক হইয়া যায় ও রোগের ভোগকাল ধর্ম হয়। ডাঃ লিলিয়েছাল লেখেন যে বসন্তে সারাসিনিয়ার কোন বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ নাই। তবে উৎকট রোগে ইহার ফাঁট ব্যবস্থা করা ঘাইতে পারে। পূর্বে আমেরিকা ও ইউরোপের এলোপ্যাথোও বসন্ত রোগে সারাসিনিয়া বিস্তর ব্যবহার করিতেন। এতদ্বারা প্রথমতঃ পীড়কা উৎপন্ন, অনন্তর পুয়োৎপাদন প্রতিক্রম হইত; এবং যাহাদের টিকা হয় নাই তাহাদের বসন্ত উপবসন্তে পরিণত হইত। লণ্ডনের বসন্ত-চিকিৎসালয়ে এই ঔষধে কোন উপকার না দর্শাতে এক্ষণ আর এলোপ্যাথেরা সারাসিনিয়া ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ ইহার ১৫ ও ৩০ ক্রম ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত রোগেও সারাসিনিয়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অতিসার।—প্রাতঃকালীন অতিসার; উদর-বেদনা সহ উদরের ক্ষীণতা; মলতাগাণ্ডে শ্রান্তি, মলিন বর্ণ, অনেক সময় বা রক্তমিশ্রিত মল; মলের হর্গন্ধ বা যুগনাভীর গন্ধ। শ্বেতপ্রদর।—জলবৎ বা দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর, গাঢ়,

ঈষৎশুভ্র, দুর্গন্ধ শ্রাব, তৎসহ জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা ; জরায়ুর অর্কদ বা শোথ জনিত ক্ষীততার আয় ক্ষীততা ও স্পন্দনকর বেদনা ; জরায়ুর দক্ষিণ পার্শ্বের কোষপূর্ণবৎ ক্ষীততা ; জরায়ুর গ্রীবার ক্ষীততা ও উত্তপ্ততা ; ভগ্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ ও উত্তাপ ; ঋতু-কাল ভিন্ন অল্প সময়ে, যথা, রজোনিবৃত্তিকালে রক্তাক্ত শ্রাব-নিঃসরণ । যক্ষ্মা ।—সোরা-ধাতু-দোষ সংস্পৃষ্ট যক্ষ্মা ও বায়ুনলীর রোগ ; ফুসফুস হইতে রক্ত উঠা, গাঢ় কাস ; স্বরযন্ত্রে ও বায়ুনলীতে অবিরত কণ্ঠ্যন ; বমনেচ্ছা ও বমন সংযুক্ত কাস, শ্বাস-রোধের আবেশ ও নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব ; কঠিন কাস, কাসিতে বৃকে ও অস্ত্রে ঝাঁকি লাগা, এবং থানিকটা আঠা আঠা আঁশ আঁশ তিক্ত, পচা, তৈলাস্বাদ জমাট শ্লেষ্মা উষ্ণিয়া গেলে কাসের বিরতি । চর্ম্ম-রোগ ।—ক্রষ্টা-ল্যাফ্টিয়া, ফ্রাইগো প্রভৃতি জর-বিবর্জিত পচ্যমান উদ্বেদ ।

## সিনেমোনম—সিনেমন—দারুচিনি ।

লরেসী জাতীয় এই চিরহরিৎ বৃক্ষ সিংহল দ্বীপে জন্মে । ইহার বন্ধলের স্থল চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

### ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ ।

মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর রেখা-পরিশৃঙ্খল পেশীতে সিনেমনের ক্রিয়া দর্শিয়া রক্ত-শ্রাব জন্মে । একত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জরায়ুর রক্তশ্রাবে, রক্ত \* প্রভূত ও উজ্জল লোহিতবর্ণ থাকিলে, সিনেমোনম ব্যবহৃত হয় । ডাঃ ই, ডারউইন জোন্স লিখিয়াছেন যে সিনেমন টী ( দারুচিনির কাথ ) পান করাতে একজন বালকের অস্ত্র হইতে উজ্জল-লোহিত পরিষ্কার রক্তপাত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তাহার নাকদিয়াও রক্ত পড়িয়াছিল । এলোপ্যাথেরা সিনেমন রক্তবহা নাড়ী ও স্নায়ুমণ্ডলীর সাধারণ উত্তেজক বলিয়া মনে করেন, এবং এতদ্বারা সমীকরণ-ক্রিয়া প্রবর্তিত হয় বলিয়া উল্লেখ করেন । সিনেমন অসব-বেদনা প্রবর্তিত ও অধিক রক্তশ্রাব প্রশমিত করে, একত্র এই উদ্দেশ্যে কখন কখন আর্গেটের পরিবর্তে ইহার প্রয়োগ হয় ।

সমস্তণ ।—ইরিজ্যরণ, ইপি, মিলি, শ্রাবিনা ।



## সিফলাইনঃম ।

সিফলাইনঃম রোগজ্ঞ ঔষধ । উপদংশের বিষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয় ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

বেদনা ।—\* \* অন্ধকার হইতে দিবালোক পর্য্যন্ত বেদনা ; গোধূলী সময় হইতে আরম্ভ ও দিবালোকে পরিসমাপ্তি ( মার্ক, ফাইটো ) । ক্রমে ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস ( ট্রাণ ) ; স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা, তজ্জন্ত রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্তন করিতে হয় । \* \* রাত্রিতে সমস্ত লক্ষণের আতিশয্য ( মার্ক ) ; সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি । উদ্বেদ ।—নিশ্বেজ, আরক্ত, তাম্রবর্ণচিহ্ন, শীতল হইবার সময় নীলবর্ণধারণ । সর্ব শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা ( এত্রোট, আইওড ) । হৃৎপিণ্ড ।—রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডের ভূমিদেশ হইতে শিখর-দেশ পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বেদনা ( শিখর হইতে ভূমি পর্য্যন্ত, মেডো ; ভূমিদেশ হইতে কণ্ঠস্থি, বা স্বক পর্য্যন্ত, স্পিজি ) । মন ।—স্মৃতিহীনতা ; পুস্তক, ব্যক্তি ও স্থানের নাম স্মরণ রাখিতে পারা যায় না, গণিতের গণনা করায় আয়াস জন্মে । অমুভূতি ।—যেন উন্মাদ হইবে ; যেন পক্ষাঘাত জন্মিবে, এরূপ অল্পভব ; ঔদাস্ত অল্পভব । নিদ্রা ।—নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা জন্মে বলিয়া রাত্রির ভয়ঙ্কর ভয় ; উহা সহ্য হয় না, বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ হয় । জাগরণান্তে অবসন্নতাজনিত ভয়ঙ্কর যাতনার আশঙ্কা ( ল্যাক ) । প্রদর ।—প্রদর ; \* \* প্রভূত শ্রাব, \* নেকড়া ভিজিয়া, গুড়মুড়া পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়ে ( এলম ) । শিরঃশীড়া ।—স্নায়বীয় প্রকৃতির শিরঃশীড়া, উহাতে রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ও প্রলাপ ; অপরাহ্ন চারিটার সময় আরম্ভ, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আতিশয্য এবং দিবালোকে নিবৃত্তি ( রাত্রি ১১ বা ১২টার সময় বিরতি, লাই ) ; \* \* কেশ-পতন । চক্ষু ।—নবজাত শিশুদিগের তরুণ চক্ষু-প্রদাহ ; চক্ষুর পাতার ক্ষীণতা, নিদ্রাকালে উহার সংযোজনা ; রাত্রিতে বেদনার তীব্রতা, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য ; প্রভূত পূষ নিঃসরণ ; শীতল জলে প্রক্ষালনে উপশম । অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত । উপরের তীর্যক্ পেশীর পক্ষাঘাত ; চক্ষুর পাতা অবনত হইয়া থাকিতে নিদ্রিতের জ্বায় দৃষ্ট হয় ( কষ্ট, গ্রাফ ) । যুগল-দৃষ্টি, এক প্রতিক্রপের নিম্নে অল্প প্রতিক্রপ দৃষ্ট হয় । দন্ত ।—দন্ত-মূলের প্রান্তভাগে দন্তের ক্ষয় প্রাপ্তি ও ভাঙ্গিয়া পড়া ; দন্তে গর্ত হইয়া যাওয়া, উহার প্রান্তভাগ করাতের দাঁতের জ্বায় কাটা-কাটা ; দন্তের আকৃতির ঋকতা প্রাপ্তি, অগ্রভাগগুলির একই বিন্দুর অভিমুখে গতি ( ট্রাক ) । স্পৃহা ।—\* বে কোন আকারে \* \* এলকোহল পানের আকাঙ্ক্ষা । পিতৃদোষ জনিত মদিরা-দোষের প্রবণতা ( এসার, সোরি, টিউবার, সল, সল-এসি ) । মল ও মলহার ।—অনেক বৎসর ব্যাপী হৃদয় মল-ক্লেশ ; সরলজ সংরুতি ( ট্রাকচার ) দ্বারা অপরূপ বোধ হয় ; পিচকারী দিলে মল-নিঃসরণের যাতনা প্রসব-বেদনার জ্বায় অল্পভূত হয় ( ল্যাক-ডি, টিউব ) । মলদ্বারে ও সরলাঙ্গে

বিদ্যায় ( ফিসার ) ( খুজা ) ; সরলান্ন বাহির হইয়া পড়া ; উপদংশের পূর্ব-বৃত্তান্ত, রোগের দুর্দম্যতা । স্বক্ক । — স্বক্ক-সন্ধি, বা স্বক্কের ত্রিকোণ পেশীর সংযোগ-স্থলে আমবাত, বাহু পার্শ্বের দিকে উঠাইলে উহার আধিক্য । ( রসটঙ্গ । — দক্ষিণ স্বক্ক, শ্রাস্ত, বাম, ফির ) । উপযোগিতা । — উপদংশ রোগে অত্যন্ত সুনির্বাচিত ঔষধেও স্থায়ী উপশম বা উপকারের অভাব । উপদংশ-গ্রস্ত যে সকল রোগীর কঠিন উপদংশ ( শ্রাস্তার ) স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়াছে, এবং উহার ফলস্বরূপ বাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত গলার ও চর্শ্বের রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, অস্ত্র কোন ঔষধের সহিত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য না থাকিলে, চিকিৎসার প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রায়ই তাহাদের উপকার দর্শে । উপচয় । — \* রাত্রিতে, গোধূলী সময় হইতে দিবালোক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ।

স্বক্ক । — অস্থি-রোগে ও উপদংশীয় পীড়ায় অরন, এসাফ, কালী-আই, মার্ক ও ফাইটোর সহিত সমগুণ স্বক্ক ।

## সিম্ফাইটম ।

সিম্ফাইটম অফিসিনেল অস্থির উপঘাতের উপযুক্ত ঔষধ । যথা, চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অন্ধি-গহবরের অস্থি উপহত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় । অস্থি-ছেদের পর ছিন্ন অস্থির অবশেষাংশের উপদলিতা দূরীকরণেও সিম্ফাইটম ব্যবহার করা যাইতে পারে । এতদ্বারা ভগ্নাস্থিও মিলিত হয় । এবং কণ্টক-বেধনব্যব বিশেষ বেদনার লাঘব জন্মে । ডাঃ জার বলেন যে ইহার ত্রিশ ক্রম আত্যন্তরিক ও মূল অরিষ্ট-সিক্ত পটি বাহু-প্রয়োগ করিলে ভগ্নাস্থি সংযোজিত হয় । কশেরুকার রোগ বশতঃ কটিক্রণ, হুহুর অস্থিরপ্রদাহ, ও আভিঘাতিক অস্থিবেষ্টের প্রদাহেও এই ঔষধে উপকার দর্শে । ইহার ২ ও ৩ ক্রম ব্যবহৃত হয় । সম্ভ্রবণের ( উণ্ড ) আরোগ্যের পরবর্তী অস্থি-বেষ্টের স্পর্শ-ঘেবে ; এবং অস্থি-ভগ্নে বেধনব্যব ( প্রিকিং ) বেদনায় আর্গিকায় পরে সিম্ফাইটম ভাল খাটে ।

## সিয়েনোথস এমেরিকেনাস — নিউ জার্সি টী ।

এই ক্ষুদ্র গুল্মের নামান্তর সিয়েনোথস বার্জিনিয়ানা । ইহার মূল লোহিতবর্ণ বলিয়া ইহাকে রেড্‌রুটও বলে । ইহা আমেরিকায় উৎপন্ন হয় । বিগত আমেরিক বিপ্লবের সময় চীনদেশীয় চা না পাওয়াতে সিয়েনোথসের পাতা চাৰ্ণ পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল এজন্য ইহাকে জার্সি-টী কহে । ইহার পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় ।

## প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

প্লীহা ।—প্লীহার এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে । প্লীহার প্রদাহ ও বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । পুরাতন প্লীহারোগে প্লীহা কঠিন হইলে সিয়েনোথস ব্যবহারে প্লীহাতে বেদনা জন্মে এবং উহা কোমল হইয়া সত্ত্বর স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় । পুরাতন প্লীহারোগে, বামপার্শ্বের পঞ্জরাস্থির নিম্নের ক্ষীততায় ; অতিশয় কর্তনবৎ বেদনা,—শীতল ও আর্দ্রত্বভূতে বৃদ্ধি, এবং রোগীর সর্বদা শীত শীত অনুভব লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েস্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন । ডাঃ ডনহাম বলেন যে তাঁহার পরিচিত একজন চিকিৎসক সিয়েনোথস প্রয়োগ করিয়া একব্যক্তির অতিশয় বিবর্দ্ধিত প্লীহা আরোগ্য করিয়াছেন । ডাঃ বার্ণেট এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কতকগুলি প্লীহার রোগী আরোগ্য করিয়াছেন । সিয়েনোথসের প্রধান প্রদাহ লক্ষণে যে সকল আরোগ্যকর লক্ষণ উল্লেখিত হইয়াছে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতেই ডাঃ হেল সেইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন । ডাঃ বার্ণেট বলেন যে প্লীহার বিবর্দ্ধন নিশ্চিত করিতে না পারিলেও বামকুক্ষিদেহে গভীর-মূল বেদনা লক্ষণে ইহা প্রয়োগকরা উচিত । তিনি সচরাচর একবিন্দু মাত্রায় ইহার প্রথম দশমিক বা শততমিক ক্রম এবং কখন কখন মাদার টিংচার ব্যবহার করেন । প্লীহার উপরে ইহার অরিষ্টের বাহুপ্রয়োগও হইয়া থাকে ।

শ্বেতপ্রদর ।—প্লীহার আনুষঙ্গিক শ্বেতপ্রদরেও এই ঔষধ ফলপ্রদ । ডাঃ মার্সী উল্লেখ করেন যে বাম কুক্ষিতে বেদনা বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদরে ইহা ব্যবহার্য্য । ডাঃ হানসেন বলেন যে কুক্ষিস্থলে প্রতিনিয়ত বেদনা, প্রভূত রজঃ, ও পীতবর্ণ প্রদর ইহার লক্ষণ ।

## প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মন । অন্ন অন্ন প্রফুল্লতা । মুখ-মধ্য ।—০ জরাস্ত্রে মুখ-ক্ষত । স্তম্ভপায়ী শিশুদিগের মুখের উপক্ষত । শ্বাস-যন্ত্র ।—০ পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ । জননেন্দ্রিয় ।—০ শ্বেতপ্রদর । প্রমেহ । উপদংশ । দশ দিবস পূর্বে প্রভূত রজঃনিঃসরণ । দেহ ।—শীত ও ক্ষুধাহীনতা সহ অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা । স্নায়ু সকল কম্পিত অনুভব, এবং একদিন আহারকালে ছুরি ও কাটা ধরিতে অপারগতা । প্রধানতঃ পৃষ্ঠের নীচে শীতানুভব । শীত কম্পন । উদর ।—তরল মল নিঃসরণ । প্লীহা ।—০ প্লীহার অতিশয় বৃদ্ধি । ০ প্রবল বমন, বামপার্শ্বে বেদনা, নিষ্টিবনবিশিষ্ট কাস, অধিক ঘর্ম্ম, ও জ্বরলক্ষণাগ্ন প্লীহা-প্রদাহ । অতিশয় জ্বর, কাস, বামপার্শ্বে বেদনা, এবং অঙ্গুলীর আঘাতে সেই পার্শ্বে ঘন গর্ভ শব্দ । ০ পুরাতন প্লীহা প্রদাহ । বামপার্শ্বে পঞ্জরাস্থির নিম্নে পুরাতন ক্ষীততা এবং উহাতে অতিশয় কর্তনবৎ বেদনা ; শ্বাস-কষ্ট, শীতল ও আর্দ্রকালে উহার আধিক্য ও রোগীর শীত শীত অনুভব । দীর্ঘস্থায়ী তীব্র শীত । অধিকাংশ সময় অগ্নির নিকটে থাকিতে হয় । শীতকাল সমাগমে ভীতি । গ্রীষ্মকালে রোগী অনেকটা ভ্রম থাকে,

কিন্তু গ্নীহার ক্ষীততা, শীত শীত অনুভব ও বেদনা যদিও দূর হয় না, তথাপি উষ্ণ ঋতুতে উহাতে তত কষ্ট হয় না। বামপার্শ্বে গ্নীহাশ্রদেশে তীব্র বেদনা। ০ বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা ও সেইস্থানে বৃহৎ ক্ষীততা। ০ সমস্ত কুক্ষিব্যাপী স্রুবহৎ গ্নীহা। ০ গ্নীহার প্রাচীন বিবর্দ্ধন। ০ বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা বিশিষ্ট পাণ্ডু। ০ বামকুক্ষিতে বেদনা বিশিষ্ট জরায়ুর রক্তস্রাব। ০ পুরাতন গ্নীহা, শীত, ও শ্বেতপ্রদর। ০ কয়েক মাস বামপার্শ্বে বেদনা, ও দক্ষিণপার্শ্বের শিরঃপীড়া। ০ বামপার্শ্বে উগ্রবেদনা ও পূর্ণতা, এবং সেই পার্শ্বে শয়নে অসমর্থতা।

## সিরেসস বার্জিনিয়ানা।

এই মার্কিন গুল্মের ইংরেজী নাম চোক-চেরি। ইহাতে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের উপাদান, ট্যানিন, ও সিল্কোনার দ্বারা একপ্রকার তিক্ত বীৰ্য্য বিद्यমান আছে। ইহার শীতল ফাণ্টই উৎকৃষ্ট প্রয়োগ-রূপ; অন্তর্ভবনের অরিষ্টও প্রস্তুত হয়।

মস্তকে গৌরব অনুভব। \* ভ্রুক্ৰদ্যবোর অল্পভজনক অগ্নিমান্দ্য। মুখ-প্রসেক সম্বলিত বিমন্দ পরিপাক-ক্রিয়া। ০ দুর্বল, সবিরাম নাড়ীসহ ক্ষুধাহীনতা। ০ শুক্রমেহজনিত দুর্বলতা। ০ হৃদ্রোগজনিত কাস। ০ হৃৎপিণ্ডের বিষম ও সবিরাম ক্রিয়া, ও বেগের ক্ষীণতা। হৃদ্ধি, ও হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ। দ্রুত, ও বিষম নাড়ী। ০ জ্বর বা অল্প কোন দুর্বলতাজনক রোগের পর, বিশেষতঃ হৃদ্রোগে, দুর্বল্য। ০ যক্ষ্মা। বিলেপীজর। ০ সবিরামজ্বর (যাপাকর)। ০ ক্ষত। গণ্ডমালা। এইগুলি চোক-চেরির লক্ষণ।

ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহার শীতল ফাণ্ট দুই ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেকবার হৃৎপিণ্ডের বিষম ও সবিরাম ক্রিয়া, বেগের ক্ষীণতা; এবং হৃদ্রোগ সংশ্লিষ্ট কাস আরোগ্য করিয়াছেন। কোন রোগের আরোগ্যানুথ অবস্থায় নাড়ীর দ্রুততা ও দুর্বলতায়; যক্ষ্মারোগে; এবং প্রসারণ সংযুক্ত হৃদ্ধিতে সিরেসস উপশমপ্রদ। আমাশয়ের অল্প সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে; মুখপ্রসেকবিশিষ্ট ধীর পরিপাকে; ও ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতিতে ডাইলিউট এলকোহলে প্রস্তুত ইহার অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ। এই সকল রোগে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও উপদাক্ষিতা থাকিলে এই ঔষধ অধিকতর উপকারী। হৃদ্ধিতে, অথবা প্রকৃতজ্বর বিद्यমানে ইহার নিম্নক্রম ব্যবহৃত্য নহে। অধিক পরিমাণে সিরেসসের ফাণ্ট সেবনে হৃৎপিণ্ডের সবলতা জন্মিয়া মস্তকের পূর্ণতা ও গুরুতা উৎপন্ন হয়। অতএব এই সকল লক্ষণে ডাঃ হেলের মতে এই ঔষধের উচ্চক্রমই উপযোগী।

## সিলফিয়ম ল্যাম্বিনিয়েটম ।

সিলফিয়ম ল্যাম্বিনিয়েটমকে ইংরেজিতে কম্পাস-প্লান্ট বা দিগ্‌দর্শন তরু বলে । ইহার নিম্নতর পত্রগুলির প্রান্তভাগ সর্বদাই উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে থাকে বলিয়াই এরূপ নাম । সিলফিয়ম আমেরিকার তৃণাবৃত প্রান্তরে জন্মে । ইহার রসে অধিক পরিমাণে ধূনা আছে । সিলফিয়মের পত্রের অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । সিলফিয়ম কোপেবা, টপেন্টাইন, ও কিউবেবসের সম্মুখ । ষ্ট্রাণ্ড ও শ্রামুকসের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে ।

সিকাগো নগরের ডাঃ হল এই ঔষধ আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন । এতদ্বারা গল-গহ্বর ও গল মধ্যের অবদরণ, কণ্ডুয়ন, ও উপদাহ, বিবমিষা, ও উদরোর্ত্তদেশে শূণ্যতাহু-ভব; থক্‌থক্‌ করিবার ও গলা চাঁচিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি, এবং পাতলা আঠাআঠা শ্লেষ্মা নিষ্টিবন লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল । উপদাহ নাসা-পশ্চাতের রক্তদ্বয়ে প্রসারিত হইয়া নাসা-পথের শ্লেষ্মিকঝিল্লী আক্রমণ করিয়াছিল । তাহাতে হাঁচি, তৎপরে নাসিকা হইতে পরিষ্কার, বিদাহী শ্রাবনিস্রবণ, এবং তৎসহকারে অক্ষিগহ্বরের উর্দ্ধদেশে একপ্রকার আকুঞ্জন ও প্রচাপন জন্মিয়াছিল । গলার অভ্যন্তরের শ্লেষ্মিকঝিল্লীর যতদূর দেখা যায় ততদূর রক্ত-সঞ্চিত ও স্থূল হইয়াছিল ; পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাবী একপ্রকার কক্কশ কাসও ছিল । একরূপ আক্কেপিক কাসসংযুক্ত ফুসফুসের আকুঞ্জন ; জিহ্বার জীবৎ শুভ্র আঠাআঠা লেপ, ও তপ্তবোলা দ্বারা দগ্ধবৎ পরিশুদ্ধতা অনুভব ; বারম্বার স্বপ্ন ও আরক্ত মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগকালে মূত্রদ্বারে জালা ; স্বাভাবিক আকারের মল, কিন্তু শুভ্র আঠাআঠা এক-প্রকার শ্লেষ্মা দ্বারা উহার আচ্ছন্নতা ; আভ্যন্তরিক জ্বরাহুভব, অথচ নাড়ীর অক্ষততা ; এবং ক্ষুধাহীনতা ; এই সকল লক্ষণ ও প্রকাশ পাইয়াছিল ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**খাস ( যাজমা ) ।**—অধিক পরিমাণে রক্তবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; গলার অভ্যন্তরে অবদরণ ও কণ্ডুয়ন অনুভব ; বিবমিষা ও শূণ্যদরতা অনুভব ; ফুসফুসের আকুঞ্জন ও অবিরত কাসিবার প্রবৃত্তি ; সিলফিয়মের লক্ষণ । সকল প্রকার খাস-রোগেই ইহা ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । **কাস ।**—গল-গহ্বর ও গল-মধ্যের অবদরণ, কণ্ডুয়ন, ও উপদাহ ; বিবমিষা, ও উদরোর্ত্তদেশে স্পর্শ-দ্বেষ ; অবিরত থক্‌থক্‌ ও গলা পরিষ্কার করা, কিন্তু কেবল পাতলা আঠা আঠা শ্লেষ্মানিষ্টিবন ; হাঁচি, তৎপরে নাসিকা হইতে পরিষ্কার বিদাহী শ্রাবনিস্রবণ, এবং তৎসহকারে অক্ষি-গহ্বরের উর্দ্ধদেশে এক প্রকার আকুঞ্জন ও প্রচাপন ; পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাবী কাস ; ফুসফুসে আকুঞ্জন ও অশিথিলতা, অবিরত কাসি তুলিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি ; আক্কেপিক কাস ;—এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । **ইনফ্লুয়েঞ্জা ।**—পূর্কোক্ত কাসাদি লক্ষণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও সিলফিয়ম ব্যবহৃত হয় । **বক্ষ্মা ।**—দড়িদড়ি কেশা কেশা, ধূসর বা পীতবর্ণ অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্টিবন, ও ভজন্ত

শীত শীত শীর্ণতা প্রাপ্তি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন যে যক্ষ্মারোগে প্রভূত পরিমাণ, ধূসর বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ ও তজ্জন্ত রোগীর দুর্বলতা লক্ষণে তিনি সিলফিয়ম সর্কোয়াক্ট ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি প্রথমে ইহার দ্বিতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ এক বা দুই গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করেন; তৎপরে নিম্নোক্ত কম পড়িলে ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাঃ হেল সিলফিয়মের অরিষ্ট তত ফলোপধায়ক মনে করেন না এবং তৃতীয় ক্রমের উপরে বিচূর্ণও ব্যবহার করেন না। পূর্বোক্তোক্ত রোগগুলিতে তিনি দশ বৎসর এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

**প্রতিশ্রায়া।**—ডাঃ হেল বলেন যে প্রাতিশ্রায়িক রোগ ও শৈল্পিক বিল্লীর রোগেই এই ঔষধের অধিকার দৃষ্ট হয়। সকল শৈল্পিক বিল্লীই ইহার ক্রিয়াধীন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রাতিশ্রায়িক শ্বাস, পুরাতন বায়ুনলী-ভূজ-প্রদাহ, শ্বাস-যন্ত্রের প্রতিশ্রায়া, মুত্রাশয়ের প্রতিশ্রায়া, এবং প্রেমহাদি রোগে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এই সকল রোগের তরুণ অবস্থায় উচ্চক্রম; ও পুরাতন অবস্থায় নিম্নক্রম উপযোগী।

## স্ট্রাণ্টোনি।

স্ট্রাণ্টোনি কম্পোজিটি জাতীয় আর্টিমিসিয়া কণ্ট্রী বা ওয়ারম সীড বৃক্ষের মঞ্জরীজাত বীৰ্য। এই বৃক্ষকে স্ট্রাণ্টোনিকা বা সিনাও বলে। ইহা এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় জন্মে। আলোক-সংস্পর্শে স্ট্রাণ্টোনিদের শুভ্রবর্ণ দানা পীতবর্ণ হয়, একত্র উহা অন্ধকারে রঞ্জিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে স্ট্রাণ্টোনি বিচূর্ণীকারে প্রস্তুত হয়।

তিন গ্রেণের অধিক মাত্রায় স্ট্রাণ্টোনি দ্বারা বিবসিয়া, বমন, তৎসহ উদর-বেদনা, অতিশয় পিপাসা, শিরোগূর্ন, ও প্রভূত অভিসার জন্মে। কাহার কাহার অতি অল্প মাত্রায়ই এতদ্বারা বিযাক্ততা উৎপন্ন হয়। বসন্ত রোগ হইতে আরোগ্যান্থ ছয়মাস বয়স্ক একটা বালকের তিন গ্রেণের স্থলে পাঁচগ্রেণ স্ট্রাণ্টোনিক এসিড সেবন করিতে দুই মাস পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত ছিল। দুই বৎসর বয়স্ক অপর একটা সুস্থ বালক দুইগ্রেণ স্ট্রাণ্টোনি সেবন করিয়াছিল। পনের মিনিটের মধ্যে তাহার আক্ষেপ জন্মিয়াছিল এবং এক ঘটিকার মধ্যে সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল রক্তসঞ্চিত, চক্ষু স্পন্দিত, অকিতারা প্রসারিত ও আলোকস্জ্ঞানপরিশূন্য, মুখ ফেলিল, দন্ত সংরুদ্ধ, শ্বাস সশব্দ, এবং উর্দ্ধাঙ্গ সময়ে সময়ে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাঃ হফম্যানও স্ট্রাণ্টোনিকার অতিক্রিয়া বশতঃ দুইজন রোগীর সঙ্কটমুহুর্ত মস্তিষ্ক-লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অতএব এলোপ্যাথিমাত্রায় (বালকের পক্ষে এক হইতে তিনগ্রেণ, ও প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তিন হইতে আট গ্রেণ) স্ট্রাণ্টোনি

প্রয়োগ সকলের পক্ষেই নিরাপদ নহে। অধিক মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিতে হইলে সাবধানে ব্যবহার করাই কর্তব্য।

ক্রিয়া।—সিনার ছায়, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্রতর। আণ্টোনিনের দশম-ক্রম দিনার প্রায় তৃতীয় ক্রমের সমান। যথোপযুক্ত মাত্রায় আণ্টোনি অস্ত্রের কুমি বিনাশক এবং সদৃশমতে ইহা কুমিজ্ঞানিত প্রতিকিষ্ট উপদাহ নিবারক। চক্ষে ও মস্তিষ্কেও এই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—কুমি; দৃষ্টিক্ষীণতা ও দৃষ্টিহীনতা; বিদগ্ধদৃষ্টি (কোটারাক্ট), মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় ও মস্তিষ্ক-বিল্লীর প্রদাহ প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান আয়ুর্গিক প্রয়োগ।

কুমি।—আণ্টোনি কুমি। মহীলতার ছায় কুমি বিনাশে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সূত্রকুমি বিনাশে ইহার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, পটুকুমি (টেপওয়ারম) বিনাশে তদপেক্ষাও কম। এক চামচ মিষ্টীকৃত দুগ্ধে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ দুই বা তিন গ্রেণ শূতোদরে, অথবা প্রত্যেক বার আহারের পূর্বে সেবন করিলে কয়েক দিবসের মধ্যেই কুমির লক্ষণ দূরীভূত হয়। মলে সকল সময় কুমি দৃষ্ট হয় না। আমাশয়ে কুমি মরিলে প্রায়ই জীর্ণ হইয়া যায়, তবে রোগীর অতিসার থাকিলে মলে কুমি বা কুমির অংশ দেখা বাইতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের পক্ষে আণ্টোনিনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহ্যেয়। সূত্রকুমিতেও আণ্টোনি সময়ে সময়ে উপকার করে। কিন্তু সেবন ও মলদ্বারে পিচকারী দিলেও সূত্রকুমি দূরীকৃত ও তাহাদের বৃদ্ধি নিবারিত হয়। অর্দ্ধ বা এক আউন্স শূকরের বসায় কয়েক গ্রেণ নিম্নতর ক্রমের আণ্টোনিনের বিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এক একবার পিচকারী দিলে সূত্রকুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। বালকদিগের মধ্যে অনেক সময় কুমির লক্ষণের ছায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অথচ বমন-বিরেচনে কখনও কুমি দেখা যায় না। এই সমস্ত লক্ষণের কতকগুলির মস্তিষ্কের উপদাহের লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব কুমির বিঘ্নমানতা সুরক্ষিত না হইলে এই সকল লক্ষণে অধিকমাত্রায় আণ্টোনি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। কারণ, বৃহৎ মাত্রায় আণ্টোনি সেবনে মস্তিষ্কের তীব্র উপদাহ, ও আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এই সকল অবস্থায় উচ্চ বা মধ্যক্রমের সিনা বা আণ্টোনি ব্যবস্থা করা উচিত। কথিত আছে যে ক্যাষ্টার অয়েলে দ্রবীভূত করিয়া আণ্টোনি প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা অতি সত্ত্বর মহীলতার ছায় কুমি বিনষ্ট ও বিনির্গত হয়।

জ্বর।—অস্ত্রে কুমি থাকিলে বাজকদিগের জ্বর বিবর্তিত হয়। একরূপ অবস্থায় কয়েক মাত্রা আণ্টোনিনের প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারে উপদাহের কারণ প্রশমিত হইলে অত্যন্ত ঔষধ ভাল কাজ করে ও সহজে জ্বর আবেগা করিতে পারে।

শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জরেও জর ক্রমি জন্মই হউক অথবা আমাশয়ান্ত্রের উপদাহ বশতঃই হউক, এই ঔষধে উপকার দর্শে।

**মস্তিষ্ক-রোগ।**—বমন, প্রলাপ, এবং মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট কোন কোন প্রকার শিরঃপীড়ায় স্ট্রাণ্টোনিং ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক-বিল্লীর প্রদাহেও ইহা উপযোগী হওয়া সম্ভব।

**চক্ষু-রোগ।**—স্ট্রাণ্টোনিংয়ের অতিক্রিয়া বশতঃ দর্শন-হ্রাসের ( অপটিকনার্ড ) এক প্রকার পক্ষাঘাত জন্মিয়া নানা প্রকার দৃষ্টি-বিকার জন্মে। এজন্ম এতদ্বারা দৃষ্টিক্ষীণতা ও দৃষ্টিহীনতা আরোগ্য হয়। একজন সম্পূর্ণ অন্ধ বুদ্ধকে ক্রমির জন্ম স্ট্রাণ্টোনিং সেবন করান হইয়াছিল; তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তিও কতকটা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া দ্বায়বীয় দৃষ্টিক্ষীণতা বিশিষ্ট ৩৬ জন রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ২৭ জন সম্যক বা প্রায় আরোগ্য লাভ করে, এবং অবশিষ্ট ৯ জনের বিশেষ কোন উপকার দর্শে নাই। নয়জন বিদগ্ধদৃষ্টি ( ফুলি ) রোগগ্রস্ত রোগীকেও স্ট্রাণ্টোনিং ব্যবস্থা করা হয়, তাহার চারিজনের আরোগ্য লাভ হয়, অত্যাচারের কোন উপকার দর্শে নাই।

**মূত্রযন্ত্রের রোগ।**—রাত্রি মূত্রবেগ; রাত্রিকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ; মূত্রকষ্ট; মূত্রক্লেচ্ছ; ও অব্যবহৃত মূত্র বা মূত্র-ক্লেচ্ছ, এক একবার কয়েক বিন্দুমাত্র হরিতাভ মূত্র-পাত-সহ পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ রোগও এতদ্বারা নিবারিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন মূত্রাশয় প্রদাহগ্রস্ত কয়েকজন রোগী এই ঔষধে সুন্দর আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ক্রমি জন্ম অনিচ্ছায় দিবসে ও রাত্রিতে শিশুদিগের মূত্র-পাতেও ইহা ফলপ্রদ। অত্যাচার সহ-পানে সহজে দ্রবণীয় বলিয়া সম্প্রতি স্ট্রাণ্টোনিংয়ের পরিবর্তে স্ট্রাণ্টোনেট অভ সোডা অধিক ব্যবহৃত হয়।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন।**—\* প্রলাপ সহকারে জরের মূহ আবেশ। \* অতিশয় অস্থিরতা সহকারে বিশৃঙ্খল প্রলাপ। \* নিরুৎসাহিতা ও স্বীয় কার্য্য করিতে অপারগতা। \* অপস্মারের শ্রায় আক্ষেপ। মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা, ভ্রমিবৎ অনুভব, আলস্ত, অবসন্নতা।

**মস্তক।**—বমন সহকারে প্রবল শিরঃপীড়া। অত্যন্ত বিবদ্ধিত আকারে তীব্র শিরঃপীড়া। মস্তকের অবশতা। দক্ষিণ শাখে মূহ বেদনা। মস্তকের সম্মুখভাগে তীব্র বেদনা। মস্তকের পশ্চাভাগে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম; সম্মুখভাগে অধিকতর আঠাআঠা ঘর্ম্ম; মস্তকের অতিশয় উত্তপ্ততা। মস্তকে অস্বাভাবিক অনুভব ও বেদনা। মস্তিষ্কোদক রোগের শ্রায় ক্রমিজন্মিত মস্তিষ্ক-লক্ষণ। ০ বর্ণ-বিভ্রম সংযুক্ত মস্তকের পশ্চাভাগের শিরঃপীড়া ( হানসেন )।

**চক্ষু।**—পীতক লোহিত দেখায়; সকল বস্তু হরিদ্রাবর্ণ দেখায়; সকলই বেগুণি বর্ণ দৃষ্ট হয়; ছায়ায় শ্রায় দৃষ্টি। নাসিকা ও ওষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ সহকারে নিমগ্ন চক্ষু। প্রদীপ্ত চক্ষু এবং অক্ষিপুটের আক্ষেপিক সঞ্চলন। দৃষ্টিবিলোপ; বাপসাদৃষ্টি;



ত্রমিবৎ অল্পভব। কনীনিকার প্রসাষণ, এবং দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য। চক্ষুর আক্ষেপিক স্পন্দন। মন্থা, ভূত হাঁটার শ্রায় দেখায়। ০ দ্বারবীর দৃষ্টিক্ষীণতা। ০ ছানি। ০ আকস্মিক বাপসা দৃষ্টি সহকারে চক্ষুর অতিরিক্ত অল্পভূতি ও রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ সূচীজীবনীদিগের। ০ এষিওপিয়া। ০ দুই চক্ষুর ছানি। ০ বর্ণাক্রান্ত। ০ রেটিনার নীরন্ততা। ০ পীতদৃষ্টি। ০ আহারান্তে সহসা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, মর্দনে উহার অল্পকাল স্থায়ী উপশম।

**নাসিকা।**—অতিশয় হ্রগন্ধ অল্পভব; গন্ধ-বিভ্রম। নাসিকার চারিদিকে নীলাভ পাণ্ডুরতা; নাসিকার কুঞ্চিত আকৃতি। \* অতিশয় নাসা-কণ্ডুয়ন; শিশু নাসা ঘর্ষণ করে; ও নাসায়ন্ত্রে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করে।

**মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলের ক্ষীততা ও রক্তসঞ্চয়; ওষ্ঠ ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক সঞ্চলন; মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন। মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্ত রাগ। কুঞ্চিত ও বিকৃত মুখাকৃতি।

**মুখ-মধ্য ও ওষ্ঠ।**—মুখমধ্যের কুঞ্চিত আকৃতি। ওষ্ঠের অতিশয় ক্ষীততা। তিক্ত আশ্বাদ; মুখে ক্ষেণ। মুখ-মধ্যে ও ওষ্ঠে জ্বালা ও হলবেধ অল্পভব। মুখ ও নাসিকার চারিদিকে নীলাভ পাণ্ডুরতা। দন্তের উপরে ওষ্ঠের আকৃষ্টতা। স্বাদ বিভ্রম।

**গল-মধ্য।**—\* গল-রোধ অল্পভব, সময়ে সময়ে উহার অতিশয় প্রাবল্য; সম্যক ক্ষুধাহীনতা। \* শুষ্ক, থকথক কাশ, স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে কণ্ডুয়ন। অবিরত পিপাসা।

**আমাশয়।**—আমাশয়ে যাতনা; বিবমিষা, ও বমন। ঈষৎ পীতবর্ণ, আঠা আঠা শ্লেষ্মা বমন। তীব্র শিরোবেদনা, শিরোগূর্ণন, প্রসারিত অক্ষিতারা এবং অস্বাভাবিক দৃষ্টি সহকারে বমন। ০ ক্রমিজনিত বমন—দীর্ঘকৃমি প্রভৃতি বমন। \* আহার করিলে দূর হয় এক্রপ বিবমিষা। আমাশয় ও পার্শ্বে তীব্র বেদনা, তৎসহ বমন। আহারান্তে বিবর্জনলীল বিবমিষা, আমাশয়িক বিশৃঙ্খলা। অতীব দপদপকর বেদনা, মস্তক অবনত করিলে উহার বৃদ্ধি। ক্ষীততা ও স্পর্শ-দেব। আমাশয় গহ্বরে প্রচাপন। বমন, বিরচন ও অবসন্নতা। আমাশয়-গহ্বরে অতীব বেদনা। ০ ক্রমিরোগ \* আমাশয়ের ক্ষীততা।

**উদর ও অন্ত্র।**—কোষ্ঠবদ্ধ ও মুহু বিরচকের আবশ্যকতা। উদরে অতীব দপদপকর বেদনা। উদরের অতিশয় অল্পভবাধিক্য, ক্ষীততা, কিন্তু কোমলতা। উদরে সূতীব্র বেদনা, তৎসহকারে প্রভূত \* অতিসার। জলবৎ, স্তরসংযুক্ত, দ্রুগন্ধি মল। ০ শক্ত বা নরম, ক্ষীত উদর বিশেষতঃ ক্রমিরোগে। ০ ক্রমিজনিত পীড়া (অন্যদ্বিতে ক্রমি)।

**মূত্রযন্ত্র।**—সর্বদা মূত্রের এক প্রকার বিশেষ হরিষ্রণ অথবা কমলালেবুর বর্ণমিশ্রিত হরিষ্রণ। ০ অতিশয় মূত্র-প্রবৃত্তি সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ; প্রত্যেকবার কয়েকবিন্দু মাত্র মূত্র নিঃসরণ। ০ পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ। ০ মূত্রনাশ। ০ অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব। ০ মূত্রকৃচ্ছ। স্বল্প মূত্র তৎসহ ইষ্টক চূর্ণের দ্বারা অধঃপতিত পদার্থ। রাত্রিতে শয্যা

মূত্রতাগ । ০ হৃৎবৎ মূত্র । মূত্র-পথে জ্বালা, দাহ, আবেগ, ও অন্ত্রাশ্রয় অসুখ অনুভব ।  
০ মূত্রে কীটাদি বিশেষের অবস্থিতি ।

ত্বক্ ।—ত্বকে জ্বালা । শরীরে পীড়কার উৎপত্তি । ত্বকের মৃতদেহের স্রাব বর্ণ ।

জ্বর ।—০ নাড়ীর অতিশয় দ্রুততা ও গাত্রে ঘর্ষণশূন্য জ্বালাকর উদ্ভাপবিশিষ্ট প্রবল জ্বর । নাড়ীর ক্ষীণতা । ০ ক্রমি-জ্বর । ০ ক্রমিজ্বলিত স্বপ্ন-বিরাম-জ্বর ।

নিদ্রা ।—অতিশয় অস্থিরতা, এক একবার কেবল কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র নিদ্রা । অস্বাভাবিক জাগ্রততা ; উদর-বেদনা জন্ম নিদ্রাভঙ্গ । অস্থির নিদ্রাকালীন মূত্র প্রলাপ প্রকাশ । ক্রমিবশতঃ অস্বাভাবিক নিদ্রা ; অপিচ রাত্রিতে দন্ত কড়মড়, শয্যায়া মূত্রতাগ, ভয়ে ক্রন্দনাদি লক্ষণ ।

জিহ্বা ও দন্ত ।—লেপাবৃত জিহ্বা । \* গাঢ় লোহিত, লেপাবরণ-পরিশূন্য জিহ্বা ।  
\* নিদ্রাকালীন দাঁত কড়মড়ি, ও দাঁত কপাটি ।

উর্দ্ধাঙ্গ ।—হস্ত ও বাহুর আক্ষেপিক সঞ্চালন । উর্দ্ধাঙ্গের উৎক্ষেপ । হস্তের শীতলতা ।

নিম্নাঙ্গ ।—অতিশয় অস্থিরতা সহকারে শাখার শীতলতা । শরীরের পায় বক্রতা, ও জজ্বার পশ্চাৎ দিকে বক্রতা ।

সমষ্টি ।—আর্টিমিসিয়া, চেনোপোডিয়ম, কারকিউবিটা, সিনা, ফিলিক্সমাস, গেল-লিমিনম, কসো, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়ম ।

## শ্যালিসিলিক এসিড ।

স্পাইরিয়া আলমেরিয়ার ফুল, গলথেরিয়ার তৈল, শ্যালিসিন, ইণ্ডিগো, ও ফেনোল হইতে শ্যালিসিলিক এসিড প্রস্তুত হয় । ইহার অন্ন মধুব স্বাদ । এতদ্বারা গল-মধ্যের উপদাহ জন্মে । শীতল জলে অত্যন্ত, উত্তপ্তজলে তদপেক্ষা অধিক ; এবং এককোহলে জল অপেক্ষা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে ইহা দ্রবীভূত হয় । হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থ শ্যালিসিলিক এসিডের বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

বিশ-ক্রিয়া ।—দশগ্রেণ মাত্রায় শ্যালিসিলিক এসিড সেবন করার অব্যবহিত পরেই একব্যক্তির অতিশয় ঘর্ম হইতে থাকে । আরও দুইমাত্রা সেবন করাতে তাঁহার ঘর্ম এতই বর্ধিত ও শক্তি এতই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে চতুর্থমাত্রা ঔষধও দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্তু তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া তিনি চতুর্থমাত্রাও সেবন করেন । চতুর্থমাত্রা সেবনের পরে তাঁহার বমন ও অতিশয় ঘর্মগ্রস্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হয় । সন্ধ্যা রাত্রি সেই বমন ও শিরঃপীড়া বর্তমান থাকে । প্রাতঃকালে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন এবং মধ্যে মধ্যে উঠে-থরে কাতরোক্তি করিতে থাকেন । কেবল মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার চৈতন্যোদয়

হয়, তখন উপস্থিত চিকিৎসকদিগের নিকটু তিনি “আমার মাথা, আমার মাথা” এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন । চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না, এবং প্রথম মাত্রা ঔষধ সেবনের সময় হইতে চল্লিশ ঘটিকার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

শ্রালিসিলিক এসিডের অতিক্রিয়া বশতঃ সাধারণতঃ অতিঘর্ষ, ও অতিশয় অবসন্নতা জন্মে ।

হোমিওপ্যাথিক ব্যবহারার্থে বিপুল একোহলে ইহার প্রথম দশমিক ও অন্ত্যন্ত ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে । তরুণ আমবাতে অধিক মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিতে হইলে ছয় বা আটগ্রেণ, একড্রাম গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায় । পায়িমিয়ার সমপরিমাণ গ্লিসিরিণ ও ব্রাণ্ডী বা হুইস্কি মদিরায় শ্রালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয় । এই গ্লিসিরিণ মিশ্রের একড্রামে আটগ্রেণ এসিড দ্রবীভূত হয়, এবং এতদ্বারা ইহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক ক্রমও প্রস্তুত করা যাইতে পারে ।

সহস্রভাগ জলে একভাগ শ্রালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিলে জলের পচন নিবারিত হয় সুতরাং এতদ্বারা বিগলিত জীব ও উদ্ভিদাদি মিশ্রিত দূষিত জল পরিষ্কার করা যাইতে পারে । একছটাক দুধে একগ্রেণ শ্রালিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিলে সাধারণতঃ যে সময়ে দুধ জমে তাহা অপেক্ষা ছত্রিশ ঘণ্টা অধিক সময় থাকে । অতএব গ্রীষ্মকালে দুই একদিন শিশু সন্তান লইয়া জাহাজে বা রেলের গাড়ীতে যাইতে হইলে একপাইন্ট ( দশছটাক ) দুধে ২ গ্রেণ শ্রালিসিলিক এসিড মিশাইয়া রাখিলে শীঘ্র দুধ নষ্ট হয় না । কিন্তু এরূপে ঔষধ দ্রব্য মিশাইয়া সর্বদা দুগ্ধ রক্ষা করা উচিত নহে ।

অধিকার ।—শিরোগর্ঘন, বামদিকে পতন-প্রবণতা ; চারিদিকের বস্ত দক্ষিণদিকে পতনের হ্রাৎ অনুভব ; শিরোবেদনা । কর্ণ-নাদসংযুক্ত শিরোগর্ঘন । কর্ণনাদ সহ সামান্য বধিরতা । জালা ও দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস বিশিষ্ট মুখ-ক্ষত । অধিক আশ্বান, ও উত্তপ্ত অন্ন উদগার বিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্য । শিরঃপীড়া ও বিগলিত ( পচা ) উৎসেচন ( ফাশ্বেণ্টেশন ) সহ অজীর্ণ । সর্জবর্ণ ভেকের ডিমের অনুরূপ মলবিশিষ্ট আম-রস । বালক-বালিকাদিগের পচা অতিসার । জালাকর বেদনা ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন সায়টিকা । তরুণ, প্রাদাহিক সন্ধিবাত, স্পর্শে ও সঞ্চালনে উপচয়, প্রভূত ঘর্ষ । ( ১—৩ দশমিক শক্তির বিচূর্ণ ) । মস্ত নিঃশ্বাস সংযুক্ত আমবাতিক প্রদাহ । বহুমূত্র ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

অগ্নিমান্দ্য ।—ডাঃ হেল বলেন যে আহারান্তে আমাশয়ে ও অন্ত্রে বাস্পোৎপন্ন হইয়া উদরের ক্ষীততা জন্মিলে অর্থাৎ অন্তরুৎসেচনবিশিষ্ট অগ্নিমান্দ্যে শ্রালিসিলিক এসিড ফলপ্রদ । ডাঃ মার্সী বলেন যে আশ্বানসংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ও আমাশয়ান্ত্রের ক্ষীততায় শ্রালিসিলিক এসিডের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক শক্তির বিচূর্ণ পল্লিষ্কৃত জলে মিশ্রিত

করিয়া সেবনে উপকার দর্শে। আহাৰান্তে আমাশয়ের অত্যন্ত ক্ষীততা, ও দুৰ্গন্ধি বায়ু উদ্গীৰণ, তৎসহকারে আমাশয়ের নিষ্ক্ৰিয়তা ও ক্ষণিক উপশম; দুৰ্গন্ধময় অন্তৰূৎসেচন-বিশিষ্ট বমন; এই সকল লক্ষণে আত্মান সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ডাঃ লিলিয়েছাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। অতিসার।—বিদাহী অগ্নিমান্দ্য; অস্ত্রে ভুক্তদ্রব্য বিসমাসিত হইয়া দুৰ্গন্ধময় আত্মান, ও অতিশয় পুতিগন্ধ দুৰ্দ্দম্য পুরাতন অতিসারের উৎপত্তি লক্ষণে শ্যালিসিলিক এসিড ব্যবস্থেয়। ডাঃ হেল বলেন যে শিশু-বিসৃচিকায় ও বালকদিগের অত্যাশ্রয় প্রকার অতিসারে উল্গারের এক প্রকার বিশেষ পচা গন্ধ লক্ষণে এই ঔষধ আর্সেনিক অপেক্ষা অধিক উপকার করে। এতদ্বারা দুৰ্গন্ধ দূরীকৃত ও অস্ত্রের রোগ উপশমিত হয়।

**মূত্র-রোগ।**—ডাঃ হেল লিখিয়াছেন যে কসকেটপ্রাবী মূত্রের অতিশয় দুৰ্গন্ধ লক্ষণে তিনি কয়েকজন রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদের একজনের মূত্রে অধিক পরিমাণে পুষ্ণ শ্লেষ্মা ছিল। এতদ্বারা মূত্রের দুৰ্গন্ধ, পুষ্ণ ও শ্লেষ্মা দূরীকৃত হইয়া তাহার রোগের উপকার হইয়াছিল। আর একজনের মূত্রাশয়ের প্রতিশ্রাব্য রোগে ইহার পিচকারী দেওয়াতে পাঁচ দিবসে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ মার্সী উল্লেখ করিয়াছেন যে দশগ্রন মত্ৰায় দিনে তিনবার শ্যালিসিলিক এসিড সেবন করাতে মধুমেহগ্রস্ত একজন রোগীর মূত্রের চিনি ও পরিমাণ হ্রাসপাশ্চ, ও অত্যাশ্রয় লক্ষণ উপশমিত হইয়াছিল এবং শ্বেতনারবিশিষ্ট আহাৰ গ্রহণে সামর্থ্য জন্মিয়াছিল।

**কর্ণ-রোগ।**—অতি মাত্ৰায় শ্যালিসিলিক এসিড সেবনে শিরোঘূৰ্ণন ও কর্ণনাদ উৎপন্ন হয়। এজন্ত শ্রবণ-স্নায়ুর ক্রিয়া বিকার সংসৃষ্ট শিরোঘূৰ্ণনে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে শ্যালিসিলিক এসিড এই রোগ জন্মায় ও আরোগ্য করে। পরিদৃষ্টমান কারণ ব্যতীত ভ্রমির আবির্ভাব ও তিরোভাব; আক্ৰান্ত পার্শ্বে পতনোক্রম, কিন্তু দৃষ্টবস্ত্ত বিপরীত দিকে পড়িবার মত দেখায়; অনেক সময় মাথাধরা, কিন্তু সর্বদা মাথা ধরা থাকে না; কর্ণে শব্দ; শ্রুতি-ক্ষীণতা; আমাশয়িক লক্ষণের অবিদ্যমানতা বা অত্যন্ততা; চিত্তহইয়া গুইয়া থাকিণে অনিশ্চিত প্রকৃতির শিরোঘূৰ্ণন, কিন্তু মাথা তুলিলে বা উঠিয়া বসিলে উহার আতিশয়; —এই গুলি শ্যালিসিলিক এসিডের লক্ষণ। কর্ণের দুৰ্গন্ধময় স্রাবে ও ইহার ব্যবহার আছে শিরোঘূৰ্ণন।—বামদিকে পতনোক্রম, কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বস্ত্ত দক্ষিণদিকে পতনের স্থায় দেখায়; মস্তকের শিখরদেশে বা পশ্চাভাগে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকঘূর্ণায়ক পেশীর নিয় পৰ্য্যন্ত (দক্ষিণদিকে অধিক) উহার প্রধাবন; কর্ণ-নাদ ও শ্রুতি-ক্ষীণতা; কর্ণে বাত্ধধ্বনি; মস্তকে রক্তের প্রধাবন; উত্তেজিত ভাব,—এই সকল লক্ষণে শ্যালিসিলিক এসিড ব্যবস্থেয়।

**আমবাত।**—তরুণ, প্রাদাহিক সন্ধিবাত, এক বা অধিক সন্ধি, বিশেষতঃ কফোণি বা জাহ্নসন্ধিতে রোগের আক্রমণ, আক্ৰান্ত স্থলের অতিশয় ক্ষীততা ও আরক্ততা তীব্র জ্বর ও অত্যন্ত অল্পভাবিকা; এবং নাড়িতে চাড়িতে অশক্তি লক্ষণে তরুণ বাতরোগে এই ঔষধ উপকারী। এলোপ্যাথেরাঃ তরুণ প্রাদাহিক বাত্বে বহুল পরিমাণে শ্যালিসিলিক

এসিড ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ হেল সন্ধিবাতে ইহার অতিশয় উপকারিতা স্বীকার করেন। তিনি এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কতগুলি রোগী সুন্দররূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ হেল বাতরোগে আদত স্থালিসিলিক এসিড পাঁচ গ্রেণ, বা প্রথম দশমিক শক্তির বিচূর্ণ পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় দুইঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিতে বিধি দেন। ইহা অপেক্ষা উচ্চক্রমে বাতে ইহাতে উপকার দর্শে না। তিনি বলেন যে ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জরে কুইনাইন, ও তরুণ প্রাদাহিক জরে ভিরেট্রম ভিন্নিডি যেমন আদত বা নিয়তম ক্রমেই ভাল কাজ করে সেইরূপ আমবাতে স্থালিসিলিক এসিডের স্কারোগ্যকারিণী শক্তি নির্দ্ধারিত পরিমাণ মূল ঔষধে বা প্রথম দশমিক ক্রমেই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, ও মূত্র রোগে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমে উত্তম ফল দর্শে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা স্থালিসিলিক এসিড দশগ্রেণ বা ততোধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। একরূপ অধিক মাত্রায় সময়ে সময়ে এতদ্বারা শিরোগ্রন, প্রান্তদৃষ্টি, কর্ণ-নাদ, গলায় জ্বালাকর কণ্টক-বেধ, প্রভূত ঘর্ম্ম, আংশিক পতনাবস্থা এবং শারীরিক উত্তাপের অতিশয় লাবব প্রভৃতি বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

**সারেটিকা।**—জারু বা পদাঙ্গুলী পর্গাস্ত আকৃষ্টবৎ সঞ্চরমান বেদনা; পা যেন পিপীলিকার মৃত্তিকা-স্তুপে রহিয়াছে পদাঙ্গুলীতে এপ্রকার জ্বালা; উপরে উঠিতে কষ্ট ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি লক্ষণে স্থালিসিলিক এসিড প্রযুক্ত। সারেটিকার ইহার একগ্রেণের দশমাংশ বা একগ্রেণ ৩.৪ঘণ্টা অন্তর ব্যবহৃত হয়।

**ডিপথিরিয়া।**—অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসন্নতা; গিলিতে কষ্ট; কোমল কৃত্রিম বিল্লী; এবং কপোল-গহ্বর ও গল-গহ্বরের আরক্ততা লক্ষণে ডাঃ লিলিয়েহাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। জন্মণ চিকিৎসকেরা প্রবলজ্বর, ও শুভ্রবর্ণ কৃত্রিম বিল্লীতে সমগ্র গল-গহ্বরের সমাচ্ছন্নতা লক্ষণে একগ্রেণের ষষ্ঠাংশ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় স্থালিসিলিক এসিড ব্যবহারে অনেকগুলি রোগী আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ডাঃ হেল বলেন যে তিনি ইহান প্রথম দশমিক ক্রমের কয়েক বিন্দু গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া, এবং একড্রাম জলে দুই গ্রেণ স্থালিসিলিক এসিড ও দুই ড্রাম গ্লিসিরিণ বা এলকোহল মিশাইয়া কুলিব্যবস্থা করিয়া দুই দিবসে কয়েকজন রোগীর কৃত্রিম বিল্লী ও দুর্গন্ধ দূর করিয়াছেন। তিনি এই রোগে স্থালিসিলিক এসিডের স্থানিক প্রয়োগ কার্বলিক এসিড অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

**মুখ-ক্ষত।**—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন স্থালিসিলিক এসিড জ্বালা ও দুর্গন্ধ নিবাস লক্ষণায়িত মুখ-ক্ষত জন্মায় ও আরোগ্য করে।

**সেপ্টিসিমিয়া।**—প্রসূতিদিগের সেপ্টিসিমিয়া রোগে, উচ্চ গাত্র-তাপ, শীত, ও উদরের স্পর্শ-দেয় লক্ষণে তিনজন রোগীগিকে ডাঃ হেল এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অতি সত্ত্বর রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে এই রোগেও আমবাতের স্থায় মাত্রা ব্যবহার করা আবশ্যিক হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—প্রাণ ; মনের অতিশয় জড়তা ; ভাবসংগ্রহে অতিশয় আয়াস ; অনন্তর অকারণে হাত, অবিরত অসংলগ্ন আলাপ, যেন কল্পিত পদার্থ দেখিতেছে একপভাবে বারংবার দৃষ্টিপাত । **মস্তক ।**—শিরোগূর্ণন,—মস্তকের জড়তা । মস্তকে রক্তের প্রাধান্য । শিরঃপীড়া । দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস । কর্ণ-নাদ, ও শ্রবণশক্তির লাঘব । কর্ণ-রোগ-জনিত শিরোগূর্ণন । **গল-মধ্য ।**—নিগীরণে কষ্ট সংযুক্ত রক্তশ্রাবী গল-কোষ-প্রদাহ । গল-কোষের অতিশয় শুষ্কতা । গিলিতে প্রবল চেষ্টা, কিন্তু গিলিতে অতিশয় কষ্ট, তজ্জন্ত নিদ্রা হইতে জাগরণ ; গলার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা ও নিগীরণ-কষ্টের নিবন্ধতা, তৎসহকারে বর্ষা-বেধবৎ যাতনা এবং সেই যাতনার ইউষ্টেকিয়ান টিউবের মধ্যদিয়া কর্ণের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সংপ্রসারণ ; দক্ষিণ তালুমুলের ক্ষীণতা এবং বাহ্যিক হস্তর কোণের নিম্নভাগেও উহার প্রকাশ, স্পর্শে উহাতে অল্পভাবাধিকা, ও সমীপবর্তী স্থানে উত্তাপের আধিক্য ; গল-মধ্যের, ও মুখ-মধ্যের পশ্চাভাগের স্নায়িক বিস্তারিত আরক্ততা ও ক্ষীণতা এবং উহাতে আলপিনের মাথায়ু ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ; কিছুকাল পরে তীব্র-গন্ধ, পর্ণিরের থণ্ডের ত্রায় একটা ক্ষুদ্র খণ্ড নিষ্টিবন, ও তৎসহকারে খানিকটা নীলাভ লোহিত রক্তপতন ; তাহার পরে ক্রমে ক্রমে গল-মধ্যের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি । ০ ডিপথিরিয়া । **আমাশয় ।**—আমাশয় ও অন্ত্রে অবদরণ ও ক্ষত । জ্বর ।—গাত্রের উষ্ণতার আধিক্য । প্রভূত ঘর্ম । কখনও অধিক কখনও অল্প প্রভূত ঘর্ম । **বিশেষ লক্ষণ ।**—ভ্রমি । অনেকক্ষণ শয়নের পর সহসা উখিত হইলে মস্তকে বিশৃঙ্খলা । কর্ণে গড়গড় ও টুনটুন শব্দ । বধিরতা । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাতের বেদনা, সচরাচর উহার অবস্থান-পরিবর্তন । একস্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে পূর্ববর্তী স্থানে উহার বিলোপ । স্পর্শে ও সঞ্চালনে স্পর্শ-দেব । অপচ্যমান, পচ্যমান বা ফোঁকার ত্রায় উদ্বেদ, উহাতে কণ্ডুয়ন । নখ-ঘর্ষণে ও শয্যায় উপশয় ।

**স্ট্রালিসিলেট-অব-সোডা ।**—বৃহৎমাত্রায় ব্যবহার করিলেও বিষ-লক্ষণ উপস্থিত হয় না এবং স্থানিক প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত অল্প উপদাহ জন্মে বলিয়া স্ট্রালিসিলিক এসিডের পরিবর্তে স্ট্রালিসিলেট অব সোডা ব্যবহৃত হয় । কিন্তু পচন নিবারণে এসিডের ত্রায় সোডা তত উপকারী নহে । বাত, স্নায়ুশূল, ও তৎসংসৃষ্ট অত্যাশ্র রোগে স্ট্রালিসিলেট অব সোডা স্ট্রালিসিলিক এসিডের উত্তম অনুকল্প । কর্ণ-রোগজ শিরোগূর্ণনে ইহার দ্বিতীয় বা ষষ্ঠক্রম সত্তর ফলপ্রদ । কুটনাইনজনিত শারীর বিকারেও ইহার প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ উপকারী । অল্প বা আমাশয়ে ভুক্তবোর অন্তঃস্রবসেচন ও তজ্জন্ত দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ লক্ষণে স্ট্রালিসিলেট অব সোডা অতিশয় ফলপ্রদ । দুর্গন্ধ মূত্রবিশিষ্ট মূত্রাশয়ের প্রতিশ্রায়ে ; ও পুতি প্রসবাস্তিক স্রাবে ইহার পিচকারী স্ট্রালিসিলিক এসিড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

## স্কটেলেরিয়া ল্যাক্টারিফ্লোরা-স্কলোপ।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আমেরিকায় জন্মে। ইহার বীৰ্য্যকে স্কটেলেরিয়া বলে। স্কটেলেরিয়ার অরিষ্ট এবং স্কটেলেরিণের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

গৃহ-চিকিৎসায় ইউরোপে ভেলেরিয়ানা যেক্রপ ব্যবহৃত হয় আমেরিকায় ন্যায়মণ্ডলের শাস্তনার্থে সেইক্রপ স্কটেলেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা ইহাকে ন্যায়বীয় বলকর ও আক্লেপ-নিবারক বলেন এবং বিবিধ ন্যায়বীয় রোগে ব্যবহার করেন।

ডাঃ হেল পনের বৎসর স্কটেলেরিণ ব্যবহার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে ন্যায়-প্রধান স্কুমার ব্যক্তিদিগের বিবিধ রোগে এই ঔষধ উপযোগী। তিনি নিদ্রাহীনতা, রাত্ৰিকালীন ভয়, গুল্মবায়ু মদাতায় বেদনা, বা উত্তেজক মনোভাব বশতঃ ন্যায়বীয় অস্থিরতা, ও দস্তোদগম বা অস্ত্রের উপদাহ জনিত বালকদিগের মস্তিষ্কের উপদাহে ইহার উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে সাইপ্রিপিডিয়মের ক্রিয়ার সহিত স্কটেলেরিয়ার ক্রিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং সাইপ্রিপিডিয়ম জ্ঞাপক ন্যায়বীয় রোগে ও বালরোগে ইহাও তদ্রূপ ফলপ্রদ। তবে উভয়ের মধ্যে সংক্ষেপতঃ প্রভেদ এই যে সাইপ্রিপিডিয়ম অপেক্ষা স্কটেলেরিয়া মস্তিষ্কে অল্প ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় অধিক ক্রিয়াদর্শে।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় ন্যায়মণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা হইতে উপদাহ জন্মে।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

তাণ্ডব (কোরিয়া)।—গুল্মবায়ুজনিত তাণ্ডব, রাত্ৰিতে অস্থিরতা ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন; দিবসে সমস্ত পেশীর স্পন্দন ও কম্পন লক্ষণে স্কটেলেরিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মাসী বলেন যে কোরিয়া রোগে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। হৃদ্রোগ।—হৃৎপিণ্ডের ন্যায়-গুল্মের ক্রিয়াবিকার জন্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈষম্য; হৃৎপিণ্ডের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন; হৃৎপ্রদেশে বিদ্ববৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলে গোরব অম্লভব; হৃৎপিণ্ডের সমীপে দপদপ অম্লভব ও তৎসহকারে মুখের আরক্ত রাগ; মনোভাবজনিত উত্তেজনা বশতঃ স্পন্দন, ও কম্পনাদি হৃৎপিণ্ডের ন্যায়বীয় রোগ; গুল্ম-বায়ু; ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের রোগ বশতঃ প্রতিক্রিয়া ন্যায়বীয় উপদাহ;—এই সকল অবস্থায় স্কটেলেরিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা, ও ন্যায়বীয় স্পন্দনাদিতে স্কটেলেরিণের প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে লাইকোপসের সহিত এই ঔষধের কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু লাইকোপসের ত্রায় ইহার অবসাদকারিণী ক্রিয়া নাই, বরং অতিরিক্ত অম্লভূতির উপর অধিকতর প্রভাব আছে। অনিদ্রা।—মনে আনন্দজনক বিবিধ ভাবোদয়ে রাত্ৰিতে অনিদ্রায় ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ মাসী

বলেন যে স্নায়বীয় উত্তেজনা জনিত অনিদ্রা; এবং মাদাতায় রোগে, পুরাতন অর্কাবাত, ও গর্ভাবস্থায় অনিদ্রায় স্কটেলেরিয়ার প্রথম দশমিক ক্রমের অরিষ্ট ফলপ্রদ ।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

**মন ।**—অধ্যয়নে মন নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় না । মনে অধিক ভাবোদয় সহকারে চিন্তের উৎফুল্লতা । শান্তি ও শক্তি অনুভব সহকারে মনের সুখ, সন্তোষ, ও সুস্থিরতা । ০ আকাংক্ষা চিন্তের অবসাদ । যুগ্মপ্রকৃতির মদাতায় । **মস্তক ।**—মস্তকের অতিশয় পূর্ণতা ও গৌরব অনুভব ; মস্তকের মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ যেন অতিশয় ক্ষুদ্র একস্থানে আবদ্ধ রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব । \* অর্দ্ধকপালের শিরঃপীড়া, দক্ষিণ চক্ষুর উপরে উহার আধিক্য এবং অনাবৃতবায়ুতে বিচরণে উপশম । মস্তকে একপ্রকার লঘুতা অনুভব সহকারে শিরোঘূর্ণন । ০ শোক, আনন্দাদি মনোভাবে সমুৎপন্ন স্নায়বীয় শিরোবেদনা । **চক্ষু ।**—চক্ষু যেন কোটির ইষ্টে বাহির হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভব । স্নায়বীয়, ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের আলোকাতঙ্ক । কনীনিকার স্বল্প প্রসারণ । **বক্ষঃস্থল ।**—বৃক্কাস্থির নিম্নে একপ্রকার যুগ্মবেদনার প্রসারণ । হৃদপ্রদেশে বিদ্বৎ বেদনা সহকারে বক্ষঃস্থলে গৌরব । হৃৎপিণ্ডের নিকটে দপদপ অনুভব ও মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ । মনোবিকারজনিত উত্তেজনা বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অসম ক্রিয়া, ও কম্পনাদি স্নায়বীয় রোগ । নাড়ীর মৃদুতা ও পর্যায়শীলতা । **পল্লিপাক-যন্ত্র ।**—বিবাক্তিত ক্ষুধা । নিয়মিত ; শুভ্র মল । **মূত্র-যন্ত্র ।**—মূত্রতাগে কষ্ট, বোধ হয় যেন মূত্রাশয়ের ছারাবরোধক পেশীর পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে । এবং বাম বৃক্ক প্রদেশে তীব্র বেদনা । \* শিরঃপীড়ার পূর্বে স্বল্পমূত্র ; শিরঃপীড়ান্তে পরিষ্কার প্রবৃত্ত মূত্র । **নিদ্রা ।**—\* অপ্রীতিকর স্বপ্নবশতঃ সহসা জাগরণ । \* রাত্রিতে অস্থিরতা ; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন জন্ম জাগ্রততা । \* মনে বিবিধ প্রীতিকর ভাবোদয় বশতঃ নিদ্রাশূন্যতা । **স্নায়ুমণ্ডল ।**—শরীরের নানাস্থানের পেশীর স্পন্দন ও কম্পন । ০ বিশুদ্ধ স্নায়বীয় তাণ্ডব ( কোরিয়া ) । \* ( টাইফয়েড জরে ) স্নায়বীয় স্পন্দন ও কম্প । ০ উপজলাতঙ্ক । ০ গুল্মবায়ু ও গুল্মবায়ুজনিত আক্ষেপিকরোগ । উদরের বিশৃঙ্খলা বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের উপদাহ জন্মিয়া অথবা শিশুদিগের দন্তোদ্যেদ জনিত আক্ষেপ ও স্নায়ুর উপদাহ । ০ জরায়ুরোগ জনিত স্নায়বীয় উপদাহ । শক্তিগমি হইতে উৎপন্ন পুরাতন লক্ষণ । পেশীর স্পন্দন, শরীরের স্থানে স্থানে বিদ্বৎ বেদনা, কখনও বা কপালের উভয়পার্শ্বে উহার প্রসারণ সহকারে সর্বাঙ্গীন অস্বচ্ছন্দতা । **উপশম ।**—প্রাতে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম । **বিশেষ লক্ষণ ।**—নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার প্রবল প্রবৃত্তি ।

**সমস্ত ।**—এম্বার, কফি, ক্যামো, সাইপ্রি, কোকা, ইয়ে, পলিনিয়া, ভেলের, ধিরা, জিঙ্কম, সিনিসিও ।



## স্কুইলা—স্কুইল ।

লিলিয়েসী জাতীয় স্কুইলা বা সিল। ম্যারিটিমা নামক উদ্ভিদের কন্দকে সচরাচর স্কুইল বলে। ইহার নামান্তর সি-অনিয়ন অর্থাৎ সামুদ্রিক পলাণ্ডু। স্কুইলা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে জন্মে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে ইহার সরস কন্দন হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—খাস-যন্ত্র ও পরিপাক-যন্ত্রের মৈত্রিক বিঘ্নীতে স্কুইলার ক্রিয়া দর্শিয়া উপদাহ, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। বৃককেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া অতিশয় মূত্র-নিঃস্রব জন্মায়; কখন কখন রক্ত-মূত্র ও মূত্র-নাড়শরও উৎপত্তি করে।

আময়িক প্রয়োগ।—খাস-পথের প্রতিশ্রায়জনিত রোগেই প্রায়শঃ স্কুইলার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা; ব্রকাইটিস, নিউমোনিয়া; প্লুরিসি; প্লুরো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্লুরিসি ও নিউমোনিয়ায়, রক্ত-মোক্ষণের পরে, এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া উল্লেখিত আছে। হাম-কালে কাসে; ছপশব্দক কাসে; ও অত্যাগ্র প্রকার কাসে; প্লেয়্যার সমধিক ঘড় ঘড় শব্দ, আক্কেপিক কাস, কাসিতে কাসিতে মূত্র নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে হৃদী-বেদন, খাস-কৃচ্ছ্র প্রভৃতি স্কুইলার লক্ষণ। বৃকক-প্রদাহ; মূত্রাশয়-প্রদাহ; বহুমূত্র; স্বল্পমূত্রসম্বলিত উদরের শোথ; এবং কাসিবার হাঁচিবার, বা ফোৎ করিবার সময় মূত্র-পাত লক্ষণাপন্ন মূত্রাশয়ের দুর্বলতায় (কষ্ট); স্কুইলা প্রয়োজিত হইয়াছে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ ।

মস্তক।—শিরোবুর্গন। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদী-বেদনং বেদনা। উভয় শঙ্খ-স্থলে আকৃঞ্চনবৎ বেদনা। মস্তকের পশ্চাভাগে, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে, আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণবৎ বেদনা। চক্ষু।—চক্ষুর তারার সঙ্কোচন। কর্ণ।—বাম কর্ণের পশ্চাভাগে ছেদনকর বেদনা। নাসিকা।—প্রাতে নাসিকা হঠতে তীব্র, বিদাহী, তরল স্রাব নিঃসরণ; হাঁচি ও অশ্রুস্রাব (\* আস; \* সেপা, ইউক, মার্ক)। নাসা-রক্তের প্রোক্তভাগে স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব। গল-মধ্য।—তালুকায় ও গলার অভ্যন্তরে জ্বালা। গলায় উপদাহ ও কণ্ঠ্যন এবং তজ্জন্ত কাসের উদ্বেক। আমাশয়।—খাণ্ড দ্রব্যের মিষ্ট বা তিক্ত আশ্বাদ। দুর্মিবার বুদ্ধি। মুখে লালাসঞ্চয় সহকারে গলার অভ্যন্তরের পশ্চাভাগে অতিশয় বিবমিবা। আমাশয়ে পাথরচাপার জ্বায় চাপ। (\* আস, \* ব্রাই, নক্স-ভম, \* পল)। উদর।—উদরে ও মূত্রাশয় প্রদেশে কষ্টপ্রদ অনুভবাবিক্য। মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রাশয়ে অবিরত, কষ্টপ্রদ চাপ মূত্রতাগের অতিশয় ইচ্ছা, জলবৎ প্রভূত মূত্রস্রাব (এপিস, এপোসা)। গাঢ় লোহিতবর্ণ মূত্র (এক, আস, ক্যাস)। স্বল্প মূত্র। মূত্র-নিঃস্রবণের অতিশয় আধিক্য (এপিস, এপোসা, ফস-এসি)। শ্বাস-যন্ত্র।—\* পার্শ্বে হৃদী-বেদনসংযুক্ত প্রবল কাস; ফলকোপাঙ্গির নিম্নভাগ কঙ্কুশিত হইয়া কাসের

উদ্রেক ; ও \* স্লেয়া নিজীবন ; নিঃশ্বাসগ্রহণে হ্রস্ব, শুষ্ক কাস। \* প্রাতে প্রচুর, আঠা আঠা স্লেয়া-নিজীবন সহকারে কাস। উদরে আঘাত ও গলার শুষ্কতা জনক প্রবল, শুষ্ক কাস। আয়াসিত শ্বাস ; বাবংবার গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা, ও তাহাতে কাসের উদ্রেক। বক্ষঃস্থলে ভার ও অশিথিলতা। \* বক্ষঃস্থলে হৃদী-বেধ সহ শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়ে উহার আধিক্য। \* নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার বা কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে বিশিষ্টরূপে হৃদী-বেধ ; ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ (\* ব্রাই)। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার শুষ্কতা। বাম স্ক্কাস্থির উর্দ্ধে কষ্ট প্রদ উৎক্ষেপ। বাম স্ক্কাস্থির উপর বেদনামূল্য আকর্ষণ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—বাহু ও জঙ্ঘার আক্ষেপিক স্পন্দন। দেহ।—নিদ্রাতুরতা ব্যতীত অঙ্গমর্দ ও জৃন্তণ। \* সর্বশরীরের অতিশয় শ্রান্তি ও দুর্বলতা। অঙ্গের অবনতি-স্থানে অবদরণ (গ্রাফ, ম্যাস)। নিদ্রা।—অতিশয় পার্শ্ব-পরিবর্তন সংযুক্ত অস্থির নিদ্রা। জ্বর।—হস্ত-পদের তৃণাবৎ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা। শুষ্ক, জ্বালাকর উত্তাপ, অল্পমাত্র গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেই কম্প ও বেদনা।

সমগুণ।—এক্ট-টার্ট, ব্রাই, কষ্ট, সেগা, কালী-কা, নক্স-ভম, রস, সল।

## হাইড্রোকোটাইল—ওয়াটার পেনিওয়াট।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা অঞ্চলিফের জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সংস্কৃত নাম মধুকপণী, বাঙ্গালায় থলকুরি বা থানকুণী বলে। শুষ্ক গাছ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ত্বকে ইহার একপ্রকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এজন্ড, ইন্ডা কুষ্ঠ, লুপঃস, ও ঈদৃশ অন্যান্য গুরুতর চর্ম-রোগে উপকার করে।

অধিকার।—কুষ্ঠ, গোদ, সগুটিক কুষ্ঠ, লুপঃস একজুডেন্স ; পুরাতন পামা, চর্মদল ; রক্তবর্ণ বয়ঃপ্রণ ; বিচচিককা ; লিম্ফেটিক টিউমারস, প্রভৃতি চর্মরোগে হাইড্রোকোটাইল প্রয়োজিত হইয়া ফলপ্রসূ হইয়াছে। উপত্বকের স্থলত্বপ্রাপ্তি ও স্থলিত হইয়া পতন এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

### প্রধান প্রধান আনয়িক প্রয়োগ।

জরায়ু-রোগ।—ডাঃ অডুইট জরায়ু-গ্রীবার দানায় ক্ষতে, ও যোনি-কণ্ডুয়েন এই ঔষধের বিশেষ উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ মিচেন বলেন যে হাইড্রোকোটাইল যেমন মূত্রাশয় গ্রীবার উপদ্রাহ, জরায়ু-গ্রীবার আরক্ততা এবং যোনির উত্তপ্ততা ও কণ্ডুয়েন জন্মায় তেমন আরোগ্য ও করে। মুখদুষিকা।—ডাঃ সালজার একনি রোজেশিয়া নামক জন্মায় তেমন আরোগ্য ও করে। মুখদুষিকা।—ডাঃ সালজার একনি রোজেশিয়া নামক জন্মায় তেমন আরোগ্য ও করে। মুখদুষিকায় ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। জরায়ু-রোগ সংশ্লিষ্ট মুখদুষিকায় ডাঃ হিউজ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্লক (লুপঃস)।—ডাঃ হেলমথ বলেন

যে মরিশস্ দ্বীপের ডাঃ বইলিয়ারো হাইড্রোকোটাইল ব্যবহার করিয়া এই রোগের পঞ্চাশ জন রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। **কুষ্ঠ**।—ডাঃ অডুইট কুষ্ঠরোগে এই ঔষধের উপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপদংশ ও গণ্ডমালার আনুষঙ্গিক কুষ্ঠে ইহা বিশেষ উপযোগী। **পামা**।—টিনিয়া কেবোসা নামক পামা রোগে মস্তকের পশ্চাত্তাগ ও সম্মুখভাগের হকের বেদনা-বিশিষ্ট আকুঞ্চন; এবং সর্কাজীন আলস্ত ও অবসাদ হাইড্রোকোটাইলের প্রয়োগ-লক্ষণ। **যকুদ্রোগ**।—যকুতের সিরোসিস; সংবোজক বিধানতন্ত্রের বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা; সমগ্র যকুৎপ্রদেশের অবরোধ; যকুতের উর্দ্ধাংশে ঈষৎ বেদনা; আমাশয়ে বিবমিষাপরিপূত খল্লীবৎ বেদনা; হাইড্রোকোটাইলের লক্ষণ। **ক্ষীপদ (গোদ)**।—ক্ষীপদ রোগেও এই ঔষধের ব্যবহার আছে। **মাত্রা**।—সাধারণতঃ হাইড্রোকোটাইলের বর্ষ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান লক্ষণ।

**মন**।—প্রফুল্লতা; বিবাদপূর্ণ চিন্তা। **মস্তক**।—শিরোধূর্ন, রক্ত-সঞ্চয় ও গুরুত্ব। **আমাশয়**।—আহারের অগ্রবৃত্তি। **উদর**।—বায়ু। নানাস্থানে কুঞ্জন। ০ যকুতের সিরোসিস। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—যোনির নিম্নতম অংশে উত্তাপ; মুখে কণ্টক-বেধন ও কণ্ডুয়ন। ০ ভগ-কণ্ডুয়ন। **দেহ**।—সাধারণতঃ সর্কসরীরে অবসাদ, গৌরব, ও ম্লানি। সর্কাজীন প্রাপ্তি। সমস্ত পেশীতে ঘূর্ণবৎ অল্পভব। **ত্বক**।—বিসর্পাকার আরক্ততা। অল্প অল্প সমুন্নত সশব্দ প্রাপ্ত সংযুক্ত, প্রায় সম্যক গোলাকার চিহ্ন। উভয় জল্বায় ঈষৎপীতবর্ণ চিহ্ন। মুখমণ্ডলে অপচ্যমান উত্তেদ। বক্ষঃস্থলে পচ্যমান উত্তেদ। নানাস্থানে কণ্টকবেধবৎ যাতনা। কোন কোন স্থানে অসহ্য কণ্ডুয়ন। **প্রভূত ঘর্ম**।

**সমগুণ**।—আর্স, সিলি, লাই।

### হাইপোফসফাইট অব লাইম ।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসক অধ্যাপক চর্চচিল এই ঔষধ প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে হাইপোফসফাইটের অতিক্রিয়া বা মুখ্যক্রিয়া বশতঃ স্নৃম্পষ্ট জায়বীয় শক্তি এবং স্বাস্থ্য ও বল বর্দ্ধিত হয়। এবং স্থির গভীর নিদ্রা; রক্তস্রাব-প্রবণতা সুহ রক্তাধিক্য; অর্শ বা অর্শ হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, অতিশয় রক্তস্রাব; ক্ষুধার অতি বৃদ্ধি; এবং হস্তপদের রক্তবহা নাড়ীর রক্তপূর্ণতা জন্মে। অধিক মাত্রায় এতদ্বারা বন্ধাগ্রস্তদিগের সাংঘাতিক ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাঃ ব্যারেট হোমিওপ্যাথিক রীতি অনুসারে ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রম সেবন করিয়া এই ঔষধ কতকটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরীক্ষার প্রধানতঃ মস্তকের শিখরে অতীব গুরুত্ব বিশিষ্ট বেদন,

তজ্জন্ত অবসন্নতাব, হৃৎপিণ্ডে পূর্ণতা ও গৌরব, মস্তক ও বক্ষঃস্থলে পূর্ণতা ; হাত, বাহু, ঘাড় ও মাথারশিরা সকলের রক্তবৎ স্ফীততা ; শ্বাস-কষ্ট, ও তন্নিমিত্ত জানালা খুলিয়া রাখার প্রয়োজন ; সর্ব শরীরে প্রচুর ঘর্ম ; পেশীর দুর্বলতা বশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তিশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল ।

ডাঃ হেল বলেন যে ক্যালকেরিয়া ও ফসফরাসের সমবেত লক্ষণাবিত রোগে হাইপো-ফসফাইট অব লাইম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগীর লক্ষণ সমষ্টি ক্যালকেরিয়া ও ফসফরাস বা ফসফরিক এসিডের লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে হাইপোফসফাইট অব-লাইম উপযুক্ত ঔষধ । ক্যালকেরিয়া ও ফসফরিক এসিডই হাইপোফসফাইটের প্রধান উপাদান । ক্ষারের সহিত অম্লের সংযোগে সর্বদা যে মিশ্র পদার্থের গুণাগুণের জন্মেনা এমন নহে । তবে হাইপোফসফাইট অব লাইমে উহার প্রধান উপাদানদ্বয়ের গুণ বিত্তমান থাকে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস । তিনি বহুবৎসর এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন ।

### প্রধান প্রধান আয়মিক প্রয়োগ ।

যক্ষ্মা ।—ডাঃ হেল বলেন যে যক্ষ্মার পূর্বরূপ অবস্থায় কাস, জ্বর, নৈশঘর্ম, অতিশয় দ্বায়বীয় অবসাদ বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-দেব ও বক্ষের অভ্যন্তরে অবদরণ অসুভব, শ্বস ও বিলম্বিত রক্তঃ, ঋতুকালে রক্তঃশ্রাবের পরিবর্তে ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব, হস্ত-পদের শীতলতার প্রবণতা, ক্রতনাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে তিনি এই ঔষধের প্রথম, দ্বিতীয়, বা তৃতীয় ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব ও ফুসফুসের প্রদাহ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে ডাঃ হেল ষষ্ঠক্রমের বিচূর্ণের নিম্নে ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন । গণ্ডমালা ।—ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক গণ্ডমালা-লক্ষণে, অর্থাৎ বালকদিগের অতিবৃদ্ধি, বৃহৎ মস্তক, বিযুক্ত ব্রহ্মরক্ত, স্থূল উদর, লসিকা-গ্রন্থির স্ফীতি-প্রবণতা ; মস্তিষ্ক-রোগ, প্রতিষ্ঠায় জনিত শ্রাবনিঃসরণ, ও ব্রণশোথাদির সম্ভাবনা বিত্তমান থাকিলে ডাঃ হেল এই ঔষধের সম্পূর্ণ উপকারিতা স্বীকার করেন । যৌবনের প্রারম্ভে শারীরিক অকাল-বিকাশ ও মানসিক অকাল-পক্বতায় হাইপোফসফাইট অব লাইমের ত্রিংশ ক্রমের বিচূর্ণ বিলক্ষণ ফলপ্রদ । অজ্ঞাতরজস্কতা ।—লোলিত গাত্র-তন্ত, স্থূলদেহ, স্থূলবুদ্ধি, ও মস্তুর রক্ত-সঞ্চালন বিশিষ্টা যুবতীদিগের প্রথম রক্তঃ দর্শনে অতি বিলম্ব, এই ঔষধের প্রথম দর্শনিক ক্রমের বিচূর্ণ, বা আদত একগ্রন মাত্রায় আহারের সহিত সেবনে প্রায়ই আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । কাস ।—অবসাদকর রোগের পরবর্তী, বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দেববিশিষ্ট কাস এই ঔষধে আরোগ্য হয় । ক্ষয় ।—মধ্যাক্ষের রোগবশতঃ ক্ষয়ে, ব্যালকের যদি রোগের পূর্বে অতিশয় স্থূলদেহ ও লোলিত মাংস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিয়া থাকে, তবে ডাঃ হেল এই ঔষধ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন । দুর্বলতা ।—রক্ত, শুক্র, শোণা, পুণ্ড ও অগ্ন্যাদি প্রাণাদির স্ফীতি

নিঃসরণ জনিত অপকার নিবারণে কেবল এই ঔষধ অথবা ইহার সহিত পর্যায়ক্রমে চায়না অত্যন্ত ফলপ্রদ। হস্ত-পদের শীতলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ। —বালকদিগের মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহের প্রচ্ছন্ন অবস্থায়, কতিপয় মাসস্থায়ী শুষ্ক ও আবেশিক কাস, ক্ষুধা ও মাংসহীনতা, এবং চিন্তের অবলাদ; হাঁটিতে অশক্তি; মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা; পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, অকস্মাৎ অপ্রফুল্লতা হইতে হাশ্বের উদ্বেক, ঘন ঘন প্রবল ক্রন্দন; মস্তক ও গ্রীবায়া বিমুক্ত ঘর্ষ; রাত্রিতে স্ননিদ্রাহীনতা চমকিত হইয়া জাগরণ; সহসা তীব্র চিংকার, তৎপরে একপ্রকার মুচ্ছাবেশ; এবং শরীরের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা; চক্ষুর অস্বাভাবিক বৃহৎ ও নিমগ্নতা, এবং নিম্প্রভ একতান দৃষ্টি, অতিপ্রসারিত কনীনিকা; গাত্র ত্বকের পর্যায়ক্রমে জ্বালা ও উত্তাপ, অনন্তর শীতলতা; এই সকল লক্ষণে হাইপোকস-ফেট অব লাইম অর্ধগ্রেন মাত্রায় দিবসে চারিবার ব্যবহার করিয়া ডাঃ হেল ও চর্চিল কয়েকজন রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। অগ্ন্যানুরোগ। —অগ্নি-ক্ষয়ের সন্দেহসূচক পুরাতন অভিসার; শরীর-ক্ষয়কর যোনির বা জরায়ুর স্বেতপ্রদর; পুষ্য-স্রাববিশিষ্ট অস্থি-রোগ; এবং দ্বায়বীয় শক্তির ক্ষীণতাজনিত শিশুদিগের দন্তোদ্যেদের বিলম্বে হাইপোকস-ফাইট অব লাইমের ব্যবহার আছে। অস্থি-বিবর্ধনের দৌষজনিত দন্তোদ্যম-বিলম্বে ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা উপযোগী। পক্ষান্তরে শিশুর দ্বায়মণ্ডল, ও নাড়ীমণ্ডল উত্তেজিত ও উপদাহিত অবস্থায় থাকিলে এবং রক্ত-সঞ্চয় বা আক্ষেপ, কিম্বা উভয়ই উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জন্মিলে ডাঃ হেল ক্যালক-ব্রোম অগ্ন্যানুরোগ প্রকার ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

## হিডিওমা ।

হিডিওমা বা আমেরিকান পেনিরয়েল একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুপ। ইহার অরিষ্ট; বা তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। জ্বী রোগেই এই ঔষধের প্রধান ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ডাঃ হেল কোন কোন জ্বী-রোগে হিডিওমা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ইহা শ্বাভাইনার সমকক্ষ। অতিশয় কুশলবিশিষ্ট বেদনা তৎসহ নিম্নোদর হইতে বাহিরের দিকে প্রচাপন। \* প্রকৃত প্রসব-বেদনার স্থায় স্নতীব্র ও সবিরাম বেদনা, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি, এবং উহার সহিত নিম্নোদর দুর্বলতা বা পক্ষাবাত অমুভব। পৃষ্ঠবংশের ত্রিকাহিষ্টান হইতে জরায়ু পর্যন্ত আকৃষ্টতা। \* কণ্ডুয়ন ও জ্বালা সংযুক্ত পীতবর্ণ প্রদর। উভয় ডিম্বাশয়েই প্রচাপনে অত্যন্ত অমুভবাধিক্য। ০ জনন-যন্ত্রের ক্ষীণতা বশতঃ রক্ত-বিলোপ। ০ জরায়ুর আক্ষেপ। ০ গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের রক্ত-সঞ্চয়। ০ কৃত্রিম প্রসব বেদনা। শর্দি লাগিয়া ঋতু বিলোপ। \* ০ প্রসবাস্তিক স্রাবের বিলুপ্তি। ০ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। এইগুলি হিডিওমাক্ষী জননেজিয়ের লক্ষণ। ডাঃ হেল বলেন যে এই সকল

দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয় যে রক্ত-কৃষ্ণ ; গর্ভ-পাত-সম্ভাবনা ; জরায়ুর রক্তস্রাব ; ও বিদাহী প্রদরে হিডিওমা মুখ্যতঃ, এবং ঋতু-বিলোপ ; প্রসবাস্তিক স্রাব-বিলোপ, এবং গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়ে গোণতঃ উপযোগী । মুখ্য লক্ষণে ইহার তৈলের তৃতীয় হইতে ষষ্ঠক্রম ; ও গোণ লক্ষণে বৃক্ষের অরিষ্ট প্রথম ক্রম বা মাদার টিকার প্রযুক্ত্য । রক্ত-বিলোপ, বা গর্ভ-স্রাব বশতঃ ডিম্বাশয়ের প্রদাহেও এই ঔষধ আরোগ্যকর হইতে পারে । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জন্মের অতিশয় দুর্বলতা সংযুক্ত জরায়ুর আবেগ হিডিওমার প্রধান লক্ষণ । “মূত্র-নাশ, কুহন ; মূত্র-ত্যাগে যাতনা ; পুনঃ পুনঃ মূত্র-বেগসহ স্বল্প-মূত্র-স্রাব ; মূত্র-মার্গ কর্তন ও আলার তায় যাতনা ; কাল চার তায় অতিশয় কাল মূত্র ।”—এইগুলি হিডিওমার মূত্র-লক্ষণ । গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ের প্রদাহেই মূত্র-যন্ত্রের ক্ষুদ্র প্রদাহিত অবস্থা ও মূত্র-লক্ষণ সাধারণতঃ বিজ্ঞমান থাকে । কাল চার তায় অতি মলিনবর্ণ, মূত্রদ্বারা মূত্রে রক্তের বর্তমানতা বুঝা যায় । স্ক্যালটিনার পরে, ও উৎকর্ষ বৃদ্ধক-রোগে সাধারণতঃ এইপ্রকার মূত্র দৃষ্ট হয় । হানসেন বলেন যে \* জন্মাবস্থার অতিশয় দুর্বলতা, অবদরনকর শ্বেতপ্রদর, এবং প্রচাপনে ডিম্বাশয়ে স্পর্শ-দেব সংযুক্ত জরায়ুর বেদনা ও আবেগ ; মূত্রাশয়ের আবেগ, মূত্র-মার্গে আলকর বেদনা, কাল চার তায় অতি মলিন স্বল্প মূত্র ;—এইগুলি হিডিওমার বিশেষ লক্ষণ ।

## হিপেটিকা ।

লিভার অর্থাৎ বৃক্কতের সহিত এই উদ্ভিদের পত্রের কল্লিত সাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম লিভার ওয়াট রাখা হইয়াছে । হিপেটিকা ট্রিলোবার সমগ্র বৃক্ষের আর্ধষ্ট প্রস্তুত হয় । ডাঃ কিম্বাল এই ঔষধ আংশিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন । গল-গহবরের অত্যন্ত বিরক্তিকর উপদাহ ; প্রভূত পীতবর্ণ, \* সরবৎ ও স্মৃষ্টি নিষ্টিবন ; বক্ষঃস্থলে তুড়তুড়ি, চুলকানি, ও হাজিয়া যাওয়া অন্ততঃ, আহ্বার করিলে বা নিঃশ্বাসের ধূলি প্রবেশ করিলে উহার আধিক্য ; এই সকল লক্ষণে কাসস্বরূপে হিপেটিকা ব্যবহৃত হয় । রক্ত-স্রাবের প্রবণতা সংযুক্ত গল-কোষ ও নাসিকার পশ্চাত্তঃগত পুরাতন প্রতিশ্রায় রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

## হেক্সা লাভা ।

হেক্সা লাভা হেক্সা নামক আণ্ডেয় গিরির ধাতুনিঃস্রব । ইহা আইল্যান্ড দ্বীপে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই পদার্থে সিলিকা, এলুমিনা, চূণ, ম্যাগ্নিশিয়া, অক্সাইড অব আয়রন, ও অক্সাল খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত আছে । হেক্সালাভার নিচূর্ণ প্রস্তুত হয় । ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম হইতে দ্রব ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

**ক্রিয়া ।**—অন্নপাতকালে হেক্সা পৰ্বত হইতে যে সূক্ষ্ম ভস্ম নিঃসৃত তৃণোশরি নিপতিত হয়, গো-মেঘ-অথ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সেই ভস্মসংযুক্ত ঘাস ভক্ষণ করে তাহাদের অস্থি বিবৰ্দ্ধন, অস্থি-ক্ষত প্রভৃতি অস্থি-রোগ জন্মে । মস্তক, হস্ত, দন্ত, ও জজ্ঞার অস্থিতেই এই সকল রোগের বিশেষ প্রাবল্য দৃষ্ট হয় । সুতরাং অস্থিতেই হেক্সালাভার ক্রিয়া প্রকাশ পায় ।

**অধিকার ।**—ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্ত-বেদনা, ও দন্ত পুগুট । আয়াসিত দন্তোদগম । দন্তোদগমনের পর দ্ব্যবসায় বেদনা । নিম্ন হস্তের অস্থি-প্রদাহ । অস্থি-বিবৰ্দ্ধন । হাইটলো ।

### প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ ।

**দন্ত-রোগ ।**—ডাঃ উইলকিনসন এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তজনিত দন্ত-মূলের ত্রণ-শোধ আরোগ্য করিয়াছেন । শিশুদিগের দন্তোদগমক্লম্ব ও এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে । ডাঃ হলকোম দন্তোৎপাটনের পরবর্তী দ্ব্যবসায় ইহার ত্রিশ ক্রম ব্যবহারে বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন ।

**অস্থি-রোগ ।**—একজন গণ্ডমালাগ্রস্তা বালিকার নিম্ন হস্তে উপঘাত লাগিয়া একটা বৃহৎ ত্রণশোধ জন্মে এবং তৎপরে হস্তের অস্থি অতিশয় বিবৰ্দ্ধিত হয়, হেক্সা লাভা ব্যবহার করিয়া ডাঃ হলকোম তাহাকে আরোগ্য করেন । হানসেন বলেন যে এতদ্বারা অস্থি-বিবৰ্দ্ধন স্থগিত ও উদার বেদনা প্রশমিত হয় । ডাঃ টমসন এতদ্বারা উপদংশজনিত নাসিকাস্থির ক্ষত আরোগ্য করিয়াছেন ।

**গণ্ডমালা ।**—গণ্ডমালাজনিত, উপদংশমূলক অস্থি-প্রদাহ, বা অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ, মুখমণ্ডলের অস্থি ও উর্দ্ধ হস্তের অস্থি-গহ্বরে উহার বিশিষ্টরূপ আক্রমণ ; দন্তোদগম-কষ্ট ; রেকাইটিস ; বক্ষণ-রোগ ; ঋতবর্ণ ক্ষীণতা, দন্ত-গহ্বরের রোগ ; গ্রীবার গ্রন্থির কঠিনতা ও রস-সঞ্চয়, মুক্তাবলীর জ্বায় সেই সকল গ্রন্থির আকৃতি, হস্তের ক্ষীণতাজনিত দন্ত-বেদনা ; ক্ষয় প্রাপ্তজনিত দন্ত-মূলের ত্রণ-শোধ ; এই সকল অবস্থায় ডাঃ লিলিয়েস্থাল এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন ।

**পেশী-বেদনা ।**—ডাঃ কেট এই ঔষধ প্রয়োগে পশুকা-মধ্য-পেশীর বেদনা আরোগ্য করিয়াছেন ।

# বিরল ঔষধাবলী

সূচীপত্র ।

অকজিট্রুপিস লেখারটাই	১	একোনাইটম...	৫	এলুমেন ...	১০
অরম আইওডেটম ...	১	— ফিরক্স ..	৫	এলুমিনিয়ম মেট্যালিকম	১০
অরম মিউরিয়েটিকম ...	১	একোয়া সিলিকেটা ...	৫	এসিমিনা ট্রলোবা ...	১০
— ছাট্টোনেটম ...	১	এডেনিস ভার্ণেলিস ...	৫	ওনিক্স ...	১০
অক্টিয়া বার্জিনিকা ...	২	এক্টিপাইরিণ ...	৫	ওনিনিস ...	১০
অসনিয়া বার্কেরেটা ...	২	এক্টিমোনিয়ম আসেনাইটম	৬	ওনোসমেডিয়ম ...	১০
আইওডোফরমম ...	২	— সলফিউরেটম অরেটম	৬	ওসিমম ক্যানম ...	১০
আইবারিস এমারা ...	২	এনাকার্ভিয়ম অক্সিডেটেল	৬	কক্সিনেলা ...	১১
আরগোটাইনম ...	২	এনাথিরম মিউবিকেটম	৬	কার্বনিয়ম অক্সিজিনাই	১১
আর্বাটাইনম ...	৩	এনিসম গিলেটঃম ...	৬	— সলফিউরেটম ...	১১
আর্সেনিকম ব্রোমেটম ...	৩	এন্থ্রা কোকেলাই ...	৬	কালী-আর্সেনিকোজম ...	১১
— মেট্যালিকম ...	৩	এপিয়ম গ্রাভিওলেস ..	৬	কালী-পায়েঞ্জানিকম ...	১১
— সলফিউরেটম ক্রেভম	৩	এভিনা স্কাটাইভা ...	৭	কালী-ফসফরিকম ...	১২
— হাইড্রোজিনিসেটম	৩	এমোনিয়কম ...	৭	কালী ফেরোসায়েনিকম	১২
ইউজিনিয়া জ্যাম্বোস ...	৩	এমোনিয়ম বেঞ্জোয়িকম	৭	— মিউরিএটিকম ...	১৩
ইউনিমস ইউরোপিয়স ..	৩	— ব্রোমেটম ...	৭	— সলফিউরিকম ...	১৩
ইউপাস টাইয়ুট ...	৩	— আইওডেটম ...	৮	— সায়েনেটম ...	১৩
ইউপিয়ন ..	৪	— ফসফরিকম ..	৮	— সিলিসাইকম ...	১৪
ইউপেটোরিয়ম এরোমেটিকম	৪	— পিক্রিকম ...	৮	কিউকারবিটা পেপো ...	১৪
ইউফরবিয়া ভিলোসা সাইভ		এম্পিলোপসিস ...	৮	কিউমেরিনঃম ...	১৪
সিলভেট্রিস্ ...	৪	এমিগডালা এনেরা ...	৮	কুপম সলফিউরিকম ...	১৪
ইণ্ডিয়ম মেট্যালিকম ...	৪	এট্রোপাইনম .	৮	কেইনকা ...	১৪
ইথিম্প এটিমোনিয়্যালিম	৪	এরম ম্যাকুলেটম ...	৯	কেওলিন ...	১৪
ইম্বলা হেলেনিয়ম ...		এরগু মরিটেনিকা ...	৯	কেজিপুটম ...	১৪
ইপিজিয়া রিপেন্স ...	৪	এরোপিয়া মায়েন্সিয়া ...	৯	কোকেনঃম ...	১৪
ইপিফিগাস ভার্জিনিয়ানা	৪	এলকোহল ...	৯	কোচলিএরিয়া ..	১৪
ইলিইস গিনীঙ্গিস ...	৪	এলনস রুত্রা ...	৯	কোচিলিটন অধিলিকঃম	১৪
ইক্টিউলাস মাত্রা ...	৫	এলটোনিয়া ...	৯	কোটোবার্ক ...	১৫
একুই লিজিয়া ভলগারিস	৫	এলিয়ম স্কাটাইভম ...	৯	কোবাল্টঃম	১৫



কোণানোট ... ..	১৫	জিন সেজ ... ..	২০	আফথালীন ... ..	২৪
ক্যাডমিয়ম সলফিউরিকম	১৫	জিনিট্যাট টোরিয়া ...	২১	পপিউলঃ ক্যাণ্ডিক্যান্স	২৫
ক্যান্সার ক্লুভাইএটলিস	১৫	জেলোপ্লা ... ..	২১	পলিগেনঃম এভিকউলোর	২৫
ক্যাংকেরিয়া আইওডেটা	১৫	টনকা ... ..	২১	পাইনস সিলভেস্ট্রিস ...	২৫
— আর্সেনিকোসা	১৬	টঃসিলেগো পিটেসাইটিস	২১	পাইলোক্যাপিনঃম ...	২৫
— এসেটিক। ... ..	১৬	টাটারিকঃম এসিডঃম ...	২১	পিক্রেটকিনঃম ( ককিউলাসের	
— কষ্টিক ... ..	১৬	টিউক্রিয়ম স্কোরোডোনিয়া	২১	উপক্ষার ) ... ..	২৫
— ক্লোরেটা ... ..	১৬	টিটেণিয়ঃম ... ..	২১	পিচি ( ফেব্রিয়ারা ইন্ট্রিক্টা )	
— ফ্লোরিকা ... ..	১৬	টেনাসিটঃম ভঃলগেয়ার	২১	... ..	২৫
— মিউরিয়টিকা ... ..	১৭	টেমঃস কমিউনিস ... ..	২১	পোথস ফিটডঃস ... ..	২৫
— সলফিউরিকা ... ..	১৭	টাক্সাস ব্যাক্কেটা ... ..	২১	প্যালেলিডঃম ... ..	২৫
— হাইপোফসফোরোসা	১৭	ট্রমবিডঃম মিউসি ডোমেণ্টিসি	২১	প্যাসিফ্লোরা ইনকাণেটা ...	২৬
ক্যালথা প্যালঃট্রিস ... ..	১৮	ট্রাইমেথিলেনিঃম ... ..	২১	প্লাটিনা মিউ রেটিকা ...	২৬
ক্যাটোরিয়ম ... ..	১৮	ডিউবঃসাইন ... ..	২২	পঃল সেটলা নঃটেলিমানা	২৬
ক্রোরঃম ... ..	১৮	ডিজিটেলিনঃম ... ..	২২	ফিঃম এসটিকঃম ... ..	২৬
ক্যান্সার আগ্রাডা ... ..	১৮	ড্যানি ইণ্ডিকা ... ..	২২	ফিরঃম কার্বনিকঃম ... ..	২৬
ক্যান্সেরিয়া ... ..	১৯	থাইরয়ঃডন ... ..	২২	ফিরঃম পিক্রিকঃম ... ..	২৬
ক্রমিকঃম এসিডঃম ... ..	১৯	থিবেহনঃম ... ..	২২	ফিরঃম মিউরিয়টিকঃম ...	২৬
ক্রাইসো ফেনিক এসিডঃম	১৯	থিরা ... ..	২২	ফিরঃম সাইট্রিকঃম ... ..	২৭
গলগিরিয়া প্রোঃসেপ্স ...	১৯	থ্যাম্পিয়া গার্গেনিকা ...	২২	ফিরঃম ডিমেটেনেটঃম ...	২৭
গেটসবার্গ স্মিঃ ওয়াটার	১৯	থ্যালিঃম ... ..	২২	ফেলভঃলপাই ... ..	২৭
গোয়াকো ... ..	১৯	নাইট্রিঃপিরিটঃস ডঃলসিস	২৩	ফ্যাগো পাইরম ... ..	২৭
গোয়ারিয়া ... ..	১৯	নাইট্রো-মিউরিয়টিক এসিড	২৩	ফ্রান সিন্কা ইউনিফ্লোরা ...	২৭
গ্যালিয়ম এপেরাইন ... ..	১৯	নিকোলঃম মেট্যানিকঃম	২৩	ফ্লোরিডজিন ... ..	২৭
গ্যাপ্টিন ওয়াটার ... ..	১৯	আইটম আইওডেটঃম	২৩	বেলিস পেরিথিস ... ..	২৭
গ্রেণেটঃম ... ..	১৯	” কোলেইনিকঃম	২৩	বোথঃপ্স ল্যাপ্সিওলেটঃস	২৮
চিনিঃম ফেরোসাইটঃ কঃম	২০	” ক্রোঃটঃম	২৩	বোরেসিকঃম এসিডঃম	২৮
চেনো পোডিয়ঃম এঃস্লেমটি-		” নাইট্রিকঃম	২৪	বোলঃস ল্যারিসিস ... ..	২৮
কম ... ..	২০	” ফসফরিকঃম	২৪	ব্যারাইটা আইওডেটা ...	২৮
জিকঃম ভেলিরিএনিকঃম	২০	” সিলিসিকঃম	২৪	ব্যারাইটা এসিটিকা ... ..	২৮
” সলফিউরিকঃম	২০	” সেলেনিকঃম	২৪	ব্যারাইটা মিউরিয়টিকা	২৮
” সাঃস্লেটম ... ..	২০			ব্যাসিলাইনঃম ... ..	২৯

ব্রাটা এমেরিকানা ...	২৯	ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা ...	৩১	টিগনেটা মেইডিস ( তরল স'র )	
ভেপ্পা ক্রেব্রো ...	২৯	ম্যাগ্নিসিয়া মংলকিউরিকা	৩১	... ..	৩২
মর্কিনঃম ...	২৯	ম্যাটিকো ...	৩১	ট্রুশিয়ানা কার্বনিকা ...	৩২
মাইমোসা হিউমিলিস ...	২৯	রেগনকিউলস এক্রিস্ ..	৩১	ট্রোফ্যান্টঃস হিম্পিডঃস	৩৩
মাইসটিস আর্ভেন্সিস ...	২৯	রেফেনঃস স্টাটাইডঃস ..	৩২	ট্রুকনাইনঃম ফসফরিকঃম	৩৩
মারকিউরিয়ঃস অরেটঃস	৩০	রোজা ডেমাসিনা ..	৩২	ট্রুকনাইনঃম পিউরঃম	৩৩
মারকিউরিয়ঃস এসিটিকঃস	৩০	লাইনঃম কাথারিটিকঃম	৩২	সংলফঃর আইওডেটঃম	৩৪
মারকিউরিয়ঃস ট্যানিকঃস	৩০	লাইম্যান্স এটার ..	৩২	সাইজিজিয়ঃম জ্যাথোলেনঃম	৩৪
মারকিউরিয়ঃস ফসফরিকঃস	৩০	লিমিউলঃস সাইরুপস ..	৩২	হাইড্রাক্সিয়া আর্দোরোসেন্স	৩৪
মারকিউরিয়ালিস পেরেনিস	৩০	লুপ্লাইনঃম ...	৩৩	হিউরাগ্রাসি শ্লাইএন্সিস	৩৪
মেডুসা ..	৩০	লোথাইরঃস স্টাটাইডঃস ..	৩২	হিপারসল'ক'উরিস ক্যালিনঃম	
মেনিস্পারমঃম ক্যান্ডেল	৩০	লেপথঃম স্যাকিউটঃম	৩২	... ..	৩৩
মোমরডিকা ব্যালস মিকা	৩০	লেমিয়ঃম স্যালবঃম ..	৩২	হেলিয়াপ্পঃস স্যানিউয়ঃস	৩৫
ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা	৩১	লোবেলিয়া সিকলিটিকা	৩২	হোরাপ্প স্যান ...	৩৫



## হোমিওপ্যাথিক বিরল ঔষধাবলী

অকজিট্রুপিস লেম্বারটাই।—বিশেষ লক্ষণ।—ইউরোপের লেণাইরস সেটাইভসের স্থায় এই ঔষধও পৃষ্ঠবংশের রক্ত-সঞ্চয়, ও পক্ষাঘাত জন্মায়। কোন লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিলে সেই লক্ষণের উপচয়। একাকী থাকিবার ইচ্ছা। কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি। মল-দ্বার হইতে লেহ-খণ্ডের স্থায় মল পিছলিয়া পড়া। মল-দ্বারের আবরণী-পেশী (স্ফিক্টার) শিথিলিত অমুভব। মূত্র-ত্যাগের কথা ভাবিলেই সর্বদা মূত্র-বেগ।

অরম আইওডেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন হৃদেট-প্রদাহ। স্রুদ-কপাটের রোগ; ধমনী-প্রাচীরের দুর্লভতা; কর্ণ-মূলের বিবৃদ্ধি; পুতিনশ্রু; লুপঃস; পুরাতন প্রমেহ; ও হৃদ্মা প্লেগ। পারদ অপব্যবহারের পর অস্থি-প্রদাহ; পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ; জরায়ুর পেশীময় অর্ধদ; ডিম্বাশয়ের কোষ; স্তন-বৃন্তবৎ অস্থি-প্রবর্দ্ধনের প্রদাহ সহকারে কর্ণের পূষ-শ্রাব।

অরম মিউরিয়েটিকম।—বিশেষ লক্ষণ।—নাসিকার বাম পার্শ্বের লোহিত বর্ণ ক্ষীণতা, নাসা-গহ্বরের গভীর ক্ষত, শুষ্কতা, পীতাত শুষ্ক চর্ম ও অবরোধ-অমুভব। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ জলবৎ শ্রাব। যোনি ও ভগের উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন। অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ প্রদর, প্রাতঃকালে উহার আতিশয্য। অগ্রাশ্র বিষয়ে অরম মেটালিকমের অমুকুণ লক্ষণ।

অরম মিউরিয়েটিকম অ্যাস্ট্রোনেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—হিষ্টেরিয়ায় আক্ষেপ, কন্ঠক বর্চল পর্য্যন্ত চৈতন্য শূন্যতা, উদরের নীতলতা সহকারে আক্ষেপের আরম্ভ, বিবৃদ্ধ প্রদাহিত জরায়ু। জিহ্বার কঠিনতা। যোনির পেশীর আক্ষেপিক আকুঞ্চন সংযুক্ত হৃদ্মা প্রদর। পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ। কন্দ। যোনি, ও জরায়ুর অংশ বিশেষের ও ডিম্বাশয়ের কঠিনতা। জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি, প্রদাহবশতঃ জরায়ুর গ্রীবার ও যোনির ক্ষত। জরায়ুর সমুখাবর্জন। হরিতের আভাযুক্ত পীত বর্ণ প্রদর।

**অক্টিয়া বার্জিনিকা।**—বিশেষ লক্ষণ।—জিহ্বার পীতবর্ণ, উহার মূলদেশের লোপাচ্ছন্নতা। ঞ্জতরাহার ও মধ্যস্থের আহারে ক্ষুধার অভাব। সমুখ কপালে অতীব শিরোবেদনা সহকারে বারংবার বিবমিষা। ( চিকিৎসায় প্রনাগিত )। **আময়িক প্রয়োগ।**—কুইনাইনের লক্ষণ বিশিষ্ট ম্যালেরিয়াজনিত সবিবৰ্ণ জরের কুইনাইনে অনারোগ্য প্রাপ্তি। আলস্ত, অল্প ক্ষুধা ও অধিক অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন পিত্ত-প্রকোপ। ম্যালেরিয়া জনিত নীরক্ততা ( এনিমিয়া ) ( উৎকৃষ্ট ঔষধ )।

**অসনিয়া বারবেরেটা।**—আময়িক প্রয়োগ।—শিরঃপীড়ায় যখন সমগ্র মস্তকে অথবা মস্তকের সমুখভাগে বেদনা জন্মে; এবং শঙ্কায় যেন ফাটিয়া পড়িবে অথবা চক্ষু যেন কোটির হইতে ছুটিয়া পড়িবে এরূপ অশুভ হইয়া তখন এই ঔষধের মূল অরিষ্ট ( মাদার টিঙ্কার ) স্নান করিয়া ফলপ্রদ।

**আইওডোফরমঃমঃ**—বিশেষ লক্ষণ।—বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে বেদনার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহের চিৎকারের দ্বারা চিৎকার দ্বারা নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা। অসমভাবে আকৃষ্ট কনীনিকা। নোকাকার উদর। উদরে কর্তনব্য যাতনা। দক্ষিণ ফুসফুসের শিখরদেশে ক্ষতবৎ বেদনা, শ্বাস-কালে দুইটা ক্ষতগ্রস্ত স্থানের যেন পুরস্পর সংস্পর্শ হইতেছে, এরূপ অশুভব। গুরুতর শর্দী লাগিলে যেরূপ ( গৌরব ) অশুভ হইয়া ফুসফুসে সেইরূপ অশুভব, বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থলের উপর একটা ভার থাকিতে বিমুক্তভাবে উহা প্রসারিত হইতে পারিতেছেন। দক্ষিণ বাহুতে আমবাতিক বেদনা, বাহু ব্যবহার করিলে উহার আধিক্য। **আময়িক প্রয়োগ।**—মিনিজাইটিস রোগে, ( সপ্তটিক আকারেও ) এই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিধি আছে। কিন্তু ইহার বাহ্যিক প্রয়োগই বিশেষ ও চলিত। ত্বকের সমস্তরণে ও ক্ষতে; উপদংশ-ক্ষতে; বিশেষতঃ দুর্গন্ধ ক্ষতে; ভগের কণ্ডুয়নে ও জরায়ুর বিদাহী ক্ষতে; পুরুষাঙ্গের কোমল উপদংশ ক্ষতে, বিশেষতঃ প্রসারণশীল ক্ষতে; আইওডোফরমের ব্যবহার হয়।

**আইবারিস এমারা।**—বিশেষ লক্ষণ।—হৃৎকম্প, হৃৎপ্রদেশে প্রচাপন, এবং ঞ্জবল স্থচী-বেদন বেদনা। হৃৎপিণ্ডের ত্রিয়ার সবিবৰ্ণতা। নাড়ীর পূর্ণতা ও বিষমতা। নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও বিষমতা সহকারে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন। সঞ্চলনে উপচয়। **আময়িক প্রয়োগ।**—হৃৎপ্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের ত্রিয়ার স্নায়বীকৃতি বিশৃঙ্খলা। বিবর্জিত হৃৎপিণ্ড সহকারে শোধ।

**আরগোটাইনমঃ (উইগাস)।**—আময়িক প্রয়োগ।—কাককা জরায়ুর স্নায়ু প্রদাহ এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন, \* প্রতিসঞ্চলনে মলিন, সংযত অথবা তরল রক্ত নিঃসরণ ইহার প্রয়োগ লক্ষণ; অপিচ, প্রসবের পর জরায়ুর অসম্যক সঙ্কোচনে, এবং অনিয়মিত ক্ষীণ, অথবা ক্ষাৎপিক প্রসব-বেদনায় ইহার ব্যবহার হয়। প্রভূত ঞ্জত্বাভ;

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রক্ত-স্বল্পতা বশতঃ নিম্ন-শাখাঙ্কয়ের পক্ষাঘাত ; এবং ধ্বজভঙ্গ রোগেও এই ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

**আর্বাটাইনাম** ।—আময়িক প্রয়োগ ।—মূত্রাশয়ের প্রতিষ্ঠান, মূত্রে প্রস্রাব-রেশ্ম ও অনৈচ্ছিক মূত্র-স্রাবে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

**আর্সেনিকম ব্রোমাইটম** ।—আময়িক প্রয়োগ ।—নাকের উপর ভায়োলেট রঙ্গের পীড়কাবিশিষ্ট গোলাপী রঙ্গের বরস কোড়া । মধু-মেহ ( বহুমূত্র ) ।

**আর্সেনিকম মেট্যালিকম** ।—বিশেষ লক্ষণ ।—হর্ষলতা । জিহ্বায় দস্তাঙ্ক ( মার্ক, পড, ইয়ুকা, হুংস, ট্রাম ) ও শুভ্রবর্ণ লেপ ।

**আর্সেনিকম সলফিউরেটম ফ্লুভম** ।—আময়িক প্রয়োগ ।—আয়াস সাধা খাস-ক্রিয়া । লিউকোডার্মা বা “ধবল” রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । উপদংশ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় সশঙ্ক চর্ম্ম-রোগ ।

**আর্সেনিকম হাইড্রোজেনিসেটম** ।—বিশেষ লক্ষণ ।—সাধারণ ক্রিয়া আর্সেনিক এলবমের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল । হৃৎপিণ্ডের শিথরে ভজ্জার ত্রায় শব্দ ( ক্রট-ডি-স্কফলেট ) সংযুক্ত রক্ত হীনতা ( এনিমিয়া ) । উৎকর্ষা ; বমন করিবার সময় রোগী মনে করে যে তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহার আর ভাল হইবার আশা নাই । রক্ত-মূত্র ( ক্যাস, ফস, সিনিসিও, টেরেবিস্ ) । লিঙ্গ-মুণ্ড ও উহার আচ্ছাদন-ত্বকে বহুসংখ্যক পচ্যমান পীড়কা, ও তাহা হইতে গোলাকার অগ্রগাঢ় ক্ষতোৎপত্তি ।

**আময়িক প্রয়োগ** ।—ডাঃ এলেন লিথিয়াছেন যে একজন রোগিণীর সহসা ঋতু বিলুপ্ত হইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক শীত জন্মে, তৎপরে হাত-পায় ছেদনকর বেদনা, মস্তকের বিশৃঙ্খলা, কর্ণ-নাদ, ক্ষুধাহীনতা, পিপাসা, সকল প্রকার ভুক্ত পদার্থেরই বমন, অস্ত্র কুঁজন, নিদ্রাহীনতা, লোহিতবর্ণ আমবিশিষ্ট অতিসার, শুষ্ক, আরক্ত বিদারিত জিহ্বা ; আঠা আঠা, ময়লা শ্লেষ্মা নিষ্টিবন, রাক্তিতে কাসিতে কাসিতে বমনোত্তম ও বমন । এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । আর্সেনিক এলবম ব্যবহারে কোন ফল দর্শনা । কিন্তু আর্সেনিকম হাইড্রোজেনিসেটম ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হয় ।

**ইউজিনিয়া জ্যাম্বোস** ।—আময়িক প্রয়োগ ।—মুখ-মণ্ডলে অপচ্যমান পীড়কীয় অনুরূপ ব্যোত্রণ । উহার চারিদিকে কতকটা দূরবর্তী স্থান পর্য্যন্ত বেদনা । এবং কঠিন-ব্রণ, মুখ দুঃখিকার্য ( এক্সি ইণ্ডুরেটা ) এই ঔষধ উপকারী ।

**ইউনিমস ইউরোপিয়স** ।—আময়িক প্রয়োগ ।—যকৃতের পিত্তাধিক্যে অর্পিত শিরোবেদনা, মুখ-বৈরন্ত লেপারিত জিহ্বা ও কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পিত্ত-প্রকোপে ইহা উত্তম ঔষধ । কাটি-বেদনা ও অর্শসংযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধতাও এই ঔষধ উপযোগী ।

**ইউপাস টাইমুট ( এনো-পুয়োজম )** ।—বিশেষ লক্ষণ ।—মুখে চোঁচ ফুটিয়া

ধাকার ছায় বেদনা। আমাশয়ে গুরুত্ব অল্পত্ব। হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন। আময়িক প্রয়োগ।—অনেকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ। পক্ষাবত। জননেদ্রিয়ের ক্ষেত্রবল্য। নখের প্রদাহিত উটা চর্ম (সুলকানি)। [ইউপাসের ক্রিয়া কিউরেয়ারের বিপরীত, স্তূতয়াং উভয়ে পরস্পরের বিষমগুণ]। উপরের ওঠের বামভাগে দ্রুত।

ইউপিয়ন।—বিশেষ লক্ষণ।—অত্যন্ত শ্রমে দারুণ ঘর্ম, অগ্নিচ নৈশঘর্ম ও ঘর্মার ঘর্ম। সমগ্র শরীর যেন লেহ (জেলি) নির্মিত এগ্রকার অল্পত্ব। পৃষ্ঠের বেদনার বিরতি জন্মিলে অবিদাহী প্রদরস্রাব নিঃসরণ। আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর অবস্থানের বক্রতায় ইউপিয়ন একটী উত্তম ঔষধ।

ইউপেটোরিয়ম এরোমেটিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—শিশুদিগের মুখ ক্ষত। পিত্ত-বমন, আমাশয়ে বেদনা, শিরঃপীড়া ও জর।

ইউফরবিয়া ভিলোসা সাইভ দিলভেস্কিস।—আময়িক প্রয়োগ।—কুর্কর দংশন-উদ্গাদে ইহার অরিস্ট বা কাথ ব্যবহারের বিধি আছে। ডাঃ কাকজোয়ান্নির অভিজ্ঞতার পর হইতে এই ঔষধ উত্তম ফলপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রতিবেদক স্বরূপে অথবা গোণের প্রারম্ভেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ইণ্ডিয়ম মেট্যালিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—নিদ্রালুতা ও বিবমিষা, দুর্বলতা, শূন্যতা, এবং পূর্বাঙ্ক ১১ টার সময়ে আমাশয়ে যেন কিছু নাই এক্রপ অল্পত্ব সহকারে শঙ্খদ্বয়ে ও কপালে অতীর শিরঃপীড়া (অর্দ্ধ-শিরঃশূল) অতি ঘন ঘন স্বপ্ন-দোষ। মূত্রের অতিদুর্গন্ধ।

ইথি অপ্স এণ্টিমোনিয়ালিস।—আময়িক প্রয়োগ।—গগুনাল জনিত চক্ষু প্রদাহে, বিশেষতঃ চক্ষুর গুরুমণ্ডলে ও কনীনিকায় স্বচ্ছ রক্তাশুপূর্ণ স্ফোট থাকিলে এই ঔষধের তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

ইক্সুলা হেলেনিয়ম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রসব সময়ের ছায় সরলান্ব ও জননাস্থের অভিমুখে প্রচাপন ও আকর্ষণ অল্পত্ব, বোধ হয় যেন কিছু বাহির হইয়া আসিবে। জরায়ুতে প্রবল বেদনা, ও পৃষ্ঠ-বেদনা, বল ও মূত্রের বেগ। (সিপিয়া)। আময়িক প্রয়োগ। স্তূতিসারের প্রবণতা সহ পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ।

ইপিজিয়া রিপেন্স।—আময়িক প্রয়োগ।—মূত্র-কুষ্ঠ সহ মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, মূত্র-ভ্যাগান্তে কুহন, মূত্রে প্লেগ্মা ও পুথ এবং উইরিক এসিড অধঃপতন (তলানি)। শ্রান্তিজনিত শিরঃপীড়া।

ইপিফিগাস ভার্কিনিয়ান।—আময়িক প্রয়োগ।—সবমন শিরঃপীড়া, শঙ্খ-দ্বয়ে, বাহির হইতে ভিতরের দিকে বেদনার প্রচাপন, বামভাগে উহার আধিক্য ও আঠা আঠা লাগা-স্রাব। অসাধারণ উত্তেজনা বা শ্রান্তি বশতঃ উহার উৎপত্তি।

ইলিইস গিনীলিস।—আময়িক প্রয়োগ।—দ্যুরোডার্মা (চর্মের দৃঢ়তা)।

ক্লিয়ারিয়াসিস বা কঠিন অর্ধদ ( প্রধান ঔষধ )। এলিক্যাক্টিয়াসিস্ এরোবাম ( গৌণ বিশেষ )।

**ইস্কিউলাস গ্রাভা।**—বিশেষ লক্ষণ।—মস্ততার দ্বার আন্দোলিত গতি সহকারে শিরোঘূর্ণন। বিশৃঙ্খল স্থিতি। মস্তকের গুরুত্ব। বাক্যের হ্রাস। আমাশয়ে খলী। অতিশয় দুর্বলতা। কম্পন ও জঙ্ঘার আকৃষ্ণনের প্রবল প্রবণতা। আময়িক প্রয়োগ।—পৃষ্ঠবংশের রোগে দৃষ্টিশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস-প্রাপ্তি সহকারে জঙ্ঘাবয়ের পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত।

**একুইলিজিয়া ভলগারিস।**—আময়িক প্রয়োগ।—বিরজা নারীদিগের হিষ্টিরিয়া জনিত প্রেক-বিক্রম শিরোগীড়া, তৎসহ বিশেষতঃ প্রাতঃকালে হরির্ঘর্ষ পদার্থ বমন। গুণ্ডা-বায়ুজনিত গোলক ( শ্লোবঃস হিষ্টিরিকঃ )।

**একোনাইটম।**—আময়িক প্রয়োগ।—স্নায়ু-শূল, বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের স্নায়ু-শূল; অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধভাগের স্নায়ুতে বিশেষ বেদনা, সঞ্চলন ও আন্দোলনে উহার আতিশয়্য। ডাঃ হিউজ ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন।

**একোনাইটম ফিরক্স।**—বিশেষ লক্ষণ।—শ্বাসকষ্ট; উঠিয়া বসিতে হয়। শ্বাসের দ্রুততা। শ্বাস-ক্রিয়া-নিষ্পাদক পেশীর পক্ষাঘাত অনুভব, হইতে শ্বাস-রোধ সহকারে উৎকর্ষ। আময়িক প্রয়োগ।—হৃদয় জনিত শ্বাস-কষ্টে এই ঔষধ যাপ্যকর। একোনাইটম নেপেলাস অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর প্রবল ও সাংঘাতিক। ইহাতে অধিক সিউডোএকোনাইটিন নামক বীৰ্য্য এবং একোনাইটম নেপেলাসে অধিক একোনাইটিন নামক বীৰ্য্য বিद्यমান আছে। এতদ্বারা পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের স্নায়ু-শূল জন্মেনা বলিয়া বোধ হয়।

**এক স্য মিটিকিট।**—আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষতে, বিশেষতঃ শিরোক্ষাতি বিশিষ্ট উষ্ণ ক্ষতে অমিশ্রিত বা জল মিশ্রিত আকারে এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ স্থলে ক্ষতের আরক্ততা, ক্ষতাক্তর, ও কেবল অভ্যঙ্গমাত্র আবরণ থাকে।

**এডোনিস ভার্ণেলিস।**—আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের বল অধিকতর হয় এবং নাড়ীর অধিকতর নিয়মিততা-জন্মে, ইহার ক্রিয়ায় মূত্র অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এম্বুমেণ ও শোণ অগুহত হয়। হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগে ও তৎসংঘর্ষী শোথে এডোনিস ব্যবহারের বিধি আছে। হৃৎপিণ্ডসংক্রান্ত শ্বাস-কাস। এই ঔষধের প্রধানতঃ মাদারটিক্কার, ৫—১০ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

**এণ্টিপাইরিণ।**—আময়িক প্রয়োগ।—সংযমীয় শিরোগীড়া, থাকিয়া, থাকিয়া বেদনার আবেশ। প্রভূত রক্তস্রাব সহকারে রক্ত-শূল ( উত্তম ঔষধ )। তীব্র প্রসবাত্তিক বেদনা। দিবসে ও রাত্রিতে বালক-বালিকাদিগের শয্যা-মুত্র-রোগ ( অত্যন্ত ঔষধ বিহীন হইলে )। \* প্রথমে দুগ্ধমণ্ডলে ও বাহুতে, সর্বশেষে জঙ্ঘা-দ্বয়ে এণ্টিপাইরিণ ( অক্লিমিয়া ) ৫



পুরাতন আর্টিকেরিয়া, (শীতপিত্ত) বিশেষতঃ জী-লোকদিগের, উহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন ও কন্দবৎ উদ্ভেদ। ক্রূপাস ডিপথিরিয়ার কৃত্রিম স্নিগ্ধীর অল্পরূপ তালু-মূলে ও গল-কোষে কৃত্রিম ঝিল্লী এবং অতিশয় অবসন্নতা ও এলবুমিনুরিয়া (সাণ্ডাল মূত্র)। নাসিকা হইতে প্রভূত রক্ত-পাতে ভুলায় করিয়া ইহার এক-ইহতে দশদিন মাত্রায় বাহ্য প্রয়োগ করিলে রক্ত-রোধ সংসাধিত হয়।

এণ্টিমোনিয়ম আসেনাইটম।—আময়িক প্রয়োগ।—\* ফুসফুসের এম্ফিসিমা ও কাসে অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট, আগারে ও শয়নে উহার আধিক্য। শ্বাস-কাস; পীতবর্ণ নিঃস্রবন বিশিষ্ট কাস। ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ। প্রতিশ্রায় জনিত ফুসফুস-প্রদাহ। হৃদেই-প্রদাহ হৃৎ-শূল।

এণ্টিমোনিয়ম সলফিউরেটম অরেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—\* প্রকালনের অবাবহিত পরে-নাসিকার রক্ত-পাত। নাসিকা; গলা; ও বায়ু-নলী-ভূজের বিবদ্ধিত নিঃস্রব। শ্বাস-কষ্ট। আময়িক প্রয়োগ।—নাসিকার ও বক্ষঃস্থলের তরুণ ও পুরাতন প্রতিশ্রায়ের এইটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; পচ্যমান বয়োব্রণেও ইহা উপযোগী।

এনাকার্ভিয়ম অক্সিডেটেল।—বিশেষ লক্ষণ।—সাধারণতঃ মুখমণ্ডলে ফোঁকা সদৃশ উদ্ভেদ, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানেও উহার উৎপত্তি। অসহ্য কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট বসন্তের পীড়-কার অল্পরূপ নাতী-সংযুক্ত পচ্যমান পীড়কা। মুখমণ্ডলে বিসর্পজনিত উদ্ভেদ, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে উহার প্রসারণ। বিসর্পজনিত প্রদাহ দক্ষিণ হইতে বামদিকে যায়। গ্রীবার স্তম্ভতা, নড়িত চড়িতে আরম্ভ করিলে উহার অতিশয়। রসটক্স জনিত বিসর্প এনাকার্ভিয়ম অক্সিডেটেল দ্বারা নিবারিত হয়।

এনাথিরম মিউরিকেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রতি মিনিটে মূত্র-বেগ সহকারে মূত্রাশয়ে প্রাচাপন ও জ্বালাকর বেদনা; মূত্রাশয় অত্যন্তমাত্র মূত্রও ধারণ করিতে পারেনা। আবিল, গাঢ়, স্লেচ্ছাপূর্ণ মূত্র। বিচরণ-কালে ও রাত্রিতে নিদ্রা-কালে অজ্ঞাতসারে মূত্র-নিঃসরণ সহকারে অব্যবহিত-মূত্র। জরায়ুতে আকৃষ্ট ও প্রচাপিতবৎ বেদনা। জরায়ুতে জ্বালাকর বেদনা, বৃদ্ধক পর্য্যন্ত উহার সংপ্রসারণ। জরায়ুর ক্ষীণতা ও আক্ষেপ। বন্ধ্যাত্ব। কণ্ডূয়ন, ও লিকেনের জায় উদ্ভেদ। আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রাশয়-প্রদাহ। অব্যবহিত-মূত্র। স্নায়বীয় ও আক্ষেপিক রক্ত-ক্লম্ব। উপসর্গ শূন্য লিকেন রোগ।

এনিসম ফিলেটম।—\* বিশেষ লক্ষণ।—\* দক্ষিণ পার্শ্বের তৃতীয় পর্জকার উপাধির বেদনা সহকারে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ।

এম্ব্রুকোকেলাই।—আময়িক প্রয়োগ।—বিচর্ডিকা (সোর্দিএসিস) যোগে ইহার তৃতীয় দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহারের বিধি আছে।

এপিয়ম গ্র্যাভিওলেস।—আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষতাজুর বিশিষ্ট ক্ষত হইতে প্রভূত জ্বাৰ নিঃসরণ, বৃক্কাস্থির উপর গ্রীষ্ম আকুণ্ণ, তৎসহ শয়নে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আকর্ষণ অল্পভব।

**এভিনা সেটাইভা ।** —আময়িক প্রয়োগ ।—ইনফ্লুয়েন্স, ওলাউঠা প্রভৃতি দৌর্য্যল্যকর রোগের পরবর্তী দুর্বলতা । ফুসফুসের গুটিকা রোগ, নিদ্রাহীনতা, বিশেষতঃ মর্ফিয়া অপব্যবহারের পক্ষ । এক এক মাত্রায় এই ঔষধ ৫ হইতে ১০ বিন্দু মাদার টিঙ্কার ব্যবহারের বিধি আছে ।

**এমোনিয়কম ।** —বিশেষ লক্ষণ ।—দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, সন্ধ্যাকালে প্রায় দৃষ্টি-হীনতা । শ্লেষ্মা নিগ্ধবন । শ্বাস-কৃচ্ছ ও বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব । উৎকর্ষ ও অস্বচ্ছন্দতা সহকারে হৃদয় শ্বাস ফুসফুসের উর্দ্ধভাগে উহার আতিশয্য । নিশ্বাস গ্রহণে গোরব, তৎসহকারে বাম অর্ধ বক্ষে হৃদী-বেদনঃ যাতনা । বক্ষঃস্থলে বেদনা সহকারে অকুঞ্চন ।

**আময়িক প্রয়োগ ।** —শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাস কাসে ও শ্বাস-যন্ত্রের প্রতিশ্রায় জনিত পীড়ায় এমোনিয়কম একটা উত্তম শ্লেষ্মা-নিঃসারক ঔষধ । বিমুক্তভাবে শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে হৃদী-বেদ, সমুখ কপালে শিরঃপীড়া, ও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি লক্ষণাপন্ন তীব্র ব্রঙ্কাইটিস রোগে এতদ্বারা উপশম জন্মিয়াছে । রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা বিমুক্তভাবে নিঃসরণ এবং সায়াক্ষে ও রাক্ষিতে বৃদ্ধি লক্ষণাপন্ন কাসেও ইহা ফলপ্রদণ অতি দুষ্কৃত নিগ্ধবন, যেন কিছু ছিড়িয়া আলগা হইবে এপ্রকার অহুভব; রোগীর ব্রঙ্কাইটিস ধারণ; ও রাক্ষিতে বৃদ্ধি লক্ষণ বিশিষ্ট পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে এই ঔষধ অনেক সময় ব্যবহার হয় এস্থিনোপিয়া রোগে, বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোকে চক্ষুর জালা ও যাতনা হইলে ফ্যারিংটন এই ঔষধ ব্যবহারের বিধিদেন । চক্ষুর বিশেষতঃ উহার অভ্যন্তরীণ কোণের রক্তাধিক্য ও দপদপানি । এই ঔষধ বেলেডোনা ও রুটার মধ্যবর্তী ।

**এমোনিয়ম বেঞ্জোইকম ।** —আময়িক প্রয়োগ ।—স্ফার্লেট ফিভারের পরবর্তী শোথে, স্বপ্ন, মলিন, উগ্রগন্ধ, ধূমবৎ-দৃষ্ট মূত্র লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবসত হয় ।

**এমোনিয়ম ব্রোমেটম ।** —বিশেষ লক্ষণ ।—কর্ণদ্বয়ের উপরে ফিভার বন্ধনের জায় অল্পভব । প্রাতে মুখ বিবরে দগ্ধবৎ যাতনা । গল-কোষের পশ্চাভাগে শুভ্র, আঠা আঠা, রক্তের রেখাঙ্কিত শ্লেষ্মা । গল-গহ্বরে উপদাহ ও কাসের প্রাবৃতি । সন্ধ্যাকালে গলা তুড় তুড় করিয়া কাসের উদ্বেক । শুভ্র, আঠা আঠা শ্লেষ্মা-নিগ্ধবন । **আময়িক প্রয়োগ ।** —বাম ডিম্বাশয়ের নায়ু শূল । বক্তাদিগের শ্বস-যন্ত্রের পুরাতন প্রতিশ্রায়ে ইহা উত্তম ঔষধ; শুষ্ক, আক্ষেপিক, অনবরত কাস, বিশেষতঃ রাক্ষিতে, তৎসহ গল-কণ্ডূয়ন, উত্তাপ ও জালা । কৃত্রিম ক্রুপার ব্রঙ্কাইটিস, ডিপথিরিয়া জনিত শ্বস-যন্ত্রের ক্রুপ, নাসিকার পশ্চাৎ-রক্তের পুরাতন প্রতিশ্রায় প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে । পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের তরুণ উপচয়, বক্ষঃস্থলে ঘড় ঘড় শব্দ, আয়াসিত ও যাতনাযুক্ত নিগ্ধবন । বক্ষঃস্থলে হাতদিয়া চাপ দিলে বেদনার উপশম; কাসের আক্রমণ বশতঃ স্ননিদ্রার অভাব; লীর্ণ মুখাঙ্কতি ।—গল-কোষে জালা, গলার মধ্যে ও গল-কোষে শুভ্র, গাঢ়, ফেণিল ও রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা । থক্ থক্ করিয়া কাসিবার আবশ্যকতা । গিলিবার চেষ্টায় কষ্ট, কিন্তু গিলিতে কষ্টাভাব ।

গলা পরিকাষের চেতায় ভুক্ত দ্রব্য বমন। প্রাতে লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি। এই সকল লক্ষণে ডাঃ ওয়েগ পুরাতন ক্যারিঞ্জাইটিস রোগে এই ঔষধের জলীয় দ্রব এক কুইতে দশ বিন্দু মাত্রায় দিনে তিন বার ব্যবস্থা করিতে বিধদেন।

**এমোনিয়ম আইওডেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—**পুরাতন স্বরংগ-প্রদাহ ও [বায়ু-নলী ভুক্ত-প্রদাহ, ক্রুপাল ব্রঙ্কাইটিস, এবং টিউবার কিউলস ল্যারিঙ্গিস। ইহার ফিরা। আইওডিয়মের অল্পরূপ বটে, কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলতর।

**এমোনিয়ম ফস্ফরিকম।—**হস্তাঙ্গুলী ও হস্ত-পৃষ্ঠের সন্ধির চূর্ণময় পদার্থের সহকে কোন কোন স্থলে এই ঔষধ ফল প্রদ। সন্ধিবাৎ বশতঃ এই সকল সন্ধিত পদার্থ দ্বারা সন্ধি-স্থানের পুরাতন বিকৃতিতেও ইহা ব্যবহার্য। গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। স্বক-সন্ধির বাত জনিত দায়ু-শূল। ( উৎকৃষ্ট ঔষধ )।

**এমোনিয়ম পিট্রিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—**নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত, দন্তকের পশ্চাত্তাগের দক্ষিণ পার্শ্বের দায়ু-শূল, কর্ণ, অক্ষি-গহ্বর ও হস্ত পর্যন্ত সংপ্রসারিত রক্ত করণবৎ বেদনা, উঠিলে শিরোগূর্ণন, বিশেষতঃ অনিয়মিত ঋতু-লক্ষণাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

**এম্পিলোপলিস কুইংকুই কোলিয়া।—আময়িক প্রয়োগ।—**যেসকল রোগী বাল্যকালে গণ্ডমালা-দোষ-গ্রস্ত ছিল তাহাদের পুরাতন স্বরভঙ্গ।

**এমিগডালা এমার।—বিশেষ লক্ষণ।—**গল-কোষ, অলি-জিহ্বা এবং তালুসুলের মলিন অরক্ত রক্তাদিক্য। তীব্র, কষ্টমবৎ বেদনা, তজ্জন্ত রোগীকে চিংকার করিয়া কাদিতে হয়, গিলিতে অতিশয় কষ্ট। সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা। **আময়িক প্রয়োগ।—**ডিপথিরিয়া টাসলাইটিস।

**এট্রোপাইনম।—বিশেষ লক্ষণ।—**প্রলাপ; রোগীকে কোন কথা বলিলে সে অনেক সময় উন্টাদিকে মাথা ফিরায়। অটৈতন্ত। কেরোটীর ভূমিদেপে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে, এতোক বার সঞ্চলনে বিদ্ধবৎ ( খাঁচামারারমত ) অল্পভব, পদবিক্ষেপে উহার আর্দ্রিক্য। আকৃষিতবৎ অল্পভব, ইটিলে খোঁচামারার মত বোধ হয়। প্রাতে জাগরণান্তে বাম শজ্ঞস্থলে বিদ্ধবৎ বাতনা, কর্ণের পশ্চাৎ পর্যন্ত উহার প্রসারণ, খোলাবাটাং নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। প্রসারিত কনীনিকা। দ্বিত্ব-দৃষ্টি অর্থাৎ একটা বস্তু দুইটা দেখা। আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল। উন্মাদবৎ মুখাকৃতি। গলার শুষ্কতা। গলাধঃকরণে খাল-রোধকর আক্ষেপের উৎপত্তি, উহাতে বাতনা ও মুখভঙ্গী ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপ। \* দুগ্ধ ও সর্বপ্রকার ভুক্তদ্রব্য বমন। স্পর্শ-ষেব সহকারে আমাশয়-গহবরে আকৃকনকর, জ্বালাজনক, ও প্রচাপনবৎ বেদনা। শূত্র উল্কার। \* বামজাহ্নু, বামজন্বা, এবং দক্ষিণ পদ-স্বর্গের স্তম্ভতা। মুখমণ্ডল এবং শরীরের উপরের অর্দ্ধাংশের স্থাল্টিনার ভায় আরক্ততা; স্বকের উত্তপ্ততা ও পরিণকতা। **আময়িক প্রয়োগ।—**অক্ষি-গহবরের উপরের

ভাগের দ্বায়-শূল, মনোভাবে উহার উপচয়, জাহ্নব নিয়ভাগে দ্বায়শূল, স্বল্পজড়াইরা উচ্চ করিলে উহার উপশম। বেলডোনার লক্ষণ বিশিষ্ট কর্ণ-বেদনা, মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ, পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, ও ক্যালেনটিন। ক্যালপার বলেন যে বেলডোনার লক্ষণের কেবল দ্বায়বায় লক্ষণগুলিতেই এট্রোপাইন উৎকৃষ্টরূপে উপযোগী। আমাশয়ের পুরাতন রোগ, বিশেষতঃ আমাশয়-গহ্বরের ক্ষত, তৎসহ অতিশয় যাতনা ও সকল প্রকার ভুক্ত দ্রব্য বমন। (বার, কাফকা, হানসেন)। উপদংশ, পিত্তাশ্মরিজনিত শূল-বেদনা, পেরিটোনাইটিস, এবং সবিরাম জরের ঘর্ম্মাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে।

এরম ম্যাকিউলেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—জিহ্বার এত অধিক ক্ষীততা যে কিছু গিলিতে পারা যায় না। জিহ্বায় নহসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটী-বেধের ছায় যাতনা এবং জিহ্বার উপরে জালা, কতিপয় ঘটিকা পরে উহার অবস্থিতি রক্ত-বমন। প্রায় অদম্য নিদ্রামুতা, বিশেষতঃ আহারের এক ঘটিকা পরে, তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্ততা।

এরেশো মরিটেনিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—স্তম্ভপায়ী শিশুদিগের প্রতিনিয়ত অতিসার। মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্রাব। বক্ষঃস্থল, উর্দ্ধশাখা ও কর্ণের পশ্চাত্তাগের পামা (একজিমা)। অপচ্যমান পীড়কা, অসহ্য কণ্ডুয়ন ও তুড়ুড়ি অহুতব। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

এরেগিয়া সায়েন্সিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—চক্ষুর নীচের পাতাধরের অবিরত স্পন্দন।

এলকোহল।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ প্রভল দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এলকোহল দ্বারা ডিপথিরিয়ার ঝিল্লী দ্রবীভূত হয় এবং উহার বৃদ্ধি নিবারিত হয়। জলমিশ্রিত ত্রাণ্ডির আকারে এলকোহল দ্বারা যে কেবল উহার বৃদ্ধি নষ্ট হয় তাহা নহে কিন্তু ভয়ঙ্কর অবসন্নতা ও প্রতিরুদ্ধ হয়।

এলসন রুত্রা।—আময়িক প্রয়োগ।—বিবর্জিত হস্ত-নিম্ন গ্রহি। জরায়ু-গ্রীবার অবদরণ বিশিষ্ট প্রদর, উহা হইতে সহজে রক্তস্রাব। রক্তস্রাব, পৃষ্ঠ হইতে মগিপূর পর্য্যন্ত জালাকর বেদনা। পুরাতন ইন্ডবিদ্ধ (হার্পিজ)।

এলেক্টোনিয়া স্কলারিস।—আময়িক প্রয়োগ।—শিবিরে বাস বশতঃ অজীর্ণ দ্রব্য শ্রাবী অতিসার, রক্তময় অতিসার। মন্দজল পান জনিত, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ামূলক অতিসার। অবসাদ-জনক জরের পরবর্তী দুর্বলতা। ভারতবর্ষের ম্যালেরিয়া জ্বর।

এলিয়ম স্ট্রাটাইভম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে মস্তকের পশ্চাত্তাগে মৃদু মৃদু বেদনা। পূর্বাহ্নে, রাত্রির আহারের পর ও রাত্রিতে মুখে জ্বং মিষ্ট অতি প্রভূত লাগার এসেক। অল্পে অবিরত অতীত বেদনাসহকারে কোষ্ঠবদ্ধতা। জ্বং শুভ্র অতি প্রভূত মূত্র; নাইট্রিক এসিড সংযোগে উহাতে সুরোৎপত্তি; বৃহত্তর ভগাধরে ও অপত্য-পথে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ চিহ্ন, উহাতে কণ্ডুয়ন ও বেদন। \* জিহ্বা কণ্টকের বিলুপ্তি সহকারে জিহ্বার

অনুজ্ঞা লোহিত আকৃতি। বায়ু-নালীতে অবিরত স্বেদার ঘড়ঘড় শব্দ। প্রাতে শব্দা-বৃহ পরিচ্যাগের পরে অসাধারণ প্রভূত স্বেদা-নিজীবন বিশিষ্ট কাস, এই স্বেদা ছন্দে, উহা সহজে উঠেন। গীতল বায়ুতে অধিক অনুভূতি।

এলুমেন।—বিশেষ লক্ষণ।—গল-নালীর নিয়ন্ত্রণে জ্বালাকর বেদনা। শিশুর অভিসারের দ্বায় পীতবর্ণ অভিসার; অনন্তর কোষ্ঠবদ্ধতা। মলের সহিত রক্ত। মূত্র-বেগ। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ। গল-কোষে গোঁজের দ্বায় চাপ, তৎসহ পরিশুদ্ধতা ও চৌচ-ফুটা বাক্তবৎ অনুভব। কথাবলিলে শ্রবণের তুড়তুড়ি, ও কাসের উদ্রেক। সায়াহ্নে শয়নান্তে শুষ্ককাস (নল ভয়)। দক্ষিণ পদ-তলে খল্লীবৎ আকর্ষণ। আময়িক প্রয়োগ।—সীমশূল ও কোষ্ঠবদ্ধতা। শুষ্ক ফ্যারিঞ্জাইটিস। টাইফয়েড জরে অস্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও অতিশয় রক্ত-খণ্ড নিঃসরণ।

এলুমিনিয়াম মেটেলিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—কেন্দ্র-মূলক দৃষ্টি-দৌর্বল্য; (এম্ব্লোপিয়া)। টেবিস ডসেলিস (বিনিম ঘোষণে এলুমিনিয়ার লক্ষণ বিশিষ্ট চারিজন রোগী এই ঔষধে আরোগ্য করিয়াছেন)।

এসিমিনা টিলোবা।—আময়িক প্রয়োগ।—বয়োব্রণ; কণ্ডুয়নকর লোহিতবর্ণ ব্রণ, প্রথমে বামদিকে, অনন্তর দক্ষিণ দিকে উহার উৎপত্তি। সায়াহ্নে বস্ত্র পরিচ্যাগকালে কণ্ডুয়নকর প্রচ্যমান (যাহা পাকে) বয়োব্রণ।

ওনিস্কসএসেলস।—বিশেষ লক্ষণ।—মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মুখাকৃতির প্রম-জ্ঞতা। চিরস্থায়ী বমন। অস্ত্র কুজন ও উদরের প্রসারণ সংযুক্ত স্ত্রীত উদর-বেদনা (কলিক) মল-মূত্র ত্যাগ ব্যতীত মূত্রাশয় ও সরণাঙ্গের কুহন। অতিশয় শারীরিক অবচ্ছন্দতা সহ মূত্র-মার্গে কর্তনবৎ জ্বালা।

ওনোনিস স্পাইনোসা।—আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহ।

ওনোসমোডিয়াম ভার্জিনিয়ানম।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে জাগরণান্তে, প্রধানতঃ বামদিকে মস্তকের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগে বেদনা। মস্তকের পশ্চাৎভাগে, উর্দ্ধ-দিকে প্রচাপন বিশিষ্ট অতীত গৌরব স্ফূর্ণ বেদনা, তৎসহ শিরোঘর্ণন (জেল, সিমিসি)। চক্ষুর অতি চালনাশতঃ শিরোবেদনা, চক্ষুতে শ্রান্তি অনুভব, অধ্যয়নে বা সন্নিবৃত্ত দৃষ্টিতে উহার আতিশয্য। পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা, সতত সন্ধমেস্ত্রিয়ের উত্তেজনা, উগ্র উদগম, পদদ্বয়ে ও স্নজ্জ্বাঘ্নে অবশতা ও ঝিন-ঝিনকরা।

অসিমম ক্যানম।—আময়িক প্রয়োগ।—প্রবল বমনসংযুক্ত বৃক্ক-শূল (বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের)। ইউরিক এসিড ধাতুদোষে, অধিক পরিমাণ রক্তবর্ণ রেণু অধঃক্ষেপ লক্ষণে, বিশেষতঃ রোগীর মূত্র-বাহী নালীতে বেদনা থাকিলে, ডাঃ ডনহাম অনেক সময় এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন। বৃক্কদ্বয়ে খল্লীবৎ বেদনা। অধিক পরিমাণে বৃক্ক-অথবা গাঢ় পুঙ্খ মূত্রস্রাব।

ককসিনেনলা সেপটেম্পকটেটা।—আময়িক প্রয়োগ।—দক্ষিণ চক্ষুর উপরে কপালে দ্বায়বীয় শিরঃশিরা, স্পর্শে উহাতে অতিশয় অস্থিত। হিকা ও আমাশয়ে জ্বালা, ক্ষিপ্র বৃদ্ধক-প্রদেশে বিশেষ বেদনা। (ডোরিকোরা, কাহ)। ক্ষয়িত দন্তজনিত দন্তবেদনায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কার্বনিয়ম অক্সিজিনাইসেটেম।—বিশেষ লক্ষণ।—মণ্ডলাকারে ঘূর্ণনের প্রবৃত্তি। \* হৃদযন্ত্রের স্তূচ-সংরোধ। স্বকের স্পর্শ-জ্ঞানের বিলুপ্তি, কিন্তু তপ্ত লৌহদ্বারা অত্যন্ত মাত্রা সংস্পর্শে পুনরায় স্পর্শ-জ্ঞানের আবির্ভাব। কয়েক দিন পর্যন্ত অতিশয় দীর্ঘালুতা। আময়িক প্রয়োগ।—হৃদযন্ত্র। সায়োটিক দ্রাব্য ও পঞ্চম দ্রাব্যযুগ্মের দীর্ঘালুতি জ্বোকার উৎপত্তি এবং উহার হার্পিক জ্বোকার (ইন্ডবিজ) রোগের সহিত সাদৃশ্য। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-স্ফোট বিশিষ্ট পেম্ফিগঃস (ফেরিংটন)।

কার্বনিয়ম সংলকিউরেটেম।—আময়িক প্রয়োগ।—মিনিয়ার টিজিঅ অর্থাৎ ক্ষতিমূলক শিরোঘূর্ণন (কট, আলিসি-এসি)। বধিরতা সংযুক্ত বা বিবর্তিত দীর্ঘকাল-স্থায়ী কর্ণ-নাদ এই ঔষধের প্রথম ক্রমে সেবনে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা এই ঔষধ পদার্থের কার্যকরে তাহাদের ধ্বজভঙ্গ জন্মে (হিউজ)।

কালী আর্সেনিকোজম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুক বা আর্দ্র পুরাতন পামা; বাহ্য চর্মের স্বাভাবিক আকৃতি অপেক্ষা অধিকতর স্থূলতা ও কঙ্কশতা, উপস্থক স্থলন, গাত্র উষ্ণ হইলে কণ্ডুয়ন, রেগীর আলস্ত, নীরস্ত, মলিন মুখাভি। সর্ব শরীরে সঙ্কটিক পামা, স্বকের আরক্ততা, হাঁটবায় সময় ও কাপড় ছাড়িলে কণ্ডুয়নের আতিশয্য। শক ও কণ্ডুয়ন সংযুক্ত সোরিএসিস (বিচর্জিকা), চুলকাইলে উহার আধিকা, শকের নীচে অতিশয় আরক্ত চর্মের বিজ্ঞানিত। লাইকেন, উদ্বেদ গুলির বহু, উহার উপরে জ্বৎ গুল চিপিটিকা (মামডি), বাহ ও জাহুর অবনতিতে বিদারণ। বয়োব্রণ, বৃহৎ পচ্যমান উদ্বেদ, ঋতুকালে আতিশয্য। গভীর তল ও বিপর্যস্ত প্রান্তবিশিষ্ট গলিত ক্ষত। সন্ধিস্থানে গাউট-জনিত চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয়, বাতান্তপের পরিবর্তনে উহার বৃদ্ধি ও তখন উহাতে বেদনা।

কালী পামেজানিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—ডিথিরিয়া। গলার অভা-  
স্তরের ও বহির্ভাগের ক্ষীণতা, \* কৃত্রিম বিদ্যায় ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। উপজিহবার জলপূর্ণ ক্ষীণতা।  
পাতলা, পুষের মত নাসা-স্রাব, নাসা-রক্তে, স্বর-যন্ত্র ও কর্ণ পর্যন্ত বেদনার সংপ্রসারণ, অবিরত  
দ্রোক গলিবার প্রবৃত্তি, কিন্তু গলাধঃকরণে বাতনা। মুত্রাধিকা; দুর্দ্দম্য কোষ্ঠরোধ ও অতিশয়  
দুর্বলতা। মলিন-বর্ণ, ও দুর্গন্ধময় অতিসার এবং তৎসহ মুখদিয়া তরল পদার্থ বমন ও  
উহার নাকদিয়া পতন। অত্যন্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বিফলাস্তে এই ঔষধে কতকগুলি আশাশ্রু  
রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অর্দ্ধগ্রাস জলে তিনগ্রেণ, ঔষধ মিশ্রিত করিয়া একঘণ্টা  
তত্তর একড্রাম মাত্রায় সেব্য। আট আউন্স জলে কুড়ি সেটিগ্রাম (একগ্রামের একশত

ভাগের একভাগকে সেণ্টিগ্রাম বলে ) মিশ্রিত করিয়া ক্ষত বিশিষ্ট গলা-বেদনার ইহার কুলি ব্যবহৃত হয় ।

**কালী-ফসফরিকম ।**—ডাঃ হুসলার বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসা নামে একপ্রকার অভিনব চিকিৎসার আবিষ্কার করেন । তিনি দ্বাদশটি ঔষধ প্রকাশিত করিয়াছেন । এই ঔষধ গুলিকে ইংরেজীতে টিসু রেমিডি বলে । মানব-দেহের আভাবিক উপাদান হইতে এই বারটি ঔষধ প্রস্তুত । রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে এইগুলি বিধান-ভঙ্গর অণুকোষের লাভনিক উপাদান । ( সেল-সার্টস ) । তিনি বলেন মইদু-শরীরের সর্বমুখ রোগই এই কয়টি ঔষধে আদৌগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে । ডাঃ হেরিংও এই কথা সমর্থন করেন । ডাঃ হুসলার তাঁহার ঔষধগুলি বিচূর্ণাকারে ব্যবহার করেন । তৃতীয় দশমিক, ষষ্ঠদশমিক ও দ্বাদশ দশমিক শক্তির বিচূর্ণই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তরুণ রোগে তৃতীয় দশমিক ; এবং পুরাতন রোগে ষষ্ঠ ও দ্বাদশক্রম ব্যবহৃত হয় । ঔষধগুলি এই :—( ১ ) ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা । ( ২ ) ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা । ( ৩ ) ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা । ( ৪ ) ফিরম ফসফরিকম । ( ৫ ) কালী-মিউরিয়েটিকম । ( ৬ ) কালী-ফসফরিকম । ( ৭ ) কালী-সলফিউরিকম । ( ৮ ) গ্যাঙ্গেশিয়া ফস-ফরিকা । ( ৯ ) জাট্রম-মিউরিয়েটিকম । ( ১০ ) ন্যাট্রম ফসফরিকম । ( ১১ ) ন্যাট্রম সলফিউরিকম । ( ১২ ) সাইলিশিয়া ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—\* স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা । স্মৃতির অপচয় । সাহিত্যিক বা কার্য-জীবদিগের মস্তিষ্কের অবসন্নতা । \* দারুণ সঙ্গম-প্রবৃত্তি । আয়ুগ্নিক প্রয়োগ ।—কালী ফসফরিকম ডাঃ হুসলারের বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসার একটা টিসু-রেমিডি । স্মারবীয় দুর্বলতাই এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ । স্মারবীয় দৌর্বল্য । \* তরুণ রোগের পরবর্তী পেশীর দুর্বলতা । অপ্রস্থল, অবসন্ন, রোষ-প্রবণ মানসিক অবস্থা ; রোগীয় সকল বস্তুই বিষন্ন ভাবে দর্শন । বালকবালিকাদিগের স্মৃতিহীনতা ও ক্ষণরাগিতা ( খিটখিটে স্বভাব ) । বিষাদ-বায়ু, উন্মাদ, অলীক দর্শন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কল্পনা, স্মৃতিকোন্মাদ, পানাত্যয় । \* টাইফয়েড জ্বর :—কণিশবর্ণ, পরিণুক্ত জিহ্বা, \* দুরিত অতিসার, নিম্ন-গতি নঃড়ী, দস্তে দস্ত-শব্দরা ( সডিঙ্গ ) । মুদ্রাশয়ের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ অসাড়ে মুদ্রাস্রাব, মুদ্রাদারণ করিতে অসমর্থতা । পৃষ্ঠের বাতজনিত খণ্ডতা, উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিবার পর উঠিবার সময় এবং নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিবার সময় উহার বৃদ্ধি ( রসটক্স ) মুখের পচাকত । শীতাদ । পচনজনিত রক্তস্রাব । শ্বস-রক্তের পক্ষাঘাত । অঙ্গুরীয়কের জায় ইঙ্গলুপ্ত । অলকস ভেন্ট্রিকিউলাই ।—এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয় ।

**কালীফেরো-সায়েনিকম ।**—আয়ুগ্নিক প্রয়োগ ।—জরায়ুর আবেগ, পুষ্যদৃশ প্রদর, আব্দিক বটে কিন্তু উপদাহকর নহে ; বিষমতা ও অশ্রুশাত । উদরোচ্ছ্বাসে

নিমগ্নতা ( সিক্তি ) অল্পভব । জরায়ুর শৈরিক রক্তশ্রাব ও তজ্জনিত দুর্বলতা । হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার সহিত আমাশয়ের নিমগ্নতাহুডবের সংশ্লেষ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যার লাঘব, তৎসহ শীতলতা, শিরোর্যুর্ন ও অবশতা ( কালী-কার্ক ) । ফুলাফুলাভাব, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, শ্বাস-কষ্ট ও শোথের প্রবণতা সংযুক্ত ক্লোরোসিস । এই সকল রোগে এই ঔষধে উপশম জন্মে । জরায়ুর স্বাভাবিক সংস্থানের ব্যতিক্রমেও কালী-কেরো উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কালী মিউরিয়োটিকম ।—আময়িক প্রয়োগ ।—কালী মিউরিয়োটিকম ডাঃ হুসলারের বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসার অপর একটি টিসু-রেমেডি । চক্ষু, কণ্ঠ, ও গলঃ মধ্যের অনেক রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয় । জিহ্বার মূল-দেশে শুভ্র বা ধূসরলেপ । \* গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা বা আঠা আঠা পদার্থ নিগ্ধবন । \* তন্তুময় একজুডেশন ( ক্ষরণ ) । \* গ্রন্থির ক্ষীততা । অধিক মসলাসংযুক্ত দ্রব্য ও পিষ্টকাদি আহারে উপচয় । কণীনিকার, সান্তর-বিধানের ( প্যারেক্সাইমা ) প্রদাহ ও ক্ষত । চক্ষুর গুল্মগুলের তত আরক্ততা \* নহে ; ক্ষতের তলদেশের মলিন পীতবর্ণ, ধাতবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ । সম্মুখবর্তী কক্ষ পৃষ্ঠ সহ কিরোটো-আইরাইটিস । ( হিপার ) । ইউটেরিক্যান টিউবের ক্ষীততা বশতঃ বধিরতা, নাসা-গলকোষ-গহ্বরে একপ্রকার অবরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অল্পভব এবং কানে এক প্রকার চট্ চট্ শব্দ । ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস, ধূসর বা শুভ্র ক্ষরিত পদার্থ, পনিরের অল্পরূপ দলাদলা নিগ্ধবন, তালু-মূলের ক্ষীততা ও প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ধূসরবর্ণ তালি-তালি চিহ্ন । ( এই ঔষধ ডিপথিরিয়ায় উপকারী ) । শুভ্র জিহ্বাসহ অগ্নিমান্দ্য, আহারান্তে যাতন্য, বসায়ন্য দ্রব্য আহারে উপচয় । একজুডেশন ও হিপেটিজেশন বিশিষ্ট নিউমোনিয়া । ফাইব্রিনাস প্লুরিসি । মুখমণ্ডলের দক্ষিণভাগের ন্যায় পক্ষাঘাত, বদনের পেশীর স্পন্দন, আহারে, বাক্যে, অথবা স্পর্শে উপচয় । মুখ-বিবর কিংবা জিহ্বার ঔপত্যকীয় অর্কুদ । ( হুসলার আঙুর প্রদাহ, প্রমেহ, ও লাল-মেহ রোগেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন ) । কোমল উপদংশ, শ্বাস-কাস । শুভ্র ও হৃৎকব্জ নিগ্ধবনবিশিষ্ট হৃৎ-শব্দককাস । সন্ধি-বাত্তে সন্ধির ক্ষীততা । পুরাতন বাত । পামা । দক্ষ । এই সকল রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয় ।

কালী-সলফিউরিকঃম ।—আময়িক প্রয়োগ ।—এটীও ডাঃ হুসলারের দ্বাদশটি টিসু-ঔষধের একটী । \* শ্লেষ্মাময় পীতবর্ণশ্রাব । \* সাধারণ উপচয়, \* শীতল বিষুক্ত বায়ুতে উপশম । বিচর্চিকা । কাস, অল্প বা অধিক কাস সহকারে বকে শ্লেষ্মার অতিশয় বড়মড় শব্দ । উষ্ণ গৃহে কাসের বৃদ্ধি, শীতল, বিষুক্ত বায়ুতে উপশম । স্থান-পরিবর্তনশীল ব্যতের বেদনা, উষ্ণতায় উহার আধিক্য । প্রভূত, পীতবর্ণশ্রাব বিশিষ্ট চক্ষু-প্রদাহ । নবজাত শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহ । অক্ষি-পল্লবে চিপটিকা । এই সকল রোগে এই ঔষধ উপযোগী । পলসেটলা নাইট্রিক্যাসের সহিত ইহার ক্রিয়ায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে । হুসলারের ব্যবহারের পর কইতেই ইহা হোমিওপ্যাথিতে প্রচলিত হইয়াছে ।

কালীসায়েনেটঃম ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ডাঃ প্রট্রোজ এই ঔষধ জার্মান



( এক গ্রেণের একশত ভাগের একভাগ প্রতি চতুর্থ দিবসে ব্যবহার করিয়া ) দুইমাসে একজন রোগীর জিহ্বায় দৃঢ়, উন্নত, ও গ্রহিল প্রান্তবিশিষ্ট ক্ষত আরোগ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে কষ্ট হইত। অধ্যাপক মার্গোলিন এইক্ষত “কাল্পনের ক্ষত, জিহ্বার মূলভাগ আক্রান্ত, শব্দ-জিহ্বা অসাধ্য” বলিয়া রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

**কালী সিগিসাইকম।**—আময়িক প্রয়োগ।—সন্ধিবাত জনিত চূর্ণময় পদার্থের মঞ্চ। অঙ্গের বিকৃতিজনক সন্ধিবাত।

**কিউকারবিটা পেপো।**—আময়িক প্রয়োগ।—গর্ভাবস্থার বমন। সাময়িক বিবিধা ( মাদার টিফার )। পট্ট-কুমি ( টেপ-ওয়ারম ) রোগে ইহার বীজ অত্যন্তকষ্ট ফলপ্রদ।

**কিউমেগ্নিনঃম।**—আময়িক প্রয়োগ।—ফুসফুসের ক্ষয়রোগে দারুণ শিরো-বেদনা। বায়ু-নলিভুক্ত-সংক্রান্ত খাস-কাশ।

**কুপ্রম সলফিউরিকঃম।**—আময়িক প্রয়োগ।—অবিরত থক্ থক্ কাশ, উহাতে শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা। আক্কেপিক কাশ, রাত্রিতে উহার আধিক্য, অত্যন্ত শ্লেষ্মা নিষ্টিবন ( কমেয় ), এইপ্রকারের কাশে এই কুপ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট ( হানসেন )।

**কেইনকা।**—আময়িক প্রয়োগ।—শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ রাত্রিতে শ্বাস-কৃচ্ছ, সংযুক্ত এলবুমিনুরিয়া ( মাণ্ডলাল মূত্র ) রোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে; উদরী ও শোথেও ইহার প্রয়োগ হয়।

**কেওলিন।**—আময়িক প্রয়োগ।—কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রূপে, ঝিল্লী কণ্ঠনালীর গভীরস্থানে নিমগ্ন থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত। কণ্ঠনালীর লম্বালম্বি এবং বন্ধস্থলের উদ্ভভাগে অত্যন্ত স্পর্শ-দেয়।

**কেজিপুটম।**—আময়িক প্রয়োগ।—আলাপে, হাঙ্গে, আহারে, বা কোন প্রকার সঞ্চালনে হৃদয় হিতায় এই ঔষধ উপকারী।

**কোঁকেনঃম।**—আময়িক প্রয়োগ।—ফুসফুস হইতে রক্তপাত, আমাশয় হইতে রক্তশ্রাব ( রক্ত বমন ), জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব। অস্ত্র হইতে রক্তশ্রাব ( বাট দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশমিক ক্রমে ব্যবহারের বিধি দেন )। কোরিয়া, বেপথু, মদিরাপানজনিত কম্পন ও বাঙ্কক্য জনিত কম্পন। ( বাট পূর্কোক্ত ক্রমে ব্যবহার করিতে বলেন )। হস্তোগ কিংবা ফুসফুসের রোগে কখনও এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া বিধেয় নহে। মর্ফাইনের বিষ-দোষ বিনষ্ট করিবার জন্তও ইহা ফলপ্রদ।

**কোচলিএরিয়া।**—বিশেষ লক্ষণ।—\* মূত্র-ভ্যাগকালে, তৎপূর্বে ও তৎপরে লিঙ্গ-মণিতে জ্বালা ও কর্তনবৎ যাতনা। \* প্রতিদিন আট দশবার মূত্রতাগ।

**কোটলিডন অম্বিলিকঃম।**—স্রবণ, কণ্ঠনাগী ও গল-কোষের প্রতিশ্রাব, জন্মহ্নঃকম্প। সন্ধিস্থলে হিষ্টরিয়া জনিত বেদনা।

**কোটো বার্ক**।—আময়িক প্রয়োগ।—গুটিকাজনিত (টিউবারকিউলার) পুরাতন, জলবৎ অতিসার, অতি প্রভূত ও দৌর্বল্য জনক মলস্রাব।

**কোবাণ্টম**।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীরে ও আত্মায় সুখের অহুত্ব। নিদ্রা আশ্রয়-সাধ্য বা অতৃপ্তিকর অশ্রীল স্রব। ক্ষয়প্রাপ্ত দস্তে বেদনা, উহার অতিরিক্ত দীর্ঘতা অহুত্ব। উপস্থের উত্থান বাতীত অগ্নে শুক্রস্রাব, অথবা বিক্ষু-পাত। পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা, উপবিষ্ট অবস্থায় উহার আধিক্য, বিচরণে বা শয়নে উপশম। (ক্যান-ইণ্ড, সিপি, জিক)।

**আময়িক প্রয়োগ**।—শুক্রস্রাবের পর কটি-বেদনা, তৎসহ জন্মদায়ের দুর্বলতা।

**কোলানঃট (ফোরিকিউলিয়া একুমিনেটা)**।—আময়িক প্রয়োগ।—সুরাপায়ীদিগের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। গুটিকাজনিত (টিউবারকিউলঃস) অতিসার। মদিরা-মত্ততায় এই ঔষধে ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তি বিবদ্ধিত হয়। অধিক শ্বাস-কৃষ্ণ সংযুক্ত শ্বাস-কাস রোগের ইহা অমোঘ ঔষধ, স্বায়মণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া সকল রোগীই এতদ্বারা আরোগ্য লাভ করে। শ্বাস-ও-পেশীর দৌর্বল্যে কোলানঃটের দ্বারা কোন ঔষধই রোগীর বলরক্ষায় এত সমর্থ নহে। ইহার ব্যবহার কালে অনাহারে থাকিয়া ও ক্লান্তি অহুত্ব না করিয়া অনেককণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। ২৫ সেটিগ্রাম হইতে ৮ গ্রাম পর্যন্ত মাত্রায় দিনে তিনবার এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একগ্রাম ১৫-৪৪৪ গ্রেণের সমান। সেটিগ্রাম উহার শতাংশ।

**ক্যাডমিয়ম সলফিউরিকম**।—বিশেষ লক্ষণ।—\* শীত ও শীতলতা। শঙ্করয়ে মুগ্ধরাঘাতবৎ বেদনা। শীতের প্রাধাত্য; নিদ্রাশূন্য, হস্তদ্বয়ের উত্তাপ সহকারে অগ্নির নিকটেও শীতলতা। **আময়িক প্রয়োগ**।—গণ্ডমালা জনিত কনীনিকার অসচ্ছতা। শীতলতাজনিত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। শীত-জরে কৃষ্ণবর্ণ বমন (আস)। মত্তপায়ীদিগের দুর্দ্দম্য বমন (এলেন)। শীতবর্ণ, কোষ্ঠাবৎ উদ্বেদ। বক্ষঃস্থলের অতিশয় আকুঞ্চন সহকারে প্রতিশ্রায়জনিত শ্বাস-কাস (হাপানি) (ক্যাক্ট, জিক)। বিবমিষা, লোণা, পচা, টক ও রক্তাক্ত উল্কার বা বমন; প্রচাপনে আশাশয়-গহবরে স্পর্শ-দেব। জ্বালাকর ও কর্তনবৎ বেদনা। বিদ্যার মদিরা পানুর পর আশাশয়ের খল্লী। আশাশয়ের লক্ষণে ক্যাডমিয়ম আসেনিকের এবং বিশ্রামে উপশমে আইওনিয়ার অমূরূপ।

**ক্যান্সার ক্লুভাই এটিলিস**।—আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকে স্থল চিপিটিকা-বিশিষ্ট পামা। লসিকা-গ্রন্থির বিবর্ধন। প্রবল কণ্ডুয়ন ও লাল দ্বাপ্রবিশিষ্ট তরুণ বা পুরাতন শীত পীড় রোগে (আর্টিকেরিয়া) অজ্ঞাত ঔষধ বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। \* এই সকল রোগে কর্দ্দমবর্ণ মল, ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ।

**ক্যালকেরিয়া আইওডেটা**।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃদনিয়-গ্রন্থির প্রদাহিত অবস্থা। মিন্জাইটিস টিউবারকিউলোসা। পুরাতন হাইড্রোকেকেলেসাস। নাসিকা ও কর্ণের পলিপাই (বহুপায়)। ক্লবুসুলের বিবর্দ্ধি। বিবর্দ্ধিত, তালুসুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে

পূর্ণতা ( বারাইটা ) ; পাণ্ডুবর্ণ, তুল ও হুর্কল, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক-বালিকা । পুরাতন কাস, দিবারাত্রি কাস, নৈশঘর্ষ, প্রলেপক জ্বর, সবুজবর্ণ, প্ৰস্রান্ত নিম্নীবন ; বিশেষতঃ গ্রীবা-গ্রন্থির সমধিক ক্ষীততাবিশিষ্ট, ক্ষীণকায়, গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ( বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ ) । এই সকল রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় । মিলি এরিয়া রোগের ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । জরায়ুর তত্ত্বময় অর্বুদে ক্যালকেরিয়া আইণ্ডোটোর প্রয়োগ হয় ।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ক্যালকেরিয়ার লক্ষণ বিশিষ্ট অপস্মার । রক্তকাস সংযুক্ত কুসকুসের পুরাতন ক্ষয়-রোগ এবং মধ্যান্ত্র ক্ষয় । ক্ষীণ ছাপিগুজনিভ শ্বাস-কৃচ্ছ । তরুণ ও পুরাতন বৃক্ক-প্রদাহ । কুসকুসের ক্ষয় রোগে ক্ষুধার অভাব ।

ক্যালকেরিয়া এসেটিকা বিশেষ লক্ষণ ।—বিষাক্ত বায়ুতে বিচরণে শিরো-ঘূর্ণন । অল্প ও হুর্গক উপহার । বেদমাশ্রুত, প্রভূত, অদৌর্বল্যকর অতিসার । প্রত্যহ প্রাতে ঘর্ষ । আময়িক প্রয়োগ ।—কিল্লীবিশিষ্ট ব্রঙ্কাইটিস । একজন চুরারোগ্য রোগী অনেকগুলি ঔষধ বিফল হইবার পরে এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, কিল্লীর খণ্ডগুলি কাসিতে কাসিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল । ক্যালকেরিয়া প্রয়োগোপযোগী প্রকৃতিবিশিষ্টা রোগিণীদিগের কিল্লীবিশিষ্ট রক্তকৃচ্ছ । মেদ-রোগ । মস্তকের অতিশয় ক্ষীতলতা ও আমাশয়ের সমধিক অল্পসহ সহ অর্ধ-শিরোবেদনা । বালক-বালিকাদিগের আমাশয় বা অন্ত্রের পুরাতন প্রতিষ্ঠায়ে ডাঃ বার লক্ষণের সাদৃশ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন ।

ক্যালকেরিয়া কটিকা ।—আময়িক প্রয়োগ ।—এই ঔষধের বাহ প্রয়োগে ফোটিক ও কার্বিকল বসিয়া যায় । ( ওয়াইল্ড ) ।

ক্যালকেরিয়া ক্লোরোটা ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ডিপথিরিয়ায় একবিন্দু বা তদপেক্ষা ন্যূনমাত্রায় এক একবার “লাইকার ক্যালসিস ক্লোরোটা” ব্যবহার্য্য ( সি, নিডহাড ) ।

ক্যালকেরিয়া ফোরিকী ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ইহাও স্তন্যলায়ের টিসু-রেমিডির অল্প একটা ঔষধ । প্রধানতঃ রক্তবহা নাড়ীর রোগ, শীরা-ক্ষীতি, রক্তার্বুদ ও অস্থিরোগে ইহার ব্যবহার হয় । তাঁহার মতে এতদ্বারা দেহের স্থিতিস্থাপক তন্তুগুলির শিথিলতা জন্মে এবং নিম্নলিখিত রোগে প্রয়োজিত হয় । ছানি, অপিচ বৃদ্ধ বয়সের ছানি । রক্তবহা নাড়ীর প্রসারণ, তীব্র বেদনবৎ বেদনা সহ শিরার ক্ষীততা ও বিবর্জিততা, ভগ্নের শিরায়ণ ; অর্শ ; শিরা-ক্ষীতিজনিত ক্ষত ; শিরার অর্বুদ ; মস্তকের অর্বুদ ; কুশ্বনবৎ বেদনা সহকারে অধিক শ্বাস-প্রাণ । জরায়ুর স্বানচ্যুতি ও কন্দ ; জরায়ু-প্রদেহে ও উরুস্থে হেঁচকনিবৎ বাতনা ; জাহ্ন-গন্ধির পুরাতন শিবাঘুণ্ড ( সাইনোভাইটিস ) ; আঙ্গুল-হাড় ।

\* কটি বেদনা, প্রথম সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত নড়িলে-চড়িলে হ্রাস ( রসটক্স ), অপচ মচকান জনিত কটি-বেদনা। হাতের তালুতে বিদারণ সংযুক্ত বা বিবর্জিত শক্ত চিপটিকা ( ক্রট্‌স্ )। কণ্ডার অর্কুদ ( গ্যাংলিয়ন )। অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের কুপোষণ উপঘাত প্রাপ্তির পর অস্থির বিবর্দ্ধন। পুরাতন অস্থি-বেষ্ট-প্রদাহ। অস্থির উপর শক্ত, খরস্পর্শ, তরঙ্গায়িত উচ্চতা। অস্থি ক্ষত, ভজ্জা বস্তি-গহবরের ত্রণ-শোথের উৎপত্তি, অপচ সংক্রামক রোগ অথবা পারদের অপব্যবহার বশতঃ বিশেষতঃ নাসিকার অস্থির ক্ষত। অস্থির অর্কুদ। অণ্ডের দৃঢ়তা। শুনে গ্রস্থি বা প্রস্তরের ত্রায় শক্ত পিণ্ড। গ্রস্থির প্রস্তরের ত্রায় শক্ত ও দৃঢ় অর্কুদ। দন্তের নালী-ক্ষত। ( শেবোক্ত রোগদ্বয়ে কোপেন-হেগেনের ডাঃ সাইমসেন এই ঔষধ বিস্তার ব্যবহার করিয়া সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন )।

ক্যালকেরিয়া মিউরেটিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—বালক-বালিকাদিগের আর্দ্র পোরাইগো ক্যাপিটস রোগে ইহার প্রথম ক্রম উদ্ভব ফলপ্রদ ( হিউজ )। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের প্রতিষেধক। স্ফোটক বসাইবার জন্য এই ঔষধের জলীয় দ্রবের স্থানিক প্রয়োগ হয়, এতদ্বারা বেদনার শান্তি জন্মে।

ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা।—ক্যালকেরিয়া সলফিউরিকা ডাঃ জুসলারের বাইওকেমিক্যাল চিকিৎসার টিস্স-রেমিডির দ্বাদশটী ঔষধের অন্যতম ঔষধ। ত্রণ-শোথে রক্ত জন্মিয়া অথবা কাটিয়া দেওয়ার পর \* পীতবর্ণ ও গাঢ় পৃথ নিঃসরণ হইতে থাকিলে পৃথ-শ্রাবে এই ঔষধ উপকারী। তালুমুলের পুষ্ণোৎপত্তি। কনীনিকার ত্রণশোথ। পৃথশ্রাবী সম্ভ্রণ ( উণ্ড )। ফুসফুসে পুষ্ণোৎপত্তি। এই সকল স্থলে ইহার প্রয়োগ হয়। হিপার সলফার অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া গভীরতর, হিপার সলফারের ক্রিয়ার উপকারীতার বিরতি জন্মিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্বে পৃথস্রাব উদ্ভিক্ত বা নিবারিত করিতে সিলিশিয়ার প্রয়োগ হয়। ( ডিউয়ি )। জরায়ুর তন্ময় বা পেশীময় অর্কুদে দুর্গন্ধ রক্ত-স্রাব লক্ষণে ডাঃ সাইএমসেন ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। দুগ্ধ-পামা ( ক্রট্যাল্যাক্টিয়া ) এবং গ্রস্থির নিস্তেজ ক্ষীততায়ও তিনি এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ হাঙ্গেন বালক-বালিকাদিগের শুক পামায় ( ড্রাই একজিমা ) এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ দেখিতে পাইয়াছেন।

ক্যালকেরিয়া হাইপোফসফোরোসা।—আময়িক প্রয়োগ—এই ঔষধের ক্রিয়া ক্যাক্স-ফসের অনুরূপ। অস্টিওমাইলাইটিস ( অস্থিমজ্জা-প্রদাহ ) ; ও ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে, বিশেষতঃ উহার প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ; অনেক রোগীর গক্ষে ক্যাক্সকার্ক ও ফস ব্যবহৃত হইলেও এতদ্বারা অধিকতর উপকার দর্শে। কোপেনহেগেন নগরের ডাঃ অলসেন ফুসফুসের ক্ষয় রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ বিস্তার ব্যবহার করিতেন এবং অন্যান্য চিকিৎসককেও ব্যবস্থা করিতে বিধি দিতেন। প্রভূত নৈশ ঘর্ষ, শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, এবং ক্ষুধা ও প্রজনন শক্তির অসম্ভাব লক্ষণপন্ন দায়বীর দৌর্গন্ধ্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল থা প্যালাক্টিস।—আময়িক প্রয়োগ।—পেঙ্গিগঃস ( বিধিকা ) যোগে ফোটগুলির চারিদিকে অজুরিয়কের আকার মণ্ডল, ও অতিশয় কণ্ডুয়ন। তৃতীয় দিবসে উহার চিপিটিকার ( ক্রঃটস্ ) পরিণতি।

ক্যাটোরিয়ঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—সকল বিষয়েই অসন্তুষ্টতা। ভরস্কর স্বপ্ন। ছেদনবৎ, প্রচাপনকর শিরোবেদনা, তৎসহ মস্তকের কেশাবৃত অংশে স্পর্শ-দেষ, কিন্তু গভীর চাপ প্রদানে বা ঘর্ষণে প্রায়শঃ উপশম। আত্মান বশতঃ উদরের ক্ষীততা মল-ত্যাগের পূর্বে কর্তনবৎ উদর-বেদনা, চাপদিলে অথবা মস্তক অবনত করিয়া দ্বিভাঁজ হইলে উহার উপশম ( কলোস )। রক্তাক্ত বা হরিদ্বর্ণ আময়ক, অথবা মলদ্বারে জ্বালা সহকারে দ্বৈবৎ শুভ্র জলময় মল। উদরে ও মাজায় বেদনা সহকারে অকাল রজঃ। আময়িক প্রয়োগ।—এই ঔষধের ক্রিয়া মস্তকসের অনেকটা অমুরূপ। সম্পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হিষ্টিরিয়ার পূর্বে যে সকল স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সকল লক্ষণাবিত্তা নারীদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। হিষ্টিরিয়া জনিত শ্বাস-কাস। যে সকল স্নায়বীয়া নারী টাইফয়েড জ্বর অথবা অন্য কোন দৌর্বল্য কর রোগের পরে সম্যকরূপে আরোগ্য লাভ করেনা এবং যাহাদের কোপনতা থাকে, ও অবসন্নতাজনক ঘর্ষ হইতে থাকে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

ক্রোরঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—মস্তকের মধ্যস্থলে এবং নিম্নদিকে বামপার্শ্বে কষ্টকর প্রাপ্তি অমুভব। নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাবনিঃসরণ, তৎসহ পাতলা অবদরণকর প্রতিশ্রাব। মুখবিবরে ছোট, পচা-গন্ধ ক্ষত ও পীতভ শুভ্র উপক্ষত। স্বরবস্ত্র-মুখ ও স্বর-রজ্জুর আক্ষেপ, শ্বাসরোধ সহকারে আকুঞ্চন। \* স্বর-রজ্জুর আক্ষেপ বশতঃ আকস্মিক শ্বাস-কুচ্ছ, তৎসহ একদৃষ্টি, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, গাত্রোপরি নীতল ঘর্ষ, ক্ষুদ্র ও কোমল নাড়ী এবং তাপের লাঘব প্রাপ্তি। আবেশে আবেশে শ্বাসরোধ, তৎপরে প্রায়শঃ প্রতিশ্রাব। \* নিশ্বাস অপেক্ষাকৃত বিমুক্ত, কিন্তু কাকের ছায় শব্দসংযুক্ত, তৎসহ অবরুদ্ধ বা অসাধ্য প্রশ্বাস, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, অঙ্গের আক্ষেপ ও আংশিক তন্দ্রাদোষ। ফুসফুসের বেদনাজনক বাতঃশ্রান। ষড়্ ষড়্ শব্দ সংযুক্ত ত্রুশ্ব নিঃশ্বাস, আঘাসিত, দীর্ঘকালব্যাপী, অপ্রচুর, উচ্চ ও দীর্ঘ ইন্সকাস শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্বাস। রোমাঞ্চ। ধ্বজভঙ্গ। আময়িক প্রয়োগ।—ল্যারিজিসমঃ ট্রাইডিউলঃস রোগের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্বরবস্ত্র-মুখের আক্ষেপ, নিবারণার্থে স্নায়ুজমা অর্থ্যাৎ শ্বাসকাসের আক্রমণেও ইহার ব্যবহার হয়। অতিশয় শুষ্ক জিহ্বা, প্রগাঢ় অবসন্নতা, কণ্ডুরার আক্ষেপিক স্পন্দন, রোগীর বুদ্ধিব্রংশ হইবার আশঙ্কা লক্ষণাপন্ন টাইফঃস জ্বর। ক্লোরিন ওয়াটার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ক্যাস্কারা স্ট্র্যাণ্ডা।—আময়িক প্রয়োগ।—নাতিতরুণ ও পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা ( ভরল সারের ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার )। প্রসারিত, শিথিল জিহ্বা, উহাতে গাঢ়, পীতবর্ণ লেপ, এবং শ্বাসের দুর্গন্ধ সহকারে আমাশয়িক শিরঃপীড়া। কোষ্ঠ কাঠিষ্ঠ সংযুক্ত অর্শ। \* হৃদ্ময় মল-কুচ্ছ, সহকারে পেণীর ও সন্ধির অনতিতরুণ ও পুরাতন বাত।

**ক্যাকেরিলা।**—বিশেষ লক্ষণ।—আমাবৃত গ্রন্থিল মল, উদর বেদনা ও জ্বালা। অল্প হইতে বারবার অমুজ্জল লোহিতবর্ণ রক্তশ্রাব, রক্তবহা নাড়ীর রোগবশতঃ রক্ত-পাত। উষ্ণ পানীয় দ্রব্য পানে উপশম।

**ক্রমিকঃম এসিডঃম।**—বিশেষ লক্ষণ।—হৃৎস্থ ওত্র শ্লেষ্মা; অনায়াসে কাসিয়া তুলিতে পারা যায় না, প্রাতে উহার আতিশয্য। বিষমিষা ও শিরোধূর্নন সহকারে জলবৎ অতিসার। আময়িক প্রয়োগ।—ডিপথিরিয়া জনিত গলা-বেদনা। তৎপরবর্ত্তি-নাসার্কুদু। জিহ্বার এপিথিলিওমা। রক্তময়, দুর্গন্ধ প্রসবাস্তিক শ্রাব।

**ক্রাইসোফেনিক এসিডঃম।**—আময়িক প্রয়োগ।—দারুণ কণ্ডূয়ন, এবং প্রভূত ও দুর্গন্ধ শ্রাববিশিষ্ট নিম্নাঙ্গের একজিমা (পামা) রোগে এই ঔষধের আত্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ হয়।

**গলথিরিয়া প্রোকঃমেন্স।**—আময়িক প্রয়োগ।—তরুণ ও অনতিতরুণ আমবাত ও ফুসফুস-বেষ্টের সম্মুখতাগের আমবাত জনিত বেদনায় গলথিরিয়ার তৈল বিস্তার ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষে এসিডঃম স্যালিসাইলিকম আছে।

**গেটিসবার্গ স্পিঃ ওয়াটার।**—আময়িক প্রয়োগ।—কশেরুকা ও বক্ষণ-মন্ধির অস্থির ক্ষত (কেরিজ)। মন্ধির সমীপে কেরিজজনিত ও অস্ত্রাঘ্ন ক্ষত। \* শ্রাব বিদাহী ও অবদরণকর (সিলি)। এই জলে লিথিয়ঃম কার্য আছে।

**গোয়াকো।**—বিশেষ লক্ষণ।—মেরুদণ্ডের নিকটে, বিশেষতঃ উহার উর্দ্ধাংশে, অপিত ঘাড়ে, স্বল্প পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত জ্বালা ও অবিরাম বেদনা। গিলিতে কষ্ট, স্বর-বন্ধন, আকুঞ্চন, জিহ্বার গুরুত্ব ও উহা নাড়িতে চাড়িতে আয়াস। শিরঃপীড়া ও মুখমণ্ডলের উত্তাপ। সঞ্চলনে উপচয়। আময়িক প্রয়োগ।—হৃষ্টপুষ্টি ও রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠবংশের উপদাহ। জিহ্বা ও শরীর-শাখার সন্ন্যাস-রোগজনিত পক্ষাঘাত (নাজা)। ত্রিক ও কটিস্থানে বেদনা সহকারে ওলাউঠার অনুরূপ অতিসার (ট্যালবট)। গোয়াকোর মাদার টিঞ্চারের ৫—২০ বিন্দু মাত্রা দ্বারা হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষা-ক্রিয়া নিম্পন্ন হইয়াছিল। গোয়াকো বিষাক্ত সর্প দংশনেরও ঔষধ।

**গোয়ারিয়া।**—আময়িক প্রয়োগ।—কিমোসিস সংযুক্ত, অপর, ছানি তুলিবার পরে চক্ষুর গুরুমণ্ডলের প্রদাহ। \* হরিতাল-মিশ্রিত-লোহিতবর্ণ লুপঃস। গোলাপি রক্তের বয়স ফোড়া।

**গ্যালিয়ঃম এপেরাইন।**—আময়িক প্রয়োগ।—জিহ্বার গ্রন্থিল অর্কুদ অথবা ক্যান্সারের ক্ষত।

**গ্যাফিন ওয়াটার।**—আময়িক প্রয়োগ।—এতদ্বারা শোথ জন্মে ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

**থ্রেণেটঃম।**—বিশেষ লক্ষণ।—\* জলরং লাল-শ্রাব। \* লাল-শ্রাব সহকারে

বিবমিষা, ঘন ঘন থুথু-ফেলা, আমাশয় ও উদরে বেদনা, বিফল মল-বেগ, ক্রম মুখাকৃতি, এক বদ মেজাজ। দিবসে পুনঃ পুনঃ মলদ্বারের কণ্ডুয়ন ও স্ফুটস্ফুটি। দীর্ঘনিশ্বাস সহ বক্ষঃস্থলে গৌরব। স্নেহ ও স্নেহদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ভারী বোঝা বহনের পরবর্তী বেদনার ছায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা, বস্ত্রের সংস্পর্শে পর্যাস্ত বাতনা হয়। করতল-কণ্ডুয়ন, তৎসহ মুখমণ্ডলে ও সমগ্র শরীরে নানাস্থানে অপচ্যমান পীড়কা উৎপন্ন হইবার ছায় দংশন অল্পভব। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বহুল স্বপ্ন, প্রাতে উহা স্মরণ করিতে পারা যায় না। আময়িক প্রয়োগ।—পাণ্ডু রোগগ্রস্তের ছায় মুখাকৃতি, উদরে স্ফীততা, জলবৎ তরল দ্রব্য-উদ্গার ও বমন, শিরোগ্রন, চক্ষুর সম্মুখে ঢেউ খেলান, বড় চক্ষুর তারা, আমাশয়ে যেন কিছু নড়িতেছে প্রকার অল্পভব, হৃৎকম্প, শ্রান্তি। (জেলসেম)। কাফকা গ্রেনেটঃম প্রয়োগে একজন লাল-প্রাবের রোগীর আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

চিনিঃম ফেরো-সাইটিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—অতিশয় নীরক্ততা সহকারে অনতিতরুণ ও পুরাতন নিফ্রাইটিস। পাপুরা হেমরেজিকা।

চেনোপোডিয়ঃম এন্থেলমিণ্টিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—দক্ষিণ স্বক্কাস্থির নিয়কোণের একটু নীচে, কিন্তু মেরুদণ্ডের নিকটে অল্প অল্প, অল্পগ্র বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—দক্ষিণ স্বক্কাস্থির নিয় কোণের নীচে, বক্ষঃস্থল পর্যাস্ত তীব্র বেদনা। শ্রবণ-স্নায়ুর স্তম্ভতা, মধ্য কর্ণ ও অভ্যন্তর-কর্ণের প্রদাহ, মল্লয়ের স্বরে বধিরতা, কিন্তু গাড়ীর বা ঘ-টার শব্দে অতিশয় অল্পভূতি লক্ষণে কর্ণ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

জিকঃম ভেলিরিএনিকঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃদশূল। রোগী যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, অথবা অবিরত জঙ্ঘা সঞ্চালন করে তখন হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ও উপকার করে। জরায়ু-রোগের পুরাতন রোগিনীদিগের এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ওভেরির প্রাচীন প্রদাহ; আক্রান্ত পার্শ্বের অঙ্গে, এমন কি পা পর্যাস্ত বেদনার সঞ্চরণ। অর। (সরসর) পরিশূত্র অপস্মার।

জিকঃম সংলফিউরিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অঙ্গের কম্পন ও আক্ষেপ, বাহ ও অভ্যার ধল্লী। পক্ষাঘাত। জিহ্বার পক্ষাঘাত। পুনঃ পুনঃ কনীনিকার প্রদাহের আক্রমণের পর উহার অস্বচ্ছতা। দানাময় অগ্নিপুট।

জিকঃম সায়েনেটঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—শিশুদিগের আক্ষেপ-রোগ। মস্তিষ্কের খিল্লীর সামান্য প্রদাহ ও উহার মূলদেশ-সংক্রান্ত প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা। সেরিক্রো-স্পাইথাল মিনিঞ্জাইটিস। এপিলেপ্সি (মুগি)। কোরিয়া। প্যারালিসিস এজিটাস (বেপথু)। হিষ্টিরিয়া। এই সকল রোগে এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

জিনসেঙ্গ।—বিশেষ লক্ষণ।—উদরের অনিখিলতা, ব্যাধিততা, ও কুঞ্জন। উদরের নিম্নভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে কুচকি পর্যাস্ত বিস্তৃত বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—ইলিও-সিকেলিস-প্রদেশে উচ্চ কুলকল শব্দ, পরিণত জিহ্বা, নিদ্রা বাইশার সময়ে প্রলাপ।

পেরিটাইল্লাইটিস অর্থাৎ অন্ধারের আবেষ্টনের প্রদাহের প্রায়স্ভাবস্থা ও টাইফয়েড জরুরক স্থানিক লক্ষণ। সঙ্গমেড্রিয়ের দুর্বলতা ও পুনঃ পুনঃ অক্লান্ত্যের পর আমবাতিক বেদনা।

জিনিফাটিংটোরিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—\* প্রবল মল-প্রবৃত্তি।

জেলাপ্পা।—বিশেষ লক্ষণ।—গাত্র-তাপের হ্রাস, ও দুর্বল নাড়ী সহকারে কয়েক বার জলবৎ, অনেক সময় রক্তাক্ত, অধিক মল নিসরণ। সারাদিন ভাল থাকিয়া শিশুর সমস্ত রাত্রি চিংকার ও অস্থিরতা। আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন অভিসার, প্রতিদিন ছয় সাতবার মলশ্রাব, মলিন, দুর্গন্ধ, মণ্ডবৎ মল, তৎসহকারে অতিশয় পেট-কামড়ানি ও কতকটা কুহন; আকস্মিক, জলবৎ, অল্প অল্প রক্ত ও অধিক বাষ্প সংযুক্ত মল; মন্থণ, চিকণ ও পরিণুক্ত জিহ্বা।

টনকা।—বিশেষ লক্ষণ।—অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধস্থমায়াতে ছেদনবৎ বেদনা, এবং অতিরিক্ত অশ্রুশ্রাব সহকারে মস্তকে উদ্ভাপ ও দপদপকর বেদনা। বজ্রগ-সন্ধি, উরুর অস্থি, ও জাঁহু-সন্ধিতেও বিশেষতঃ বামভাগে ছেদনবৎ বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—অর্দ্ধ-শিরঃশূল, মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল, কূচকীতে বেদনা।

টোসিলেগো পিটোসাইটিস।—আময়িক প্রয়োগ।—তরুণ বা পুরাতন প্রমেহে, পীত বা শুভ্র, গাঢ়শ্রাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

টার্টারিকঃম এসিডঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে দুর্বলতা, প্রায় শরীর-তানিয়া চলিতে পারা যায়না। কণিশবর্ণ ও পরিণুক্ত জিহ্বা। মলিন হরিৎবর্ণ বমন। রাত্রিতে অনেক বার মল-তাগ। কাফি চূর্ণের বর্ণ মল।

টিউক্রিয়ঃম স্ফোরোডোনিয়া।—শ্লেষ্মা-পুষ্পময় নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। অণু-প্রদাহ অথবা গুটিকাজনিত উপকোষ-প্রদাহ, এবং শোথেও ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা ক্রম, বা চা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টিটেনিয়ঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—উর্দ্ধভাগের অর্দ্ধ-দৃষ্টি।

টেনাসিটঃম ভলগেয়ার।—আময়িক প্রয়োগ।—অদ্বৃত্ত অঙ্গ-ভঙ্গি সংযুক্ত কোরিয়া। নিদ্রাবস্থায় পেশীর অক্ষেপিক আকৃঞ্চন এবং ভয়প্রাপ্ত হইয়া জাগরণ লক্ষণাপন্ন ক্রমিকজনিত পীড়া। কূষ্ঠনবিশিষ্ট বেদনা, স্পর্শ-দেহ ও কূচকীতে আকৃষ্টতা সহ রক্ত-কৃচ্ছ।

টেমঃস কমিউনিস।—আময়িক প্রয়োগ।—সামান্য, অভয়, চিলবেন ( শীর্ষ-ফোট ) রোগে ইহার মাদার টিঙ্কারের বাহ্য প্রয়োগের বিধি আছে।

ট্যাক্সঃম ব্যাক্টেরিয়া।—আময়িক প্রয়োগ।—চর্মের পচ্যমান উদ্ভেদ, উদ্ভেদ গুলি, চেপ্টা, বৃহৎ ও প্রবল কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি আছে। পদের গাউট রোগ, এবং মন্দ-গন্ধ নৈশ ঘর্ষেও ইহার ব্যবহার হয়।

ট্রিমবিডিয়ঃম মিউসি ডোমেস্টিসি।—বিশেষ লক্ষণ।—উৎখানান্তে কণিশবর্ণ আতিশায়িক মল সহকালে কুক্ষিতে পরিকর্জন ( আইপিং ), মলশ্রাবান্তে বেদনার শান্তি।



প্রত্যাহারের পরে প্রবল বেদনার প্রত্যাবৃদ্ধি, অনন্তর কুহনসংযুক্ত মল-নিঃসরণ।  
 আময়িক প্রয়োগ।—কপিশ, পাতলা, রক্তাক্ত ও স্কুহন বিরচন বিশিষ্ট আময়িক রোগ।  
 শয্যা হইতে উত্থানান্তে তরল মলের বেগ বিশিষ্ট বক্রতের রক্ত-সঞ্চয়; মলভ্যাগকালে বাম পার্শ্বে  
 তীব্র বেদনা, ও উহার নীচের দিকে সঞ্চরণ।

ট্রাইমেথিলেমিনঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মণিবন্ধ-  
 সন্ধিতে অতিশয় বেদনা, অধিকন্তু অতিশয় অস্থিরতা, দাঁড়াইলে গুড়মুড়ায় বেদনা, অত্যন্ত মাত্র  
 নড়িলে চড়িলে উহার উপচয়। তরুণ বাতে ব্যবহার্য।

ডিউবয়মাইন।—আময়িক প্রয়োগ।—অক্ষি-গোলকে স্থতীত বেদনা।  
 প্রসারিত কনীকিকা। নিউরো-রেটিনাইটিস। বহিরাগত অক্ষি-গোলক বিশিষ্ট গণ্ডমালা।

ডিজিটেলিনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃৎপিত্ত, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বিশিষ্ট  
 বিবৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা সংযুক্ত হৃৎকপাটের পীড়া। স্বপ্নদোষ। অপস্মার। হৃদ্রোগ-  
 জনিত শোথ। অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা বশতঃ মূর্ছার আক্রমণ।

ডাফনি ইণ্ডিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আকস্মিক,  
 বিদ্যুৎ, অতীব উৎক্ষেপ।

থাইরয়ডিন।—আময়িক প্রয়োগ।—মাইক্সিডিয়া ( গল-গ্রন্থির শীর্ণতা বিশিষ্ট  
 এক প্রকার পুরাতন রোগ )। দুর্বল হৃৎপিণ্ড, চঞ্চল নাড়ী, শয্যা শয়ন করিতে অসামর্থ্য,  
 অনেক মাস পর্যন্ত ক্ষুধা-অবিদ্যমানতা, গল-গ্রন্থি-প্রদেশের ক্ষীণতা, আশাহীনতা ও নিদ্রাহীনতা।  
 ঘিচর্কিকা, অপচ শীতল হস্তপদবিশিষ্ট লসিকা-প্রধান রোগীদিগের রোগ। জরায়ুর তন্তুম্বর  
 অর্কুদ (কাইত্রোমা)। পামা (একজিমা)।

থিবেইনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—টরুটকার। আক্ষেপ একোনাইট, সাইকিউটা,  
 ও হাইড্রোসায়নিক এসিডের যত অনুরূপ ঔষকনিয়ার তত অনুরূপ নহে।

থিয়া।—বিশেষ লক্ষণ।—আগাশয়ে যেন “কিছু নাই” এরূপ অনুভব। একটা ক্ষুদ্র  
 স্থান হইতে বিকীর্ণ সর্বমন শিয়ঃপীড়া। বাম ওভেরিতে বেদনা। অস্থিরতা ও অবলুণ্ঠন সহকারে  
 নিদ্রাহীনতা।

থ্যাপ্সিয়া গার্গেনিক।—আময়িক প্রয়োগ।—শীত শীত পুষ পূর্ণ হয় এরূপ  
 ক্ষয়সাধন উদ্ভেদ। (ক্রোটন)।

থ্যালিয়ঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—কম্পন। আগাশয়ে ও অস্ত্রে তাড়িতাঘাতের  
 জায় শীত শীত এক বারের পর অল্পবার ভল্লাঘাতবৎ বাতন। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।  
 (প্রথম)। আময়িক প্রয়োগ।—টেবিস ডসেলিস রোগের প্রচণ্ড বেদনা এই ঔষধে  
 উপশমিত হয়।

নাইট্রি স্পিরিটস ডঃলসিস।—বিশেষ লক্ষণ।—অল্প একটু হাঁটলেই অতি  
 ক্ষুদ্র শ্বাস, এবং জমাগত সঞ্চয়নে ক্ষুদ্র, আঘাসিত ও বাতনাসংযুক্ত শ্বাস, তৎসহ বৃক্ষস্থির

নীচে বেদনা বিশিষ্ট আঁকুখন। আময়িক প্রয়োগ।—\* ইজিয়-জ্ঞানের উদাসীনতা সংযুক্ত টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত ঔষধ ব্যবহেয় না হইলে হানিম্যান এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। রোগীর সুপ্তি, তাহাকে জাগরিত করিতে কষ্ট, এবং জাগরিত হইলেও পুনরায় তখনই পূর্বের জ্বর উদাসীন অবস্থা প্রাপ্তি; এইসকল লক্ষণে অর্ধগ্রাস জলে ইহার মাদার টিঞ্চারের কএকবিন্দু স্নায় প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দুইতিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিতে হয়। (কসফরিক এসিড ও হেলিবোরস তুলনা করুন)। হেলোফেজিয়ার মন্দফলে ইকহলম নগরের ডাঃ লাইডবেক প্রতিহারক স্বরূপ এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

নাইট্রো-মিউরিয়টিক এসিড।—বিশেষ লক্ষণ।—লালাশ্রাব, রাক্তিতে উহার আধিক্য। সকল সময়ই আমাশয়ে শূন্যতা ও ক্ষুধা অনুভব, আহারে উহার অনুপশম। ভাগ্য করিলে মূত্র ঘোর হয়, এবং অকজেলেটের অবস্থিতি জন্ত মূত্র-মার্গে জ্বালা জন্মায়।

নিকোলম মেট্যালিকম (বা কার্বনিকম)।—বিশেষ লক্ষণ।—কশের দাঁত (পেষকদন্ত) চুষিলে উহা হইতে অন্ন হর্গন্ধ জগন্ধরূপ। সায়াছে পিপাসা ও দারুণ হিকা। \* আহারের ইচ্ছা ব্যতীত উদরোর্দ্ধস্থানে যেন “কিছুনাই” এইপ্রকার শূন্যতা অনুভব।

স্ট্রাট্রম আইওডেটম।—আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগের লক্ষণ। প্রতিশ্রাব ও পুরাতন স্বরবন্ধ-প্রদাহ।

স্ট্রাট্রম কোলেইনিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—কোষ্ঠবদ্ধতা। অজ্ঞে বায়ু-সঞ্চয়। আমাশয়ের প্রতিশ্রাব ও অজ্ঞের প্রতিশ্রাবের পুরাতন লক্ষণ। তৎসহ কোষ্ঠ-রোধ ও বায়ুসঞ্চয়। অন্ধাজ্ঞের প্রদাহ, প্রতিশ্রাব জনিত পাণ্ডু, পিত্তশিলা জনিত উদর-বেদনা। উদর-শোথসহ যকৃতের সিরোসিস। আমাশয়িক উপজ্বর জনিত গিরোঘূর্ণন। মধু-মেহ।

স্ট্রাট্রম ক্লোরেটম।—বিশেষ লক্ষণ।—জরায়ুর আবেগ (বেয়াসিংডাউন), জরায়ু যেন একবার উন্মুক্ত ও একবার অবরুদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভব। বসিলে জরায়ু যেন উপরের দিকে ধাক্কা মারিতেছে এইপ্রকার অনুভব। (ফেরি-আইওড)। \* কপালের আড়া আড়ি বেদনা, ও জরায়ুর আবেগ সহকারে \* শিরোঘূর্ণন ও তজ্জন্ত পতন। সম্ভরণব্যব অনুভব; যেন করোটীর শিখরদেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। \* আহারান্তে তজ্জন্তুতা। (চিকিৎসায় সপ্রমাণ হইয়াছে)। আময়িক প্রয়োগ।—জরায়ুর ও উহার বন্ধনীর রক্ত-সঞ্চিত ও শীর্ণতা প্রাপ্ত অবস্থায়, এবং তৎসংস্কষ্ট বক্ষঃস্থলের বেদনায় ও যকৃত্রোগে লণ্ডন নগরের ডাঃ কুপার এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। বালক-বালিকাদিগের কর্ণের, বিশেষতঃ মধ্যকর্ণের প্রতিশ্রাব জনিত পুরাতন রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। তিনি “লোলিত, দুর্বলীভূত দেহ, রস-প্রধান ধাতুতেই” এই ঔষধের বিশেষ উপযোগীতা স্বীকার করেন, এইপ্রকার ধাতুতেই ইহার বলকর প্রভাব দৃষ্ট হয়। কপালের অল্পপ্রস্থে বেদনা সংযুক্ত, পতন-জনক ভ্রমিতে ন্যাট্রিম ক্লোরেটম ব্যবহার্য।

**অ্যাক্ট্রিম নাইট্রিকঃম**।—আময়িক প্রয়োগ।—ডেরমেকায়ের চিকিৎসাপদ্ধিতে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক একোনাইটঃমের ন্যায় প্রদাহের ঔষধরূপে প্রয়োজিত হয়। স্বরব্রত ও কণ্ঠনাগীর প্রদাহ ও ক্রুপ, তরুণ নিউমোনিয়া, জ্বরেট-প্রদাহ, জ্বংপিণ্ডের আত্মকল্পিত রোগ, রক্ত-মূত্র, তরুণ আমবাতিক সন্ধিবাত, প্রতিশ্রায় ও ক্রুপজনিত প্রদাহ, বিবিধ ব্রত হইতে রক্তশ্রাব, মস্তিষ্ক বিপ্লীর প্রদাহ, ব্রাইটডিজিজ; চক্ষুর গুরু মণ্ডলের প্রদাহ, কনীনিকার প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ইহার বিশেষ ব্যবহার হয়।

**অ্যাক্ট্রিম ফসফরিকঃম**।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ন্যাক্ট্রিম ফসফরিকঃম ডঃ স্থলারের টিস্ন-রেমিডি গুলির অপর একটা ঔষধ। অগ্নাধিক্যে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। একান্ত অল্প অগ্নিমান্দ্য (অবলের ব্যারাম), প্রভৃতিতে ইহা অতিশয় উপকার করে। \* শরীরের অল্প অবস্থা। বহুমূত্র। মুখে তিত্তাসাদ। \* তালু ও মুখ-বিবরে পশ্চাত্তাগে গাঢ়, পীতবর্ণ লেপ। \* অল্প উদগীরণ, \* অল্প তরলপদার্থ বমন, তৎসহকারে আমাশয়ে বেদনা, ও অতিশয় আধ্বান। অতিসার, অল্প-গন্ধ, জ্বং হরিদ্রণ, মলদ্বার অবদরণকর, \* আময় মল। অস্ত্রের দীর্ঘ বাঃস্র-ক্রম, অল্প অবস্থা, নাক খুঁটা, তিৰ্য্যগ্ধৃষ্টি, মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন। চক্ষু-প্রদাহ, পীতবর্ণ, সরসদৃশ শ্রাব, অপিত গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ। গাঢ় পীতবর্ণ স্লেয়াশ্রাবী নাসিকা ও গল-কোষের প্রতিশ্রায়। শুক্রশ্রাব, তৎপরে \* পৃষ্ঠের দুর্বলতা, জাহ্ন ও জজ্বার কম্পন, বোধ হয় যেন হাঁটবার সময় উহা ভাঙ্গিয়া আসিবে। ফসফরিক এসিড অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট পাইলাইটিস (বৃক্ক-বস্তির প্রদাহ)। সন্ধিবাত। (পডেগ্রা)।—এই সকল লক্ষণে এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

**অ্যাক্ট্রিম গিলিসিকঃম**।—আময়িক প্রয়োগ।—হিমোকিলিয়া অর্থাৎ ধাতু-দোষ বা কুল-দোষ বশতঃ সামান্য কারণে আত্যন্তিক বা বাহ্য রক্তশ্রাবের প্রবণতা। ফুসফুসের গুটিকা-রোগ (টিউবারকিউলিসিস)। পুরাতন সন্ধিবাত। অস্থিকোমলতা রোগ। গণ্ডমালাজনিত অস্থি-রোগ।

**অ্যাক্ট্রিম সেলেনিকঃম**।—আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তাক্ত স্লেয়াধঃ নিজীবন ও অল্প-অল্প স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট স্বরবাত্তিক বক্ষায় মেহকার এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। রোগের প্রারম্ভ অবস্থায়ই ইহা সবিশেষ উপযোগী।

**অ্যাকুথালীন**।—বিশেষ লক্ষণ।—মূত্রত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, মূত্র-মার্গের বাহ্য-মুখের আরক্ততা ও ক্ষীণতা, এবং য়েট্র-স্রবের শোথ। আময়িক প্রয়োগ। ওষধিগন্ধজ জ্বর (ফে-ফিভার), হৃদ্ময় রোগী; হাঁচি, চক্ষু-প্রদাহ ও বাতনা, 'মস্তকের উত্তপ্ততা। আক্ষেপিক ব্রকাইটিস ও স্নায়ুজমা, অনাবৃত বায়ুতে উপশম, সমুখ প্রদেশে পূর্ণতা, বক্ষঃস্থলে ও আমাশয়ে স্পর্শ-দেব, ব্রত শিথিল করিয়া দিতে হয়। বায়ুজ্ঞাত ফুসফুসের ক্ষীণতা (এন্ফিসিয়া), অতিশয় শ্বাস-কষ্ট ও দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণবৎ নিশ্বাস, প্রবল সঞ্চলনে উপশম। হৃৎশব্দ-বাস, বাস, দীর্ঘকালস্থায়ী আবেশ, নিশ্বাসগ্রহণ প্রায় অসাধ্য। তরুণ অবস্থার বিরতি

পর প্রমেহ। এই সকল রোগে এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। ফুসফুসের ক্ষয়-রোগে শ্বাস-  
থালীন অতিশয় ফলপ্রসূ, বিশেষতঃ উহার প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।  
(এতদ্বারা অনেকগুলি রোগীর আরোগ্য জন্মিয়াছে)।

পাপিউলোস ক্যাণ্ডিডাস।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীরের স্বকের স্পর্শ-জ্ঞান-  
পরিশূণ্যতা, পৃষ্ঠে ও উদরে উহার আধিক্য; বদন ও পেষণে কোন বাতনা জন্মেনা বরং  
উষ্ণতা জন্মে বলিয়া উহা ভান লাগে। হাতের আঙ্গুলের প্রাপ্ত-ভাগের স্থলস্থ ও শৃঙ্গের  
জায় দৃঢ় প্রাপ্তি, চিম্টি কাটিলে ও কাঁটা বিনাইলে বোধ জন্মেনা।

পালিগেনাম এভিকিউলেয়ার।—ফুসফুসের ক্ষয় রোগে ইহার মাদার টিঙ্কারের  
৫-১০ বিন্দু তিন তিনবার ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

পাইনাম দিলভেস্কিস।—গণ্ডমালাগ্রস্ত ও রিকেটরোগগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের  
নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা, গুলফ-সন্ধির দুর্বলতা, এবং হাঁটতে শিথিলে বিলম্ব। মাদার টিঙ্কারের বাহ্য  
প্রয়োগও হয়।

পাঠিলোক্যাপিনাম (জেনোরাগ্ণির উপকার)।—বিবিধ রোগের বক্ষ-কালে, এবং ক্ষয়-  
রোগের নৈশ ঘর্ষে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হানসেন বলেন যে দলবৎসর প্যাস্ত তিনি  
শেষোক্ত নৈশঘর্ষে ইহার তৃতীয় দর্শমিক ক্রম পাচ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অতিশয়  
ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পিক্রেটস্কিনাম (ককিউলাসের উপকার)।—আময়িক প্রয়োগ।—  
ক্ষয়ী (কনজুমেট) দিগের নৈশঘর্ষে শয়ন-সময়ে ব্যবহৃত হয়।

পিচি (ফেবিয়ানা ইম্মিউকোটা—আময়িক প্রয়োগ)।—অতিশয় অবদরশ-কর মূত্র  
ও মূবাম্বুরি বিশিষ্ট ইউরিক এসিড দাতু-দোষ। সমগ্র মূত্র-মার্গ-পথের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ  
প্রস্রাব করার অশ্রুত্ব, প্রস্রাব কবিতার পর জ্বালাকর বেদনা এবং মূত্রাশয়ের প্রবল কুঞ্জন।  
তরুণ বা পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদাহ, অশ্মরি বশতঃ উহার উৎপত্তি, মূত্র ত্যাগে বাতনা,  
প্রস্টেটের প্রদাহ, অধিক স্লেয়া ও পুষ্যনিঃসরণ (করল সারের ১-২০ বিন্দু মাত্রায়  
ব্যবহৃত)।

পোথাস ফিটিডাস—বিশেষ লক্ষণ।—খাসের উপবব ও ঘর্ম সচকারে সচসা  
যতনা (চিকিৎসায় সুপ্রমাণ হইয়াছে)। খাসকাস (যাজমা), কোন প্রকার প্লি নিঃসনে  
উহার আধিক্য।

প্যাালেড্রিয়াম—বিশেষ লক্ষণ।—ক্রন্দন প্রবৃত্তি। \* সারাজের আন্দোদ-  
প্রমোদের পর পরদিন লক্ষণ সকলের উচয়। সহজে অভিমানে আঘাত লাগে। মাথা বেন  
পশ্চাতে ও সম্মুখে আন্দোলিত হইতেছে এ প্রকার অচুভব। জরায়ুতে ছুরি দিয়া কণ্ঠনের  
জায় বাহনা, মল-ত্যাগান্তে উহার শান্তি। দক্ষিণ ওভেরি-হানে ক্ষীণতা, তৎসহ বস্তি-

গম্বরে বেদনার সঞ্চরণ ও কুহন; স্বৰ্ণে বেদনার শাস্তি। আময়িক প্রয়োগ।—মস্তক শিখরের অল্প প্রস্থে, এক কর্ণ হইতে অল্প কর্ণ পর্যন্ত শিরঃপীড়া; মাথা যেন পশ্চাতে ও সম্মুখে দুৰ্গতেছে একরূপ অল্পভব। দক্ষিণ ওভেরির ক্ষীততা ও দৃঢ়তা, নাভী হইতে স্তন পর্যন্ত স্পর্শ-ঘেষ ও সঞ্চরমান বেদনা দক্ষিণ ওভেরির স্বায়বীয় বেদনা, আবেগ (বেয়ারিং ডাইন), দাঁড়াইলে ও নড়িলে বুদ্ধি, মর্দনে ও শয়নে ক্রাস, অপর তৎসহকারে গলায় চক্চকে শ্লেষ্মা এবং চিকণ বা লেহবৎ প্রদর-স্রাব।

প্যামিফোরা ইনকাগেটা।—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধম্বষ্টকার এই ঔষধে আবেগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এলকোহলের ক্রিয়ায়, মর্স্কিয়ার ক্রিয়ায় এবং অনিদ্রায় ও ইহার ব্যবহারের বিধি আছে। অনিদ্রায়, বিশেষতঃ বুদ্ধি দিগের অনিদ্রায় এই ঔষধ মাদার টিঙ্কারের ১০—২০ বিন্দু সেবনে সুন্দর ফল দর্শিয়াছে। (হানসেন)।

প্লাটিনা মিউরেটিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকের পশ্চাত্তাগে উপদংশ-জনিত প্রবল শিরঃপীড়া (আইওডাইড অব পোটাসিয়াম বিফলান্তে)। নালাস্রাব ও গিলিতে কষ্ট সহকারে গল-মধ্যের উপদংশজ পীড়া। উপদংশজ অপচ্যমান ও ফোফাকার চর্ম-রোগ। উপদংশ সম্ভূত অস্থি-বেদনা। অস্থির ক্ষত, বিশেষতঃ নাসস্থি ও গুল্ফাশ্বির কেন্দিজ, অপিচ উপদংশজনিত বাত; বিশেষতঃ মারকিউরি ও অরম ব্যবহারের পর। রাত্রিতে শয্যা-মুত্র। ক্ষেদ্রস্রাব বিশিষ্ট পুরাতন প্রমেহ। মুখ-দূষিকা। ভগ বা গুহ্মদ্বারে আঁচলবৎ উপনাস।

পংলসেটিনা নঃটেলিয়ানা।—বিশেষ লক্ষণ।—জিহ্বায় পীতবর্ণ লেপ। নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মুখে শুষ্ক ও মণ্ডবৎ স্বাদ, যেন জিহ্বা গাঢ়রূপে লেপাবৃত রহিয়াছে একরূপ অল্পভব। অত্যাশ্রয় লক্ষণ অনেকটা পংলসেটিনা নাইগ্রিকাসের অনুরূপ। \* পংলসেটিনা নঃটেলিয়ানার লক্ষণ হাঁটিবার সময় উপচিত হয়, কিন্তু কেবল সঞ্চলনের প্রারম্ভেই পংলসেটিনা নাইগ্রিকাসের লক্ষণের উপচয় জন্মে এবং ক্রমাগত সঞ্চলনে উপশম পড়ে।

ফিরঃম এসেটিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—হৃদয়া এনিমিয়া ও দুর্বলতা। কৃশ, দুর্বল, ও পাণ্ডুর বালক বালিকা, বাহারা শিশু শিশু লম্বা হইয়া উঠে এবং সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ে তাহাদের রোগ। ফুসফুস হইতে রক্ত স্রাব। নাসিকা হইতে রক্তপাত। দক্ষিণস্কন্ধের ত্রিকোণ-পেশীর বাত। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। কেশ-রোগ (এস্থলে টিক্কুরা ফেরি এসিটসাই রূপে প্রয়োগ করিতে হয়)।

ফিরঃম কার্বনিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—নীরক্ত রোগীদিগের রক্তসঞ্চয়-জনিত দম্ব বেদনা। ক্লোরোসিস (হরিৎপাণ্ডু)।

ফিরঃম পিত্রিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—লণ্ডন নগরের ডাঃ কুপার রক্ত-বহানাদী সংক্রান্ত (ভ্যাক্সি উলার) বদিরতায় এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন।

ফিরঃম মিউরিটেটিকম।—আময়িক প্রয়োগ।—অশ্মরী মহকারে বুদ্ধক-বস্তি-

প্রদাহ ( পাইলাইটিস ) । রক্তহীনতা ( এনিমিয়া ) । মলিন, সংযত রক্ত বিশিষ্ট ফুসফুসের রক্তশ্রাব ( হিম্ অপ্টেসিস ) । ইহার নিয় ক্রম বা মাদার টিঞ্চার সেবনের পর সোড়া-ওয়াটার দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলা উচিত ।

ফিরঃম শাইট্রিকঃম ।—ক্লোরোসিস ( হরিৎপাণ্ডু ) ।

ফিরঃম হিমেটিনেটঃম ।—আময়িক প্রয়োগ ।—গুরুতর রোগের পর, বিশেষতঃ সমাক অনারোগ্য তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমধিক রক্তহীনতা ( এনিমিয়া ) ।

ফেলভঃলপাই ।—বিশেষ লক্ষণ ।—কোষ্ঠ-রোধ । অস্ত্রে বায়ু-সঞ্চয় ।

ফ্যাঃগোপাইরঃম এক্সি টেলের্টঃম ।—বিশেষ লক্ষণ ।—অপ্রসন্নতা, কোপনতা, অধ্যয়নে অসমর্থতা, অথবা যাহা পাঠ করা যায় তাহা স্মরণ রাখিতে অপারগতা । মস্তকের গভীর স্থানে, প্রায়শঃ চক্ষুর পশ্চাৎভাগে কপালে, মস্তক যেন ফাটিয়া যাইবে উর্দ্ধদিকে এরূপ প্রচাপন সহকারে প্রচণ্ড বেদনা । চক্ষুর অভ্যন্তরে ও চতুর্দিকে কণ্ডুয়ন । কণ্ঠস্থের উত্তাপ ও কণ্ডুয়ন ( এগেরিক ) । মুখ হইতে তর্জক নিঃসরণ ( পলস ) । অলি-জিহ্বার দীর্ঘতা, তালু-মূলের ক্ষীণতা, আরক্ততা ও অবদারণ অল্পভব ( ফাইটো ) । \* আহারে ক্ষুধার উৎকর্ষ প্রাপ্তি ( এতদ্বিপরীত লাইকো, ও নক্স-মস্চেটা ) । আমাশয়ে শূন্যতা অল্পভব ( সিপি ) । \* পীতবর্ণ প্রদরশ্রাব সহকারে স্বী-অঙ্গ-কণ্ডুয়ন, বিশ্রামে উহার আধিক্য ও সঞ্চলনে একটু উপশম ( কেবল এই ঔষধেই এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় ) । ঘাড়ের পেশীতে স্তম্ভতা ও ঘৃষ্টতা অল্পভব এবং তৎসহকারে ঘাড় যেন মাথা রাখিতে পারে না এরূপ অল্পভব । হাতের আঙ্গুলে ছল বেদন, ও জ্বলনবৎ বেদনা সহকারে স্বন্ধের আমবাতিক বেদনা সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি । লাল লাল দাগ ( শীতপিত্ত ) । বাহুতে ও জঙ্ঘায় প্রবল কণ্ডুয়ন, সন্ধার প্রাকালে উহার আধিক্য । সন্ধাকালে জন্তণ ও অঙ্গ-মর্দন সহকারে নিদ্রানুতা, কোন বিষয়ে মনোযোগ প্রয়োগে উহার লাঘব । শব্দায়, উপরের তলায় যাইলে, ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে উপচয় । গভীর শ্বাস । উত্তেজের কণ্ডুয়ন । কফি-পানে, শীতল পোষ্টিশ প্রদানে, শীতল বায়ুতে সঞ্চলনে ; এবং উষ্ণগৃহে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে উপশম ।

ফ্রানগিস্কা ইউনিফোরা ( যেনাকা ) —বিশেষ লক্ষণ ।—মাথার চারিদিকে বন্ধনের স্থায়ী তীব্র শিরোবেদনা, মস্তকে পশ্চাৎভাগে, ঘাড়, ও মেরুদণ্ডে বেদনা, সর্বত্র ভয়ানক ভল্লাঘাতবৎ বেদনা, তৎসহ সর্পশরীরে অতিশয় উত্তাপ, অনন্তর প্রভূত ঘর্ম্ম, ও সকল যন্ত্রণার বিরাম । আময়িক প্রয়োগ ।—তরুণ, অনতি-তরুণ, ও পুরাতন বাতে ও তরুণ বাতে ক্রোধে-প্রদাহে, এই ঔষধের সমধিক ব্যবহারের বিধি আছে ।

ফ্রে রিডজিন ।—আময়িক প্রয়োগ ।—সশর্কর বহুমূত্রে এই ঔষধের দশমিক তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ ব্যবহারের বিধি আছে ।

বেলিস পেরেনিস ।—আময়িক প্রয়োগ ।—বার্ণেট বলেন যে শরীরের উত্তপ্তা-বহায় শীতল পানীয় দ্রব্য বা শীতল খাদ্যদ্রব্য দেবন করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় ;

অপর, শরীর উত্তপ্ত থাকিলে শীতল বাতাস লাগিয়া যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে বেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। জটুলে ইহার বাহ্য প্রয়োগেরও বিধি আছে।

**বোথ প্স ল্যান্সিওলেটঃস**।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ ফ্যারিংটন এফেশিয়া অর্থাৎ বাকশক্তিহীনতায় এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

**বোরেসিকঃম এসিডঃম**।—বিশেষ লক্ষণ।—ইউরিটার অর্থাৎ মূত্রনালীর প্রদেশে বেদনা। ঘন ঘন মূত্র-বেগ। আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন মূত্রাশয়-প্রদানে বোরাসিক এসিডের জলীয় দ্রবের পিচকারী দ্বারা অনেক সময় উত্তম ফল দর্শে।

**বোলঃম ল্যারিসিস**।—আময়িক প্রয়োগ।—যক্ষ্মারোগে নৈশঘর্ম। ক্ষুধাহীনতা। পাণ্ডু, রক্তবর্ণ মূত্র ও অল্প অল্প শীতল লক্ষণাপন্ন প্রাত্যহিক সঘনির্ম্ম জ্বর। অল্প অল্প ঘর্ম্ম কিন্তু উহাতে অল্পপশম।

**ব্যারাইটা আইওডেটা**।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেল বলেন যে তালু মূল, অণ্ড, প্রদেহ প্রভৃতি গ্রন্থির দৃঢ় অর্কসুদে ব্যারাইটা আইওডেটা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। লাইবোলড বলেন যে গ্রীবার গ্রন্থির ক্ষীততা ও রোগীর পরিপুষ্টির প্রতিরুদ্ধতা সংযুক্ত গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহে এই ঔষধ উপযোগী।

**ব্যারাইটা এসেটিকা**।—বিশেষ লক্ষণ।—পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধে অনৈকক্ষণ ইত্যন্তঃ করা। কথা বলিবার সময় অথবা বক্তৃতা করিবার সময় শব্দের বিস্মৃতি (ব্যারাকার্ক)। মুখমণ্ডলের উপর লুতা-তদ্ব অমৃভব (এলুমিনা, গ্রাক)। নিতম্বদেশে বেদনা সহকারে পুনঃ পুনঃ মল-বেগ। সমগ্র বাম জজ্বার নিম্ন পর্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা। জ্বালকের সূচী-বেধবৎ যাতনা সহকারে স্বকের স্থানে স্থানে স্ফুটন্ত অমৃভব। আময়িক প্রয়োগ।—মায়ু-শূল। পক্ষাঘাত। হিউজ বলেন যে ব্যারাইটা কাস অপেক্ষা এই ঔষধ জাপক পক্ষাঘাত অধিকতর উগ্র। দেহ-শাখার পক্ষাঘাত এবং তথা হইতে সমগ্র শরীরে গতি। মস্তিষ্ক অবিকৃত।

**ব্যারাইটা মিউরিটিকা**।—আময়িক প্রয়োগ।—চক্ষুণে ও গলাধঃকরণে কর্ণে সন্ সন্ ও ভন্ ভন্ শব্দ। তালু-মূলের প্রাচীন ও গণ্ডমালা জনিত বিবৃদ্ধি (অপিচ, লাইকার ব্যারাইটা মিউরের একবিব্দু অধবাতি দ্বৈভঙ্গ্য জলে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে কুলি) (কুণ্ডুচা-করা)। গিলিলে ও হাচিলে পটাং পটাং শব্দ সহকারে গলা-কোষ ও কর্ণ-নলের আংশিক পক্ষাঘাত, অতি সহজে পটহ গহ্বরে বায়ুর সংবেশ। (এলেন)। ঙ্গংকম্প, বক্ষঃস্থলের পূর্ণতা এবং বৃক্কগ্রন্থির নিকটে বৃকের ক্ষীততা লক্ষণাপন্ন ধমস্তর্কসুদ। প্রথম দশমিক ক্রমই এখানে উৎকৃষ্ট; অধোগামী ওয়টার (বৃহদ্রমণী) অর্কসুদের একজন রোগীর মৃত্যু সঙ্গীপবর্তী হইয়াছিল, কিন্তু এই ঔষধ সেবনে ছয়মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল (এলেন)। বৃক্ক, ক্রোন, ও মধ্যগ্রন্থি গ্রন্থির ক্ষীততা ও মৃত্যু। হস্ত গৈগুন। নারীদিগের স্থানিক উপদাহ জনিত ক্যানোসাদে ও পুরুষের

কামোদ্ভাদে ইহা উত্তম ঔষধ। শ্লেষ্মা ও জল বমনবিশিষ্ট প্রবল জ্বালাকর উদর-বেদনা ( কলিক )। বরফবৎ শীতলতা সহ হস্ত ও পদের পক্ষাঘাত, শরীরেরও পক্ষাঘাত ( ফেসেন )। মূত্রাশয়ের ঘাটারবরণী পেশীর পক্ষাঘাত। স্ক্রুফিউলোসিস ফ্রোরিডা। শুভ্র অর্কুদুঃ। মস্তকের কেশাবৃত অংশে প্রভূত পুষ্পাবী উদ্ভেদ। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার মংগিটেপেল। স্ক্লারোসিস রোগে, বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগের পক্ষে; অপর, শিশুদিগের মস্তিষ্কের বিকাশের অসম্ভাব্যে ডাঃ হামণ্ড ব্যারাইটা-কার্ক ও ব্যারাইটা-মিউর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ব্যাংগিলাইনঃম।—কুসকুসের টিউবারকুলোসিস ( গুটিকা দোষ ), সগুটিক মস্তিষ্ক বিলী প্রদাহ ও সন্ধি-প্রদাহ। সর্বদা শদিলাগা। লণ্ডন নগরের ডাঃ বার্ণেট এই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন।

ব্লাটা এমেরিকানা।—আময়িক প্রয়োগ।—বৃকক-প্রদাহ জনিত উদর-শোথ। স্নায়ুজমা বা শ্বাস-কাসের আক্রমণ ( ব্রঙ্কাইটিস সহকারে কুসকুসের এম্ফিসিমা )।

ভেঙ্গা ক্রেভো।—বিশেষ লক্ষণ।—অক্ষি-পুটের বিসর্জজনিত প্রদাহ। মুখ-মণ্ডলের সেই পার্শ্বের ক্ষীততা ও বেদনা, গুরুমণ্ডলের প্রায় সম্পূর্ণ কিমোসিস, স্ক্লারোটিক বিলীর উপরে উহার উত্থিতি, কনিণিকার প্রান্ত পর্যন্ত চক্ষুর অর্ধেকেরও অধিকাংশের উপরে উহার বিস্তৃতি। লসিকা নিঃসৃত হইয়া উহার উৎপত্তি, বোধ হয় যেন উহার তলে, বসাময় পদার্থের অবস্থিতি আছে। আময়িক প্রয়োগ।—গুরুমণ্ডলের থলীর স্থায় ক্ষীততা সহ চক্ষুর প্রদাহ। নারীদিগের মূত্র-ত্যাগে জালা। \* জরায়ু-মুখে ক্ষত। স্পর্শ-দেয়, ঘন ঘন মূত্র-ত্যাগ, পৃষ্ঠ পর্যন্ত সংপ্রসারিত ত্রিকোণ-বেদনা, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট বাম ডিম্বাশয়ের রোগে ভেঙ্গা উত্তম ঔষধ।

মর্ফিনঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—পেশিমণ্ডলীর দুর্বলতা। শারীরিক ও মানসিক উদাত্ত। অস্থির দৃষ্টি। \* সরলাঙ্গের অভ্যন্তরভাগের আংশিক পক্ষাঘাত। তির্ঘাঙ্গদৃষ্টি। অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত। দুর্বল-কুআটিকাত দৃষ্টি। বিবনিবা। দাক্ষণ্যকণ্ডূয়ন। ক্যান্সারের স্থায় বেদনায় অত্যন্ত অন্তর্ভুক্তি, তজ্জগৎ অঙ্গের আক্ষেপ, আকুঞ্চন ও উৎক্ষেপের উৎপত্তি।

আময়িক প্রয়োগ।—আধান। মস্তিষ্ক কুঞ্চিত অল্পভব। শ্বাস-কৃচ্ছ্র সহকারে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভেদনবৎ বেদনা। বাম পদতলের তুষারবৎ শীতলতা উহা যেন অয়েল-ক্লথের উপর রহিয়াছে একরূপ অল্পভব।

মাইগোসা হিউমিলিস।—আময়িক প্রয়োগ।—বাম গুলফের আরক্ততা, অশিথিলতা, ও ছেদনবৎ বেদনা সংযুক্ত ক্ষীততা। জাহ্নসন্ধির আরক্তাবিশিষ্ট আমবাতিক প্রদাহ। চক্ষুর আমবাতিক প্রদাহ।

মাইসটিস আর্ভেন্সিস।—প্রভূত, পুষ্পময় নির্জীবন, শীর্ণতা, ও নৈশঘর্ম বিশিষ্ট,



মারকিউরিয়ঃস অরেটঃস ।—আময়িক প্রয়োগ ।—উপদংশজনিত হৃদয়া চৰ্ম রোগ করতল ও পদতলের বিচর্চ্চিকা, নাসিকার ও গল কোষের দীর্ঘকালস্থায়ী উপদংশজ প্রতিশ্রাব, অস্থির প্রদাহ ও পুয়োৎপত্তি ।

মারকিউরিয়ঃস এসিটিঃস ।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মূত্র-কালে ও তৎপরে মূত্রমার্গে জ্বালা । মূত্রমার্গে অতি বেদনা বিশিষ্ট উপদংশজ ক্ষত । উপদংশ মূলক দারুণক ( টিনিয়া ক্যাপিটিস ) উপদংশজনিত ক্ষয় ( টেবিস ) রোগে ভল্লাঘাতবৎ বেদনা ।

মারকিউরিয়ঃস ট্যানিকঃস ।—আময়িক প্রয়োগ ।—উপদংশজ চৰ্ম রোগে, \* রোগীর আমাশয়ান্ত্রের রোগ থাকিলে, অথবা কোনপ্রকার উগ্রতর পারদ সহ্য না হইলে এই ঔষধ ব্যৱহৃত হয় ।

মারকিউরিয়ঃস ফসফরিকঃস আময়িক প্রয়োগ ।—উপদংশজনিত শায়বীর রোগ । অপরন্ত মস্তিষ্কের রোগ, ক্ষয়-রোগ ( টেবিস ), মঃটিপল স্ফারোসিস, ইত্যাদি । উপদংশজনিত অস্থি-বৃদ্ধি ও স্থূলত্ব প্রাপ্তি ।

মারকিউরিয়্যালিস পেরেমিস ।—বিশেষ লক্ষণ ।—\* সিঁড়ি বাহিয়া নীচে ষাইতে শিরোবর্ণন । মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, বোধ হয় যেন কোন ভারী বস্তু দ্বারা মস্তক চাপিত হইতেছে, মস্তকের কেশাবৃত ভাগ লঘু ও অবশ বোধ হয়, এবং উহা নাড়িতে চাড়িতে কষ্ট অনুভূত হয় । উপরের অক্ষিপুটের, বিশেষতঃ বামদিগের অক্ষিপুটের স্পন্দন । রাত্রিতে জাগ্রিবার সময় চক্ষু মেলিবার পূর্বে, উহা মর্দন করিতে হয় । অক্ষিপুটের শুষ্কতা ও শুকতা । অতিরিক্ত অগ্রস্রাব । কনীনিকা সম্যক্রূপে প্রসারিত । নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু শীতল । মুখ-দিবরের সমধিক শুষ্কতা, একথণ্ড চিনি গলাইতে পারা যায় না । মুখমণ্ডলে উত্তাপ সহকারে সমস্ত শরীরে শীত । বস্ত্রাবৃত হইলে ও নিদ্রা গেলে উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয় । বাতজনিত রোগেই এই ঔষধের অত্যধিক ব্যবহার হয় । এই সকল লক্ষণ চিকিৎসায় প্রমাণিত হইয়াছে ।

মেডুস ।—আময়িক প্রয়োগ ।—ইহার ফল আটকা ইউরেন্সের প্রায় সমতুল্য । ইহাতে শীতপিত্তের উৎপত্তি হয় ।

মেনিস্পারমঃ ক্যানেডেন্স ।—বিশেষ লক্ষণ ।—ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রচাপনবিশিষ্ট শিরঃপীড়া, অঙ্গ-মর্দ ও জ্বত্ত্বণ সহকারে অনেক সময় উহার প্রাবল্য । বিরক্তিকর ও বিশৃঙ্খল স্বপ্ন এবং নিদ্রা হইতে চমকিত-হইয়া-উঠা সহকারে অস্তিরতা । সবমন-শিরঃপীড়া ( এক পার্শ্বের ), কপালে ও শঙ্খদ্বয়ে সমস্ত :দিনব্যাপী বেদনা, সময়ে সময়ে মস্তকের পশ্চাভাগে উহার সংকট ।

মোমরডিকা ব্যালানিক ।—বিশেষ লক্ষণ ।—\* স্থলাঙ্গের সহিত স্নিহার সংযোগ স্থলে বহু-সংকট ।

ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা।—বিশেষ লক্ষণ।—অর্দ্ধ বায়ুর বংশাব্যস্ত উপভোগে শরীরের নানাস্থানের স্তব্ধতা, শুষ্ক কালে উহার ভ্রাস। সকলকার্য্যেই অপ্রবৃত্তি। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা সহকারে শিরোগূর্ণনের সূচনা। সর্বাঙ্গীন আলস্ত, শিরোগূর্ণন ও বিবিধা সহকারে আগাশয়ে শূন্যতাম্ভব। ক্রান্তবেগে হাঁটিলে অথবা বাম\* পাশে শুইলে খাঁস-রোধ। দক্ষিণ স্বক্কাহিতে ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে আমবাত জনিত সূচী-বেধবৎ বেদনা, তৎপরে মৃত্যুভয় ও সর্বাঙ্গীন শীতলতা সহকারে জ্বংপিণ্ডে সূচী বেধ, বামপার্শ্বে শয়নে ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে উহার উপচয়। শরীর শাখায় তীব্র উৎপথগামী অথবা আমবাতিক বেদনা। আময়িক প্রয়োগ।—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেদনা, সন্ধিস্থলে আশ্রিত্য, অবিরত উহার স্থান-পরিবর্তন। ( \* পশস )। স্বক্কাহিতে বাতের বেদনা। শিরোগূর্ণন, জ্বংকম্প, খাঁস-রোধ, বাম উর্দ্ধাঙ্গের অবশ্যতা। হৃদকপাটের রোগ, জ্বংপিণ্ডে বেদনা জন্ম দ্বাস-ক্লম্ব এং মৃত্যু-ভয়। এডোকার্ডাইটিস অর্থাৎ জ্বংপিণ্ডের অন্তর্কোষের প্রদাহ, সন্ধির বাত এবং জ্বংপিণ্ডে পর্যায়ক্রমে খল্লীবিৎ ও ভল্লাঘাত সদৃশ বেদনা। গলার আকুঞ্জন সহ হৃদযন্ত্রের প্রদাহ ( পেরিকার্ডাইটিস ) ও জ্বংপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। বৃহদ্রমণীর ধমহুর্কুদ ( এমুরিজম )। জ্বংশূল ( এঞ্জাইনা পেটোরিস )।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা।—আময়িক প্রয়োগ।—ম্যাগ্নিসিয়া ফসফরিকা ডাঃ হুস্কারের দ্বাদশটী টিসু-রেমিডির অত্যন্ত ঔষধ। অক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহা অতিশয় উপকারী ঔষধ। উষ্ণ বাহ প্রয়োগে শান্তি ইহার পরিচালক লক্ষণ। প্রতি রাত্রিতে নিয়মিতরূপে স্নায়ুর গতি-পথে \* চিড়িক-মার, আক্ষেপিক বেদনা, উষ্ণতায় ও প্রচাপনে উহার উপশম, জ্বং সংস্পর্শে উপচয়। \* শূল-বেদনা, অবনত হইয়া দ্বিভাজ হইলে ( কলোসিস ) ও উষ্ণতা প্রদানে উহার উপশম; বেদনা সহকারে শান্তিশূন্য বাষ্প উদগীরণ। অক্ষিপ্ত অথবা মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ, হিকা ও দন্তোদগম-কালে শিশুদিগের আক্ষেপ, মূত্রের আক্ষেপিক অবরোধ ও রজ-ক্লম্ব। উত্তাপে উপশম। আবেশিক ও আক্ষেপিক শুষ্ক কাস। ছপ-শঙ্ক-কাস রাত্রিতে ও শয়ন করিলে উহার আধিক্য। সন্ধি-বাত। পক্ষাঘাত, টঙ্কার, ও অঙ্গের, স্তব্ধতা, মুষ্টিবদ্ধ হস্তাঙ্গুলী, অভ্যন্তর দিকে অঙ্গুষ্ঠের আকৃতি। কোরিয়া, লেথক, পিয়নো-বাদক, বা বেহালা-বাদকের খল্লী। দোগীর অবসন্নতা।

ম্যাগ্নিসিয়া সলফিউরিক।—বিশেষ লক্ষণ।—প্রাতে উঠিবর অব্যবহিত পরে মস্তকের গুরুত্ব, এক ঘণ্টাপরে উহার বিরতি। মন্দ অণ্ডের স্বাদের ছায় স্বাদবিশিষ্ট ঘন ঘন উল্কার।

ম্যাটিকো।—আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ কাককা প্রাচীন প্রমেহে অর্থাৎগ্লীট রোগে ইহার প্রথম ক্রম ব্যবহারের বিধি দেন।

রেগনকিউলস এক্রিস।—বিশেষ লক্ষণ।—শরীর নোওয়াইলে ও খুরাইলে মিতত্বের পেশীতে এবং সন্ধি-সকলে বেদনা ( চিকিৎসায় প্রমাণিত হইয়াছে )।

**রেফেনেস স্টাটাইভ্‌স্‌ । বিশেষ লক্ষণ ।**—আগ্নান জনিত উদরের ক্ষীণতা, উদর \* শক্ত, বেন বায়ুরা পূর্ণ । \* অতিশয় আগ্নান । \* উর্দ্ধদিকে বা অধোদিকে, কোনদিকেই বায়ু নিঃসৃত হয় না । তরল, পীতাত্ত কপিশবর্ণ, ফেগিল, প্রভূত মল । **আময়িক প্রয়োগ ।**—জায়বীয় দস্ত-বেদনা, সক্ষাৎকালে দপদপকর, সঞ্চরমান বেদনা, গর্ভের প্রথমাবস্থায় দস্ত-বেদনা । শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি, হাঁটিয়া বেড়াইলে হ্রাস । আগ্নান বা বন্ধু-সঞ্চয় । পাতলা, কপিশ, ফেগিল, পীতাত্ত অতিসার, উহার সহিত উদর-বেদনা ও অল্প উন্নত হইয়া গদির মত হওয়া, \* উর্দ্ধ বা নিম্ন কোন দিকেই বায়ু নিঃসৃত হয় না । হরিৎ, তরল, রক্তাক্ত মল বিশিষ্ট ও বায়ু-নিঃসরণ পরিশূন্য পুরাতন অতিসার । প্রদাহ বা বেদনা বিহীন পেপ্টিগেস ( বিষিকা ) । টৈলাক্ত ত্বক্ ও বলা-শ্রাব ( সেবোরিয়া ) ।

**রোজা ডেমানিয়া ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—হে-ফিভার ( তবদিগন্ধজ্বর ) রোগের প্রাথমাবস্থায় কর্ণ-নলের আক্রান্তি, অতি-শক্তির ক্ষীণতা, এবং কর্ণ-নাদ লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী ।

**লাইনয় ক্যাথারিটিক্‌স্‌ ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—আগ্নাসে নিঃসারিত নিষ্কীর্ণ বিশিষ্ট ল্যামিনাইটিস ও ব্রঙ্কাইটিস । স্বল্প-সন্ধির বাত ।

**লাইম্যাক্স এটার ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—অঁচিল ও স্ক্যোডোপে চর্ম্মের বিবর্ণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণদাগে এই ঔষধের মাদার টিফারের বাহ প্রয়োগ হয় ।

**লিমিউল্‌স্‌ সাইক্লপস্‌ ।**—বিশেষ লক্ষণ ।—সমুদ্র জ্ঞানের পর অতিশয় অবসন্নতা । শক্তির অঙ্গুলে উদ্বেদ, স্বক থমিত বা চর্চিত দৃষ্ট হয় ।

**লুপুলাইনয় ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—মূত্র-মার্গে আগ্না । রাজিতে অগ্ন-দেহ । প্রমেহ-রোগে বেদনা বিশিষ্ট লিম্ফোথান

**লেথাইরস স্টাটাইভ্‌স্‌ ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—স্বকের অতিরিক্ত স্পর্শ-শক্তি সংযুক্ত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত । চক্ষু-বৃদ্ধিয়া দাঁড়াইলে শিরোবুর্গন ।

**লেপেথয়ম্‌ স্যাকিউটয়ম্‌ ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—শিরোবেদনায় পরবর্ত্তী নাসিকার রক্তস্রাব । কটি ও ত্রিকোণের বেদনা সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর ।

**লেমিয়য়ম্‌ স্যালবয়ম্‌ ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—এই ঔষধ বাহুবলি অর্শে ব্যবহৃত হয় । অত্যন্তমুদ্র বিশিষ্ট মূত্রাশয়ের বৃদ্ধনেও ইহা উপযোগী ।

**লোবেলিয়া সিকিলিটিকা ।**—বিশেষ লক্ষণ ।—বায়ু সঞ্চাতির অভ্যন্তরপ্রান্তের ভলে, কিন্তু নিম্নে নয়, বেদনা, অশ্রু পাতের পর উহার আতিশয়্য ।

**ক্টিগমেটা মেইডিস ( তরল সার ) ।**—আময়িক প্রয়োগ ।—বৃক্ক-শূল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর, আরক্তরেণু, ও রক্ত নিঃসরণ সহকারে বৃক্কের অশ্মরি রোগ । প্রস্তর বণতঃ পুরাতন বৃক্ক-বস্তি-প্রদাহ ( পাইলাইটিস ) । মূত্র-ভ্যাগের পর অতিশয় কুহন স্ফুটকাবে পুরাতন মূত্র-স্তম্ভ-রোগ । ( রিটেনশন ) । নিবেট পদার্থের অসহ্যতা, ও নিম্ন

আকস্মিক গুরুত্ব সহকারে মৃত্যু-নাশ (সম্প্রেশন)। মৃত্যুশয়ের প্রতিশ্রা (ক্যাটার), মৃত্যুশয়ের আবেগ, এমোনিয়া বিশিষ্ট মূত্র, অধিক শ্লেষ্মা। পুরাতন প্রমেহ, মৃত্যুশয়ের মুখশারী গ্রন্থির আক্রান্তি, মূত্র-ত্যাগে বাতনা। হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ, নিরাসের অধিক শোথ ও বর মূত্র (হানসেনের চিকিৎসায় পরীক্ষিত)। (শেষোক্ত রোগধর্ম ২০ বিদ্যুৎ মাত্রায় ব্যবহার্য)।

**ক্রোশিয়ানা কার্বনিকা।—বিশেষ লক্ষণ।—**\* শিরঃপীড়া, ঘাড় হইতে উহার উপস্থিতি এবং তথা হইতে সমগ্র মস্তকেপরি বিস্তৃতি; মস্তকে বজ্র জড়াইয়া মাথা উষ্ণ করিলে সমস্ত শিরোলক্ষণের উপশম। (সিলি, ম্যাগ্নে, মিউ)। মুখমণ্ডলে থাকিয়া থাকিয়া আরক্ত রোগের প্রকাশ, ধমনী সকলের প্রবল স্পন্দন। শ্বাস-শূল, বিশেষতঃ অক্সি-কোটরের উর্দ্ধভাগের শ্বাসের বেদনা, আস্তে আস্তে বেদনার হ্রাস-বৃদ্ধি (ষ্টাণ, প্লাট)। অতিসার, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, \* রোগী মল-ত্যাগ-পাত্র পরিত্যাগ করিয়া বাইবামাত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। \* প্রাতঃকালের প্রাক্কালে লাঘব। মাধক-দোষ (সাইকোসিস) জনিত অর্ধ, কণ্ঠ-রনশীল ও জ্বালাকর উদ্বেগ। \* অনাবৃত শ্বাস-শূল, বিশেষতঃ উষ্ণ স্বাভাবিক-কারণে উপশম। আময়িক প্রয়োগ।—মস্তকের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়, ও রোগী যতবার হাঁটে ততবারই মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে সংক্রান্ত রোগের আশঙ্কা। গণ্ডমালীয়া ধাতুতে অস্থির, বিশেষতঃ উরুর অস্থির কেরিজ, তৎসহ জলবৎ অতিসার, সতত উহার প্রত্যাবৃতি ও রাত্রিতে অধিক্য। সন্ধির জলপূর্ণ ক্ষীণতা (ইডিমা) সংযুক্ত পুরাতন বাতকণ্টকে (স্পেণ) আশঙ্কা ও রুটা বিফলাস্তে এই ঔষধ উপযোগী।

**ক্রোফ্যাণ্টেস হিম্পিডেস।—আময়িক প্রয়োগ।—**হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট ও বহির্বেষ্ট ঝিল্লীর প্রদাহ। হৃৎকপাটের রোগ। হৃৎকম্প। হৃৎপ্রাণে উদরী। হৃৎপ্রাণজনিত শ্বাস কাস। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, প্রাণীর বীরত্বের, সবলত্বের, ও অধিকতর নিয়মিততা প্রাপ্তি। পুরাতন বৃদ্ধক-প্রদাহের শোথ (হ্রাস প্রাপ্ত হয়)। উগ্র মদিরা; তাবাক ও চা সেবন বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উপদ্রব।

**ক্রিকনাইনঃম কসফরিকঃম।—বিশেষ লক্ষণ ও আময়িক প্রয়োগ।—**পৃষ্ঠ-বংশীয় মজ্জার রক্তস্রবতা (এনিমিয়া) নিবন্ধন পক্ষাঘাত সহকারে পৃষ্ঠবংশের শ্বাস দুর্বলতা। (উৎকৃষ্ট ঔষধ)। পৃষ্ঠবংশের জ্বালা, অবিরাম বেদনা, ও দুর্বলতা সংযুক্ত পৃষ্ঠবংশের উপদ্রব, বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগ পূর্বাঙ্গ বেদনার সম্প্রসারণ। পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে প্রচাপনে স্পর্শ-বেদ। নিদ্রাহীনতা, লীড়ল পদ। পা, হাত, ও বগলে আঠা আঠা বর্ষ।

**ক্রিকনাইনঃম পিউরঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—**অস্থিরতা। \* অতিরিক্ত কোপনহা (ইরিটেবিলিটি)। চক্ষু উজ্জ্বল সহকারে পূর্ণ ও বিদারণবৎ শিরঃপীড়া। পৃষ্ঠবংশের নিম্নভাগে সর্বত্র বরফ থাকার ভাষা অনুভব। অঙ্গ-কম্প। \* গ্রীবা ও হস্তর স্তম্ভতা। হস্তস্তম্ভ। \* পক্ষাঘাত টঙ্কার, আবেগের ব্যবহৃত সময়ে পেলীর শিথিলতা।

\* বংশাশ্রিত্য স্পর্শে, শব্দে, গন্ধে, শু গোলমালে উপচয়; রোগীর গাত্র মর্দন করিলে উপশম। সংসর্গের প্রবৃত্তি, কিন্তু শুভ্র-স্রাবের সময় অসামর্থ্য প্রাপ্তি। নারীদিগের শরীরে, যে কোন স্থানে কেন না হউক, যে কোন প্রকার স্পর্শে সুখের অমুভব জন্মে। সর্কশরীরের ছকের, বিশেষতঃ নাসিকার কণ্ডুয়ন। আময়িক প্রয়োগ।—ধনুস্তম্ভ। হনুস্তম্ভ। অপস্মার। বেপথু রোগের জায় হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীর অবিরত কস্পন। সশব্দে উদগত কাস। আক্ষিপিক শ্বাস-কাস (রাজমা)। এই ঔষধে আমাশয়িক রসের (গ্যাস্ট্রিক য়ুস) পরিমাণ ও সাধারণ অল্প হইয়া যায়।

সংলক্ষণ আইওডেটঃম।—বিশেষ লক্ষণ।—অলিজিহ্বা ও তালু মূলের বৃদ্ধি ও আরক্ততা, বায়ু-নালীতে মলিন, পুথাক্ত স্লেম্মার সঞ্চয়, আয়সে স্লেম্মার নিঃসরণ। গল-মধ্যমেন ফুলিয়াছে একপ অমুভব। কর্ণ ও নাসিকার উপর এবং মূত্রমার্গের মধ্য কণ্ডুয়ন। মুখমণ্ডলের উপর অপচ্যমান উদ্বেদ। উপরের ওষ্ঠের উপর দ্বৈত পীতবর্ণ, বেদনাসংযুক্ত পচ্যমান উদ্বেদ, অবিলম্বে শুষ্ক শব্দে উহার তিরোধান। ঘাঁড়ের সম্মুখভাগে ও মুখ-বিবরের সমীপে ফোটক। শীতপিত্তের জায় কণ্ডুয়নকর উদ্বেদে বাহুদ্বয়ের আবৃততা। আময়িক প্রয়োগ।—জিহ্বার প্রস্ফাভের পর উহার স্থলতার অবশিষ্টতা। কর্ণমূল-প্রস্ফাভের পরে কর্ণমূলের অস্বাভাবিক বিবর্ধন (হাইপারট্রফি)। তালু-মূলের পুরাতন বিবর্ধন। পুরাতন অর্জিপামা। অধঃশাখার শিরা-স্বীতিসংযুক্ত আরক্ত পামা। ক্ষৌর-কণ্ডু (উভয় ঔষধ)। যুবক-যুবতীদিগের মুখমণ্ডলে বড় বড়, বেদনাবিশিষ্ট, ও পচ্যমান বয়োত্রণ (এক্সি)। পুরাতন ও সামান্য লাইকেন।

সাইজিফিরঃম ড্যাবোলেইনঃম।—সশর্কর বহুমূত্র (অত্যন্ত উপকারী ঔষধ)। সকল লক্ষণেই একসঙ্গে উৎকর্ষ জন্মে। (সম্ভবতঃ বহুমূত্র-মূলক) ছকের পুরাতন ক্ষত।

হাইড্রক্সিড্রা আর্কোরেসেন্স।—আময়িক প্রয়োগ।—কোন কোন প্রকার অশ্মারি-রোগে, বিশেষতঃ মূত্রে অল্প পরিমাণ শুভ্রবর্ণ, আকারহীন লাবণিক পদার্থের সঞ্চয়ে (ডিপজিট) এই ঔষধ উপকারী। এককালী ইচ্ছাশয়ে প্রস্তরোৎপত্তির প্রবলতা প্রতিরুদ্ধ এবং বৃক্কের অশ্মারিকমিত হইত। তৎসহ বৃক্ক-প্রদেশের উপর স্পর্শ-দেহ ও রক্তাক্ত মূত্র উপশমিত হইয়াছে।

হিউরা ত্র্যাসিলাইএসিঅস্।—বিশেষ লক্ষণ।—চর্ম্মে, বিশেষতঃ অস্থির প্রবর্তিত অংশের চর্ম্মের উপরে, যথা হস্তর অস্থির উপরে লাল লাল কোষ। চর্ম্মের অশিথিলতা, এক প্রকার অনমনীয়তা অমুভব (ক্রোট-টিং)। ফোফাগুলি একই দৃঢ় যে ছাড়াই দিলে উহাদের অভ্যন্তরস্থ রস ছুটিয়া পড়ে। হাতের অঙ্গুষ্ঠের নখের নীচে চৌচ ফুটার জায় অমুভব।

হিপার সংলক্ষিউরিস ক্যালিনঃম।—আময়িক প্রয়োগ।—এম্প্রিয়া

অনতিতরুণ ও পুরাতন নিক্রাইটিস, এবং পানাইটিস রোগে হিপার সংলব্ধ অণুজীব  
কিন্তু প্রবলতর ক্রিয়া দর্শাইবার অভিপ্রায়ে ডাঃ হেইনিগকি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

হেলিয়াস্‌ংস স্যানিটরীস্‌।—আময়িক প্রয়োগ!—সাধারণতঃ এই ঔষধের একভাগ, দশ হইতে কুড়ি ভাগ জৈবজ্জ্ব জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃষ্ট্রণ ও রক্তশ্রাবী লজ্জরণে আর্নিকা ও ক্যালেলুলারিয়ার আয় বাহ প্রয়োগ হয়।

হোয়ার্ড-স্থান।—আময়িক প্রয়োগ।—পক্ষাঘাত, পামা, গাভকণ্ডু পুণ্ডন কণ্ড, ক্যান্সার, \* কুষ্ঠ (প্রধান ঔষধ), এবং সর্প দংশনে এই ঔষধ উপকারী। সুখমণ্ডল ঘাড় পৃষ্ঠ ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল স্থানে বসাব্রাশির আধিক্য আছে সেই সকল স্থানের গাত্র-কণ্ডু ও পচ্যমান পামার ইহার ব্যবহার হয়। স্কেটিক ও কার্ককলের প্রদাহ এতদ্বারা প্রশমিত, এবং সর্সাদীন পরিপোষণ প্রবৰ্দ্ধিত হয়। খাতু-গত উপদংশে ও গ্রাহি মণ্ডলের ককটিকায় (ক্যান্সার) এই ঔষধ সর্সাদীন পরিপোষণের উদ্ভূতি জন্মায়। কুষ্ঠরোগে এতদ্বারা নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হয়; রোগীর বল বৃদ্ধিপ্রায়, স্পর্শ-শক্তির অভাব দূর হয়, এবং স্পর্শ-জ্ঞান প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। ক্ষত গুলিতে চক্ষোৎপত্তির হুচনা জন্মে। কুষ্ঠরোগে ইহার পাঁচ হইতে দশ বিদ্ধু মাঝার প্রতিদিন তিনবার ব্যবহৃত হয়। অত্যধিক বিষধর সর্পের দংশনেও বিষয় বলিয়া ইহার অতিশয় খ্যাতি আছে।









